



B 5

5

140

BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
FIRENZE

LIBRI

DONATI DAL

DOTTOR ANNIBALE GIULIONI

GIURISTA

Nato a Firenze il 7 Febbraio 1807
e morto il 1° Dicembre 1895 in Firenze.

16 Maggio 1896

127

monna 65.
depa
210221

62

incording 232

refu 129-

Sept 1911 9411

Ch 11

Inc 336

MEDICINA DOMESTICA

O S I A

TRATTATO COMPLETO

DI MEZZI SEMPLICI PER CONSERVARSI IN SALUTE
IMPEDIRE E RISANARE LE MALATTIE

OPERA UTILE

E ADATTATA ALL'INTELLIGENZA DI CIASCUNO

DI GUGLIELMO BUCHAN

MEDICO DEL COLLEGIO REALE DI MEDICINA
DI EDIMBOURG

TRADOTTA DALL'INGLESE E ARRICCHITA DI MOLTE
AGGIUNTE ED ANNOTAZIONI

DAL SIG. DUPLANIL

MEDICO DELLA UNIVERSITA' DI MONTPELLIER

EDIZIONE SECONDA ITALIANA RIVEDUTA, RICORRETTA
E NOTABILMENTE ACCRESCIUTA *SV* LA SETTIMA
DI LONDRA E LA QUARTA DI PARIGI.

T O M O II.



IN PADOVA, MDCCLXXXIX.
NELLA STAMPERIA DEL SEMINARIO

APRESSO TOMMASO BETTINELLI

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

Valetudo sustentatur notitia sui corporis ; & observatione , quæ res aut prodesse soleant , aut obesse ; & continentia in victu omni atque cultu , corporis tuendi causa ; & prætermittendis voluptatibus , &c. CICER. de Offic.

Omnes homines artem medicam nosse oportet : & ex his maxime eos , qui eruditionis ac eloquentiæ cognitionem habent . Nam sapientiæ cognitionem MEDICINÆ sororem ac contubernalem esse puto . Sapientia enim animam ab affectibus liberat : augescit autem intelligentia præsentē sanitate , cuius providentiā habere honestum est eos qui recte sentiunt . At ubi corporis habitus agrotat , neque mens ipsa alacritatem habet ad virtutis meditationem . Morbus enim præsens animam vehementer obscurat , intelligentiam ad affectionem per consensum ducens .

HIPPOCRATES . Lib. de Nat. Hom.

Ps 5. 5. 140



AVVERTIMENTO DEL TRADUTTORE FRANCESE

*Sopra il Prospetto de' Sintomi, ec., che precede
la Seconda Parte.*

* N *
* *
* *

 Oi collochiamo nel principio di questa Seconda Parte, come abbiamo fatto nelle precedenti Edizioni, il *Prospetto de' Sintomi*, che caratterizzano, e costituiscono le malattie generali interne, vale a dire quelle, che non avendo alcuna sede determinata; e non presentando d'una maniera evidente le cagioni che le anno prodotte, lasciano incerti sulla loro denominazione.

Noi diamo in oltre l'esposizione de' *sintomi* precursori, o forieri dell'altre malattie gravi, che anno benissimo una sede determinata, come quelle del *cervello*, del *petto*, dello *stomaco*, del *fegato*, della *pelle*, ec., ma che richiedono più o meno di giorni per rendersi palesi. Imperciocchè è provato dall'esperienza, e se ne resterà facilmente convinto dalla lettura di quest'Opera, che le malattie gravi anno dei giorni preparatorj, se è lecito di così esprimersi, durante i quali la Natura sembra sviluppare i *sintomi* caratteristici, che nel seguito costituiranno il morbo di tale, o tal'altra specie: e questi giorni preparatorj, più o meno numerosi, relativamente alla malattia che deve sopravvenire, presentano de' *sintomi* par-

ricolari, i quali sebbene leggieri, e che sembrano a bella prima di avere molta rassomiglianza tra loro, sono ciò non ostante capaci d'indicare sino a un certo segno, di qual genere sarà il male, da cui si viene minacciato.

Ora siccome dai soccorsi prestati nei principj dipendono in gran parte gli eventi nella cura de' mali in generale, e a più forte ragione in quella delle malattie pericolose; giacchè pure talvolta dallo prestarvisi sin dal momento dell' invasione si giunge a tanto di farle svanire nel loro nascere, o a prevenire gli accidenti, da cui sono accompagnate; ognuno comprende quanto fosse necessario di unire dentro un piccolo numero di pagine i caratteri essenziali, che annunziano anticipatamente un tale o tal altro morbo, ovvero che gli fanno avere tale o tal altro nome, allorchè egli è di già dichiarato o avanzato.

Di fatti col mezzo di questo *Prospetto* niente è più facile, che il distinguere la malattia, che si vuol riconoscere. Prendiamo per esempio una delle differenti specie di *febbri*, malattie le più moltiplicate, e per questa ragione le più intricanti: supponiamo, che l'infermo sia assalito dalla *febbre* chiamata *remittente*; la persona, che s'interessa a di lui pro, e che supponiamo eziandio che abbia già letto quest'Opera abbastanza, per non ingannarsi intorno i caratteri che distinguono le *febbri* da ogni altra malattia; questa persona, dico, dà di piglio al *Prospetto*; percorre ciaschedun Articolo; si arresta all'uno di quelli, alla testa del quale vede tra l'altre la voce, *febbre*; lo legge; confronta i *sintomi* ivi descritti con quelli, che presenta la malattia. Se non vi discopre verun rapporto, oltre passa ad un altro, innanzi al quale egualmente si trova la voce *febbre*, e da questo ad un altro ancora, sino che abbia riconosciuto, che il maggior numero de'

sopra il Prospetto de' Sintomi, ec. v
fenomeni sono simili e nella descrizione, e presso
il malato.

Imperciocchè non bisogna prendere sbaglio :
non si trovano giammai in un solo malato tutti
i *sintomi* descritti in ciaschedun Articolo del ma-
le . Due soggetti affaliti dalla stessa malattia non
presentano esattamente lo stesso numero di *sinto-
mi* ; ma esibiscono sempre quelli che si chiamano
essenziali o caratteristici di questo male ; e sicco-
me questi sono in generale i più rilevanti, poco
moltiplicati , è impossibile , per poco che vi si
presti di attenzione , di cadere in errore.

Secondo la nostra supposizione , questa persona
non sarà dunque obbligata di leggere, che nove
Articoli contenuti in nove o dieci pagine ; il che
non ricerca che alcuni minuti di lettura : laddo-
ve senza questa guida, avrebbe dovuto percorrere
nove Capitoli , che compongono presso che du-
gento pagine .

Se il malato è preso di *scorbuto* , non si avran-
no a leggere che venticinque o trenta pagine ;
mentre senza questo soccorso si avrebbe avuto a
scorrere ventotto Capitoli , che formano un vo-
lume e mezzo . Lo stesso si dica di tutte le altre
malattie .

Del resto noi non insisteremo di vantaggio sul-
la utilità di questo *Prospetto* : egli è bastantemen-
te giustificato dall'accoglimento che il Pubblico
s'è degnato di fargli . Diremo solamente di aver-
lo accresciuto di parecchi Articoli , segnatamen-
te di quelli, che trattano de' mali da noi aggiun-
ti a quelli che compongono questa Seconda Par-
te ; ed abbiamo esteso cadauno di cotesti Articoli
quanto ci è sembrato necessario , onde si possa
cogliere con facilità il vero carattere di ciascun
male .

Ognuno avvedesi , che non ci convenne di far
entrare in questo *Prospetto* la descrizione delle
malattie sintomatiche ; perchè i mali , di cui esse

no non formano che i *sintomi*, ci stanno descritti; nemmeno la narrazione de' mali locali, come quelli degli occhi, dell'orecchio, del naso, della bocca, della gola, delle mammelle, ec. avvenchè per quanto moltiplicate sieno coteste malattie, la sede che occupano non permette punto di prendere abbaglio. Non v'è, a cagione di esempio, chi vedendo gli occhi rossi, infiammati, o contaminati da macchie, da cateratta, ec. non pensi ben tosto che bisogna rintracciare cadauno di questi mali ne' Capitoli, che versano sulle *malattie degli occhi*, e dell'*organo della vista*. Lo stesso è parimente della *schinanzia*, o *infiammazione di gola*, e de' mali della *pelle*, come la *scabbia*, e le *volatiche*, ec. perchè queste si fanno abbastanza conoscere dalla sola ispezione, e perchè cercando nel Sommario de' Capitoli di ciaschedun Volume, il loro nome si offre da se stesso.

Neppure descriveremo in questo Prospetto i *sintomi* dell'*infreddatura*; delle differenti spezie di *zoffi*; delle *coliche*; della *diarrea*; delle *scorrenze di ventre*; del *vomito*; della *soppressione d'urina*; delle diverse spezie di *emorragie*, dell'*itterizia*; dell'*idropisia*; della *paralisi*; del *cancro*, ec. Sì fatte malattie non sono punto equivoche, e manifestano a bella prima il loro nome.

Quanto alle *malattie veneree*, alla *rabbia*, ec. è impossibile di non ravvisarle dalle cagioni che le anno prodotte: sarebbe dunque superfluo l'entrare nella stesa de' loro *sintomi*. Le malattie peculiari alle femmine e ai fanciulli sarebbero più imbarazzanti, se il Sig. BUCHAN non le avesse racchiuse dentro due Capitoli col titolo: *Malattie delle femmine*; *Malattie de' fanciulli*; il che le rende facilissime a ritrovare. I mali Chirurgici i più frequenti sono compresi in tre Capitoli, intitolati, della *Chirurgia*, o delle *malattie Chirurgiche*, e *conseguenze de' mali Chirurgici*.

Il nostro obbietto nell'offerire questo *Prospetto*, non è certamente di fomentare la pigrizia e la negligenza; al contrario rendiamo cadauno avvertito, che per ben intendere cotesta Opera, e per ritrarne un frutto reale, deesi leggerla e rileggerla con una sempre egualmente seria attenzione. Ma siccome è proprio solo d'un uomo, che si sia occupato pel corso di parecchi anni nella storia de' mali, di coglierne a dirittura il carattere e la natura, e che per quanta memoria supponga in una persona, che non se è fatto della Medicina la sua principale occupazione, non si può sperare, (malgrado la lettura replicata,) ch'ella abbia ad avere sempre presente allo spirito i rapporti e le differenze, che offre la maggior parte de' mali: abbiamo pensato, che questo *Prospetto* riuscirebbe a' nostri Lettori ciò, che fu altra volta a *Teseo* il filo di *Arianna*; che li assisterebbe a sortire dal labirinto, in cui si trova involta ogni persona, che non sia dell'Arte, dalla folla de' mali a' quali è esposto il genere umano; e che in oltre soccorrendo la loro memoria, diverrebbe una spezie di allettamento ad attrarneli; che fissarebbe d'una maniera più particolare la loro attenzione sopra degli oggetti della maggiore importanza, poichè niente meno si tratta in quest'Opera, che d'indurli a confluire alla loro propria conservazione e a quella de' loro simili.

Noi seguiremo in questo *Prospetto de' Sintomi* l'ordine de' Capitoli.

viti *Avvertimento del Traduttore, &c.*

N. B. I due primi Capitoli , che non trattano
di malattie propriamente dette , ma che contengono
de' precetti generali sopra tutte le malattie
e sopra le *febbri* , devono servire d' *introduzione*
a ciascheduno de' Capitoli susseguenti . Noi esor-
tiamo dunque il Lettore a leggerli unitamen-
te a quello , che tratta della malattia che vuole
conoscere , e di cui vuole intraprendere la
cura .



P R O S P E T T O

D E' S I N T O M I

Che caratterizzano , e costituiscono le malattie generali interne ; e gli altri mali gravi .

VOgliamo supporre , che una persona penetrata dallo spirito con cui quest'Opera è composta , cioè cercando di fare del bene ad un malato , senza rischiare di nuocerli ; o volendo invigilare sulla condotta sospetta di uno di quegli uomini , che si riscontrano troppo spesso , e che non si dicono dell'Arte che per disonorarla : noi supponiamo , dico , che cotesta persona desideri assicurarsi a bella prima del nome della malattia da cui è compreso questo malato , a fine di poter ricavare dal Capitolo che versa su questo male , i consigli de' quali si sente in bisogno per pervenire al suo scopo ; supponiamo ancora sì fatta persona istruita del valore della maggior parte dei segni , massimamente di quelli della fisonomia , della *respirazione* , del ventre , del *polso* : cognizioni di cui farà debitrice ad una iterata lettura di quest'Opera , e segnatamente della Seconda Parte .

Tutto ciò supposto , questa persona s'accosta al malato : esamina attentamente la positura , ch'ei tiene sul letto , il di lui colorito , gli occhi , la lingua , la *respirazione* ; gli tocca il ventre , il *polso* ; bel bello lo interroga lungamente ; raccoglie precisamente tutto ciò , che può dalla di lui bocca ricavarne ; si volge in seguito verso quelli che sono stati testimonj della prima invasione del male , o dei fenomeni ch'egli ha presentato , qualora siasi già da alquanti giorni che il male

X *Prospetto de' Sintomi*,
esista; e lo interroga di bel nuovo, e nella ma-
niera presso poco che lo abbiamo consigliato no-
ta 1, e 2, del Cap. I, Tom. II.

Febbri intermittenti.

Ora se rilevasi che la malattia ha cominciato da doglie di capo, di lombi, di reni, da una lassatezza in tutte le membra, da un senso di freddo all'estremità, da protendimenti, e da sbavigli, accompagnati da ansietà, da nausea, e talvolta da vomito; se quella persona intenda che a sì fatti sintomi sono susseguiti de' brividi, poscia un violento tremore; che subito dopo la pelle per lo avanti fredda e asciutta, è divenuta umidiccia; che il sudore, che in questi casi scorre abbondante, che l'orine, che sono rossiccie, del color dei mattoni, e che danno una posatura dello stesso colore, abbiano messo fine all'accesso; che co-testo accesso abbia avuto de' ricorsi più o meno frequenti; questa persona riconoscerà che la malattia è una *febbre intermittente*. Consulterà per tanto il Capitolo III, Tom. II, che le indicherà il *vitto* e i *rimedj* che convengono a questa specie di *febbre*.

Febbre cotidiana.

Se questi *sintomi*, o questo *accesso* rieda in ciascun giorno, si concluderà che questa è una *febbre intermittente cotidiana*, o semplicemente una *febbre cotidiana*.

Febbre terzana.

Se questi *sintomi* non ritornano che una volta in due giorni, o sia sul principio del terzo, in guisa che v'abbia un giorno interamente li-

che caratterizzano le malattie , ec. xi
bero , si conoscerà che questa è una febbre
terzana .

Febbre quartana.

Se non ritornano che a capo di tre giorni , o sia nell' ingresso del quarto , di maniera che passino due giorni interi senza febbre , si saprà che questa è una febbre quartana , e si ritroverà in questo stesso Capitolo III , il governo ch' esigono queste tre spezie di febbre intermittente .

Febbre continua acuta , o Febbre infiammatoria .

Se il malato provi subitamente un tremito o un freddo generale , susseguito ben tosto da gran calore , con *pulso pieno e frequentissimo* , doglia di testa , aridità ed ardore alla pelle , rossore negli occhi , se il colorito del volto è acceso , se sente doglia nel dorso e nei reni , con difficoltà di respiro , *ansietà* , propensione al vomito ; se querelasi d' una gran sete ; se rifiuta gli *alimenti* solidi ; se punto non dorme ; se la lingua umida da prima , diviene successivamente secca , ruvida , nera ; ec. se preso sia da delirio , da agitazione eccessiva , da oppressione di *petto* ; se abbia una *respirazione* laboriosa , de' *sussulti* nei *tendini* , il *singhiozzo* , del freddo all' *estremità* , de' *sudori viscosi* , uscita involontaria dell' *orine* , ec. si riconoscerà , che questo male si chiama *febbre continua acuta* , o *infiammatoria* , e se ne troverà il governo nel Capitolo IV , Tom. II.

Pleuride legittima .

Se si comprenda che la malattia s' è manifestata con de' brividi e tremori , susseguiti da calore , da sete , e da *vigilia* ; che poscia sia sopravvennu-

ta una doglia violenta e *pungitiva* in uno de' lati, e come talvolta accade, lungo tutta la *spina* del *dorso*, o verso il davanti del petto, o verso le spalle; se questo dolore è più acuto nel tempo dell' *inspirazione*; se il *polso* è *veloce* e *duro*; se le *orine* sono cariche di colore; se il *sangue* nello scodellino si copre d'una spezie di *cotenna*; se la *tosse* da prima secca, poco a poco si faccia umida; se gli *sputi* s'ispessiscano successivamente, e divengano *sanguigni*; *ec.* si ravviserà che questa è una *vera pleurisia*, e si leggerà il Capo V, §. I del Tom. II.

Pleuritide spuria:

Se la doglia laterale, di cui s'è fatto parola nell' Articolo precedente, è più all' esterno, e si fa sentire principalmente nei *muscoli* del *petto*; se la *tosse* è secca; se il *polso* è *veloce*, e se il malato prova difficoltà di giacere sul lato infermo; *sintomo* più comune nella falsa *pleurisia*, che nella *vera*; si leggerà il §. II di questo stesso Capitolo, il quale tratta della *pleuritide spuria*.

Parafrenitide:

Se il malato ha una *febbre* acutissima, accompagnata da un dolore violento nella *regione* del *diaframma*; se questo dolore s' aumenta nel tossire, nello starnutare, nel respirare, prendendo gli *alimenti*, scaricando il ventre, orinando, *ec.* se la *respirazione* è breve; se il malato respira dal ventre; se abbia il *singhiozzo*, del delirio, il *riso sardonico*, ch'è una spezie di smorfia, o sberleffe involontario, *ec.* si vedrà che questa è la *parafrenitide*, o sia *infiammazione* del *diaframma*, e si consulterà il §. III dello stesso Capitolo V.

Peripneumonia, o Fluxione di petto vera.

Se l'infermo abbia tutti i *sintomi* della *pleurisia legittima*, (Vedete qui sopra pag. xi.) eccetto che il *polso* sia più *molle*, e le *doglie* meno acute, ma che la *respirazione* sia più difficile, e l'*oppressione* di *petto* più grande; si saprà che questo male è una *peripneumonia vera*, la di cui cura si trova al Capo VI, §. I del Tomo II.

Peripneumonia falsa o Affezione catarrale di petto.

Se la malattia comincia con delle *alternative* di freddo e di caldo; se il *polso* è *piccolo* e *veloce*; e se il malato sente un peso sul petto; se la *respirazione* è difficile; se lagnasi di tempo in tempo di *doglia* di capo, accompagnata da *vertigine*; se le *orine* sono pallide, ec. questo male si chiama *Peripneumonia spuria*. Si consulerà il §. II dello stesso Capitolo VI.

Tifichezza.

Se il male si annunzia, come ordinariamente accade, per via di una *tosse* secca, che sovente continua per alquanti mesi, accompagnata da *svoigliatezze* e da *propensioni* al vomito dopo di aver mangiato; se il malato sente un calore superiore allo stato naturale; se abbia de' dolori e dell'*oppressione* di *petto*, segnatamente dopo di aver fatto un poco di moto; se gli *sputi* anno un sapore *falsugginoso*, e sono di spesso intrisi di sangue; se il malato è tristo, *melancolico*, e riarso da sete; se viziato è l'appetito; se il *polso* si fa sentire in generale *frequente*, *molle*, e *piccolo*, talvolta sufficientemente pieno, tal'altra duro;

se subito dopo gli *sputi* prendono una tinta verdastria, albiccia, o *sanguigna*; se il malato ha una *febbre etica* e de' *sudori colliquativi* che si succedono alternativamente, cioè gli uni verso la sera, e gli altri verso il mattino; se sia molestato da *scorrenza di ventre* e da *flusso eccessivo d'orine*; se prova un calore cocente nella palma delle mani; se le guancie si coprano d'un rosso carico dopo il cibo; se le dita si attenuino, le unghie divengano curve, i capelli cadano; se da ultimo sopravvenga una enfiagione ai piedi e alle gambe; se le forze si perdano totalmente; se gli occhi si facciano incavati, ec. all'apparato di tutti cotesti sintomi si riconoscerà la *tifichezza*, il di cui governo è descritto nel Cap. VII, §. I del Tom. II.

Atrofia, o Consunzione.

Se il malato insensibilmente incontri uno smagrimento ed estenuazione di tutto il corpo, senza grado notabile di *febbre*, senza *tosse*, senza difficoltà di respiro; se sia mancante affatto di appetito; se soffra delle *indigestioni* frequenti; de' *spessissimi* sfinimenti, ec. questo malato è preso dal male chiamato *atrofia*. Si leggerà il §. III dello stesso Cap. VII.

Febbre lenta o nervosa.

Qualora il malato abbia avuto per *sintomi* precursori, *abbattimento*, perdita d'appetito, indebolimento, lassatezza dopo il menomo movimento, *vigilie*, sospiri profondi, depressione di spirito: ec. se a questi *sintomi* succeda un *polsò piccolo*, e *frequente*, aridità di lingua, senza che l'infermo sia notabilmente assetato: se provi a vicenda de' freddi leggieri e delle incalescenze, che si manifestano dal rossore del volto; se a un tratto

si quereli di *vertigine*, di doglie di capo, di *nausee*, d'incitamenti al vomito; se il *polso* è *veloce*, e talvolta *intermittente*; se le *orine* sieno pallide, e rassomiglianti alla birra vappida; se l'infermo difficilmente respira; se abbia del *delirio*, o delle leggiere alienazioni di mente; se senta oppressione al *petto*, ec. se verso il nono, decimo, o duodecimo giorno la lingua si umetti, e gli *sputi* divengano copiosi; se appajano pel basso alcune leggiere *evacuazioni*, o un tenue umidore alla *pelle*; o se accada qualche *suppurazione* all'una o l'altra orecchia, o qualche *grassa pustola* sopra le labbra, sopra il naso; ec. se per lo contrario l'infermo verso lo stesso tempo del male abbia una *scorrenza* di *ventre* eccessiva; se provi de' *sudori colliquativi*, seguiti da frequenti *accessi* di *sincope*; se la lingua tremola; se l'estremità sono fredde; se il *polso* è formicante, o produce la sensazione d'un verme che striscia; se il malato ha de' *suffulti* nei *tendini*; se la vista e l'udito sono poco meno che estinti; se rende involontariamente gli escrementi, ec. si concluderà ch'egli è attaccato d'una *febbre lenta*, o *nervosa*, e si troverà al Cap. VIII del Tom. II, la maniera di trattare questo male.

Febbre putrida, maligna, petecchiale.

Se il malato parecchi giorni prima della malattia risenta una notevole debolezza, e delle lassèzze spontanee senza veruna causa apparente; s'egli è abbattuto; se sospira; se si perde d'animo; se sia colpito dal timor della morte; se alcuni giorni dopo sia molestato da *nausee*; se talvolta vomiti della *bile*; se abbia una violenta doglia di capo, accompagnata da *pulsazioni*, o da battimento nell'*arterie temporali*; se gli occhi appajano rossi, infiammati; se vi risenta del dolore sino nel fondo dell'orbite; se intenda un ronzio nell'orecchie; se la

respirazione sia laboriosa, e di spesso interrotta da sospiri; se si lagni di dolori nella regione dello stomaco, nel dorso, e nei reni; se la lingua bianca da prima, divenga nera e screpolata, ec. se i denti si coprano d'una crosta nericia; se talvolta il malato renda de' vermini pel di sopra e pel di sotto; se abbrividi, tremi, e mandi molta saliva; se il sangue estratto dalla vena appaja disciolto, o non abbia se non pochissima consistenza, e imputridisca prontamente; se le dejezioni, sempre fetidissime, sieno talvolta verdastre, talvolta nere, o rosleggianti; se la pelle si copra di macchie petecchiali livide, brune, nere; se il malato soffra dell'emorragie dagli occhi, dal naso, dalla bocca; ec. se il polso sia piccolo, veloce e duro, talvolta floscio e depresso, sovente intermittente; se la pelle è secca, arida, infocata, e talora fredda e viscosa; se verso il quarto o quinto giorno si manifesta una scorranza leggiera di ventre, accompagnata da un leggero calore e da un sudore moderato, sintomi favorevoli del male; se al contrario appaja in quest'epoca una diarrea eccessiva, col ventre duro ed enfiato; delle macchie larghe, nere, livide sopra la pelle, dell'asfe nella bocca, de' sudori freddi e viscosi, la gotta-serena, il cangiamento di voce, la vista smarrita, la difficoltà d'inghiottire, il tremito della lingua e l'impossibilità di trarla fuori di bocca; se l'infermo abbia una propensione costante a scoprirsi il petto; se in fine il sudore e la scialiva sieno tinte di sangue, le orine nere, ec. non vi avrà dubbio che si fatto male non sia una febbre putrida, maligna, o petecchiale, e si consulterà il Cap. IX del Tom. II.

Febbre miliare.

Se il male si annunzia per via d'un *brivido* leggiero, suffeguito da calore, da debolezza e da sospiri; se il *polsò* è *piccolo e frequente*, accompagnato da difficoltà di respirare, da *ansietà*, da oppressione di *petto*, da *piccola tosse*, da agitazione, da *delirio*; se la lingua è bianca; se le mani tremolano, sebbene sieno talora infocate; se ad una femmina dopo il parto, oltre tutti i *sintomi* precedenti, il *latte* si devia, e si sopprimono i *flussi*; se il malato prova sulla pelle un *pizzicore* e delle trafitture simili a quelle che cagionano le punture de' spilli; se verso il terzo o quarto giorno si manifestano delle *pastiolette* innumerevoli, rosse, o biancastre, seguite dalla diminuzione de' *sintomi* precedenti; da un *sudore* che ha un odor particolare di *putrescenza*, e dal ritorno dell' *evacuazioni* sopresse; se verso il sesto o settimo giorno queste *pustole* cominciano a seccarsi e a cadere, locchè viene accompagnato da un assai spiacevole prurito alla *pelle*; se altre fiatte elleno appajono e spariscono a vicenda, o mai più compariscono di nuovo, il che indica un grande pericolo; se, oltre la maggior parte di questi *sintomi*, le *pustole* presso le femmine, che sono di parto, si riempiono alla prima d'un'acqua chiara, che diviene ben tosto gialla, e se sono talvolta frammischiate da altre *pustole* rosse; ec. a sì fatti caratteri si riconoscerà la *febbre miliare essenziale*, e se ne cercherà il governo al Cap. X del Tom. II.

Febbre remittente.

Se il malato comincia dal provare de' sbavigli, de' protendimenti, delle doglie di testa, delle *vertigini*, e dell'alternative di freddo e di caldo; se

sente dolore alla *regione dello stomaco*, accompagnato alcune volte da gonfiezza; se la lingua è bianca; se la *pelle* e gli occhi appaiono gialli; se il malato vomita della *bile*; se il *polso*, che radamente è *pieno*, si fa talvolta sentire un poco *duro*; se v'abbia o *stitichezza* eccessiva, o *notabile scorrenza di ventre*; se tutti cotesti *sintomi*, e una infinità d'altri ch'è impossibile di descrivere, perchè talora sono quelli della *febbre biliosa*, talora della *febbre nervosa*, tal'altra volta della *febbre maligna*, e alle volte ancora di mano in mano si succedono presso lo stesso soggetto; qualora, dico, tutti questi *sintomi* anno delle *remissioni* notabili, vale a dire de' tempi, in cui sieno infinitamente meno violenti, senza per altro disparire interamente; e se il regresso loro violento viene a cadere dentro ad ore o a giornate *periodiche*, presso poco come gli *accessi* delle *febbri intermittenti*, ec. questa malattia si nomina *febbre remittente*. Si troverà al Cap. XI del Tom. II. la cura che le conviene.

Vajuolo.

Se un fanciullo, o un adulto di lieto ch'era, diviene tristo e indifferente; o ch'ei sia allegro, di tristo ch'era per lo innanzi; se sia assopito, assetato, senza appetito alcuno pegli *alimenti* solidi; se dolgasi di lassatezza; se sudì, per poco che faccia di movimento; se cotesto disagio di salute duri due o tre giorni, e che il terzo o quarto giorno vi succedano delle vicende di freddo e di caldo, primamente leggiero, ma che tosto prendono della intensità, e sono ben tosto accompagnate da doglie di *reni* e di testa, da *vomiti*, o almeno da propensioni al vomito; se il *polso* è *veloce*, la *pelle* infocata; se il malato non dorme; se quando è assopito, prova una specie di ribrezzo seguito da *scorimento* improvviso, *sin-*

che caratterizzano le malattie, ec. XIX

stomo ordinario della vicina *eruzione*; e se il malato, essendo fanciullo tenerissimo, è sorpreso da *convulsioni*, ec. si presentirà, ch'egli va incontro all'attacco del *vajuolo*, le *pustole* del quale cominciano a comparire ordinariamente nel quarto giorno: noi ci arrestiamo a questa descrizione del preludio, perchè non v'ha persona che non conosca il *vajuolo*, dacchè l'*eruzione* si sia manifestata. Si vedrà nel Cap. XII del Tom. II, come debbasi curare cotesto male.

Rosolia.

Se il malato prova delle alternative di freddo e di caldo, accompagnate da mal stare e da perdita di appetito; se la lingua è bianca, ma per l'ordinario umida; se v'abbia una piccola *tosse* secca e *breve*, la quale però talvolta non si dichiara che dopo l'*eruzione*; se si senta pesante il capo; se gli occhi sieno infiammati, lagrimosi, e d'una sensibilità estrema, in guisa che non possano essere esposti alla luce senza soffrire; se il malato abbia uno scorrimento di lagrime acrisime, e di serosità dalle narici; se de' dolori nel *petto*; se, come avviene talvolta, vomiti, o *scorrenza* di *ventre*; se essendo fanciullo, renda egli delle *feccie* verdastre; qualora si lamenti di prurito alla *pelle*; se sia inquieto, mesto; se sparga sangue dal naso; se verso il quarto giorno, delle taccherelle simili alle morcicature delle pulci si mostrino da prima sulla fronte, sul volto, di là sul *petto*, da ultimo sull'*estremità*; se queste macchie restino superficiali, e se terminino col cadere in piccole scaglie, laddove quelle del *vajuolo* divengono de' *tubercoletti* che suppurano, ec. si riconoscerà la *rosolia*, di cui il governo sta descritto al Cap. XIII del Tom. II.

Febbre scarlattina benigna.

Se la malattia comincia con delle vicende di freddo e caldo, senza un notevole disagio della persona; se la pelle si copre di macchie rosse più larghe, più cariche, e meno uniformi che nella *rosolia*; se queste macchie durano due, o tre giorni, e poscia spariscono; se dopo che sono svanite, la *cuticola*, o sia l'*epidermo* si sgretola e cada in iscaglie; questa malattia s'appella *febbre scarlattina benigna*.

Febbre scarlattina maligna.

Ma se avendo cominciato da freddo, ribrezzo, abbattimento, da universale sconcerto, e da una grande *oppressione* di petto, vi sia susseguito un calore eccessivo, delle *nausee*, del vomito, ec. se il polso sia frequente, ma piccolo e depresso; se la *respirazione* è anelosa, difficile; se la pelle è infocata, senza essere affatto asciutta; se la lingua è umida e bianca; se in fine l'*eruzione* non apporta verun sollievo, ec. ella si chiama *febbre scarlattina maligna*. Si troverà il governo di queste due specie di *febbre scarlattina* al Cap. XIV.

Febbre biliosa.

Se ai *sintomi* della *febbre continua acuta*, o se a quelli delle *febbri intermittenti*, parimenti a quelli della *febbre remittente*, si congiunga una *evacuazione* copiosa di *bile* pel di sopra e pel di sotto, ec. questo male si nomina *febbre biliosa*, per cui si consulterà il Cap. XV del Tom. II.

Risipola.

Se i primi *sintomi* del male sono stati *brividi*, *fete*, *debolezza*, *doglie di capo* o nel collo, *caldo*, *vigilia*, *polso frequente*, talvolta vomito, e sovente *delirio*; qualora verso il secondo, terzo o quarto giorno una qualsivisa parte del corpo è divenuta gonfia, rossa, e s'è coperta di *pustolette*, locchè in generale scaccia là febbre; se questa *eruzione*, ch'è d'un rosso vivace, biancheggia al tatto, vale a dire se appoggiando il dito sopra una delle porzioni infiammate, il luogo premuto dal dito resta segnato di bianco per alcuni istanti, dopo de' quali ritorna rosso al pari di prima, carattere essenziale di questa *malattia*; si concluderà che il malato è attaccato da *risipola*, e se ne ricercherà la cura nel Cap. XVI del Tom. II.

Frenitide, o infiammazione del cervello.

Se la malattia si annunzi da dolori di capo, rossori negli occhi, e sul viso, da sonno interrotto o totalmente mancante, da grande aridità di pelle, stitichezza, ritenzione d'urina, leggiero gocciolamento di sangue dalle narici, tintinnio d'orecchie, e da una irritabilità estrema nel *sistema nervoso*; se a tutti questi *sintomi* vi si aggiungano quelli della *febbre infiammatoria*, o *continua acuta gravissima*; se in oltre il polso è talvolta *debole*, *irregolare*, *formicante*, e tal'altra *duro e ristretto*; se l'*udito* sia delicatissimo, di maniera che il malato senta con singolare squisitezza, *sintomo* caratteristico di questo male, ma che non è di lunga durata; se il battimento delle *arterie* del collo e delle *tempie* è sensibilissimo, altro *sintomo* egualmente comune a questo male; se la lingua è nericia, e secca senza se-

te, e con ripugnanza per la bevanda; se lo spirito del malato non sia occupato che degli oggetti che lo avevano colpito immediatamente avanti della sua malattia; se immerso nel più profondo silenzio, sembra sortirne tutto ad un tratto, e divenire furioso; se il delirio è continuo, in guisa che ora il malato sbalzi fuori del letto, ora schiamazzi, canti, pianga, e che i suoi discorsi sieno senza ordine, come anco le sue risposte; se i suoi occhi sieno d'una mobilità singolare; se gli tremolino le mani, se l'orine sieno sopresse, o bianche, ec. questo male si chiama *frenitide* o *infiammazione del cervello*. Se ne troverà il governo al Cap. XVII del Tom. II.

Infiammazione dello stomaco.

Se il malato abbia un dolore stabile, e un calore cocente nella *regione dello stomaco*; se delle veglie, e dell'*ansietà*; se il *pulso* è piccolo, frequente e duro; se vomiti, o soffra delle *nausee* e de' mali di cuore; se abbia una sete eccessiva; se respiri difficilmente; se abbia de' *sudori freddi colliquativi*, e talvolta delle *convulsioni* e delle *fiacchezze*; se lo *stomaco* è gonfio, e sembra duro al tatto; se il malato prova un senso doloroso tutte le volte, che prende della bevanda o degli *alimenti*, massimamente se queste bevande o questi *alimenti* sono troppo caldi o troppo freddi, *sintomi* caratteristici di questo male, ec. in tal caso si saprà, che l'infermo è assalito da una *infiammazione di stomaco*, di cui la cura stà descritta nel Cap. XXI, §. I del Tom. II.

Infiammazione del basso ventre, o Passione iliaca, Volvulo, ec.

Se a de' *sintomi* presso poco simili a quelli, che abbiamo or' ora esposti nell' Articolo prece-

che caratterizzano le malattie, ec. XXIII
 dente , si congiunga un dolore più stabile e più acuto , situato verso il *bellico* ; se il ventre è stretto come da una corda ; se la stitichezza è costante , il *polso frequente* , *piccolo* , depresso , mancante , la sete inestinguibile , e il calore grandissimo ; se allorchè la malattia prende una buona piega , i dolori cangiano di luogo ; se i vomiti non si risvegliano , che a qualche intervallo ; se i *clisteri* si rendano pel di sotto : se al contrario , allorchè ella è pericolosa , il malato vomita i *clisteri* e le *materie fecali* ; se trovasi estremamente debole ; se il polso è *piccolo* , *tremulo* e *formicante* ; se l'alito riesce spiacevole e puzzolente ; se i *sudori* sono *viscosi* , le *dejezioni* nere e fetide , ec. questa malattia si appella *infiammazione del basso ventre* , o *passione iliaca* , *volvulo* , ec. Bisogna consultare il §. II del medesimo Cap. XXI.

Infiammazione dei reni , o Nefritide .

Se il malato sente un dolore acuto ne' *reni* e nel dorso , accompagnato da *febbre* , da intormentimento , o da dolore sordo nella coscia del lato affetto , e da ritiramento de' *testicoli* ; se il dolore è gravativo , e corrisponde alla terza *costa* contando dal basso , e a tre dita trasverse dalla *spina* del *dorso* ; se l'*orina* , ch'è da prima chiara , diviene in seguito rossa , e nel più acuto del male pallida o cruenta , sortendo con difficoltà , con ardore , e in iscarsissima quantità per volta , restando di spesso onninamente soppressa ; se soffre molto nel camminare , o nel tenersi rizzato in piedi ; se si corichi più agevolmente sul lato infermo , che sull'altro ; se abbia de' sforzi di vomitare , e se vomiti durante l'*accesso* , il quale non dura talvolta che alcune ore , e altre volte uno o due giorni , e poi si termina col flusso dell'*orine* o colla sortita del *calcolo* , ec. questa ma-

Prospetto de' Sintomi,
lattia si denomina *infiammazione dei reni*, o *nefritide*. Se ne troverà il governo al §. IV. dello stesso Cap. XXI.

Infiammazione della vescica.

Se il malato senta un dolore acutissimo nella parte inferiore del ventre; se provi difficoltà d'orinare, accompagnata da un poco di *febbre*, da voglie continue di votare il ventre, e di mandar fuori l'*orine*; se nel premere il ventre, si senta un *tumore ovale*, situato nella regione ipogastrica, e doloroso in proporzione che si preme; se subito dopo sopravvenga una *disuria*, una *iscuria*, una *febbre continua*, che sieno seguite da *vigilia*, da *sete*, e da *delirio*; se l'*estremità* divengano fredde; se il malato abbia costantemente restio il ventre, ec. si chiama questa malattia *infiammazione di vescica*, di cui si tratta nel §. V di questo stesso Cap. XXI.

Infiammazione del fegato, o sia Colica epatica.

Se il malato prova una tensione dolorosa sul fianco destro sotto le *coste spurie*, accompagnata da un poco di *febbre*, da un sentimento di peso in questa parte, da difficoltà di respirare, da noia pegli *alimenti*, da *sete ardente*, ec. se gli occhi e la *pelle* del malato anno una tinta gialla o pallida, *sintomo* essenziale di questo morbo; e che lo distingue dall'*infiammazione della pleura*, de' *muscoli del basso ventre*, ec. questa malattia è una *infiammazione del fegato*, la quale, allorchè la parte convessa di questo *viscere* è malata, produce un dolore più acuto, un *pulso* più *veloce*, e cagiona sovente una *tosse secca* e il *singhiozzo*: il dolore in tal caso si stende sino alla spalla, l'infermo soffre della difficoltà di coricarsi sul fianco

che caratterizzano le malattie, ec. xxv
sinistro, ec. Se ne troverà la cura nel §. VI del medesimo Cap. XXI.

Morbo-collera.

Se il malato sia di repente molestato da calore ardente nello stomaco; e ne' intestini, da rutti acidi, da flati, da doglie intestinali; se tali sintomi sieno seguiti da vomiti eccessivi, e da evacuazioni copiose pel di sotto, da bile verde, gialla, e nera, accompagnata da tensione nello stomaco e da dolori di ventre; se queste evacuazioni assai ripetute ed abbondanti facciano smagrire il malato a vista d'occhio, in guisa che in tre o quattr'ore egli spesso più non si ravvisi; se il polso è velocissimo; ineguale; se sia tormentato da una sete ardente; se senta una doglia acutissima verso il bellico; se in seguito il polso si abbassi, e sovente a segno di divenire presso che impercettibile; se l'estremità si rendano fredde; se un sudor freddo si spanda su tutto il corpo; se l'orine si sopprimano; se il malato abbia delle palpitazioni di cuore, un violento singhiozzo, de' sfinimenti, delle convulsioni, ec. egli è assalito dal così detto morbo-collera. Consultate il Cap. XXII, §. I del Tom. II.

Diabete, o Evacuazione eccessiva d'urina.

Se il malato evacui più d'urina di quello ingoja di liquido, senza provare nei primi tempi molto incomodo; se le sue orine sieno chiare, pallide, e d'un dolce scipito, o d'un odore più o meno spiacevole; se abbia una sete ardente e continua, accompagnata da un po' di febbre, che lo consumi insensibilmente; se la bocca sia asciutta; se renda incessantemente degli sputi schiumosi; se le forze sieno abbattute, l'appetito si perda, la buona salute svanisca in guisa, che il malato in bre-

ve non abbia più che la pelle e le ossa; se provi del calore negl'intestini e nei lombi; se la coglia e i piedi si gonfino, ec. questa malattia s'appella *diabete*, o *evacuazione eccessiva d'orine*. Consultate il Cap. XXIII, §. I del Tom. II.

Incontinenza d'orina.

Se le *orine* scolino involontariamente, e goccia a goccia, senza eccedere la quantità ordinaria, e senza che il malato provi d'altronde de' grandi incomodi, ec. si dà a questo male il nome d'*incontinenza d'orina*, di cui parimenti si troverà il governo al Cap. XXIII, §. II.

Renella.

Se il malato ha de' dolori nei lombi, e delle svogliatezze; se vomita; se *orina sangue*, come accade tal fiata, ec. questi *sintomi* annunziano la *renella*, o de' *calcoli* che sono fitti nei reni. Ma se questi *sintomi* aumentano d'intensità; se i dolori s'avanzano alle parti vicine della *vesfica*, se la gamba e la coscia del lato infermo sono intormentite; se i *testicoli* si ritirano in alto; se si sopprimono le *orine*, ec. essi annunziano, che i *calcoli* sono fortiti dai reni, e che sono impegnati negli *ureteri*.

Pietra.

Se il malato provi de' dolori nell'orinare, e sì prima che dopo di avere orinato; se l'*orina* non sorta che goccia a goccia; se altre volte ella s'arresti repentinamente nell'istante che sortiva a pieno sgorge; se il malato senta un dolore acuto nel collo della *vesfica* dopo aver fatto del moto, massimamente dopo essere stato a cavallo o in carrozza sopra una strada scoscesa; se le *orine* de-

che caratterizzano le malattie, ec. XXVII
pongano un *sedimento* bianco, denso, abbondante di cattivo odore, *mucofo*, ec. se l'infermo provi un solletico alle parti genitali, che l'obblighi a portarvi incessantemente le mani; se abbia delle voglie di scaricare il ventre nello stesso istante dell'orinare; se orini più agevolmente stando sdraiato, che rizzato sui piedi; se nel rendere l'ultime goccioline d'orina provi un dolore acuto, seguito da un moto *convulsivo*, ec. egli apparisce aggravato dalla *pietra*. Consultate il Cap. XXIV del Tom. II, per questa e per la precedente malattia.

*Flusso di sangue, Dissenteria, o Flusso
dissenterico.*

Se la malattia si annunzia da *scorrenza* di ventre, accompagnata da dolori violenti negl'intestini e da voglie perpetue di scaricare il ventre; qualora il malato renda negl'*scarichi* del sangue in più o meno quantità; abbia de'*brividi*, una *prostrazione* di forze, un *pulso* minuto, una *sete ardente*, e delle propensioni al vomito; se la lingua diventi secca, coperta da viscida bava, e segnata di screpolature; se si formino delle *afte* nella bocca; se, come succede talvolta, il malato abbia de'*vomiti* strabocchevoli, ed altre volte la pelle sia gremita di macchie *porporine*; se sopraggiunga il *singhiozzo*, delle convulsioni, ed altri *sintomi* di *febbre putrida*, *maligna*, ec. se gli *scarichi* sieno da prima crassi e schiumosi; se tosto si facciano intrisi di sangue, e che alla fine rassomiglino al puro sangue, meschiato di piccoli filamenti, che rappresentano delle rasure di carne; se il malato mandi talvolta fuori de'*vermini* sia pel alto, sia pel basso; se scaricando il ventre senta un gran peso verso il podice, come se tutti gl'intestini volessero sortire al di fuori, ec. bisogna concludere, ch'egli abbia la *dissenteria*,

Flusso epatico.

Se il malato manchi da qualche tempo di appetito; se abbia la bocca di cattivo sapore; se renda de' *flati*, e se l'orine sieno cariche di bile; se la *regione del fegato* sia più o meno addolorata, e che il malato vi senta talvolta della tensione; se la *pellè* sia d'un giallo citrino, e sovente d'un giallo carico, se abbiasi della tosse, della difficoltà di respiro; se cogli *scarichi* egli mandi fuori del *sangue*, e, come accade qualche volta, ne goccioli dal naso, ovvero egli ne getti cogli sputi, o per altra via; se tutti sì fatti *sintomi* si manifestano, segnatamente in seguito dell'*itterizia*, dell'*infiammazione*, o di altre malattie del *fegato*, essi caratterizzano il male appellato *flusso epatico*, di cui si troverà parimente la cura al Cap. XXV, §. VII, Art. II.

Flusso mesenterico e Morbo negro.

Se agli *sintomi* della *dissenteria* e del *flusso epatico*, descritti nell'Articolo precedente, si congiungano delle *evacuazioni più sanguigne* d'assai; se allora questo *sangue* abbondantissimo sia puro, rubicondissimo, o vermiglio, e senza odore puzzolente, questo male si appella *flusso mesenterico*; se altre volte ei sia nero, corrotto, fetido, ecc. se si dà il nome di *morbo negro*. Vedete il §. VII, del Cap. XXV, Art. III.

Lienteria.

Se a una parte dei *sintomi* della *dissenteria* si congiunga una inappetenza estrema, oppure una specie di fame canina, abbattimento, debolezza, *orina* più o meno fecciosa, e in poca copia, se

che caratterizzano le malattie; ec. XXIX
gli *scarichi* in vece d'essere sanguigni, non sieno composti che di alimenti poco mutati, o che non abbiano provato punto di *digestione* sensibile, ec. questa malattia è quella che si chiama *lienteria*.

Passione o Flusso celiaco.

Se la maggior parte di questi medesimi *sintomi* della *dissenteria* sono accompagnati da nausea, da tutti *acidi*, da sete, da dolore ai *lombi*, e spesso da febbre; se l'*orine* sono torbide o poco abbondanti; se in fine le *fecce*, in luogo d'essere come nella *dissenteria* e nella *lienteria*, sieno biancastre, grigie, *chilose*, il che appalesa che gli *alimenti* anno soggiaciuto ad una prima *digestione*, ec. sì fatto male si appella *passione o flusso celiaco*, per cui, come anco per la *lienteria*, bisogna leggere il Cap. XXV, §. VIII.

Vermini.

Se il malato abbia ora pallido il volto, ora d'un rosso notabile; se provi prurito alle narici, (*sintomo* per altro assai equivoco, massimamente presso i fanciulli, che si stropicciano il naso in tutte le malattie;) se quando il malato è coricato, digrigna i denti; se il labro superiore si gonfi; se l'appetito sia talvolta mancante, e tal'altra vorace; se abbiavi *scorrenza di ventre*, l'alito acido, fetido, il ventre duro, gonfio, una sete ardente; se l'*orine* sieno schiumose, e tal fiata d'un colore biancastro; se l'infermo abbia de' dolori di ventre, di *colica*, una *salivazione* involontaria, segnatamente nel tempo del sonno, e de' dolori frequenti nel fianco, con una *tosse* secca, un *pulso* *ineguale*, delle *palpitazioni di cuore*, de' *deliquj*, de' sudori freddi, la *paralisi*a, degli *accessi epiletici*; se provi un solleticamento, o *stiratura nella gola*, o che gli appaja sentire un

corpo mobile, che gli ascenda dallo stomaco verso il gozzo, ec. egli ha de' vermini. Si consulterà il Cap. XXX del Tom. III, che tratta delle diverse specie di vermini.

Gotta regolare.

Se il malato soffra delle *indigestioni*; se sia abbattuto; se mandi fuori de' *flati*; se abbia delle doglie di capo, delle debolezze, e de' *vomiti*; se si lagni di lassatezza, di *prostrazione* di forze; se provi dolore nei *lombi*; se gli sembri sentire dell' *aria* o dell'acqua fredda a scorrere lungheffo la coscia, ec. tutti sì fatti *sintomi* annunziano, che un *accesso* di *gotta* stà sul punto di manifestarsi; se non vi si presti rimedio, uno o due giorni prima che l' *accesso* si dichiari, l'appetito aumenta d'una maniera sensibilissima, il malato sente de' leggieri dolori nell'orinare, e tutti i *sintomi* che abbiamo descritto nel principio di questo Articolo, prendono maggior forza e vigore; finalmente se verso le due o tre ore della mattina, il malato è tutto ad un tratto assalito da dolore ad una delle *estremità*; se questo dolore è accompagnato da *ribrezzo* e da qualche grado di *febbre*; se aumentandosi e fissandosi sulla parte inferma, il malato prova al tempo stesso de' dolori d'ogni maniera; se gli sembra di bruciarsi, di essere stracciato; se la parte malata diviene stranamente sensibile; se cotesti dolori avendo durato venti quattr'ore, scemano insensibilmente d'intensità; se la parte s'intumidisca, divenga rossa, e si copra di umidezza; tutti cotesti *sintomi* caratterizzano un *accesso* di *gotta*, che reiterato forma ciò che appellasi un *attacco*. Consultate il Cap. XXXIII, §. I del Tom. III.

che caratterizzano le malattie, ec. XXXI

Gotta irregolare, o salita al capo.

Se un uomo soggetto alla *gotta*, o che n'abbia poc' anzi sofferto un *attacco*, prova una cessazione istantanea de' dolori nella parte inferma, e sente nel tempo stesso delle *doglie* di *testa* violenta, accompagnate da assopimento, da *vertigine*, da convulsioni, *delirio*, ec. ovvero se abbia de' dolori eccessivi d' *orecchie* e di *denti*; se si appalesi una *ottalmia*, de' tremori, l' *apoplessia*, la *paralisi*a, ec. cotesti *sintomi* indicano che la *gotta* è salita al capo.

Gotta salita al petto.

Se nello stesso caso sopravvenga al malato un' *oppressione eccessiva* di *petto*, con *tosse* e difficoltà di *respiro*, la *schianzia*, degl' *ingorghi infiammatori*, lo *sputo di sangue*, l' *asma*, dell' *ansietà*, la *sincopa*, ec. cotesti *sintomi* annunziano che la *gotta* è salita al *petto*.

Gotta salita allo stomaco.

Ovvero se il malato provi delle *svogliatezze*; se *vomiti*; se abbia delle *ansietà*; se senta una *doglia* nella *regione* dello *stomaco*; se cada in una gran *debolezza*, ec. questi *sintomi* fan conoscere che la *gotta* è risalita allo *stomaco*.

Gotta salita nel basso ventre o nei reni.

Finalmente se il malato, sempre nella medesima circostanza, prova la *cardialgia*, l'ardore, e il dolore il più acuto nello *stomaco*, la *colica*, la *nefritide*, delle *nausee*, ec. se abbia del vomito; se la *diarrea* o *dissenteria*; se l' *orine*, come succede talvolta, depongano un *sedimento*

geffoso; se il malato senta della irritazione nei reni, e de' dolori rassomiglianti a quelli della renella; se i vecchi gottosi provino uno stringimento agl'ipocondri, ai fianchi, e dei dolori abituali nei visceri, ec. questi *sintomi* indicano che la gotta è negl'intestini, nel basso ventre, o nei reni. Si consulterà per questi quattro Articoli il §. II dello stesso Cap. XXXIII.

Reumatismo infiammatorio, o acuto.

Se il malato comincia dal provare delle lassiezze, de' brividi, *vigilia*, *feto*, ec. in corto dire la maggior parte degli altri *sintomi* delle febbri; se in seguito si quereli di doglie vaganti, che crescono ad ogni menomo movimento, e divengono eccessivamente acute; se sì fatti dolori si fissino nei membri alle articolazioni mobili, le quali divengono sovente gonfie e infiammate; se la febbre, che accompagna cotesti *sintomi*, sia remittente, avendo li suoi raddoppiamenti ordinati a guisa di quotidiana; a tali caratteri si ravviserà il reumatismo infiammatorio o acuto, e se ne troverà la cura nel Cap. XXXIV del Tom. III.

Scorbuto.

Se la malattia comincia da lassiezze straordinarie, anche nel sortire dal letto, con un peso nel petto, difficoltà di respiro, massime dopo il moto; se il malato abbia le gengive tumide, violacee, spiccianti sangue al menomo sfregamento, il fiato fetido, frequenti perdite di sangue dal naso, una specie di crepito, che sentesi di tanto in tanto nelle articolazioni, una difficoltà a camminare; se talvolta le gambe si gonfino; se altre volte dimagrino; se si manifestino delle macchie livide, gialle, violacee, nere sopra le gambe, e qualche volta sopra le braccia, ec. tutti questi *sintomi*

che caratterizzano le malattie, ec. XXXII.
tomi annunziano un vizio scorbutico, che darà luogo ai più grandi accidenti, se non si metta di buon' ora ostacolo al suo ingrandimento. Imperocchè qualora sopravvenga al malato la putrefazione delle gengive, e dei denti, delle emorragie, o delle effusioni di sangue da differenti parti del corpo, e delle ulcere pertinaci, de' dolori in tutto il corpo, segnatamente nel petto, alcune eruzioni secche, scagliose, ec. egli ha lo scorbutico confermato, che termina sovente con una febbre tifica, con una dissenteria, una diarrea, idropisia, paralisi, ovvero con una cancrena di qualcheduno degl' intestini. Leggete il Cap. XXXV, §. I del Tom. III.

Flussione scorbutica.

Se il malato ha la bocca presso poco contaminata come nella *salivazione mercuriale*; se le *glandule* salivari sono più o meno gonfie e addolorate; se le gengive e i denti sono coperti da una specie di *sanie* biancastra; se l' alito è fetido, le gengive gonfie e dolorose, mandando facilmente del sangue; se queste si *ulcerino* talvolta; se allorchè questa *flussione* è forte, sopravvenga nell' interiore delle labbra, delle guancie, e sugli orli della lingua, dell' *asse ulcerate*, che incomodano queste parti, nella stessa guisa che succede nella *salivazione mercuriale*; se cotesta *salivazione* diviene copiosissima, e i dolori considerabili; se alla fine la *febbre*, e una veglia proporzionata ai dolori e all'abbondanza della *salivazione*, si congiunga a tutti questi *sintomi*; si riconoscerà la *flussione scorbutica*, di cui la cura è descritta nel §. II dello stesso Cap. XXXV.

Scrofole.

Se il malato comincia ad avere ingorgate le *glandule* al di sotto del mento e al di dentro l'orecchie; se sì fatte *glandule* s'induriscano; se crescano di numero e di grossezza, fino che alla fine formino un ampio *tumore* duro, che resta talvolta un tempo assai considerabile prima che si apra; se allorchè siasi aperto, mandi una *sanie* chiara o un umore acquoso; se si scoprino delle simili durezza sotto le *ascelle*, nelle *anguinaglie*, sopra i piedi, le mani, il petto; ec. se il ventre è duro; se vi si sentano le stesse durezza a cagione dell'ingorgo delle *glandule* del *mesenterio*, del *fegato*, della *milza*, ec. se il naso e il labbro superiore sono gonfi, segnatamente presso i fanciulli, che d'altra parte sono più sottoposti a questo male, ec. si concluderà, ch'egli abbia le *scrofole*, e si consulterà il Cap. XXXVI del Tom. III.

Astma.

Se il malato ha la respirazione laboriosa e precipitosamente accelerata, accompagnata per l'ordinario da certo strepito che rassomiglia al sibilo; *respirazione* ch'è talvolta sì malagevole, che l'infermo è obbligato di tenerli in una positura dritta, altrimenti sarebbe in pericolo di soffocarsi; se questa difficoltà di respirare inforge in generale dopo che il malato è stato esposto a un vento freddo di levante, o ad un'aria densa e grave, o dopo d'esserli bagnato, o finalmente dopo essere rimasto lungo tempo in un luogo umido, questo malato è *asmatico*; e se egli provi delle lassezze, delle *vigilie*; se abbia della raucedine, della *tosse*; se renda de' *fiati* per l'alto,

che caratterizzano le malattie, ec. xxxv
 accompagnati da un senso di peso sul *petto*, da una grande difficoltà di respirare, ec. cotesti *simptomi*, che aumentano d'intensità verso la sera, annunziano l'avvicinamento dell'*accesso*, che si dichiara alcune ore dopo il pranzo, o circa due ore dopo la mezza notte, per via di calore, di *febbre*, dolori di testa, *svogliatezze*, incitamenti al vomito, grande *oppressione* al *petto*, *palpitazioni* di cuore, *polsi deboli*, e talvolta *intermittente*, lacrimazione involontaria, *vomiti biliosi*, ec. e che termina a capo di alquante ore, talvolta alla fine di due o tre giorni, con un flusso di *urina* colorate e che anno della posatura. Leggete il Cap. XXXIX del Tom. III.

Apoplessia.

Se taluno in età avanzata abbia degli offuscamenti di vista, de' dolori di testa fissi e pertinaci, de' sfordimenti, de' torpori di membra, delle *vertigini*, uno scemamento rapido di memoria, delle momentanee alienazioni di mente, delle spezie di ottenebramento di spirito, una emorragia dal naso, ec. egli dee temere l'*apoplessia*, il di cui avvicinamento è ancora più certo, se la *vertigine* è continua; se la perdita di memoria diviene totale; se prova degli assopimenti, un ronzio nell'orecchie, l'*incubo*, un corso involontario di lagrime, una *respirazione faticosa*, il tremore delle labbra, ec. in fine se il malato non ha più nè sentimento, nè movimento, in guisa che si prenderebbe per morto, se il cuore e il *palmone* non continuassero ad agire; se russa; se non può inghiottire; egli si trova attaccato da *apoplessia*.

Apoplessia sanguigna.

Se il malato essendo nell'attacco, abbia la tinta florida, il viso pieno e gonfio, le vene e le arterie, massimamente quelle del collo e delle tempie, tumide di sangue, il polso forte e duro, gli occhi prominenti e immobili; se la respirazione è difficile, e si eseguisce con una specie di romore; se le urine e gli escrementi sortano involontariamente; se il malato talvolta vomita, ec. egli è travagliato da *apoplessia sanguigna*.

Apoplessia sierosa, o pituitosa.

Ma se il polso è piccolo, ineguale, e intermitte; se la tinta del malato, in vece d'essere vivace, è pallida e livida; se la respirazione è, come accade talvolta, più oppressa che nell'*apoplessia sanguigna*; se il rantolo è più forte, l'infermo ha una *apoplessia sierosa*. Veggasi per questi tre Articoli il Cap. XL del Tom. III.

Cardialgia.

Se l'infermo prova una sensazione di calore ardente, e un dolore assai violento verso l'orifizio superiore dello stomaco, accompagnato talora da ansietà, da nausea, e da vomiti, ec. egli ha il male chiamato *cardialgia*.

Pirofi o sia Ardore di stomaco.

Se questo dolore diviene mordicante, cocente, ei s'appella *pirofi* o *ardore di stomaco*, ch'è talora accompagnato da vomiti enormi, e da palpitazioni di cuore, da difficoltà di respiro, da brividi, da sudori freddi, da raffreddamento dell'estremità,

che caratterizzano le malattie, ec. XXXVII
da *iscuria* o *soppressione d'urina*, da *convulsioni*,
da *paralisi*; ec. Leggete il Cap. XLIV del Tom.
III.

Vapori o Mali de' nervi.

Se il malato prova un distendimento; o una gonfiezza di *stomaco* e degl' *intestini*, cagionata da *flati*; se l'appetito e le *digestioni* sono abitualmente depravate; sebbene accada talvolta che l'appetito sia insaziabile, e le *digestioni* prontissime; se gli *alimenti* inacidiscano dentro allo *stomaco*; se il malato vomita dell'acqua chiara, delle *flemme* dense, o un liquore nerastro simile alla *posatura del caffè*; se soffra sovente de' dolori atroci verso il *bellico*, accompagnati da *flati* o da *borboglio* nelle budella; se il ventre sia alcuna volta aperto, ma più di sovente chiuso, il che cagiona de' *flati*, del disagio della persona, ec. se l'*urine* sieno talvolta in piccola quantità, e altre siate abbondanti e chiarissime; se il malato senta uno stringimento al *petto*, delle difficoltà di *respiro*, delle *palpitazioni* di *cuore*, talvolta delle vampe improvvisi di calore in diverse parti del corpo, e alle volte un senso di freddo simile a quello che cagionerebbe dell'acqua fredda versata sopra queste parti; se abbia de' dolori nel dorso, nel ventre, rassomiglianti a quelli prodotti dalla *renella*; se il *pulso* irregolarissimo sia talora più lento del solito, e talora più *veloce*; se il malato abbia de' sbavigli, il *singhiozzo*, de' sospiri frequenti, se si senta soffocare come da un peso, o da un globo che salisse dal basso all'alto, e gli premesse il *petto*; se rida e pianga a vicenda; se il sonno sia interrotto dall'*incubo*; se a misura che la malattia s'avanza, il malato provi delle doglie di capo, de' granchi, de' dolori *fittici* in differenti parti del corpo; se gli occhi si os-

fuschino; se sieno sovente addolorati; se l'orecchie susurrino; se l'udito s'indebolisca; se in fine tutte le *funzioni animali* sieno viziate; se l'infermo abbia la mente turbata; se sia precipitoso, e agitato da' pensieri molesti, spaventevoli; se sia inquieto, se si spaventi per ogni menomo motivo; se sia diffidente, ec. se prenda diletto delle idee le più capricciose; se abbia le fantasie le più stravaganti; se la memoria gli svanisca, come pure la ragione gli manchi; se abbia un timore perpetuo della morte; se sia pieno di rammarico, impaziente, correndo incessantemente da un Medico all'altro, ec. tutti questi *sintomi*, e un numero infinito d'altri consimili, (imperciocchè sarebbe impossibile di descriverli tutti,) indicano, che l'infermo è sopraffatto dalla triste e affannosa malattia, appellata *vapori*, *malattia nervosa*, o *malattia vaporosa*. Consultate il Cap. XLV del Tom. III.

Melanconia, Follia, o Mania.

Se una persona è paurosa, di cattivo umore, brigosa, pretendente, impazientandosi per il menomo motivo, talora avara, tal'altra prodiga; se sia soggetta a de' timori panici, a delle offuscazioni di vista, a de' stordimenti; se getti delle lagrime senza ragione; se il suo sonno è laborioso e accompagnato da sogni spaventosi; se si quereli di dolore, di peso alla testa, di susurro nell'orecchie; se abbia dei tremori, delle convulsioni, dell'affopimento, delle *palpitazioni di cuore*, de' stringimenti di *petto*, dell'*ansietà*, e de' dolori sordi all'orifizio superiore dello *stomaco*; se abbia il ventre ordinariamente stitico; se l'*orine* sieno chiare e in piccola quantità; se abbia lo *stomaco* e gl'*intestini* gonfi da *flati*, manifestandosi per via di rutti e di flatuosità; se renda de' sputi densi;

che caratterizzano le malattie, ec. XXXIX
 se abbia il sembiante pallido, il polso piccolo e debole; se le funzioni dell'anima sieno talmente alterate, ch'essa s'immagini sovente d'essere morta o cangiata in qualche altro animale; se si dia altre volte a credere che il suo corpo sia trasmutato in vetro, o in altre sostanze così fragili, in guisa che non osi fare il menomo movimento pel timore di frangerlo, ec. ella è una *malattia nervosa*, chiamata *malinconia*. Consultate il §. II dello stesso Cap. XLV.

Epilessia, o Mal. caduco.

Se il malato ha delle lasserezze straordinarie, de' dolori di testa, delle gravezze, degli abbagliamenti, accompagnati da ronzio negli orecchi, da debolezza di vista, da *palpitazione di cuore*, *vigilia*, difficoltà di respiro, *flati negl'intestini*, ec. se l'*orine* sono copiose, ma chiare; se il malato è pallido; se l'*estremità* sono fredde; se prova di spesso una sensazione simile a quella che cagionerebbe un'aria fredda, che ascendesse dai piè alla testa, o una spezie di solleticamento; se sia triste; se monti facilmente in collera; se i suoi occhi sieno lagrimosi, gonfi, come pure le palpebre; se abbia de' sogni spaventevoli, o un sonno assai agitato, de' dolori nel petto, o de' sconcerti di stomaco, ec. tutti cotesti *sintomi* sono segni forieri dell'*epilessia*, e se abbiano un certo grado d'intensità, annunziano che l'*accesso* è sul punto di sorprendere. Questo *accesso* si manifesta per via de' *sintomi* seguenti: gli occhi s'aggirano, il malato dimenasi, manda schiuma dalla bocca, le braccia, e le gambe si contorcono, i pollici si curvano e si accostano al cavo della mano, il *seme*, l'*orina*, le *feccie* sortono involontariamente; il malato è affatto privo de' sensi e di ragione, ec. dopo l'*accesso*, riprende poco a poco il sentimen-

XL *Prospetto de' Sintomi*,
to, si lagna d'una specie d'intormentimento, di
lasschezza, di doglie di capo, non ha alcuna remi-
niscenza di ciò, che gli è accaduto durante l'*ac-
cessi*, ec. Leggete il §. IV dello stesso Cap. XLV.

Danza di S. Vito.

Se gli *accessi convulsivi*, da cui il malato è af-
fetto, sono accompagnati da movimenti violenti,
da gesti, da agitazioni, da salti precipitosi e ri-
dicoli, ec. si concluderà, ch'egli ha il male,
chiamato *danza di S. Vito*, e si consulterà il §.
V dello stesso Cap. XLV.

Incubo.

Se il malato in tempo di notte s'immagina di
provare una oppressione considerabile, o di sen-
tire un peso enorme sul *petto* e sopra lo *stomaco*,
da cui non può liberarsene; se affatto addormenta-
to manda de' gemiti; se alle volte grida altamen-
te, sebbene spesso faccia de' sforzi vani per par-
lare; se talora gli sembri di trovarsi impegnato
in qualche zuffa; e che il timor della morte por-
tandolo a voler fuggire, si senta arrestato; se al-
tre volte si creda essere in una casa che sia in fiam-
me, o nel procinto di cadere in un fiume, e che
la tema di bruciarsi o di annegarsi lo svegli su-
bitamente, ec. egli ha la malattia nervosa, ap-
pellata *incubo*. Consultate il §. VIII dello stesso
Cap. XLV.

Affezione isterica.

Se la malata, poichè questo male è particola-
re alle femmine, cade in *accessi* frequenti di de-
bolezza o di *sincope*, che differisce dalla *sincope*
ordinaria, in quanto ch'ella non è accompagnata

né da pallore di volto ; né da sudori freddi , e che dura molto più a lungo ; poichè se né sono vedute persistere pel corso di parecchi giorni ; se in questo stato ella perda la conoscenza , e che la respirazione sia tanto debole che appena si renda sensibile , perciocchè non appanna punto lo specchio , e non agita la fiamma d'un lume che si presenti alle narici ; se la freschezza del corpo sia tale che faccia supporre la malata morta ; se in altre circostanze l'inferma cada in una specie di oppressione , o se provi delle convulsioni violente , poco differenti dall'epiletiche ; se questi accessi sieno proceduti talora da freddo nelle estremità ; da prostradimenti , da sbavigli , prostrazione di forze , oppressione , ansietà , ec. e talora da un sentimento somigliante a quello che cagionerebbe una palla , che rotolasse nel basso ventre e che ascendesse verso lo stomaco , dove ella suscita un gonfiamento , delle svogliatezze , e talvolta il vomito , ec. in seguito verso la gola , dove cagiona una specie di soffocazione , alla quale succede una respirazione precipitosa ; delle palpitazioni di cuore , delle vertigini , l'indebolimento della vista , la perdita dell'udito , e de' movimenti convulsivi nell'estremità e in altre parti del corpo , del basso ventre , i quali si sollevano talvolta stranamente , ec. una tal femmina è molestata dalla malattia nervosa , chiamata affezione o passione isterica . Leggete il §. XII dello stesso Cap. XLV.

Affezione ipocondriaca .

Se il malato soggiace presso poco ai medesimi sintomi che caratterizzano l'affezione isterica , ma in un grado meno violento e generalmente più ostinato ; se durante l'accesso , il malato prova una

strozzamento alla faringe ed all' esofago, che impedisca l'inghiottire; delle *convulsioni*, tremori, e intormentimento di tutte le parti, palpitazione de' *muscoli*, *singhiozzo*, sbavigli, distendimenti, ec. se fuori dell' *accesso*, oltre i *flatì*, l' infermo risenta altresì de' dolori violenti nello *stomaco*, la *cardialgia*, una gonfiezza considerabile negl' ipocondri e in tutto il *basso ventre*, con de' dolori de' visceri; se provi ora una fame canina, ed ora dell' avversione al cibo; se l' *orine* sieno albiccie, abbondanti, avendo talvolta l' aspetto della birra, o la negrezza dell' inchiostro; se abbia delle voglie frequenti di evacuarle, e se le getti sovente con dell' ardore; se non possa prender sonno, o se ne venga interrotto spiacevolmente; se questo sonno sia alle volte molesto, in guisa che il malato abborrisca il letto; se abbia de' timori panici; se sia triste; se *melanconico*, e molto pauroso intorno il suo stato, in guisa che la sua immaginazione si turbi, ec. egli è affediato dalla *malattia nervosa*, nominata *affezione ipocondriaca*. Consultate il §. XIII dello stesso Capitolo XLV.

*Ostruzioni e Tumori scirrofi nel petto
e nel basso ventre.*

Se il malato prova in una parte qualunque del corpo, segnatamente in quelle che contengono delle *viscere glandulose*, come il *petto* e il *basso ventre*, un sentimento di dolore, di peso, e di pressione; sensazione ch' s' aumenta e diviene più dolorosa, allorchè vi si porta la mano per toccare questa parte; se scoprafi dell' *elevatezza* in questa stessa parte, particolarmente quando la sede del male è nel ventre, con del pal-

che caratterizzano le malattie, ec. XLIII
lore e tumidezza di volto e de' piedi ; se v'abbia della *tosse* , e se la *respirazione* sia oppressa , il che indica che questi è o il *polmone* , o il *fegato* , o la *milza* , che sono tocchi ; se il malato abbia dell' *inappetenza* , delle *digestioni* difficili , de' *rutti* , e delle gonfiezze di *stomaco* ; se abbia la bocca asciutta e impastricciata ; se si trovi oppresso , e se non può dormire ; di più se il *polso* sia sempre *febbrile* ; se si osservino delle *remissioni* di *febbre* dopo il pasto ; se il malato sia il più sovente travagliato da *scorrenza di ventre* , e se renda delle *orine* scolorate ; si concluderà , ch'egli ha delle *ostruzioni* o de' *tumori scirrofi* nel *petto* o nel *basso ventre* .

Ostruzioni nella Faringe e nell' Esofago .

Se ad una parte de' predetti *sintomi* si unisca una difficoltà d' *inghiottire* , ciò indica , che la *faringe* e l' *esofago* sono attaccati .

Ostruzioni nel Polmone .

Se questi stessi *sintomi* sieno accompagnati da *oppressione di petto* , in questo caso annunziano le *ostruzioni nel polmone* .

Ostruzioni nel Fegato .

Se a certo numero di cotesti *sintomi* si accoppi l' *isterizia* , ella indica l' *ostruzione del fegato* .

Ostruzioni nella Milza .

Se in queste circostanze sopravvengano la maggior parte dei segni dello *scorbuto* e la tensione dell' *ipocondrio sinistro* , si concluderà che l' *ostruzione* è nella *milza* .

Ostruzioni nel Mesenterio:

Se nello stesso caso si manifesti l'*atrofia* e una *scoprenza di ventre* pertinace, massime presso i fanciulli, ciò indica le *ostruzioni del mesenterio*.

Ostruzioni nello Stomaco, Piloro, e Pancreas.

Se sì fatti *sintomi* sieno accompagnati da vomito abituale, lo stomaco, il piloro, e il pancreas sono quelli che patiscono *ostruzione*.

Ostruzioni nel canale intestinale.

Se finalmente ad una parte de' *sintomi* soprammentovati si congiunga la *passione iliaca*, e una *dissenteria* ostinata, le *ostruzioni* sono nel *canale intestinale*. Consultate per queste differenti sedi di *ostruzioni* e *tumori scirrosi* il Cap. XLVII, §. I del Tom. III.

Avvelenamento cagionato dall' Arsenico.

Se una persona qualunque, per ogni riguardo nella più perfetta salute, s'abbatta di provare tutto a un tratto una grande oppressione, accompagnata da calore, da dolore occulto nello stomaco e negl' intestini, e da una sete eccessiva, con propensione al vomito; se la lingua e le fauci diven-

che caratterizzano le malattie, ec. XLV
gano aspre ed asciutte; se cada in *ansietà* eccessi-
ve, accompagnate da *singhiozzo*, da *sincopa*, e da
un freddo sensibile all'*estremità*; se a tutti costetti
sintomi succedano de' vomiti strabocchevoli di ma-
teria nera, de' sudori freddi, delle angoscie; se in
questi primi istanti il ventre s'appiana e si ri-
stringe; se il *pulso* è piccolo, ristretto, e concen-
trato, come accade ne' vivi dolori de' visceri; se
poco dopo succedano delle *evacuazioni* violente pel
basso di maniera fetida, delle *sincopi*, delle *lipo-*
timie, delle tensioni di basso ventre, la *cancrena*
dello stomaco e degl' *intestini*, *sintomi* forieri di
morte, si riguarderà questa persona come avvele-
nata dall'*arsenico*, e si consulerà il Cap. XLVIII,
§. II, Art. I del Tom. III.

Avvelenamento cagionato dal Verde rame.

Se una persona, che gode della miglior salute,
si trova dopo un pasto provare alla forcella del
petto un senso di dolore assai vivo, a cui succeda-
no delle doglie di stomaco e d' *intestini*; se vomiti
ciò che ha mangiato; se poscia rigetti molta
bile densa e rugginosa, con degli sforzi e delle an-
goscie eccessive; se il basso ventre s'appiani, per
la contrazione *spasmodica* de' muscoli di questa re-
gione; se l'*estremità* tanto superiori, come infe-
riori sieno di spesso agitate da movimenti *convul-*
sivi, accompagnati da dolori acutissimi; se que-
sto malato si lamenti di tintinnio d'orecchi, e di
doglie violente di capo; se gli sopravvengano
in fine degli svanimenti, de' sudori freddi, il *sin-*
ghiozzo convulsivo, ec. questa persona è avvelena-
ta dal verde rame. Si consulerà l' Articolo III
del §. II dello stesso Cap. XLVIII.

*Avvelenamento cagionato dal Piombo
e sue preparazioni.*

Se il malato prova la maggior parte de' *sintomi della colica nervosa*, o de' *Pittori*, vale a dire, se comincia dal sentire de' dolori vaghi nel ventre, delle inquietudini, de' tremiti *convulsivi*; se patisce di *stitichezza*, de' dolori di *stomaco*, de' vomiti; se i dolori del ventre aumentano in poco tempo, e si fissano al *bellico*, ch'è ritirato e incavato; se questo dolore diviene in fine sì vivo, che il malato si rimena sul letto, gettando grida altissime; se in questo tempo le *orine* e gli escrementi sono ritenuti; se l'orifizio dell' *ano* sembra rientrato e chiuso ermeticamente; se sopraggiungono delle *convulsioni*, la perdita della vista e della voce, degli *accessi epilettici*, ec. se l'estremità inferiori si rendono *paralitiche*; se le dita s'incurvano, ec. finalmente se i dolori divengono sì terribili, che il malato vi soccomba, egli è stato avvelenato dal *piombo*, o dalle sue preparazioni. Vedete l'Articolo IV del §. II dello stesso Cap. XLVIII.

*Avvelenamento cagionato dalle Canterelle
prese internamente.*

Se il malato sente corrodersi tutte le parti del suo corpo, dalla bocca sino alla *vesfica*; se il suo fiato è puzzolente; se rende le *orine* con difficoltà, meschiate di *sangue*; se orina del *sangue* schietto; se evacua per secesso delle materie simili a quelle che si rendono nella *dissenteria*; se ben tosto incontra delle *sincopi* frequenti, delle *vertigini*, il *priapismo*, delle *perdite di sangue* per l' *ano* ec. egli è avvelenato dalle *canterelle* prese internamente. Vedete l'Art. V del §. II dello stesso Cap. XLVIII.

che caratterizzano le malattie, ec. XLVII

*Avvelenamento cagionato dagli Animali
velenosi.*

L'avvelenamento cagionato dalla morsicatura degli animali arrabbiati, dal morso delle *vipere*, de' *serpenti*, degli *aspidi*, e degl' insetti velenosi, anno delle cagioni troppo evidenti, onde non temere d'ingannarsi sulla natura dei loro effetti. Noi crediamo dunque dovere dispensarsi dal descriverne i *sintomi*; che d'altra parte si troveranno al §. III dello stesso Cap. XLVIII.

*Avvelenamento cagionato dai veleni
vegetabili.*

Se oltre il calore cocente e i dolori vivi dello stomaco e degl' *intestini*, cagionati dai *veleni minerali*, il malato provi eziandio delle *vertigini* fino a certo grado, dello stupore, dell' assopimento, ec. egli è stato avvelenato con de' *veleni* della classe de' *vegetabili velenosi*. Consultate il §. IV dello stesso Cap. XLVIII.

Avvelenamento cagionato dall' Oppio.

Se il malato si trova in un assopimento considerabile, con intormentimento, *stupore*, e tutti gli altri *sintomi* dell' *apoplessia*; o se abbia del riso smodato, della fiacchezza nelle membra, dell' alienazione di mente; se la vista sia offuscata; se il viso rosso; se v'abbia del rilassamento nelle mascelle, della gonfiezza nelle labbra, dell' oppresione di respiro, delle *nausee*, de' *vomiti*, delle *convulsioni*, delle *sincopi*, de' *sudori freddi*, ec. egli è avvelenato dall' *oppio* preso in troppa dose. Si consulerà l' Articolo I del §. IV dello stesso Cap. XLVIII.

Avvelenamento cagionato dalla Cicuta.

Se una persona dopo aver mangiato sia in *alimento*, sia a caso in un giardino, o per viaggio, ec. d' una pianta simile al *prezzemolo* per le foglie, e alla *pastinaca* per la radice, senta un intormentimento talvolta subitaneo; se subito dopo si manifesti la *vertigine*, l' offuscamento della vista, il *delirio*, la perdita di cognizione, delle *convulsioni*, il vomito, il *singhiozzo*, l' ardore e il dolore degl' intestini, la gonfiezza della *regione epigastrica*, gocciolamento di sangue dall' orecchie, schiuma alla bocca, ec. questa persona è stata avvelenata dalla *cicuta*. Si consulterà l' Art. II del §. IV dello stesso Cap. XLVIII.





MEDICINA DOMESTICA

PARTE SECONDA.

Delle Malattie.

CAPITOLO PRIMO.

Osservazioni generali sopra la cognizione e la cura de' mali.

***A cognizione de' mali non dipende tanto
* dai principj *teoretici* della Medicina, quan-
* L * to alcune persone se l'immaginano: ella
* * non è che il risultato dell'osservazione e
*** dell'esperienza.

Coll'assistere ai malati, mediante l'osservazione di tutti i fenomeni, che presentano le loro malattie, si può pervenire ad un grado abbastanza completo di cognizione, e sul carattere dei loro *sintomi*, e sull'uso dei rimedj ch'esse esigono. Così gl'Infermieri periti, e le persone che stanno incessantemente d'attorno a' malati, conoscono di sovente meglio le malattie, che coloro che anno studiato per divenire Medici.

Tuttavolta non pretendiamo per alcun modo d'insinuare, che lo studio della Medicina sia inutile: non è permesso di dubitare della sua importanza; ma la *teoria* di questa scienza non potrà giammai supplire alle veci dell'osservazione e dell'esperienza, che non si può acquistare se non per via della pratica.

La Medicina non è fondata, che sopra l'osservazione e l'esperienza.

Cosa bisogna fare per acquistare la cognizione de' mali.

Non vi si può pervenire se non mediante la pratica della Medicina.

Sotto qual
aspetto bi-
sogna con-
siderare u-
na malat-
tia.

Ragioni,
che anno
dettato il
piano, che
l'Autore se-
gue in que-
sta seconda
Parte.

Ogni malattia può essere considerata come una u-
nione di *sintomi*: dunque solo dai *sintomi*, che offronsi
costantemente, e nella maniera la più evidente, ella
deve essere caratterizzata.

Così in luogo di disporre le malattie per classi, se-
condo il metodo sistematico, conviene ben meglio al
piano d' un Opera di questa natura, il dare la de-
scrizione chiara ed esatta di ciascheduna malattia in
particolare, a misura ch' ella si presenta; avendo per
altro avvertenza di riferire le circostanze, nelle qua-
li certi *sintomi* d' una malattia anno della rassomi-
glianza a quelli d' un altra, e di descrivere al tem-
po stesso i sintomi particolari e caratteristici, da
quali cotesta malattia può essere distinta da tutte
l' altre.

Se a questi obbietti si presti l' attenzione che me-
ritano, si troverà, che la cognizione d' un male non
è tanto difficile ad acquistarsi, quanto s' è portati a
crederlo a prima vista.

§. 1.

*Del governo generale de' mali relativamente all' età, al
sesso, alla costituzione, al carattere, all' aria, agli
alimenti, alle occupazioni, ec. del malato.*

Prima in-
tenzione
che bisogna
avere pres-
so d' un
malato.

Osservaremo da prima, ch' è di massima impor-
tanza l' usare somma attenzione all' età, al ses-
so, alla *costituzione*, al carattere dell' infermo. S' i fat-
ta avvertenza servirà singolarmente a discoprire la
natura del morbo, e conseguentemente a far cono-
scere il governo che gli conviene.

Le malat-
tie de' fan-
ciulli e de'
vecchi di-
versificano
essenzial-
mente tra
esse. Per-
chè?

Nell' infanzia le fibre sono molli e deboli; i *nervi*
sono estremamente irritabili; i *fluidi* sottilissimi:
nell' età avanzata al contrario le *fibre* sono rigide; i
nervi poco meno che insensibili, e il maggior nume-
ro de' *vasi* ostrutti. Queste, ed altre simili particola-
rità rendono le malattie de' fanciulli e de' vecchi
differentissime: elleno in conseguenza esigono un me-
todo differente di cura.

Le femmi-
ne anno
delle ma-

Le femmine sono soggette a molte malattie, che
non affliggono gli uomini. Di più il *genere nervoso*

essendo in esse molto più irritabile che presso gli uomini, le loro malattie ricercano di essere maneggiate con maggiori cautele. D'altra parte le femmine sono meno atte a sopportare delle grandi *evacuazioni*, e ogni *rimedio* irritante non può loro somministrarsi senza grande circospezione.

lattie, che gli uomini non anno, e ricercano d'essere trattate con più di precauzione.

La differenza delle *costituzioni* rende non solamente gl'individui suscettibili delle malattie che loro sono proprie, ma ancora richiede della varietà nella maniera di trattarle. A cagione d'esempio una persona delicata, di cui i nervi sono deboli, e che ordinariamente vive ritirata, non può essere, qualunque sia il morbo ch'essa abbia, precisamente curata della stessa maniera, come quella, ch'è forte, robusta, e che s'è incessantemente esposta all'*aria* aperta.

Una persona delicata esige un governo differente da quello d'una forte e robusta.

Devesi parimente consultare con la maggiore diligenza il carattere del malato, nel governo de' mali. Un carattere mesto, timido, inquieto, o impaziente produce de' mali, e li aggrava.

Bisogna conoscere il carattere del malato.

In vano porgonsi de' *rimedj* al corpo per sanare le malattie dello spirito. Allora quando l'anima è afflitta, il miglior mezzo è di blandire le passioni; di allontanare dallo spirito i pensieri crucciosi, e di mantenere il malato in uno stato tanto tranquillo, e tanto aggradevole, quanto sia mai possibile.

Perchè?

Si dee altresì averè attenzione al luogo in cui il malato soggiorna; all'*aria* ch'ei respira; al suo *vitto*; alle sue occupazioni, ec. Coloro, che dimorano in luoghi bassi e di maremma, sono soggetti a molti mali sconosciuti dagli abitanti delle montagne: coloro che respirano l'*aria* impura delle Città, ne soffrono parimente parecchi che sono assolutamente stranieri ai venturosi abitatori delle campagne.

Perchè bisogna usare attenzione all'aria, che il malato respira?

Le persone che si nutricano d'*alimenti* grossolani, che abusano nel bere de' *liquori spiritosi*, sono sottoposti a de' mali, cui non soggiacciono quelle che sono sobrie e temperanti, ec.

Agli alimenti, ch'egli usa?

Abbiamo già fatto osservare, che le diverse occupazioni degli uomini, e la loro maniera differente di vivere, li dispongono a delle malattie che loro sono particolari. (Vedi. il Cap. II. della Prima Par-

Alle di lui occupazioni, alla sua maniera di vivere, ec.

4 *Parte Seconda, Cap. I. §. II.*
 te.) E dunque necessario d'interrogare il malato su questi differenti punti importanti: quindi si scoprirà non solo il vero carattere della malattia, ma ancora la maniera, con cui bisogna diportarsi nel suo governo: poichè sarebbe una somma imprudenza il trattare gli operaj nella stessa maniera, come gli uomini sedentari, ancorchè si suppongano attaccati dallo stesso male.

§. II.

Cosa bisogna fare prima di mettersi a curare una malattia.

Bisogna assicurarsi della natura della malattia, del tempo da cui ella dura, e di ciò che l'ha prodotta.

IMporta il cercare di conoscere se la malattia sia *costituzionale*, o *accidentale*; (se semplice, o complicata; *essenziale*, o *sintomatica*): da quanto tempo sia ch'essa duri: se proceda da un cangiamento notevole e subitaneo del *visto*, della condotta, ec. (1).

Perchè?

(1) Questi precetti sono di massima importanza. Una malattia *costituzionale* si guarisce difficilmente, mentre quella, che non è che *accidentale*, cede più facilmente ai rimedj appropriati e bene amministrati. Lo stesso è della malattia semplice, paragonata a quella ch'è complicata d'una o di parecchie altre malattie.

Quanto alle malattie *sintomatiche*, non si possono guarire se non si rimonti alla sorgente; ch'è quanto a dire, se non si cominci dal guarire quella, di cui questa non è che un *sintomo*. Si può altresì dire che in generale, quando una malattia non cede ad un governo diretto a tenore delle leggi della sana dottrina, v'è ogni motivo di presumere ch'ella dipenda da un vizio occulto, che bisogna scoprire, attaccare, e distruggere qualora egli ne sia suscettibile. Si vedranno parecchi esempi di questa specie di malattie nel corso di quest'Opera, segnatamente nel Cap. XX, §. II, Art. IV, e Cap. XXII, §. III, e IV. ec.

Del resto quest'ultimo precetto è uno di quelli che più generalmente si seguono: la sua importanza è stata intesa da tutto il mondo; e non v'è quasi alcuno di coloro che s'intermettono nell'ufficio di Medico, che non interroghi il malato su questo proposito. Ma il punto essenziale è di sapere la verità; e ci sono tante persone, che pur si compiacciono a mascherarla!

Di più bisogna assicurarsi dello stato del ventre e dell'altre evacuazioni: della maniera, con cui si ele-

Conviene assicurarsi delle eva-

Quanti sforzi non si fanno tutto giorno per inorpellare, ed esibire sotto un diverso aspetto le malattie lunghe, o croniche; segnatamente quelle che il morbo venereo ha cagionato, o che da esso mantengono! Non è però che il libertinaggio non abbia talmente comune questa malattia, sicchè nella maggior parte delle Città non sia attualmente la facilità, con cui se ne fa da certuni la confessione, in ragione direttamente opposta della ostinata ritrosia, da cui sono mosse le persone di sentimenti delicati ad occultare per fino i menomi indizj, che potrebbero indurre a farnela sospettare.

Quanto si è esposto ad esser ingannato nelle relazioni, che gl' infermi fanno delle loro malattie.

Ma s'incontrano parimente di questi ultimi nelle stesse Capitali; e ciò basta, onde esortare coloro che si destinano al sollievo dell'afflitta umanità, sia per mestiere, sia per inclinazione, di non fidarsi sempre interamente delle relazioni de' malati; ma d'interrogarne altresì i parenti, gli amici, tutti coloro che ne anno qualche interesse, e che lo conoscono, a fine di raccogliere il più ch'è possibile di fatti acconci a svelare il carattere del male, da cui è compreso.

Uopo è dunque di consultare non solo il malato, ma quelli eziandio che gli stanno d'attorno.

Si fatte ricerche serviranno di più a confermare ciò che l'infermo avrà liberamente confessato, o a far rigettare ciò ch'egli avrà avanzato di contrario alle apparenze e ai sintomi attuali della sua malattia. Imperciocchè trovasi un'altra classe di malati, e questa classe è assai numerosa, che si persuadono d'essere infetti d'una malattia stabile e permanente, che dicono di avere o ereditata da' loro genitori, o acquistata fin da tempi rimoti, e che riguardano come la cagione di tutte quelle che loro sopravvengono, per poco che queste ultime resistano ai rimedj.

Quante non sono, a cagione d'esempio, le femmine, le quali vogliono, che tutte l'indisposizioni, o malattie, che soffrono, sieno dipendenti dal latte deviato e sparso! Quante altre mai non vogliono tutte attribuirle ai nervi! e sventuratamente trovano da per tutto de' cerretani, che le mantengono nelle loro opinioni prestandovi la loro approvazione; i quali di spesso eziandio creano sì fatte opinioni per guadagnarci certa confidenza, di cui abusano d'una maniera la più crudele; opprimendo di rimedj coteste sciagurate, che precipitano in un diluvio di mali, perchè loro non somministrano giammai che de' rimedj contrarj alla loro situazione. (Vedi Cap. VIII, nota 3, di questo Vol. e Cap. XXXVI, nota 7, del Tom. III.)

Sarebbe un non venire più a capo, se volessimo entrare nel minuto ragguaglio delle differenti maniere di pensare degli uomini nello stato del male, e sopra le loro malattie. Gli

Differenti maniere di pensare degli uomini

esazioni, guisceno le funzioni vitali e animali, come la respirazione, la digestione, ec. Devesi in fine domandare al malato quali sono le malattie, cui è stato maggiormente soggetto, e quali i rimedj che gli sono stati i più salutari. Bisogna altresì chiedergli quale specie di *medicamenti* gli riesce meno disagiata: se abbia una forte avversione per qualcheduno in particolare, ec. (2).

nello stato del male, e sopra le loro malattie.

uni, e questi sono sopra tutto i *letterati*, non vogliono mai esser malati; e sebbene la loro sanità si consumi visibilmente, essi con ostinata fermezza ricusano di confessarlo. Gli altri all'opposto vogliono avere tutte le malattie che sentono nominare, o di cui loro vien fatta una descrizione toccante. Rispondono sempre affermativamente alle quistioni che loro si fanno; in guisa che per quanto moltiplicate sieno state coteste interrogazioni, trovasi il Medico per via di queste tanto poco istrutto, quanto lo era nel momento primo che ha cominciato a vedere l'infermo. Nell'uno e l'altro caso, qualora non si possa consultare qualche altra persona fuor dell'infermo, non v'è che la sagacità e l'esperienza, che possa trarci fuori del caos, in cui immergono queste risposte insidiose. Taluni troncano la descrizione che fanno del loro male, per non andare soggetti ad una data maniera di *visito*, ai tali *rimedj*; e questo difetto è quello de' giovani, de' discoli, ec. Tali altri aggiungono a questa stessa descrizione, per farsi prescrivere un tale, o tal altro *medicamento*, ec. In fine il genio dell'uomo pel meraviglioso, la sua inclinazione per la dissimulazione, e il suo allontanamento dalla verità, sembrano essere talmente proprie della sua essenza, che la tema di rovinare la sua salute, e anco di rischiarne la vita, non è sempre capace di farnelo trionfare.

Non abbisogna nella relazione del malato, che della franchezza e della verità.

Non si può dunque prestare attenzione soverchia nell'esame d'una malattia. Non si dee aver riguardo nè pel malato, nè per quei che gli stanno d'attorno. Ma non abbisogna nelle loro risposte, che dalla franchezza e della verità. Una esposizione chiara e semplice, benchè mancante d'ordine e di stile, instruisce molto più di tutte quelle descrizioni pompose, dove il brio dello spirito altera quasi sempre la verità de' fatti. La follia delle descrizioni brillanti delle malattie, è per dirlo di passaggio, una delle ragioni principali, che la Medicina consultiva è sì di sovente mancante.

Maniera di fare queste interrogazioni ad un adulto;

(2) Ecco la maniera presso poco, con cui secondo il Sig. TISSOT si possono fare coteste interrogazioni.

Andate voi soggetto alla malattia, da cui siete ora afflito? I vostri genitori ci sono stati essi pure sottoposti? L'avete voi contratta da qualcheduno che ne fosse infetto? La persona,

§. III.

Del vitto nella cura delle malassie.

Abbiamo di già fatto osservare, che la *dieta* sola Importanza della dieta nel-
 può soddisfare alla maggior parte delle *indica-*

da cui l'avete contratta, aveva essa qualche altro male, o evidente, o nascosto? Godevate voi per lo innanzi buona salute? Qual genere di vita menate voi abitualmente? Quali sono le vostre occupazioni? Il vostro male è egli per avventura la conseguenza di qualche fregolatezza nel bere, nel mangiare? Come vi ha egli colto? Da qual tempo in qua dura egli? Avete voi de' dolori di testa, di gola, di *petto*, di *stomaco*, di ventre, de' *reni*? La lingua è ella asciutta? Siete voi affettato? Avete voi un disgustoso sapore di bocca? Provate mai delle svogliatezze, della propensione al vomito? Il ventre è obbediente? Sono frequenti gli *scarichi*? Come sono le *feccie*? Orinate? Quali sono le *orine*? Si cangiano esse sovente? Avete de' *sudori*? Della *tosse*? Degli *spusi*? La *respirazione* è ella libera? Dormite? Come incontrano i brodi, le tisane, ec.?

Se una femmina è quella che giace malata, se le domanda di più:

Avete voi di presente le vostre *purghe*? Ne siete fuori? A una femmina i.
 Quanto è? Le attendete presto? Fra quanti giorni? Sono poi regolari, abbondanti? Quanto dura il loro flusso? Siete maritata? Vedova? Incinta? da quanti mesi? E' lunga pezza, che avete partorito? Allattate? Patite forse de' *menstrui bianchi*? Vi siete sconciata? E' ciò da gran tempo?

Se sia un fanciullo, si domanda:

Qual'è precisamente la sua età? Quanti denti ha egli? Partisce nel metterli? Vi si vede verun indizio di *rachitide*? Ha egli alcuna *rottura*? Ha avuto il *vajuelo*? Caccia mai fuochi de' *vermini*? E' tumido il ventre? Prende egli sonno tranquillo? Quando il malato è un fanciullo.

Tali questioni per quanto sieno moltiplicate, non sono ancora sufficienti per avere una cognizione esatta dallo stato del malato. Bisogna, oltre l'attenzione che abbiamo raccomandato nella nota precedente, avvicinarsi a lui, esaminare la sua fisionomia, gli occhi sopra tutto; considerare la lingua, la *respirazione*; palpare il ventre; guardare le *feccie*, le *orine*, gli *spusi*; sapere qual sia l'odore del sudore, della *traspirazione*, ec. perchè in generale la malattia è tanto più grave, quanto più l'apparenza di tutti questi obbietti, e l'odore che esala l'infermo, si scostano dallo stato naturale. Bisogna esaminare l'esterne apparenze del malato, le sue evacuazioni, l'odore che egli esala, ec. Perché?

La cura
delle ma-
lattie.

zioni nella cura de' mali. (Ved. la Prima Parte Cap. III, p. 122, nota 1.) La *dieta* è dunque il primo obbietto, a cui fa d'uopo avere attenzione.

Errore del
popolo in
riguardo
a' medica-
menti.

Coloro che più non fanno, s'immaginano che tutto ciò che porta il nome di *medicamento* sia dotato di qualche potere soprannaturale, di qualche segreto incantesimo. Credono che come tosto il malato sia sufficientemente riempito di *rimedj*, debba sentirsi bene.

Conse-
guenze di
si fatto er-
rore.

Questo errore ha le più funeste conseguenze. Questo fa che mettesi della fiducia solo nelle *droghe*, e che si trascurino gli ajuti, che si anno tra mano: di più ciò scoraggia e induce ad abbandonare un malato, qualora veggasi che non s'è al caso di aver de' *rimedj*. (Ved. nella Tavola le parole *dieta*, *vitto*, *alimento*, e *rimedio*. Ella è cosa di somma importanza per intendere quest'Opera d'avere una idea giusta e vera di questi termini.)

I rimedj
non posso-
no essere
utili: se
non quan-
do sieno in-
dicati, e
ammini-
strati con
prudenza.

I *rimedj* sono al certo utilissimi allorchè sieno indicati; e se vengano amministrati con prudenza, producono in allora molto di bene: ma quando si fanno servire ad ogni sorta di bisogno, e che si ordinano a caso, ciò che pur troppo spesso avviene, possono riuscire assai dannosi. Brameremmo per tanto, che in luogo di attaccarsi alla ricerca de' *rimedj* arcani, si rivolgesse l'attenzione su ciò che riguarda il *vitto*, che a caduno riesce più familiare: così non si avrebbe almeno motivo di temere ch'egli divenisse nocevole.

ARTICOLO PRIMO.

*Di qual specie deve essere la dieta nelle
malattie in generale.*

Ogni ma-
le indebo-
lisce le for-

Ogni male indebolisce le forze digestive. La *dieta* dunque deve essere in tutti i mali leggiera e

Avremo cura di definire il valore di cadauno di questi se-
gni; di mano in mano che ci verranno presentati dai mali;

di facile *digestione* (3). Un uomo che avesse una *gamba infranta*, non sarebbe più imprudente nel voler camminare, di chi avendo la *febbre* volesse mangiare gli stessi *alimenti* e nella stessa quantità di colui che gode fior di salute.

L'astinenza sola guarisce sovente una *febbre*, massimamente quando sia cagionata da fregolatezze nel bere e nel mangiare.

In tutte le febbri accompagnate da *infiammazione*, come nella *pleurisia*, nella *polmonia*, ec. i *cremori* leggieri di *avena*, il *siero di latte*, le *infusioni* delle *pianze*, e delle *radici mucilaginosi*, ec. sono non solamente capaci di nutrire il malato, ma sono ancora i migliori rimedj che loro si possano amministrar.

Nelle *febbri lente*, *nervose*, *maligne*, ec. che non sono accompagnate da *infiammazione*; che esigono che le forze del malato sieno sostenute coi *cordiali*, si adempirà sempre meglio all'intenzione della Natura, prescrivendo una *dieta* nutritiva e de' *vini generosi*, che ordinando la maggior parte degli altri rimedj fin ora conosciuti.

Niente meno merita la nostra attenzione la *dieta* nelle *malattie croniche*, che nelle *malattie acute*. Le persone molestate da *stati*; da debolezza de' *nervi*; da tutti gli altri *simptomi* dell'*affezione ipocondriaca*, si troveranno meglio dall'usare degli *alimenti* solidi e de'

Dieta in una febbre cagionata da frivolezze; Nelle febbri infiammatorie;

Nelle febbri lente; nervose; maligne; ec.

Nella malattia cronica;

(3) Questa verità è generale per tutte le *malattie acute*; ma lascia luogo ad alcune eccezioni nelle *malattie croniche*. Ce ne sono di queste ultime, nelle quali l'infermo è costretto a mangiare molto e di sovente. Noi vedremo che una parte delle *malattie nervose*, e quelle che derivano da *bile somverchia*, sono di questa classe.

Il Sig. GALLATIN mi ha comunicato su questo proposito l'osservazione seguente. Ho conosciuto, mi disse, un uomo di 74 anni, d'un *temperamento secco e bilioso*, ch'era ogni notte costretto a mangiare. Si fatto incomodo procedeva da una *bile acerrima*, la quale in quel tempo che stava orizzontalmente coricato, sgorgava dentro lo *stomaco*. Fu liberato da questa fame, mediante l'uso d'una tisana fatta *col miselo* e il *fior di tartaro*.

Eccezione a questa regola generale.

10 *Parte Seconda, Cap. I. §. III. Art. II.*
vini generosi, che tutti i cordiali e tutti i rimedj car-
minativi.

Nello scor-
buto ;

Lo *scorbuto*, quella malattia cotanto pertinace, cederà più prontamente ad una *dieta vegetabile* appropriata, che a tutti gli *antiscorbutici* i più vantati degli *Speziali*.

Nella con-
fusione.

Nella *sabe*, allorchè gli umori sono viziati, quando lo *stomaco* è troppo debole per poter digerire le fibre solide degli animali, o anche per convertire in propria sostanza il *suco de' vegetabili*, una *dieta*, la di cui base sia il *latte*, sosterrà e nutrirà non solamente il malato, ma lo guarirà altresì sovente, allorchè tutti gli altri *rimedj* sarebbero stati inutili.

ARTICOLO SECONDO.

Dell' aria nella cura de' mali.

C I sono nelle malattie molti altri oggetti, i quali sebbene d'una necessità meno assoluta della *dieta*, non sono meno degni della nostra attenzione.

Importan-
za dell'a-
ria fresca
e rinnove-
lata nella
maggior
parte de'
mali.

La follia singolare, in cui s'è lungo tempo durato, di privare i malati di ogni comunicazione coll' *aria* esterna, ha cagionato i più gravi accidenti, non solamente nelle *febbri*, ma ancora nella maggior parte de' mali *acuti*. Il malato ritrarrà maggiore vantaggio dall' *aria* fresca introdotta con prudenza nella camera, che da ogni altro *rimedio* che si potrebbe esibirgli. (Ved. la Prima Parte Cap. IV, e le note 4, e 5.)

ARTICOLO TERZO.

Dell' esercizio nella cura delle malattie croniche.

L'esercizio
può essere
riguardato
come un ri-
medio in
molte ma-
lattie cro-
niche.

L' *Esercizio* può egualmente in molti casi essere riguardato come un *rimedio*. Il *moto a cavallo*, a cagione d'esempio, e la *navigazione*, faranno più utili per guarire la *sabe*, o la *sifischezza*, le *ostruzioni* delle glandule, ec. di quello che la maggior parte de' rimedj conosciuti sino al presente. Nelle malat-

tie che vengono da laschezza de' solidi, il bagno freddo e tutte le altre parti del governo ginnastico, saranno eziandio della maggiore utilità. (Ved. la Prima Parte Cap. I, nota 35, e Cap. V, nota 2.)

ARTICOLO QUARTO.

Della politezza nel governo de' mali.

LA politezza è parimenti di somma importanza nella cura de' mali. Quando si lascia un malato dentro a biancherie sudicie, la materia che *traspira* da tutte le parti del corpo, assorbita, o retrocessa al di dentro contribuisce a mantenere il morbo, e ad aumentarne il pericolo. Parecchie malattie possono essere guarite dalla sola politezza. Ella può contribuire a mitigarne un gran numero; e in tutte ella è importantissima pel malato, e molto aggradevole a coloro che lo assistono. (Ved. la Prima Parte Cap. IX, nota 2.)

La politezza sola può sanare parecchie malattie, e in tutte ella è utile al malato, e a coloro che lo governano.

ARTICOLO QUINTO.

Della superiorità del vitto sopra i rimedj nel governo de' mali.

SE fosse necessario, potrei riferire molte osservazioni, onde provare quanto un *vitto* appropriato sia importante nelle malattie. In fatti egli guarisce sovente le malattie senza il soccorso di verun *rimedio*; laddove giammai i rimedj riescono, se il *vitto* sia negletto. Così nel governo de' mali abbiamo sempre parlato del *vitto*, prima di parlare de' *rimedj*.

Il vitto può guarire senza rimedj, laddove i rimedj non possono riuscire, se il vitto sia negletto.

Coloro che temono l'uso de' *rimedj*, possono attenersi alla sola *regola* del vitto (4). Quanto agli al-

(4) Non è, che il Signor BUCHAN pretendia che tali persone possano guarire qualunque male senza *rimedj*. Dir vuole solamente, che quando non si conoscano l'efficacia e gli effetti de' *rimedj*, molto meglio si è l'astenersi dall'amministrarli, di quello che arrischiarsi a far del male. Devono que-

Come debbano regolarsi coloro, che non anno capacità sufficiente per

tri, in cui supponiamo più di cognizione; abbiamo avuto l'avvertenza di prescrivere in cadauna malattia le *formule de' rimedj* i più semplici e i più approvati.

Il rimedio non può essere amministrato da ogni sorta di persone.

Tuttavolta essi non possono venire amministrati, se non che da persone intelligenti e perite; e ancora non lo devono essere, che con le cautele che avremo l'avvertenza di raccomandare.

CAPITOLO SECONDO.

Delle febbri in generale.

Tutti gli uomini devono conoscere le cagioni delle febbri. Perché?

LE *febbri* secondo l'opinione la più comune cacciano dal mondo più della metà del genere umano: è dunque di massima importanza, che tutti gli uomini conoscano le cagioni che possono produrle.

Cagioni generali delle febbri.

Le cagioni più generali delle *febbri* sono la *contagione*; gli errori commessi nel *vitto*; l'*aria* malsana; le affezioni violente dell'anima; la soppressione di qualche *evacuazione consueta*; tutto ciò, che può nuocere al corpo, sia interiormente, sia esternamente; l'estremo calore; in fine il freddo eccessivo.

Siccome abbiamo già trattato diffusamente d'una parte di queste cagioni, e ne abbiamo dimostrati gli effetti; noi ci dispenseremo dal ripetere in questo luogo quanto ne abbiamo detto: ci ristingeremo a raccomandare a tutti coloro che vogliono star lontani dalle *febbri* e dall'altre malattie perigliose, di prestarvi l'attenzione la più scrupolosa. (Ved. la Prima Parte Cap. III, IV, X, XI, e XII.)

Le febbri sono le ma-

Le *febbri* non sono solamente le malattie le più

amministrare i rimedj.

Si tali chiamare aiuto, subito che si avveggon che la malattia è grave, o che non cede al governo prescritto. D'altra parte resterà loro ancora modo di adempiere ai sentimenti di beneficenza, da cui sono animati, cioè invigilando sull'amministrazione del *vitto*, ch'è senza dubbio la base essenziale del governo di tutte le malattie.

frequenti; elleno sono ancora le più complicate. La febbre la più semplice ha sempre una combinazione di *sintomi* differenti, alcuni de' quali appartengono egualmente ad altri mali.

La febbre la più frequente e la più complicata.

I *sintomi* caratteristici delle febbri sono il calore eccessivo, la *frequenza* del *pulso*, la perdita dell'appetito, una debolezza universale, e una difficoltà d'adempire alcune delle *funzioni*, sì *vitali*, come *animali* (1).

Sintomi essenziali delle febbri.

Gli altri *sintomi*, che sono meno caratteristici delle febbri, ma che le accompagnano per l'ordinario, sono le *nausee*, o voglie di vomitare, la sete, le *ansietà*, le *lassenze*, lo smagrimento, la *veglia*, o il sonno interrotto, che impedisce che non si rinfranchi il malato.

Sintomi generali delle febbri.

Allorchè una febbre non assale che per gradi, il malato comincia dal provare un languore, una differenza per tutto ciò che l'attornia; si lagna di dolore nei *muscoli*, nelle *ossa*, nella *testa*: egli non ha verun appetito; sente delle *svogliatezze*, e la bocca impastricciata: qualche tempo in seguito prova un calore eccessivo, una sete ardente, una impossibilità di dormire, ec.

Sintomi delle febbri che non affliggono, che per gradi.

Ma allorchè una febbre sorprende di lancio, ella comincia sempre da un sentimento straordinario di

Di quella che sorprende.

(1) Questa enumerazione di *sintomi* rende noto abbastanza che la sola *frequenza* del *pulso*, siccome comunemente si crede, non costituisce la febbre. In fatti benchè tutti concorrono a manifestare la febbre, non si può dire che l'uno sia ad essa più dell'altro essenziale; qualora ne se eccettui uno solo di cui il Signor BUCHAN ne parla in appresso, ed è la *dolgia* di capo. Ecco quanto il Sig. LE ROY solea dirci a questo proposito nelle *pubbliche lezioni sopra i pronostici* d'IPPOCRATE.

La sola frequenza del pulso non costituisce la febbre.

„ La *dolgia* di *testa*, che ha la sua sede nel fronte, è comunemente un *sintomo* di febbre, talmente che i Medici che non trovano nel *pulso* i segni necessari ad annunziare la febbre, si rivolgono ordinariamente a questo indizio, quando abbiano motivo di sospettare cotesto malore. Se il malato, soggiunge, non sentisse verun dolore di capo, converrà fargli fare un moto più o meno violento, per cui non tarderà molto a sentirlo „

Sintomo il più frequente delle febbri.

di primo
lancio.

freddo, con debolezza e perdita di appetito. Questo freddo è affai di sovente accompagnato da *brividi*, da rallentamento di *circolazione*, da stringimento di cuore, da mali di *stomaco*, da *vomiti*, ec.

§. I.

Delle diverse spezie di febbre.

SI dividono le *febbri* in *continue*, in *remittenti*, in *intermittenti*, e in quelle che sono accompagnate da *eruzioni cutanee*, e da *infiammazioni locali*, come dal *vajuolo*, dalla *risipola*, ec.

Cosa inten-
dasi per
febbre con-
tinua;

Per *febbre continua* intendesi quella che non abbandona il malato per tutto il corso del male, o che durante tutto questo tempo non fa apparire verun altro accrescimento, verun'altra diminuzione sensibile ne' suoi *sintomi*, fuorchè quella che dipende dal suo progresso: vale a dire, che avendo acquistato per gradi il più alto punto del suo accrescimento, ella insensibilmente declina, e alla fine cessa interamente, sia pel *soccorso* della sola Natura, sia mediante quello de' rimedj.

Questa spezie di *febbre* è suddivisa in *febbre acuta*, in *febbre lenta*, e in *febbre maligna*.

Per febbre
acuta;

Si dice che una *febbre* è *acuta*, quando i *sintomi* sono violenti, e che il progresso è precipitoso, in guisa che la sua durata non oltrepassa i quaranta giorni.

Per febbre
lenta;

Si dice che la *febbre* è *lenta*, qualora il progresso e i *sintomi* sono più moderati.

Per febbre
maligna,
ec.

Finalmente allorchè in una *febbre continua* si manifestano delle macchie livide, *petecchiali* (2), le qua-

Pericoli
che minac-
ciano le
petecchie
nelle feb-
bri. In che
queste mac-
chie differi-
scono dal-
la miglia-
re, e dal-
la rosolia,
ec.

(2) Le macchie *petecchiali*, o le *petecchie*, sono d'un pessimo presagio; e qualora sieno frammischiate ad altre macchie livide, brune, o nericie, la *febbre* è quasi sempre mortale. Si distinguono le *petecchie* dalla *migliare*, dalla *rosolia*, e dall'altre *eruzioni*, non solo al loro colore, ma ancora perchè si manifestano senza verun ardore, nè prurito; senza ele-
vazione, e scabrezza veruna, nè *esulceramento* della *pelle*, e d'ordinario senza apportare verun sollievo al malato.

li annunziano la corruzione evidente degli umori, cotesta febbre appellasi *maligna*, *putrida*, o *petecchiale* (3).

La *febbre remittente* differisce dalla *continua* unicamente ne' suoi gradi. Nella stessa guisa di questa ultima, ella non abbandona il malato durante tutto il corso del male; ma ha dentro le venti quattr'ore de' frequenti accrescimenti, delle frequenti diminu-

Cosa intenda-
si per
febbre re-
mittente;

(3) Qui accade da farsi una distinzione essenziale. In Francia vediamo benissimo, sopra tutto nelle provincie meridionali, alcune *febbri maligne* con *petecchie*; e il carattere che abbiamo esposto di queste macchie, (Ved. la parola *petecchie* nella Tavola) appartiene a quelle che accompagnano questa specie di *febbre*: nulladimeno vediamo più di sovente alcune *febbri* semplicemente *petecchiali*, che sono febbri puramente *eruttive*, talvolta *benigne*, dice il Sig. LE ROY, ma più spesso pericolose. In queste ultime l'*eruzione* si fa d'ordinario nel quarto o quinto giorno; alle volte fin dal primo o secondo; alle volte ancora verso il sesto o settimo, egualmente che nel *vajuolo* e nella *migliare*: così nelle *febbri petecchiali* l'*eruzione* è talvolta *critica*, seguita da sollievo notabilissimo; sovente poi non sembra recare miglioramento veruno.

Vi sono
delle feb-
bri pura-
mente pe-
tecchiali,
senza effe-
re maligne.

I punti principali che differenziano le *febbri maligne*, accompagnate da *petecchie*, dalle febbri semplicemente *petecchiali*, sono i seguenti. In queste ultime l'*eruzione* ha luogo presso la maggior parte de' malati, tanto in quei che risanano, tanto in quelli che soccombono: nelle nostre *febbri maligne* queste macchie sono un sintomo molto raro, e nel numero de' più mortali. Nelle *febbri petecchiali*, le macchie *porporine* appariscono di rado al di là del settimo giorno, più spesso verso il quarto, alle volte più di buon'ora: nelle *maligne*, sono solite di manifestarsi solamente quando la malattia piega alla morte. Nelle *febbri petecchiali*, l'*eruzione* delle macchie è alcuna volta seguita da un sollievo notabilissimo: al contrario nelle *maligne* le macchie sono costantemente *sintomatiche*, e presagiscono per l'ordinario una morte vicina. Finalmente nelle nostre *febbri maligne*, le macchie *porporine* sono rare; appaiono ordinariamente sul collo, sul petto; sono veracemente del colore di porpora, come il vino rosso carico; talvolta ancora pendono al bruno: all'opposto nelle *febbri petecchiali* queste macchie sono d'ordinario d'un rosso più vivace; sono più numerose; se ne sogliono vedere in copia sui reni, sulle natiche, ec. (*Mélanges de Physique & de Médecine*, Tom. I. p. 212, e seg.)

Cosa di-
stinga le
febbri ma-
lignae con
petecchie
dalle feb-
bri pura-
mente pe-
tecchiali.

zioni, o come dicono i Medici, de' frequenti *raddoppiamenti* e delle frequenti *remissioni*. (Ch'è quanto a dire de' momenti, ne' quali ella è più forte, degli altri in cui ella è più debole.)

Per febbre
intermit-
tente.

Le *febbri intermittenti* sono quelle che, durante il tempo ch' elleno sorprendono il malato, gli lasciano alcuni intervalli notabili, ne' quali i *sintomi* della *febbre* svaniscono onninamente: (di modo che durante questo tempo la persona non prova più verun sentimento di *febbre*, e sovente ella sembra godere salute: ma a capo di alquante ore, di alcuni giorni, più o meno, la *febbre* comparisce di nuovo per disparire più o meno di volte, finchè alla fine resti perfettamente guarita.)

§. II.

Del governo generale delle febbri.

Vera idea
che dee for-
marsi della
febbre.

Poichè la *febbre* non è altro che uno sforzo della *Natura* per togliersi d'intorno la *materia morbosa*, (o piuttosto, come dice benissimo un Autore moderno, per dare a questa *materia* il grado di *elaborazione* antecedentemente richiesta all'*evacuazione* che deve farsi;) tocca a quei che assistono ai malati di osservare con attenzione qual'è la via, che la *Natura* sceglie per espellere questa *materia morbosa*, e di aiutarla in questa sua operazione. Tale è la struttura del corpo umano, ch'egli è costantemente disposto a rigettare lungi da se e scacciare tutto ciò che può nuocere alla salute. Ora ciò è quanto la *Natura* opera ordinariamente per via dell'*evacuazioni*; tali sono le *orine*, i *sudori*, gli *scarichi di ventre*, gli *sputi*, i *vomiti*, ec.

Si potreb-
bero arre-
stare i pro-
gressi d'una
febbre se-
condando
nei princi-
pij gli sfor-
zi della Na-
tura.

Se sino dal principio d'una *febbre* si seguissero e si secondassero gli sforzi della *Natura*, v'è luogo a presumere che questa *febbre* non sarebbe di lunga durata; ma allorchè questi sforzi non vengono ravvivati, o sono negletti o contrariati, non è strano, che la malattia si prolunghi e divenga pericolosa. Abbiamo degli esempi giornalieri di persone, che dopo essersi *infreddati*, anno ogai altro sintomo d'una *febbre* co-
min-

minciante: ma se queste persone si custodiscano calde, i *sintomi* svaniscono in poche ore, e non anno più a temere alcun pericolo. Allorchè la *febbre*, da cui si è minacciato, sia del genere *putrido*, i vomitivi reiterati sono il miglior mezzo a prevenirne gli effetti.

Il nostro disegno non è di entrare in una ricerca critica della natura e delle cagioni immediate delle *febbri*. Noi ci limiteremo ad indicare i *sintomi* i più rilevanti, e ad esporre il governo che meglio conviene al malato, relativamente al *vitto*, alla bevanda, all'*aria*, al calore, ec. nei differenti periodi del male. Non obbliaremo in alcuno di questi articoli di consultare il gusto del malato; ciò farà una delle principali regole della nostra condotta.

Presto che tutte le persone che anno la *febbre*, si querelano d'una gran sete: domandano incessantemente da bere, segnatamente de' liquori di qualità *refrescante*. Questo istinto della Natura c'indica l'uso dell'*acqua*, e dell'altre bevande *refrescanti* e *diluenti* (4).

Qual è lo scopo che l'Autore s'è proposto nella descrizione e nella cura delle febbri.

Qual è il primo rimedio ispirato dalla Natura nelle febbri. L'acqua.

(4) Abbiamo assegnato (Part. I, Cap. III, nota 8.) i caratteri dell'*acqua* più pura, e abbiamo dimostrato l'importanza di usarne per la conservazione della salute. Ella niente meno di elogi si merita per la guarigione de' mali. „ Si deve considerare, dice l'illustre Sig. LIEUTAUD, *Précis de la Médecine Pratique*, T. I, p. 36, che l'*acqua* comune può moderare il calore del *sangue*; impartire della fluidità agli umori, e della morbidezza agli organi; favorire l'*escrezioni* con più di sicurezza che le *risane*; i *giulebbi*, l'*emulsioni*, gli *apozemi*, e altri beveraggi, che senza misura si porgono agli ammalati, e che traggono la loro principale virtù dall'*acqua* che n'è la base. „ I *rimedj* semplici, dice in seguito, quando sono bene indicati, devono sempre preferirsi ai composti; i naturali a quelli che l'arte ha alterato. . . . Sebbene la *chinachina* siassi la miglior cosa che si possa adoperare per la *febbre tertiana*, per la *doppia tertiana*, io non ho mancato spessissimo di dare la preferenza all'*acqua* pura, presa come nodrimento totale pel corso di tre o quattro giorni. „

Importanza dell'acqua nella cura delle febbri e delle malattie acute.

I rimedj semplici sono da preferirsi ai composti, ecc.

Le prime scoperte degli uomini, le prime arti, i primi metodi, i bisogni primi, i primi soccorsi sono stati semplici: la semplicità è propria della Natura. I Medici che non la rav-

La semplicità è propria della Natura.

Effetti
fantaggiosi
delle be-
vande leg-
giere e di-
lucanti nel-
le febbri
acute.

Cosa v'è mai al mondo che sembri altrettanto propria a scemare il calore, ad attenuare gli umori, a distruggere gli spasmi e le ostruzioni, a favorire la traspirazione, ad eccitare le orine, in fine a produrre tutti gli effetti salutari in una *febbre acuta, ardente*,

Sentimenti
degli anti-
chi sopra i
rimedj
composti,
ed intor-
no la loro
moltiplici-
tà.

visarono, cercarono di abbagliare con l'apparato pomposo di quelle *ricette* e di quelle *formule* stravaganti, che non anno mai potuto altro essere che l'opera dell'ignoranza la più completa, o dell'ostentazione la più ridicola.

I buoni Autori anno egualmente biasimato i *rimedj* composti, che la loro moltiplicità: parecchi ancora anno asserito che si potrebbe guarire con minor pericolo tutte le malattie acute, mediante la sola bevanda e la *dietta*. IPPOCRATE curava i malati colla sola *regola* di vitto: ETTMÜLLERO teneva i suoi parecchi giorni con le semplici bevande: SYDENHAM pretendeva che si avessero ad accagionare i rimedj dati fuori di tempo della maggior parte de' mali i più gravi: BAGLIVI sgridava contro l'abuso che se ne faceva a' suoi giorni, e asserverava che la più parte de' *sintomi* formidabili, che si aggiungono ai *mali acuti*, devono imputarsi ai rimedj: HOFMANN, che ha scritto sopra questo soggetto, si scagliò fortemente tanto contro i rimedj troppo composti, come contro la loro farragine, &c.

Il testimonio di questi grandi uomini, di questi veri amici dell'umanità, sia dunque quello che faccia aprire gli occhi del pubblico; che gl'insegna a conoscere le virtù e le proprietà delle sostanze semplici, ch'egli ha incessantemente tra mano; apprenda egli a farne uso, e non tarderà di restare convinto di queste verità: che la Medicina consiste essenzialmente nell'osservazione e nell'imitazione della Natura; che il conveniente modo di vivere è il solo foccorso di cui ella abbisogni ne' mali, ne' quali le forze dell'ammalato sono in ragione dell'attività dei *sintomi*; che non si dee usar de' *rimedj* fuorchè nei casi contrarij, e che in allora debbonsi sempre preferire i più semplici agli artificiali, ai composti.

Cosa deb-
basi inten-
dere per ri-
medj sem-
plici.

Speriamo che non ci venga rimproverato di dare impropriamente il nome di *rimedj* semplici alle *frutta*, alle *pianse*, alle *radiche*, all'*acqua*. Sappiamo che queste sono sostanze molto composte; e che sono de' *misti* risultanti dalle loro particole costituenti, le quali sono *eterogenee* e di natura disferente. Ma per mancanza di termini siamo obbligati con tutti gli Autori poc'anzi citati, con tutti i Pratici, di appellare *rimedj* semplici tutti quelli che mettiamo in opera quali li riceviamo dalle mani della Natura, all'opposto di quelli che sono il risultato della combinazione fatta degli uomini.

Infiammatoria, quanto una bevanda copiosa d'acqua calda, di *cremore* acquoso di *avena*, o di qualsiasi altro liquore leggiero, *diluente*, di cui l'acqua ne formi la base?

La necessità delle bevande *diluenti*, è del pari indicata dalla siccità della lingua, dall'aridità della pelle, e dal calore ardente, come dalla sete inestinguibile del malato.

Sintomi che indicano se si fanno bevande.

Un gran numero di bevande *rinfrascanti*, che sono aggradevolissime al malato nelle *febbri*, si fanno con delle frutta, come le *decozioni* di *tamarindo*, il tè di *pomi*, ec. il *siero* di *latte aranciato*, e altre consimili. Le bevande *mucilaginosi* si preparano colla radice di *altea*, coi *semi* di *lino*, i *fiore* di *tiglio*, e molte altre piante di questa specie. Queste bevande, massimamente quando sono *acidulate*, (Vedi questa voce nella Tavola) gradiscono singolarmente ai malati, e non si devono loro giammai negare.

Come si preparano coteste bevande.

Nel principio d'una *febbre* il malato in generale si lagna d'una grande *lassatezza*, e ama solo il riposo. Questi *sintomi* evidentemente ci mostrano il vantaggio di lasciare l'infermo tranquillo, e anche, qualora sia possibile, nel farlo star *corticato*.

Importanza del riposo nel principio d'una febbre.

Il riposo del letto distrugge gli *spasmi*, modera la violenza della *circolazione*, e mette la Natura in istato d'impiegare tutte le sue forze per scacciare il male. Il solo riposo del letto potrebbe sovente guarire una *febbre* ne' suoi principj: ma se il malato voglia lottare col male, in luogo di faticarsi a scacciarlo, lo radica più profondamente, e lo rende più pericoloso. Noi abbiamo pur troppo spesso occasione di ciò osservare tra i viaggiatori che si trovano in cammino assaliti da *febbre*: il desiderio che anno di giungere al luogo meditato, li porta a continuare la loro via malgrado la *febbre*, e questa condotta di rado non lascia di loro divenire funesta.

Effetti salutari del riposo del letto nelle febbri.

D'uopo è nelle *febbri* di cercare di tranquillare lo spirito del pari che il corpo. Radamente la compagnia è aggradevole al malato. E' certo che tutto ciò che può turbare l'immaginazione, aggrava la malattia. Per ciò stesso ogni persona compresa di *febbre* deve essere tenuta perfettamente tranquilla; e

La tranquillità dello spirito non è meno di quella del corpo importante nelle febbri.

non se le dee permettere di vedere, nè d'intendere nulla che possa nel menomo modo alterare, o disturbare la tranquillità del suo spirito. (Ved. la Prima Parte Cap. X, nota 1, e Cap. X, nota 5.)

Avver-
so agli ali-
menti soli-
di inspira-
ta dalla
Natura nel-
le febbri.

In vece di
nutrire il
malato, es-
si non fa-
rebbero che
alimentare
la malat-
tia.

Cosa devo-
no essere
gli alimen-
ti, allor-
chè sono
indicati.

Sebbene il malato abbia durante la *febbre* una forma brama di bere, di rado tuttavia si vede ch'egli abbia dell'appetito. Questa disposizione della Natura ci ammaestra quanto sia contro le sue intenzioni l'aggravare di nodrimento lo *stomaco* de' malati.

Gli *alimenti* solidi in una *febbre* sono i veri mezzi di rendere la malattia più perigliosa. Mettono degli ostacoli agli sforzi della Natura; e in vece di nutrire il malato, non fanno che alimentare la malattia.

Se porgonsi a' malati degli *alimenti*, questi devono essere in piccola quantità, leggieri, e di facile *digestione*: devono essere sopra tutto tratti dalla classe de' *vegetabili*, e non consistere che in *panadella*, in *poma cotte* dinanzi il fuoco, in *cremore d'avena*, e in altri simili.

I cordiali
non sono
capaci che
di aumen-
tare la feb-
bre, o di
produrla,
quando non
ca sia.

Non così subito i poveri anno nella loro famiglia un malato, che corrono di volo dai loro benefattori vicini per chiedere un qualche *cordiale*. Essi danno a questo malato del *vino*, de' *liquori spiritosi*, (della *Teriaca*,) ec. di cui non avevano mai gustato nel tempo di loro salute. Se questo sventurato sia preso da certo grado di *febbre*, cotesti *cordiali* ben tosto l'aumentano; e se non ne abbia, essi sono capaci di produrla. (Ved. la Prima Parte p. 204.)

Pericoli
dalle con-
fetture,
de' biscot-
tini, ec.
nelle feb-
bri.

Impastricciare un malato di *confetture*, di *biscottini*, e di altre *ghiostomerie*, è egualmente pernicioso. Tali sostanze sono sempre più difficili a digerire, che gli *alimenti* ordinarij, e non possono a meno di non facilitare lo *stomaco*.

Vantaggi
dell'aria
fresca nelle
febbri. Ri-
pugnanza
perniciosa
del popolo
contro
questo pre-
cetto.

Nulla v'ha che un malato preso di *febbre* più vivamente desideri, quanto un' *aria fresca*: non solamente ella calma l'ardore e l'*effervescenza* del *sangue*, ma lo rinfresca eziandio: ravviva gli spiriti, e procura i più grandi vantaggi. Gran numero di malati assaliti da *febbre* sono in certo modo soffocati sino a morire, per mancanza d'*aria fresca*. Tuttavolta tal'è la pertinacia incomprendibile della maggio-

Parte degli uomini, che appena vedono una persona febricitante, s'immaginano ch'ella debba essere tenuta in una camera ben chiusa, dove non entri soffio alcuno di *aria novella*.

Non vogliono persuadersi che deesi tenere una condotta affatto opposta; che bisogna costantemente mantenere nella camera del malato un corso d'*aria fresca*, in guisa che questa camera abbia una temperatura moderata, e che il calore non sia maggiore di quello ch'è gradevole ad una persona in perfetta salute. (Ved. Parte Prima Cap. IV, nota 5.)

Niente corrompe di vantaggio l'*aria* d'una stanza, e la rende maggiormente nocevole ad un malato, quanto la *respirazione* d'un gran numero di persone che vi si trovino assembrate. Se il *sangue* sia infiammato, se gli umori sieno in uno stato di *putridità*, quest'*aria* che sarà stata respirata parecchie fiato, accrescerà singolarmente la malattia: imperciocchè l'*aria* non solamente perde da ciò parte della sua elasticità, e diviene incapace di servire alla *respirazione*, ma eziandio acquista delle qualità nocevoli, che la rendono in qualche modo un *veleno* pegli ammalati. (Ved. la Prima Parte Cap. II, nota 1, e Cap. X, nota 1.)

Nelle *febbri*, allorchè il coraggio e le forze dell'infermo sono abbattute e presso che perdute, fa di mestiere non solamente inanimarlo con de' *cordiali*, ma ancora ricrearlo e tranquillare il suo spirito con tutti i mezzi possibili. Tuttavolta buon numero di persone, per uno zelo mal inteso, portano lo spavento e la tema nell'anima di coloro che vedono in pericolo, loro rappresentando gli orrori, e le pene dell'inferno; in vecè d'incoraggiarli colle speranze e le consolazioni della Religione. Non m'appartiene di qui insistere sulle conseguenze pericolose di sì fatta condotta: quel ch'è v'ha di certo si è, ch'ella nuoce sovente al corpo, e che v'è luogo di credere, che di rado sia utile all'anima. (Ved. Prima Parte Cap. XI, §. II, nota 6.)

Tra il popolo al solo nome di *febbre* si pensa alla cacciata di *sangue*, e credesi necessaria. Questa opinione sembra essere fondata, in quanto che la mag-

Grado di calore che deve avere la camera del malato.

Non bisogna permettere che vi resti molta gente nella stanza del malato. Perché?

Circostanze che indicano di dare de' cordiali, d'inanimare il coraggio e la speranza dell'infermo.

Se cosa sia fondata la falsa opinione del popolo, &c.

passivamente alla necessità della missione di sangue nelle febbri.

gior parte delle *febbri* in questo Paese sono state nella loro origine di natura *infiammatoria*; ma la verità è che attualmente esse sono di rado accompagnate d'*infiammazione*. I lavori sedentari, e la maniera di vivere affatto differente da quella di altri tempi, anno talmente cangiato la natura dei mali in Inghilterra, che tra dieci *febbri*, si può dire francamente, che non ve n'ha nemmeno una in cui abbisogni cacciar sangue (5).

Febbri nelle quali la missione di sangue è nociva.

Nella maggior parte delle *febbri lente, nervose, putride*, oggigiorno tanto comuni, la missione di *sangue* è realmente nociva, in quanto ella indebolisce il malato, abbatte le di lui forze, ec.

Non ci sono che i sintomi d'*infiammazione* che indichino il salasso nelle febbri.

Per tanto proporremo per regola generale, di non cacciar sangue giammai nel cominciar d'una *febbre*, qualora almeno non ci sieno de' sintomi evidenti d'*infiammazione*. Il salasso è un eccellente rimedio quando ci sia indicato; ma non si dee giammai farsene giuoco (6).

Il carattere de' mali ha cangiato unitamente alla regola del vitto.

(5) Tocca ai Pratici a decidere se le nostre *febbri* sieno nel caso stesso che quelle degl' Inglese; se le nostre occupazioni egualmente sedentarie; se le nostre gozzoviglie moltiplicate del pari; se la nostra maniera di vivere altresì contraria alle viste della Natura, debbano aver apportato nel carattere de' nostri mali la differenza stessa che l' Autore ha osservato in quelli de' suoi compatrioti. Certo è, che confrontando le malattie descritte nei libri, con quelle che offrono oggigiorno i malati, questa differenza apparisce tale, che in moltissime circostanze, forza è per riuscirvi di opporsi a quelle cacciate di *sangue* che certuni vogliono fare o per *sistema*, o per *consuetudine*, o per *prevenzione per il nome della malattia*.

La cacciata di sangue non è nemmeno necessaria in tutte le febbri infiammatorie.

(6) Questa è la legge che anno seguito e che seguono tutti i maggiori Medici. Non tutte le *febbri*, dice il Sig. LIEUTAUD, richiedono la cacciata di *sangue*; essa è di spesso inutile e talvolta pericolosa E' fuor di dubbio, che le *febbri* infiammatorie sono quelle che più la esigono; nulladimeno ella è spesso volte in questi stessi mali contraria, come l' HUXAM, e parecchi altri Autori anno osservato in alcune epidemie. (*Précis de la Médecine Pratique*, Tom. I. pag. 32.)

Malattie particolari in cui il salasso riesce mortale.

Ci sono, dice il Sig. CLERC, sei casi particolari, ne quali il salasso produce sovente la perdita dell' animalato. 1. L'*apoplessia serosa*, in cui è mortale. 2. Il sopore con oscuro de-

Un'opinione niente meno comune è quella, che sia sempre necessario di eccitare il sudore nel principio d'una *febbre*. Siccome le febbri sovente derivano da *traspirazione* soppressa, è certo che si fatta opinione è fino a certo segno fondata. Tengasi nel proprio letto il malato; se gli ammolino i piedi e le mani nell'acqua calda; prenda egli dell'*acqua di orzo* in copia, o qualsivisia altra bevanda leggiera, *diluente*: tutti questi mezzi di rado falliranno di sollecitare una libera *traspirazione*. Il tepore del letto e le bevande abbondanti distruggeranno l'*eretismo* universale, che in generale affetta i solidi nel cominciamento d'una *febbre*; apriranno i *pori*; favoriranno la *traspirazione*, e quindi potranno sovente togliere la *febbre*.

Quando è come bisogna favorire il sudore nelle febbri.

Ma non così regolasi ordinariamente: si carica oltre misura di copertine il malato; non se gli porgono se non delle cose di natura *riscaldante*, come degli *elissiri*, degli *aromi*, ec. che infiammano il *sangue*, aumentano gli *spasmi*, e rendono il male più pericoloso (7).

Pericolo del metodo ordinario di eccitare il sudore.

lirio, o l'*apoplessia lactea* delle femmine di parto. 3. La *polmonia*, o *infiammazione del petto*, in cui il malato sputa agevolmente, sebbene la *febbre* sia gagliarda. 4. Le malattie che vengono in seguito dei piaceri di amore, segnatamente la *tabe dorsale* de' sposi novelli: i dolori che l'accompagnano, sono talvolta sì vivi, che prendesi cotesto male per un *reumatismo*, o per una *lombagine infiammatoria*. 5. Tutte le malattie di *dissoluzione*, e le effusioni serose. 6. Qualunque morbo eccessivamente *putrido*, quali sono le *febbri putride*, *maligne*, lo *scorbuto* avanzato, ec. Potrei, soggiungere egli, noverare altresì l'*indigestione*. Non v'è per tanto se non i *sintomi d'infiammazione*, che possano indicare con certezza la necessità del *salasso*.

Questi sintomi sono un *pulso frequente, pieno, e duro*; un *calore gagliardo*; le *dolgie di capo*; l'*aridità della pelle*; il *rosso degli occhi*; il *volto acceso*; la *difficoltà di respirare*; i *dolori de' reni*, ec. (Ved. Cap. IV, §. II di questo Tom. II.)

Caratteri de' sintomi che indicano il salasso.

(7) Le malattie cagionate dalla *soppressione della traspirazione* sono adunque le sole, in cui si può con sicurezza eccitare il *sudore*. In tutte le altre questa pratica costa ogni anno la vita a parecchie migliaia di persone. Non si può, di-

Malattie nelle quali unicamente si può eccitare il sudore.

Nelle feb-
bri bisogna
avere at-
tenzione a'
desiderj de'
malati.
Perchè?

In tutte le *febbri* bisogna avere una attenzione particolare ai desiderj de' malati. Queste sono voci della Natura, che di spesso ci additano la via che dobbiamo seguire. E' vero che non conviene loro ciecamente concedere tutto ciò che il loro infermo appetito richiede; ma si può in generale accordare un poco di ciò che desiderano ardentemente, tutto che a bella prima apparisca non dover loro convenire. Ciò che un malato desidera con bramosia, il suo stomaco ordinariamente lo digerisce; e alcune di queste cose anno talvolta il più felice effetto (8).

Si fatte
malattie
sono rarissime.

Pericoli
dell' arre-
stare il su-
dore qua-
lunque vol-
ta appari-
sca natural-
mente, so-
pra tutto
alla fine
de' mali.

La Natura
ispira so-
vente il
gusto pegli
alimenti e
pei rimedj
convene-
voli alla
malattia.

Inspirazio-
ne della
Natura
nelle ma-
lattie del
genere pu-
trido.

ce il Sig. TISSOT, bastantemente ammonire gli abitanti della campagna, i quali studiando nel principio delle *febbri* di promuovere il sudore, con de' *rimedj riscaldanti*, miseramente si ammazzano. Ho veduto, soggiunge, alcuni casi; ne quali le sollecitudini che si erano prese per isforzare il sudore, avevano recato la morte all'infermo tanto evidentemente, come se alcuno gli avesse d'un colpo schiacciato la cervella.

Rarissimi sono adunque que' mali nel cominciar de' quali abbisogni eccitare il sudore. Su tale affare, d'ordinario dobbiamo consultar la Natura. Qualora essa si trovi disposta al sudore, i mezzi proposti dal Sig. BUCHAN sono bastevoli per aiutarla in questa *escrezione*.

Ma siccome è pericoloso di eccitare il sudore nel principio della maggior parte dei mali, non lo è però meno l'arrestarlo quando naturalmente si manifesti, sopra tutto alla fine di alcune malattie, allorchè dopo alcune copiose bevande se ne sieno distrutte le cagioni; avvegnachè questo sudore seco strascina fuori una porzione degli umori morbosì, le parti le più grosse essendo omai uscite per la via degli *escrementi* e delle *orine*.

(8) Lo sforzare pertinacemente un malato a prendere dei *medicamenti* che gli ributtano, massime quando quelli ch'egli brama non sieno direttamente opposti al suo male, nè molo to di per se nocevoli, questo è un atto di perigliosa e biasimevole severità. Quegli che conosce la Natura, sa ch'ella c'ispira, ben più sovente che non si crede, la bramosia degli *alimenti* e de' *rimedj* che convengono alle sue viste salutari.

In quasi tutte le malattie di genere *putrido* gli ammalati anno una avversione invincibile per li brodi di carne, per le sostanze *animali*, per il pesce, per tutto altro di analogo. In questi casi poco meno che tutti i malati domandano de' *cedri*, degli *aranci*, degli *alimenti* e de' *rimedj acidi* li addentano con avidità. Sono pur de' quelli che convengono

§. III.

Del Governo della convalescenza delle febbri.

Quello, su cui più di tutto deeſi occupare nella convaleſcenza delle febbri, è di prevenirne il ritorno. Buon numero di perſone fanno delle ricadute, o contraggono degli altri mali per eſſerſi troppo preſto perſuaſe di eſſere guarite (9).

Prima in-
tenzione
che biſogna
avere nella
convaleſ-
cenza del-
le febbri.

contro la *putreſcenza*, e che per combatterla ſi preſcrivono dai Pratici più illuminati.

Da per tutto la Natura domanda ciò ch'è a lei neceſſario. I popoli ſettentrionali anno un'appetenza determinata pegli *amari* che convengono nella viſchioſa *saverra* che loro è quaſi naturale; e gli abitanti delle regioni meridionali ſi formano le loro delizie dall'*emulſioni*, dai *ſorbetti*, dalle *confeſture*; ec. che loro rieſcono neceſſarie.

Da per tut-
to la Natu-
ra doman-
da ciò ch'
è a lei ne-
ceſſario.
Eſempio
dei popoli
del Nord è
del Mezzod-
giorno.

Queſte riſieſſioni provano che ſeguendo le orme della Natura, è difficile di ſmarrirſi, e che confrontando tra loro i ſenomeni ch'ella ci preſenta, ſi trova ch'ella offre tutta intera ſe ſteſſa agli occhi noſtri. (M. CLERC, *Hiſt. nat. de l'hom. mal.*)

(9) E' dunque importante di ſiffare l'idee ſu ciò, che deeſi intendere con la parola *convaleſcenza*, e di eſibire per quanto è poſſibile i caratteri di queſto ſtato, che tiene il luogo di mezzo tra la malattia e la ſanità: imperciocchè nella convaleſcenza non v'è più male; egli è ceſſato; e la ſanità per anco non eſiſte, poichè il *convaleſcente* non può eſercitare le ſue *funzioni* con quella ſteſſa forza, vigore, e regolarità di allora quando godeva ſalute.

Cosa deb-
baſi inten-
dere per la
parola con-
valeſcenza?

Secondo IPPOCRATE il malato entra in *convaleſcenza*, allorchè più non prova alcun dolore, allorchè reſpira con facilità; che dorme placidamente la notte, e che dà a divedere tutti i ſegni che inſpirano la ſicurezza la più completa. (Progn. lib. 3.) Un malato non può dunque eſſere riputato convaleſcente ſe non dopo che i ſegni caratteriſtici della malattia ſono ſpariti; che i ſintomi anno ceduto ai ſoccorſi tanto della Natura, come dell'Arte; che le *ſecrezioni* e l'*eſcrezioni* cominciano ad adempierſi con regolarità; in corto dire, come prima l'ordine e l'equilibrio tra i *ſolidi* e i *fluidi* appaiono poco a poco riſtabilirſi. Ma abbifoſogna per queſto che la cagione del male più non eſiſta, e per conſeguenza che la materia morboſa ſia ſtata evacuata, o diſſipata. La *convaleſcenza* non può adunque eſſere ſe non lo ſtato che ſuſ-

Caratteri,
da' quali ſi
riconoſce
che l'infer-
mo è ca-
trato nella
convaleſ-
cenza.

Il coavale-
scenti de-
vono met-
tersi al ri-
paro dal
freddo, fa-

Siccome il corpo dopo avere sofferta una febbre è debole e dilicato, bisogna che i *convalescenti* si muniscano contro il freddo, a fine di evitare l'*insfredda-*

segue immediatamente alle *crisi*. (Ved. questa voce nella Tavola.)

Cagioni
per le qua-
li insorgano
tutto gior-
no sopra i
caratteri
della con-
valescen-
za.

Per quantunque facili sembrino a rilevarsi sì fatti caratteri, pur niente v'è di più comune, quanto il veder commettere su tal proposito più gli errori i più grossolani. Quanti malati, de' quali se n'era annunciata la *convalescenza*, non sono ricaduti alcuni giorni in appresso, o anche sono morti con grande sorpresa di coloro che li assistevano? Cotesi abbagli si rinnovelleranno e si moltiplicheranno, finchè quegli che si spaccia per maestro dell'Arte, non ravviserà il potere della Natura nella guarigione de' mali, e che non fiderà se non nei propri *rimedj*; fino a tanto che non vorrà persuadersi, che il Medico non è assolutamente che il ministro di questa vigile madre; ch'egli non è destinato che a conoscere le sue intenzioni, ad eseguirle i suoi ordini, ad esser docile alle sue istruzioni, a seguire il cammino ch'ella gli segna, ed a prestarlo i soccorsi ch'ella domanda. (Ved. qui appresso il Cap. III, nota 11, e Cap. IV, nota 7. di questo Vol. II.)

Non v'è
alcuna ve-
ra conva-
lescenza,
quando
non sia sta-
ta precedu-
ta da una
crisi.

Qualora sia incapace di persuadersi di queste verità, giammai arriverà a conoscere, o a prevedere una *convalescenza*. Di fatti in mezzo a tanta folla di *rimedj* accumulati gli uni sugli altri senza ordine, senza scelta; in mezzo a quelle cacciate di sangue sempre soverchiamente moltiplicate; a quei purgativi ripetuti dal cominciamento della malattia fino alla fine, come scorgere e distinguere que' movimenti salutari, in cui la Natura si mette per venire a capo del suo lavoro, o ch'ella medita per eseguire lo sforzo estremo, che deve renderla vittoriosa, sollecitare la *crisi*, e ricondurre la *convalescenza*.

Cosa sia la
convale-
scenza in
seguito d'
una malat-
tia trattata
a tenore d'
un metodo
di confu-
sione.

Per la qual cosa le ricadute sono tanto e più frequenti che le guarigioni, malgrado la forte resistenza che la stessa Natura incessantemente oppone a sì fatti metodi attivi, furiosi, micidiali, altrettanto che assurdi; e gl' infelici che si salvano da cotesa pratica viziosa, non risentono per tutta la *convalescenza*, per degli anni interi talvolta, che una debolezza e un languore, ch'è causa che la più menoma cosa li affetta, che ogni piccolo motivo li sconcerta, e che la più esatta regola del vivere basta appena per far loro sopportare uno stato, che più s'avvicina alla malattia che alla salute.

La conva-
lescenza è
in ragione
della crisi
nelle ma-

Ma quando s'abbiano lasciati alla Natura tutti i suoi dritti, che si sieno amministrati solo de' *rimedj*, de' quali ella ne ha dato una *indicazione* verace, e che non si sieno ripetuti se non quanto ch'ella ne ha ispirato la necessità, in allora la

pure. Una compagnia piacevole e gioconda, come pure un esercizio moderato all'aria aperta, loro saranno utilissimi; ma deesi evitare sopra tutto una grande stanchezza.

Gli *alimenti* devono essere leggieri, ma nutritivi. Bisogna mangiare sovente; ma poco alla volta. Sarebbe pericoloso per un *convalescente* ch'ei mangiasse in ciaschedun pasto, quanto il suo stomaco ricerca.

Non è ciò che si mangia che nutrisce, egli è ciò che si digerisce. Il *convalescente* che mangia poco, digerisce e si fortifica. Quegli che mangia molto, aggrava il suo stomaco, che spollato dal modo di *vitto*, dai *rimedj*, dalla malattia, non ha forza bastante per digerire; e ben lungi dal nodrirsi e fortificarsi, egli poco a poco si strugge.

Si può, dice il Sig. TISSOT, ridurre al piccolo numero delle regole seguenti, quanto v'ha di più essenziale da osservarsi, per terminare perfettamente le malattie acute, e impedire tanto le ricadute, come le malattie di languore.

1. Che i *convalescenti* mangino pochissimo alla volta e frequentemente.

2. Che non prendano che una sola specie di *alimento* in un pasto, e che non cangino spesso.

3. Ch'essi mastichino molto ciò che prendono di solido.

4. Che scemino la quantità di bevanda che usavano nella malattia. In generale la migliore è l'acqua con un terzo di vino vecchio.

Una soverchia quantità di bevanda in questo tem-

re un esecizio che non stanchi, ec.

Quali debbono essere i loro alimenti.

Bisogna ch'ei mangi poco alla volta e di sovente. Perché?

Regole che bisogna seguire nel governo della convalescenza.

malattia che ha percorso tutto il suo viaggio senza essere contrariata, perviene a quello della *crisi*, nel mentre che il malato ha ancora una gran parte delle sue forze; in guisa che la materia morbosa ben preparata si evacua agevolmente, prontamente, e il malato entra immediatamente in una *convalescenza* felice: avvegnachè la convalescenza è sempre in ragione della *crisi*: allorchè questa è pronta e facile, quella riesce comoda e corta: allorchè la *crisi* è difficile, lenta o imperfetta, la convalescenza ha gli stessi caratteri.

lattie trattate a tenore dei precetti dell'arte.

po impedisce allo stomaco di riprendere le sue forze; nuoce alla *digestione*, mantiene la debolezza, aumenta la disposizione all'enfiagione delle gambe; talvolta altresì cagiona una *febbre lenta*, e getta il *convalescente* in languore.

5. Vadano a diporto il più spesso che potranno; a piedi, in vettura, a cavallo, massimamente innanzi il desinare: Il moto a cavallo è il più salutare di tutti: e coloro che sono in caso di gustarne gli vantaggi, a gran torto lo trascurano. Diciamo di fate dell'*esercizio* avanti il desinare, perchè egli turberebbe la *digestione*, qualora si facesse dopo.

6. Prendano pochi *alimenti* la sera; il loro sonno sarà più tranquillo.

7. Usino del moto; a fine di dissipare l'enfiagione poco dannosa delle gambe, che sopravviene alla fine di quasi tutte le malattie gravi.

8. Prendano ogni due o tre giorni un *serviziale*; se si trovino troppo stitici. Non è però necessario che scarichino ogni giorno il corpo; ma non bisogna che il ventre stia più di due, o tre giorni senza, a fine di evitare la *stitichezza*, che cagionerebbe delle enfiagioni, del calore, delle doglie di capo, ec.

Si trovano sovente de' *convalescenti*, che hanno bisogno di essere purgati una o due volte, onde prevenire il pericolo degli ammassi, che si formano agevolmente quando si mangia molto, e che gli organi della *digestione* non hanno per anco ripreso tutte le loro forze: In tal caso un blando *purgativo*; come due *dramme* di *follicoli di senna*, e due oncie, o due oncie e mezzo di *manna grassa*; è per l'ordinario bastevole.

9. Se loro resti molta debolezza, se lo stomaco sia sconcertato, se abbiano di tempo in tempo qualche risentimento di *febbre*, prendano una, due, tre volte per giorno una *dramma* di *chinachina* in polvere: questo *rimedio* ristabilirà le *digestioni*, rimetterà le forze, e scaccierà la *febbre*.

10. Si guardino dal riprendere troppo presto le loro occupazioni. Il troppo anticipato lavoro è la cagione delle malattie di languore, che riconoscono

quasi sempre l'origine da una *malattia acuta*, la quale per mancanza di riguardo nella *convalescenza*; non è stata bene guarita. Questo è un difetto, in cui cadono quasi tutti gli artefici e le genti della campagna. Se ne scontrano tutto giorno di languenti e d'incapaci a riprendere le loro occupazioni con la loro primiera attività, perchè non anno voluto riposarsi qualche giorno di più: pur tuttavia questo leggiero sacrificio loro avrebbe risparmiato simili infermità.

11. Schivino con la maggiore attenzione e diligenza l'*aria notturna*: su di che abbiamo parlato nella Prima Parte Cap. XII, §. III, Art. IV.)

CAPITOLO TERZO.

Della Febbri intermittenti.

LE *febbri intermittenti* sono di tutte le *febbri* quelle, che offrono le occasioni le più favorevoli d'osservare tanto il carattere di questa classe di mali, quanto l'effetto dei *rimedj*. Non v'ha persona che non possa distinguere una *febbre intermittente* da qualsiasi altra; e i *rimedj* che le convengono, sono assolutamente conosciuti presso che universalmente (1).

(1) Noi vorremmo daddovero supporre la stessa cognizione in tutti i nostri compatrioti; ma l'esperienza ci fa veder tutto giorno, che le parole *intermittente*, *serena*, *quiescenza*, ec. sono ancora termini incogniti alla maggior parte d'essi; giacchè solo a forza di molte e diverse interrogazioni si giunge alla fine a conoscere la specie di *febbre*, da cui sono travagliati.

Niente però è sì facile a rivelare quanto il carattere delle *febbri intermittenti*. Si dà questo nome a quelle che anno de' *raggraffi periodici*; vale a dire, quelle che dopo essere onninamente sparite, ritornano replicatamente a capo di ventiquattr'ore, al termine di due, tre giorni, ec. Questi ritornanti si chiamano *accessi*. Nell'intervallo che scorre tra l'uno e l'altro *accesso*, il malato è assolutamente libero di *febbre*; e sembra spesso godere ottima salute. Vienfi omai ad accorre

Cosa sia
una febbre
intermittente.

Divisione
delle febbri
intermit-
tenti.

Le differenti spezie di *febbri intermittenti* prendono il loro nome dai differenti *periodi*, dentro a' quali gli *accessi* ritornano: quindi ce ne sono di *cotidiane*, di *terzane*, di *quartane*, di *terzane doppie*, di *quartane doppie*, ec. E avendo riguardo alle stagioni nelle quali assalgono più ordinariamente, si dividono ancora in *febbri di primavera* e in *febbri di autunno*.

Cosa inten-
dasi per feb-
bre coti-
diana;

Si dà e si deve dare il nome di *febbre cotidiana* a quella, in cui l'*accesso* ritorna tutti i giorni a presso poco alla stessa ora.

Per febbre
terzana;

Nella *febbre terzana* egli riede il terzo giorno; in tal caso il malato ha un giorno libero, cioè un giorno in cui non v'ha *febbre* affatto alcuna.

Per febbre
quartana;

Nella *febbre quartana* l'*accesso* ricorre il quarto giorno, e il malato ha due giorni liberi.

Per febbre
terzana
doppia;

Nella *febbre terzana doppia* l'*accesso* ritorna ogni giorno, come nella *cotidiana*, con questa differenza che non è di così lunga durata; che un giorno è più leggiero, l'altro più forte; e che l'ora nella quale ritorna non è la stessa; in guisa che il primo *accesso* corrisponde per l'ora e per l'intensità al terzo, il secondo al quarto, ec. Alle volte nella *terzana doppia* l'*accesso* sopravviene due volte nello stesso giorno, e il dì seguente è libero.

Per febbre
quartana
doppia;

Nella *quartana doppia* si anno talora due *accessi* in un giorno, e i due giorni susseguenti restano liberi; e talora v'è un *accesso* in ciaschedun giorno per due giorni di seguito, allora il terzo giorno si trova libero.

Ci sono ancora delle *febbri* che ritornano il quinto, sesto, settimo, ottavo giorno, che ricompariscono tutti i mesi, ciascun anno; ma elleno sono rarissime, ed entrano per la cura nella classe delle *febbri intermittenti* semplici, come quelle che abbiamo ora descritte.

Per febbri
di prima-
vera e di
autunno.

Le *febbri di primavera* sono quelle che regnano dopo il mese di febbrajo fino alla fine di Giugno; quelle di *autunno* dominano dal mese di Luglio fino

gere che queste *febbri* sono opposte alle *febbri continue*, di cui si farà parola nel Capitolo seguente.

al mese di Gennajo : i loro caratteri essenziali sono i medesimi . Queste propriamente non sono malattie differenti ; ma le varie circostanze che le accompagnano , meritano qualche attenzione .

Le *febbri di primavera* per esempio sono talvolta congiunte ad una disposizione *infiammatoria* , perchè tale è la disposizione del corpo in questa stagione ; e siccome di giorno in giorno questa stagione si rende più favorevole , elleno sono ordinariamente assai brevi .

Caratteri
delle febbri
di primavera .

Le *febbri d'autunno* per lo contrario sono molto spesso accompagnate da *putrescenza* ; e siccome la stagione si rende ogni giorno più molesta , elleno sono più pertinaci . Le *febbri d'autunno* sono altrettanto più ostinate , quanto più tardi esse cominciano . Così quelle di Settembre e di Ottobre durano più lungamente che quelle di Luglio e di Agosto . Quando la stagione è avanzata , queste *febbri* alle volte si annunziano come *febbri putride* ; in guisa che a capo soltanto di alquanti giorni elleno si riducono a *febbri di accesso* , a *febbri intermittenti* . Ma non v'ha pericolo alcuno nello sbagliare , e nell'impiegare il governo notato per le *febbri maligne* (2) . (Ved. Cap. IX , di questo Vol.)

Caratteri
delle autunnali .

§. I.

Cagioni delle febbri intermittenti .

LE *febbri intermittenti* dipendono dai vapori ch'essalano dall'acque stagnanti e corrotte . Questa verità è dimostrata , perchè se ne vede un maggior numero nelle stagioni piovose : perchè sono più fre-

(2) Noi preghiamo istantemente il Lettore , prima di passare innanzi , di leggere i Cap. I , e II , di questo Vol. II , che abbiamo già detto di dover servire d'introduzione al trattato di cadauna malattia . Noi riguardiamo la lettura di questi Capitoli per tal guisa necessaria , che ci faremo un dovere di rimandarvi il Lettore in tutte le malattie gravi ; e siamo persuasi che in grazia della loro importanza ci verranno perdonate le tante ripetizioni .

quenti nelle contrade, dove il suolo è pantanoso; come in *Olanda*, nelle maremme della provincia di *Cambridge*, nella Contea d'*Essex*; (sulle nostre coste marittime, sulle sponde de' stagni del Mediterraneo ec.)

Gli *alimenti* di difficile *digestione*; una troppo grande quantità di frutta da nocciuolo; un *vitto* acquoso, e poco sostanzioso; l'umidità delle abitazioni; la rugiada della notte; il sonno preso sopra un terreno umido; le veglie; le fatiche; le passioni opprimenti, quali sono la mestizia, il rammarico, ec. possono altresì cagionare le *febbri intermittenti*.

Allorchè gli abitanti d'un paese elevato vengono ad abitare un luogo basso, di frequente ne vengono presi; e quando queste *febbri* dipendono da sì fatta cagione, elleno sono soggette a divenire funeste.

In corto dire, tutto ciò che può rilassare i *solidi*, diminuire la *traspirazione*, arrestare la *circolazione* de' fluidi nei *vasi capillari*, cioè ne' più piccoli *vasellini* del corpo, dispone alle *febbri intermittenti*.

§. II.

Sintomi delle febbri intermittenti.

Sintomi
che annun-
ciano l'ac-
cesso.

UNA *febbre intermittente* comincia in generale da doglia di capo, dei lombi, dei reni; da lassatezza in tutte le membra; da senso di freddo nell'*estremità*; da *pratendimenti*, da sbavigli accompagnati da *ansietà*, da *nausee*, e talvolta da vomito.

Sintomi
dell'acces-
so.

A tutto ciò succedono de' *brividi*, poscia un violento tremore: ma ben tosto la pelle si fa umidiccia, il sudore scorre copioso, e termina l'*accesso*.

Avviene talvolta però che questa *febbre* assale di sbalzo, nel momento stesso che il malato si crede in perfetta salute: ma più comunemente ella è preceduta da fiacchezza, da perdita d'appetito, e dai *sintomi* soprammentovati.

Sintomi
caratteri-
stici.

(Uno de' *sintomi* che caratterizzano più particolarmente queste *febbri*, è il colore dell'*orine* che il malato rende nel tempo stesso, e segnatamente dopo il

Regola di vitto nelle febbri intermitteuti. 33
il sudore. Esse sono rossiccie, laterizie, vale a dire, eh' esse depengono un sedimento che ha l'aspetto del mattone pesto.

Nel principio dell' *accesso* il polso è *veloce*, *debole*, e *piccolo*; la sete è assai gagliarda. Durante il caldo il polso è più forte, più grande, e la sete eccessiva. Immediatamente dopo il freddo il malato prova un calore artificiale, cui sussegue il sudore.)

§. III.

Regola di vitto che devono seguire i malati presi di febbre intermitteute.

Durante l'*accesso* il malato dee bere in copia d'una decozione d'orzo, o di avena; del siero di latte ^{Virto durante l'ac-} ^{cesso.} *avanciato*, ovvero una infusione leggiera de' fiori di *camomilla*: se si senta infiacchito, prenderà del siero di latte *vinoso* avvalorato col *succo di cedro*.

Le bevande tutte devono essere calde, onde poter facilitare l'escresione del sudore, e conseguentemente diminuire l'intensità dell'*accesso* (a).

Negl' *intervalli* tra gli *accessi*, bisogna sostentare il malato con degli *alimenti* nutritivi, ma leggieri e di facile *digestione*: tali sono li brodi di vitello, o di pollo; del *cremore di avena* con un poco di *vin*; delle zuppe leggieri, ec. La sua bevanda sarà del *vin* inacquato, *acidulato* col *succo di cedro*, o di *melarancia*, e alcune fiate un poco di *punch* leggiero. Bisogna ancora, ch'ei beva delle *infusioni* di *piante amare*, tali sono quelle di *camomilla*, d'*assenzio*, o di *risfoglio palustre*. Può in allora e in tutti i tempi bere un po' di *vin* leggiero, in cui si avrà fatto in-

(a) Si è osservato che venti o ventecinquè goccioline di *laudanum liquido* del SYDENHAM, date al malato in un bicchiere dell'una o dell'altra di queste *risane*, mezz'ora dopo l'incominciamento del calore dell'*accesso*, facilitavano il sudore, diminuivano la lunghezza del *parossismo*, alleggerivano il capo, e confluivano singolarmente alla guarigione della febbre.

^{Laudanum}
^{liquido pro-}
^{posto come}
^{capace di}
^{moderare}
^{l'accesso.}

fondere della radice di *genziana*, della *centaurea minore*, o qualche altro *amaro*.

Avvantaggio d'un esercizio moderato tra gli accelli.

Siccome la principale attenzione che si deve avere nel governo d'una *febbre intermittente*, è di corroborare i *solidi* e di agevolare la *traspirazione*, l'infermo per conseguenza farà tra l'intervallo degli *accessi* tanto *esercizio*, quanto potranno le sue forze permettere. Se sia in istato di sortire, di montare a cavallo, o di andare in cocchio, ne ritrarrà un grande vantaggio. Ma se sentasi troppo debole, non farà di meno che quanto ne potrà sopportare. Tuttavolta niente contribuisce d'avvantaggio al prolungamento d'una *febbre intermittente*, quanto il cedere alla inclinazione che ci porta alla pigrizia e all'inazione.

Queste febbri si guariscono sovente senza rimedi, e colla sola regola di vitto.

Quando sia di mestiere di ricorrere ai rimedi,

La regola conveniente e ben diretta del *vitto* guarirà sovente una *febbre intermittente*, senza il soccorso di verun *rimedio*. Se la malattia non è d'un *peffimo carattere*, se il luogo che abita il malato è asciutto e ben arioso, si farà quasi sempre sicuro di riuscire per via della sola regola di *vitto* (3).

Ma se le forze sembrano andar mancando, se gli *accessi* giungano ad un tal grado di *violenza* che facciano temere per la vita dell'infermo, allora bisogna senza indugio ricorrere ai *rimedi*. Tuttavolta non si devono giammai cominciare, qualora il male non siasi perfettamente dichiarato, ed è quanto a dire, che il malato non abbia sofferti parecchi *accessi* (almeno tre).

Eccellenza relativa a quelle dell'autunno.

(3) Questo è vero relativamente a quelle di *primavera*; ma non è lo stesso di quelle d'*autunno*, che talvolta durano tempo lunghissimo, e anche sovente fino alla primavera seguente, qualora si lascino senza *rimedi*, e non si governino convenevolmente. (Ved. in seguito pag. 43. di questo Vol.)

§. IV.

Della cura delle febbri intermittenti.

ARTICOLO PRIMO.

Maniera di governare gli adulti.

LA prima cosa da farsi nella cura d'una *febbre inter-* Bisogna cominciare dai vomitivi. Perché?
mittente, è di ripulire le *prime strade*. Dopo questa operazione non solamente l'applicazione dei *rimedj* è più sicura, ma essi ancora divengono più efficaci.

In questa malattia lo *stomaco* è ordinariamente carico di *flemme viscosi*; e accade spessissimo che il malato vomiti una grande quantità di *bile*. Questi sforzi della Natura indicano bastantemente la necessità di far vomitare. I vomitivi sono adunque i primi *rimedj* che bisogna amministrare al malato.

L'*ipecaeuana* è tra tutti gli altri quello che corrisponde meglio a questa *indicazione*: venti o trenta grani di questa radice in polvere basteranno per un adulto. Si diminuirà la dose proporzionatamente all'età del malato (4). Allorchè il *vomitivo* comincerà

Si deve dare la preferenza all'*ipecaeuana*.

(4) Questo consiglio è senza dubbio savissimo: ma la dose che l'Autore propone per un adulto, potrà parere troppo gagliarda, perchè quindici grani di cotesta radice fanno generalmente vomitare, e la più forte dose è di ventigrani. Fortunatamente si è osservato che coloro i quali la danno a quaranta grani, non ne ottengono effetto maggiore di quelli che non la usano se non a quindici. La ragione di questo fenomeno, dice il Sig. VERNER, è assai semplice: ed è che come prima i *fuchi* dello *stomaco* anno disciolto sufficiente quantità di *resina* dell'*ipecaeuana*, onde eccitare il *vomito*, il malato vomita subitamente, e ne rigetta il resto. Se il *vomito* continua, ciò deriva soltanto, perchè la *resina*, la quale è stata disciolta, rimane attaccata alle pareti dello *stomaco*, e l'irrita. Non v'è Pratico alcuno che non abbia avvertito l'aggiustatezza di sì fatto ragionamento. Tuttavolta crediamo più prudente di tenerli a quindici o venti grani, poichè in questa dose egli è infinitamente raro ch'essa manchi del suo effetto.

Dose in cui bisogna dare questa radice.

ad operare, il malato berà abbondantemente d'una leggiera infusione di fiori di camomilla.

In qual
momento
conviene
l'orgere
emetico.

In una *febbre intermittente* conviene porgere il vomitivo due o tre ore avanti il ritorno dell' *accesso*.

Si può iterarlo, se sia necessario, il giorno appresso, per una *febbre quotidiana*, e due o tre giorni dopo, per le altre *febbri intermittenti*.

Importan-
za de' vo-
mitivi nelle
febbri in-
termitten-
ti.

Oltre che i vomitivi nettano lo stomaco, eccitano ancora la traspirazione, e aumentano tutte le altre *escrezioni*. Cotesti effetti li rendono d'una tale importanza, che guariscono sovente le *febbri intermittenti* senza il soccorso di verun altro rimedio.

I purgati-
vi ci sono
alle volte
utili.

I purgativi sono alle volte utili in queste *febbri*, anzi ci sono sovente necessari. S'è veduto una *purgazione* violenta guarire una *febbre intermittente*, che aveva resistito alla *chinachina* e agli altri rimedj *febrisfugi*.

Sintomi,
che indica-
no i purga-
tivi in tut-
te le ma-
lattie.

(Si deve segnatamente purgare, quando, dopo il vomitivo, il malato anche fuori dell' *accesso* si sente disgustosa la bocca; qualora provi dell' inappetenza; de' dolori ne' reni, nei lombi; dell' inquietudini; ec. *sintomi* che indicano sempre i purgativi in qualunque malattia, e presso qualunque malato si rincontrano.)

Come bi-
sogna farla
prendere.

Un'attenzione che bisogna avere, quando si esibisce l'*ipocacua* in polvere, e in generale tutti i rimedj in polvere presi in un liquido, si è ch'ella sia perfettamente mescolata all'acqua o alla *risana*. Per tal effetto si mette la polvere nel fondo del bicchiere; si versano al di sopra alquante goccioline d'acqua; si stempera perfettamente col dito, e con un cucchiajo; si continua a versare dell'acqua, e a diluire sino a che il bicchiere sia pieno. Dopo che l'ammalato ha preso questo rimedio, egli resterà in quiete sino a tanto, che si senta alcune voglie di vomitare. Allora se gli daranno in seguito due o tre bicchieri d'acqua, o di leggiera *risana* tiepida: dappoichè abbia vomitato per la prima volta, si ripeterà un bicchiere della bevanda in ogni quarto d'ora, finchè più non si senta disposizione alcuna al vomito; dopo di che se gli darà un brodo, purchè però vi manchi ancora un'ora almeno da questo momento a quello del ritorno del nuovo *accesso*; perchè più tardi il malato non ha più bisogno di nulla.

Frattanto siccome i vomitivi sono infinitamente meglio indicati nelle febbri intermittenti, i purgativi ci divengono meno necessarij, qualora almeno il malato non senta della ripugnanza per i vomitivi; allora bisognerà che si ripuliscano gl' intestini nel giorno, che non deve sopravvenire l'acceso, ovvero otto bre avanti l'acceso nelle febbri quotidiane; con una dose, o due di *sal Glauberiano*; di *sciarappa* e di *riobarbaro*, (combinati nella maniera seguente.

Ma lo scemmeno che i vomitivi.

Tempi di amministrarli.

Modello d'una medicina conveniente in questi casi.

Prendete di *sciarappa* pesta; grani venticquattro; *riobarbaro* scelto pesto, una dramma, Fate bollire queste due sostanze in un bicchiere d'acqua per alquanti minuti; feltrate.

Aggiungete di *sal Glauberiano*, due dramme.

Si prenda questa medicina in un bicchiere, e si ripeta se sia necessario:)

La *cacciata di sangue* può alcuna volta convenire nel cominciamento d'una *febbre intermittente*, massimamente quando il calore eccessivo, il delirio, ec. danno motivo di sospettare d'*infiammazione*; ma siccome in questa specie di *febbre*; il *sangue* è assai di rado in uno stato *infiammatorio*, la *missione di sangue* vi si trova altresì radamente necessaria; e se sia ripetuta parecchie volte; essa non tende, che a prolungare la malattia (5).

Il salasso è radamente necessario nelle febbri intermittenti.

Dopo le convenienti *evacuazioni* (6) il malato può con tutta sicurezza prendere la *chinachina*. Bisogna

Tempi, in cui bisogna amministrarla.

(5) Noi preghiamo il Lettore di rivedere ciò, che si è detto pag: 21, e nota 5, e 6 di questo Vol., e di non perdere giammai di vista, che i sintomi descritti alla fine della nota 6, sono i soli, che rendono necessario il *salasso*. Io non posso a meno, dice il Sig. CLERG, di osservare, che si deve essere estremamente circospetto sull' uso del *salasso* nelle febbri intermittenti: la loro cagione d'ordinario risiede nelle *prime vie*, e non vedo il motivo, perchè si abbia a vuotare i *vasi sanguigni*, quando queste *febbri* non sono accompagnate da *sintomi* straordinarij. La debolezza del malato, la lunghezza della *febbre*; l'*enfiammazione*, e l'*idropisia* sono le conseguenze ordinarie di questi *inopportuni salassi*.

Perchè?

Suoi effetti funesti in queste febbri.

(6) Ch'è quanto a dire, dopo il vomitorio, o il purgante; o il *salasso*, se questo sia indicato. In generale la pur-

Prendere la chinachina. Sotto qual forma, e come conviene esibirla.

esibirla sotto la forma che più gli aggrada. Ma nessuna preparazione di *chinachina* conviene meglio nelle *febbri intermittenti*, che la forma la più semplice sotto cui si può darla, voglio dire in polvere.

Prendete della miglior *chinachina*, due oncie.

Riducetela in polvere finissima.

Dividetela in ventiquattro parti uguali.

Si prenderà cadauna di queste parti sia in un bicchieretto di vino, sia in una tazza d'infusione di *camomilla*, come in una tazza di decozione di *avena*: oppure se ne faranno tanti bocconcelli con quantità sufficiente di sciloppo di cedro.

Nella febbre cotidiana;

Nella *febbre cotidiana*, vale a dire in quella, di cui gli accessi ritornano tutti i giorni, il malato prenderà ogni due ore, eccettuato durante l'accesso, una delle parti specificate qui sopra; con questo metodo potrà prenderne cinque o sei nell'intervallo degli accessi.

Nella terzana;

In una *febbre terzana* basterà di prendere ciascheduna di queste parti ogni tre ore.

Nella quartana, ec.

Nella *quartana* ogni quattr'ore, sempre fuori del tempo dell'accesso (7).

Se il malato non potesse risolversi a prendere in una volta una dose così grande di *chinachina*, si potrebbe distribuirgliela in due o in tre parti: allora prenderà queste divisioni di dose in ciaschedun'ora per la *febbre cotidiana*; ogni due ore per la *terzana*; ogni tre ore per la *quartana*.

denza vuole che si cominej sempre dal far vomitare, o dal purgare l'infesto. La *chinachina* in allora agisce con più di efficacia. Ma tosto che si avrà cominciato l'uso della *chinachina*, si avrà riguardo di non far vomitare o di non purgare: queste *evacuazioni* manterrebbero la *febbre*, o la risveglierebbero, qualora fosse assopita.

La cura di tutte queste specie di febbri, effere la stessa.

(7) Si vede che la cura che il Sig. BUCHAN propone in questo paragrafo, conviene a tutte le *febbri intermittenti*, che abbiamo noverato qui sopra pag. 30. di questo Vol., poichè tutte coteste *febbri* essendo essenzialmente le medesime, come l'abbiamo detto, esigono gli stessi *rimedj*, con le modificazioni per altro specificate.

Una ben minore quantità ne abbisognerà per le persone giovani, (cioè dell'età di quindici, dodici anni, e al disotto fino ai sette: si vedrà qui appresso nell'Art. II. di questo Paragrafo, come bisogna trattare i fanciulli.) In generale la dose deve essere proporzionata all'età; alla costituzione; alla violenza dei sintomi; ec. (8).

La *chinachina* nella maniera da noi descritta di rado manca di guarire una *febbre intermittente*. Ma non bisogna che il malato la tralasci, subito che l'*accesso* sembra averlo abbandonato; per lo contrario fa di mestiere ch'ei ne continui l'uso, sino che sia certo che il male è interamente guarito. Si resta deluso nella cura della maggior parte di queste *febbri*, perchè il malato non mette in uso bastantemente a lungo la *chinachina*. In generale molti ne prendono, sino a tanto che veggono gli *accessi* dissipati; allora la lasciano, col rischio di ricadere dopo qualche tratto di tempo. Per questo mezzo la malattia acquista vigore, e ricomparisce sovente con vie maggiore violenza.

Per quanto tempo faccia d'uopo di prendere la *chinachina*.

La sola maniera di prevenire le ricadute è, dopo che i *sintomi* sono svaniti, di continuare per qualche tempo l'uso della *chinachina* in piccole dosi.

Maniera di prevenire le ricadute.

Tal è il metodo il più sicuro e il più efficace di guarire le *febbri intermittenti*.

Durante l'uso della *chinachina*, si potrà bere dell'*infusione* seguente.

Prendete della radice di *genziana*, un' oncia;
 di *calamo aromatico*,)
 di *scorza d'arancio*,) mezz'oncia.
 di *fiori di camomilla*,)
 tre o quattro pizzichi;
 di *femi di coriandolo*, un pizzico.

Infusione amara di cui bisogna bere durante l'uso della *chinachina*.

(8) Non bisogna credere che le due oncie di *chinachina*, qui dall'Autore prescritte, sieno una troppo grande quantità per un adulto. Vi sono delle persone, cui questa dose non basterà, e le quali faranno altresì obbligate a raddoppiarla. Si manca soventemente di guarire le *febbri intermittenti*, appunto perchè si prescrive la *chinachina* in dose troppo scarsa. Si esclama contro il *rimedio*, che si crede inutile: ma tale non è, se non per colpa di quelli che lo mettono in uso.

La *chinachina* dee prendersi in gran dose, se si vuole ch'ella risani.

Pestate leggermente tutto in un mortajo. Prendete un mezzo pizzico di tutti questi ingredienti; mettetelo in un vaso da tè; versatevi sopra una foglietta d'acqua bollente. (Lasciatelo in *infusione* come il tè.)

Una tazza di questa *infusione* bevuta tre o quattro volte per giorno, fortificherà lo stomaco, e accelererà singolarmente la guarigione.

Siccome vi sono degli ammalati che non possono soffrire le *infusioni* fatte nell'acqua; questa si farà loro nel vino, mettendo in *infusione* due pizzichi di questi ingredienti dentro una pinta di vino bianco, per lo spazio di quattro o cinque giorni. Ne berranno un bicchiere due o tre volte al giorno.

Se il malato prende copiosamente dell'*infusione* acquosa anzidetta, o dell'*infusione* vinosa, come s'è prescritto, o di qualsivoglia altra *infusione* di *piante amare*, avrà bisogno d'una minore quantità di *china china* per giungere alla guarigione (b).

Parecchie
piante no-
stali po-
trebbero
guarire le
febbri in-
termitten-
ti.

(b) V'è ragione di credere che un gran numero delle nostre piante, o scorze *amare e astringenti*, riuscirebbero nella cura delle *febbri intermitteni*, massime qualora si accoppiassero ad alcune *piante aromatiche*. Ma siccome la *chinachina* è da lungo tempo riconosciuta per uno *specifico* in questi mali, e che la riputazione, che s'è acquistata, le conviene meritevolmente per tutti i riguardi, ci troviamo meno in bisogno di ricorrere ad altri *rimedj*. Non possiamo tuttavia dispensarci dal far osservare, che la *chinachina* è di sovente adulterata o falsificata, e che fa d'uopo di molta perizia ed attenzione per distinguere la falsa dalla vera. Io non faccio questa osservazione se non a fine, che coloro i quali si serviranno di questa corteccia, si mettano in guardia contro le persone che ne fanno il commercio (9).

(9) Per questa ragione importantissima, sopra tutto in grazia degli abitanti della campagna, che possono appena procacciarsi le *droghe* le più comuni, e sempre falsificate o guaste, ci accingiamo ad additare le *piante* di questa regione, le quali essendo eccellenti *febrifugi*, possono supplire alla *chinachina*, tutte le volte che v'abbia ragion di temere d'essere ingannati sulle qualità di questa ultima scorza, o che non si abbia la facilità di procurarsene.

Quali sono queste
piante.

Queste piante sono: 1. il *salice bianco comune*; il *salicone*, o *salcio fragile*, e il *salcio a tre stami*: 2. il *castagno*

Le persone, che non potranno trangugiare la *chinachina* in sostanza, vale a dire in polvere, la prenderanno in *infusione* o decotto. L'*infusione* si fa nella maniera seguente.

Altra maniera di prescrivere la chinachina.

d'India: 3. il *ciriegio silvestre*: 4. il *frassino*, e 5. il *pruno spinoso*.

1. Sebbene tutte le spezie di *salcio* sembrino possedere le medesime proprietà, devonsi appigliare a quelle che abbiamo nominato, come le sole, la di cui efficacia è stata avvertita dall'esperienza.

Tre spezie di salcio
Maniera di adoperare la scorza di questi alberi.

E' già da gran tempo ch' erasi cimentata la corteccia del *salcio* nelle *febbri intermittenti*, e si fatti tentativi non erano senza frutto riusciti. Ma riferbavasi al Sig. COSTK, e al Sig. WILLEMENT di autenticarli. Questa è la maniera, con cui si esprimono in un'Opera coronata dall'Accademia di Liona nel 1776, intitolata: *Essais Botaniques, Chymiques, & Pharmacologiques, sur quelques plantes indigènes, substituées avec succès à des végétaux exotiques, &c.*

„ Abbiamo fatto prendere nelle *febbri intermittenti* la scorza del *salcio*, alla dose d'una dramma, in polvere finissima di quattro in quattr'ore in una decozione leggera di *caffè*. Questo rimedio ha poche volte mancato di effetto, massime quando abbiamo preparato i nostri inferni con un vomitorio, o con un purgativo. Quattro persone purgate col *sirimalo* anno preso nell'intervallo dal quarto al quinto *accesso* sei dramme di questa scorza nella decozione somministrata. In due di essi il quinto *accesso* non è comparso. I due altri lo anno avuto assai moderato. Ne anno preso di più una mezza oncia in quattro prese nell'intervallo dal quinto al sesto *accesso*, che non s'è fatto vedere; e noi siamo onninamente convinti di una guarigione radicale, senza veruna recidiva, nè incomodo coll'uso di questo rimedio „.

La corteccia di *salice*, prescritta come ora s'è detto, ha guarito sotto i miei occhi una *febbre quartana*, che una femmina attempata portava da sei mesi, quella di un suo fanciullo dell'età di nove o dieci anni, e una *febbre tertiana* in una giovine femmina incinta, che non arrivò al settimo *accesso*.

2. Il *castagno* d'India, sì bene conosciuto dal fare l'ornamento de' nostri giardini, somministra una corteccia, che secondo l'asserzione di parecchi Medici, non è meno della *chinachina* valevole contro le *febbri intermittenti*. Questa scorza si prescrive immediatamente avanti l'*accesso*, alla dose di due dramme, ridotta in polvere, e infusa in quattro oncie d'*acqua di cardo santo*.

Il castagno d'India.
Maniera di adoperare la sua scorza.

Infusione
nel vino.

Prendere della miglior *chinachina* in polvere un' oncia . Mettetela in una pinta di vino bianco : lasciatela infondere a freddo per quattro o cinque gior-

Oppure in decotto, nella maniera seguente .

Prendete della scorza di *castagno d'India* ridotta in polvere grossolana , un' oncia ;

radice di legorizia acciaccata, una mediocre porzione .

Fate bollire la scorza in una pinta d' acqua fino a ridurla un terzo . Aggiungete sul fine la *legorizia* . Feltrate il tutto .

Divisa questa porzione in quattro bicchieri , se ne prende uno di quattro in quattr' ore nell' intervallo degli *accessi* . Se abbiasi qualche ripugnanza a così fatta bevanda , si darà questa stessa scorza , come segue .

Prendete della scorza di *castagno d'India* in polvere sottilissima , un' oncia ;

graziola preparata , grani quarantotto ;

sale di spigo salvatico , una dramma ;

sciloppo di fiori di pesco , quanto abbiso-

gna per formare del tutto un *elettuario* .

Il malato ne prenderà una quantità della grossezza d' una *noce moscata* , di tre in tre ore , bevendovi sopra un bicchiere d' *infusione di cicoria silvestre* .

„ Undici febbricitanti di differente età e *complexione* , al
„ dire dei Signori COSSE e WILLEMENT , sono risanati dal-
„ la *febbre terzana e quartana* , mediante questa corteccia ,
„ che anno presa presso poco nella stessa quantità , in cui si
„ usò la *chinachina* . Essi guarirono dentro gli otto o dieci
„ giorni , che si sono soggetti alla prima ordinazione , sen-
„ za più ricadere „ .

Ciriagio
silvestre.
Maniera di
adoperare
la sua scor-
za .

3. Saranno daccirca venti anni , che si riconosce nella Lo-
rena la scorza del *ciriagio silvestre* come analoga alla pro-
prietà della *chinachina* . Si dà la scorza di questo *ciriagio* al-
la dose d' una dramma in polvere : o se questa polvere ripu-
gna , se ne fa un *elettuario* , nella maniera seguente .

Prendete della scorza di *ciriagio silvestre* ridotta in polvere sottilissima , un' oncia ;

sal ammoniaco , una dramma ;

sciloppo di fiori di ciriagio , o mancando que-

sto , *sciloppo di assenzio* , quantità sufficiente per fare

un *elettuario* .

La dose farà la grossezza d' una *noce moscata* ogni tre ore fuori dell' *accesso* , e vi si berà sopra immediatamente dopo un bicchiere di *decozione* fatta con una dramma della stessa *corteccia* tagliata minutamente , e un poco di *legorizia* .

Tre *febbrì terzane* , una *quartana* , una *coridiana* , e una

ni, avendo cura di scuotere frequentemente la bottiglia; chiarificate l'*infusione*.

Se ne prendono tre o quattro bicchierini per gior-

doppia *terzana* si sono tutte guarite radicalmente, e senza ricadute, nè accidente di alcuna maniera.

4. La scorza del *frassino* è già stata nel 1712 nominata dall' *HELVIG* la *chinachina* di *Europa*. Essa si dà in dose di due dramme, polverizzata sottilmente di fresco, dentro una tazza di *decozione* delle foglie dello stesso albero, adolcita con un po' di *zucchero* o di *melo*. Si ripete questa dose ogni quattr'ore per tre giorni fuori del tempo dell'*accesso*. Da ultimo il malato non ne prende più che due volte per giorno: cioè la mattina e la sera, per tre o quattro giorni solamente.

il frassino.
Maniera di
adoperarne
la scorza.

„ Siamo obbligati di confessare, dicono i Signori *COSTE* e *WILLEMENT*, che tra dodici soggetti che la praticarono, ve ne furono quattro attaccati da *febbre quartana* che non guarirono, benchè se ne abbia di più d'un terzo aumentata la dose ordinaria, e insistito nell'amministrazione oltre a un mese continuo. Siamo passati alla *chinachina* in due di questi, che risanarono perfettamente. Un terzo guarì con la scorza del *pruno spinoso*; e il quarto è morto *idropico* a capo di quattro mesi. „

5. Finalmente il *pruno spinoso*, che è il nostro *acacia*, somministra una scorza, che non la cede a quelle che abbiamo poc' anzi nominate. Questa ha guarito due *febbri terzane*, in cui il sesto *accesso* non è comparso; una *febbre cotidiana*, e uno de' prefati malati, che non guarì con l'uso della scorza del *frassino*.

il pruno.
Maniera di
prescrivere
la di lui
scorza.

La sua dose è di due dramme, in *decozione* fatta a guisa di *caffè*, e ripetuta due volte per giorno: oppure se ne dà una dramma e mezzo in polvere finissima stemperata in un cucchiaino d'*infusione* de' fiori dello stesso *pruno*, una mezz' ora innanzi l'*accesso*; o finalmente se ne prende di sei in sei ore una dramma in polvere, ridotta in *pillole*, con un po' di *sciloppo* o di *melo*.

Queste sono le *pianse nostrali*, che l'esperienza ha sino ad ora averato essere *febrisfugi* valevoli a supplire le veci della *chinachina*. Quanto non è ella importante questa scoperta, poichè, come osserva l'Autore, e come si dirà nella *Tavola*, alla voce *Chinachina*, è difficilissimo il procurarsi della buona *chinachina*, e quella che si trova di buona qualità, è altresì di un prezzo che obbliga i poveri ad astenersene, e lasciarne l'uso prima che non dovrebbero, e quasi sempre prima di essere perfettamente guariti!

no, più o meno secondo l'intensità della febbre, ma sempre nell'intervallo degli accessi.

Decozione
acquosa, e
viscosa.

Questa è la maniera di preparare la *decozione*.

Pigliasi della miglior *chinachina* acciaccata, un' oncia;
radice di *serpentaria virginiana*,) di cadauno
sale di assenzio,) due dramme.

Fate bollire il tutto in una pinta d'acqua, e riducetela ad una foglietta. Feltrisi; aggiungete una quantità eguale di vino rosso; se ne prenda un bicchierino spesse volte tra giorno.

Cosa biso-
gna aggiun-
gere alla
chinachi-
na nelle
febbri in-
termitten-
ti ostinate.

Nelle *febbri intermittenti* ostinate la *chinachina* sarà più efficace se si congiunga a de' *cordiali*, di quello che se si usi sola: questo è quanto ho avuto spesso motivo di osservare in un paese, dove queste *febbri* tenevano *endemiche*. La *chinachina* vi riusciva di rado, qualora non fosse combinata almeno con la radice di *serpentaria virginiana*, col *gengiovo*, la *cannella bianca*, o con qualsiasi altro aroma caldo.

Allorchè gli accessi sono frequentissimi e assai violenti; la febbre s'accosta sovente allo stato *infiammatorio*: in questo caso sarà e più sicuro e più conveniente di dare il *sale di tartaro* in luogo del *gengiovo*. Ma nelle *febbri terzane* o *quartane* ostinate, che assalgono alla fine dell'autunno o all'entrar dell'inverno, le sostanze calde e *cordiali* sono assolutamente necessarie (c).

(c) In questa specie di *febbri* ostinate; nei soggetti in età avanzata; di *temperamento flemmatico*; quando la stagione è piovosa, allorchè le loro abitazioni sono umide, o in qualunque altra circostanza consimile, sarà necessario di aggiungere alle due oncie di *chinachina* una mezz'oncia di *serpentaria virginiana*, e due dramme di *gengiovo*, o di qualsivoglia altro aroma caldo. Ma quando i *sinтоми* annunziano una febbre di natura *infiammatoria*, in vece di tutte coteste sostanze, si mescolerà con la *chinachina* mezz'oncia di *sale d'assenzio*, o di *sale di tartaro* (10).

Non abbisogna che di rado aggiungere altri rimedi alla chinachina.

(10) In generale, tutte le sostanze alle quali si associa la *chinachina*, ne indeboliscono la virtù *febrifuga*. Fa di mestiere adunque di attentamente ponderare il caso, in cui il Sig. BUCHAN consiglia di accoppiarla ai *cordiali*, ai *temperanti*. Questi qui riferiti sono i soli, in cui possa farsi lecitamente sì fatta combinazione.

Siccome le *febbri d'autunno* e d'inverno sono in generale molto più pertinaci, che quelle di *primavera* o di *estate*, come si è detto pag. 34. di questo Volume, sarà necessario di continuare l'uso de' *rimedj* molto più a lungo nelle prime che nelle seconde. Coloro che anno sofferto una *febbre intermittente* al cominciar dell'inverno, per prevenire la recidiva, sopra tutto se la stagione è piovosa, devono prendere la *chinachina* in piccola dose fino al ritorno della buona stagione, tutto che la malattia appaja onninamente guarita. Schiveranno altresì di esporfi troppo spesso all'aria umida, massimamente quando regnino de' venti freddi orientali.

Attenzione che bisogna avere nelle febbri d'autunno.

Allorchè le *febbri intermittenti* non sono perfettamente guarite, esse spesso degenerano in malattie *croniche* contumaci; tali sono l'*idropisia*, l'*itterizia*, ec. Per ciò stesso bisogna mettere in opra tutti i mezzi possibili per stradicarle interamente, avanti che gli umori sieno viziati, e deteriorata la *costituzione*.

Malattie nelle quali degenerano le febbri intermittenti trascurate.

Sebbene non v'abbia cosa di più semplice e di più ragionevole del metodo di trattare le *febbri intermittenti*, da noi poc'anzi esposto; tuttavia per un incomprendibile capriccio, si prova tutto giorno la compiacenza di adoperare in queste malattie piuttosto, che in tutte le altre, i *rimedj* i più misteriosi ed assurdi. Non v'è vecchiarella che non posseda un segreto per sanare le *febbri intermittenti*, ed affrettasi di dar credenza alle loro pretese fallaci. Il ma-

Pretenzioni ridicole del popolo sopra il governo di queste febbri.

Si osserverà di passaggio, che talvolta la prima dose, o anche le prime dosi di *chinachina* purgano. Non v'ha in ciò niente di male. Pur tuttavia, siccome mentre ella purga, non arresta la *febbre*, bisogna riguardare queste prime dosi come perdute in quanto a questo suo oggetto principale. Forza è di darle alcune altre che cessino di purgare, e che mettan freno all'*accesso*. Se la *diarrea* continuasse, bisognerebbe per un giorno sospendere l'uso della *chinachina*, e in tale giornata dare una dramma di *rubarbaro*, sia in polvere o in bocconcetti, sia in *infusione* o in bollitura, e poscia riprendere la *chinachina*. Se la *diarrea* persistesse, si mescolerà a ciascheduna presa del *febrisugo* quindici o venti grani di *teriac*, fino che essa sia fermata.

Cosa conviene fare allorchè la chinachina purga, e produce scorrenza di ventre.

lato è sollecito a prestar fiducia a chiunque gli promette una guarigione pronta e momentanea: ma nella cura de' mali, *il cammino più corto non è sempre il migliore*.

Unico metodo di guarire sicuramente le malattie.

L'unico metodo per ottenere una guarigione certa e durevole, è d'aiutare gradatamente la Natura nei mezzi ch'ella impiega per scacciare la cagione della malattia (11).

Pericoli dei liquori spiritosi, e per guarire dalle febbri intermit-
tenti.

Taluni per verità tentano dell'esperienze ardite, o piuttosto temerarie per guarire dalle *febbri intermit-
tenti*; come di bere *liquori spiritosi*; di gettarsi in qualche fiume, ec. Simili mezzi possono talvolta riuscire; ma recano sempre seco del pericolo, e possono divenire funesti, massimamente quando v'abbia dell'infiammazione, o che si abbia motivo di temerla. Il solo malato, che mi ricordo d'aver perduto in una *febbre intermittente*, si ammazzò evidentemente da se stesso, bevendo de' *liquori spiritosi*, persuaso a tenore dell'asserzione di alcune persone, che questo fosse il *rimedio* infallibile.

La Natura guarisce i tre quarti dei mali.
Cosa debasi intendere per la voce *Malattia*.

(11) Non bisogna dunque giammai perdere di vista questa verità, che la Natura eseguisce i tre quarti dell'opera nella cura di parecchie malattie. I buoni Medici ne vanno d'accordo con IPPOCRATE. *La malattia non è altro che l'effetto necessario della Natura operante sopra d'un corpo, i di cui organi sono in travaglio*. Il meccanismo del corpo umano è così saggiamente disposto, che i movimenti che ne dipendono, rimediano al disordine, cacciando gli umori nocivi dal centro alla circonferenza per alcune vie particolari, o generali. Laonde conviene concludere, che in molti casi il sapere di coloro che stanno presso il malato, e che lo assistono, dee molto più consistere in una saggia osservazione, che nella stessa azione dell'Arte operatrice.

Non si devono amministrar i rimedj se non a norma dell'indicazione della Natura.

Sicchè dunque non si caccierà *sangue*, non si ecciterà il *vomito*, non si *purgherà*, non si promoverà il *sudore*, ec. se non quando la Natura avrà dato de' segni manifesti ch'ella porta i suoi sforzi verso queste *evacuazioni*; imperciocchè i *rimedj* non riescono se non in quanto all'applicazione convenevole che ne vien fatta: qualora si applichino male a proposito, essi stessi divengono cagione di morbo. Questi segni sono i sintomi che abbiamo indicato nel corso di questo Volume, come per il *salasso* veggasi di sopra sul fine della nota 6, p. 23; per i *sudoriferi* nota 7, p. 23; per i *purgativi* pag. 36; per i *vomitivi* nota 7, pag. 68.

Ci sono molti rimedj nauseosi, come le *tele de' ragnatelli*, le *smoccolature delle candele*, ec. che si vantano come maravigliosi nella cura delle *febbri intermittenti*. Ancorchè potessero talvolta avere questo vantaggio, la ripugnanza però che ispirano in generale, deve bastare per farne rigettar l'uso, massime quando s'abbiano de' rimedj meno ributtanti, e l'esito de' quali è meno incerto.

Oggettà disgustosi proposti come rimedj in queste febbri.

Il solo rimedio, che possa essere riguardato come uno *specifico*, capace di guarire radicalmente cotesta sorta di *febbri*, è la *chinachina*. Ella è sempre sicura, e posso affermare con verità, che nella mia pratica non l'ho mai veduta fallire, qualora sia stata amministrata con le cautele necessarie, e che se n'abbia esteso l'uso ad un tempo conveniente (12).

La chinachina è il vero specifico nelle febbri intermittenti.

ARTICOLO SECONDO.

Maniera di governare i fanciulli attaccati da febbre intermittente.

NET paesi, dove le *febbri intermittenti* sono endemiche, gli stessi fanciulli ne sono spesso attaccati. E' difficilissimo di risanare questi piccoli malati, perchè è raro che si possa pervenire a far loro prendere la *chinachina*, o qualsivia altro rimedio disgustoso.

(12) La *chinachina*, dice il Sig. TISSOT, è il solo rimedio, che sia sicuro e innocente in tutte le *febbri intermittenti*. Tutti gli altri rimedj, qualora si eccettuino quelli esposti nella nota (c) di questo Capitolo, non devono riguardarsi, che come de' coadiuvanti, che soli non guariranno sì fatte *febbri*, sebbene di lor natura li esigano. Gli uomini sono stati per lungo tempo imbevuti del pregiudizio contrario. Si credeva, che la *chinachina* sconsigliasse lo stomaco. Ma ben lungi dal nuocere allo stomaco, ella n'è il sovrano rimedio che lo fortifica e lo ristabilisce in istato migliore. Si credeva, ch'essa producesse le ostruzioni, ch'inducesse l'idropisia. Si fa oggigiorno che questi mali non derivano, che dalla lunghezza della *febbre*, e che la stessa *chinachina* li guarisce, quando sieno cagionati dall'averne trascurato l'uso. In corto dire, quando la *febbre* è sola, la *chinachina* ha fatto e farà sempre tutto il bene possibile.

Pregiudizj del popolo intorno la chinachina.

Mezzo di
far prendere
a la chi-
nachina ai
fanciulli.

Il mezzo di rendere questo medicamento più ad essi soffribile, è di porgerlo in una *mistura d'acqua stillata* e di *sciloppo*; e perchè riesca ancora più aggradevole, vi si aggiungono alquante goccioline di *elisire*, o di *spirito di vitriolo*: l'uno e l'altro mezzo migliora il rimedio, e ne toglie il sapore ributtante (13).

Mistura salina.

Qualora non si possa procacciarsi della *chinachina*, e farne prendere al fanciullo, se gli darà con frutto la *mistura salina*. (Ved. questa voce nella Tavola.)

Bevanda.

Il *siero di latte vinoso* è una bevanda, che conviene singolarmente ai fanciulli presi di *febbre intermitente*. In un mezzo sestiere di questo *siero* si può aggiungere un cucchiaino da caffè dello *spirito di corno di cervo*.

Esercizio.

Non bisogna trascurare di far loro fare dell'*esercizio*, il quale non può divenire se non assai vantaggioso.

Se

Mistura
febrifuga
conveniente
ai fanciulli.

(13) Si può loro prescrivere la *chinachina* nella maniera seguente:

Prendete <i>acqua di menta stillata</i> ,	due oncie;
<i>sciloppo di limoncelli</i> ,	un'oncia;
di <i>chinachina</i> della migliore in polvere, una dramma.	

Mettete la *chinachina* in un mortajo, o in qualunque altro vaso; versatevi alquante goccioline di *sciloppo*; rimiscolate perfettamente con un pestellino o cucchiaino; aggiungete poco a poco il resto dello *sciloppo*, sempre rimiscolando; versatevi sopra l'*acqua di menta* per farne una *mistura*: se ne darà un cucchiaino da caffè ogni ora.

Si possono, come dice il Sig. BUCHAN, aggiungere alcune goccioline di *spirito di vitriolo*. Ma su questo bisogna starfene assai circospetti; tre o quattro goccioline devono bastare per tutta la surriferita ricetta.

Quando il fanciullo l'avrà consumata, si passerà ad una seconda, ad una terza, ed anco ad una quarta ordinazione, se sia necessario. Si avrà l'avvertenza di non porgere cotesto rimedio, se non dopo di aver promosso il vomito, o purgato il fanciullo, quando però si scorgano i *simptomi*, che abbiamo annunziato come indicanti sì fatte *evacuazioni*. Il rimedio non si darà giammai durante gli *accessi*; e dopo guarita la *febbre*, se ne continuerà l'uso parecchi giorni, dandone solo ogni due ore; poscia ogni tre; da ultimo ogni quattro ore.

Se la *febbre* si rende contumace, bisogna trasportare il fanciullo in un' aria più asciutta, e più calda. Se gli daranno degli *alimenti* nutritivi, e talvolta un poco di ottimo *vino*.

Quanto ai fanciulli, che non possono mandar giù la *chinachina*, o lo stomaco de' quali non è capace di soffertela, conviene loro introdurla per via di *clistere*. Questa è la maniera, con cui il Dott. LIND prepara un tal *clistere* per un adulto.

Clisteri di chinachina per gli adulti;

Prendete dell' *estratto* di *chinachina*, mezz' oncia;

Scioglietelo in quattr' oncie di *acqua calda*.

Aggiungete *olio* di *mandorle dolci*, mezz' oncia; *laudano liquido*, sei, oppure otto goccioline.

Si ripeta questo *clistere* ogni quattr' ore, o più spesso, se la *febbre* lo ricerca,

Quanto ai fanciulli, bisogna diminuire la dose dell' *estratto* di *chinachina* e del *laudano*, in proporzione dell' età e delle loro forze.

Per i fanciulli.

Alcuni fanciulli sono stati guariti da *febbre intermittente*, facendo loro portare delle cinture imbottite, in cui s'era rinchiusa della *chinachina* in polvere. Degli altri bagnandoli in una forte *decozione* di questa scorza, e stropicciando loro la *spina* del *dorso* con de' *liquori spiritosi* gagliardi, o una *mistura* composta di parti eguali di *laudano liquido* e di *linimento apocaco*.

Altri mezzi di risanare i fanciulli aggravati da febbre intermittente.

§. V.

Non deve assumersi l'impegno di guarire da se stessi dalle febbri intermittenti, quando esse sono irregolari, o accompagnate da sintomi pericolosi.

NOI ci siamo tanto più estesi sulle *febbri intermittenti*, in quanto ch'elleno sono comunissime, e che pochi infermi sopraffatti da questo morbo chiamano il Medico, se non abbiano di già perduto ogni speranza di risanarsi da se stessi.

Si danno tuttavia de' casi, ne' quali queste *febbri* sono irregolarissime, essendo complicate con altri mali, o accompagnate da *sintomi*, che le rendono pericolosissime e difficilissime a ravvisarsi. Noi

li abbiamo appostatamente passati sotto silenzio, perchè avrebbero imbrogliato la maggior parte de' Lettori.

Quando la malattia è affatto irregolare, e che i sintomi sono pericolosi, non v'è motivo di esitanza; fa di mestieri che il malato chiami senza indugio il Medico, e che si sommetta assolutamente a' suoi consigli.

§. VI.

Mezzi di prevenire le febbri intermittenti.

Rimedi
preservati-
vi delle feb-
bri inter-
mittenti.

IL mezzo di prevenire le *febbri intermittenti*, è di non esporri alle cagioni che sono capaci di produrle. Abbiamo fatta l'enumerazione di queste cause. (Ved. qui sopra pag. 31, di questo Volume.) Si faremo soltanto lecito di qui soggiungere la ricetta d'un *rimedio preservativo*, di cui coloro che vivono in luoghi umidi, di maremma, e malsani, o che anno di già sofferto alcuni attacchi di queste febbri, devono far uso.

Pigliate della miglior *chinachina*, un' oncia;
radice di *serpentaria virginiana*,) di ciascuna
scorze di *melarancia*,) mezz' oncia.

Tritate il tutto insieme, e lasciate *infondere* per cinque o sei giorni in una pinta d'*acquavite*, o di spirito di *ginepro d'Olanda*, o di qualsivoglia altro *liquore spiritoso*; chiarite il liquore, prendetene due, o tre tazze per giorno.

So che si può accusarmi di prescrivere dell'*acquavite*; ma le sostanze *amare* in gran parte distruggono gli effetti perniciosi di queste specie di *liquori*. Coloro che non anno, o non vogliono servirsi d'*acquavite*, possono fare questa *infusione* nel *vino*. (Egli è certissimo che l'*infusione* di *chinachina* nell'*acquavite*, o nello *spirito di vino*, non può convenire che ad un piccolissimo numero di persone. In generale si troverà infinitamente meglio confacevole l'*infusione* fatta semplicemente nel *vino*.) E le persone che potranno accostumarsi a masticare la *chinachina*, troveranno che questa pratica riesce assai bene.

Mezzi di prevenire le febbri intermittenti. §1

Si potrà ancora alternativamente e per lo stesso effetto, masticare la radice di *genziana* o di *calamo aromatico*, ec. tutti gli *amari*, quelli sopra tutto che sono caldi e *astringenti*, sembrano essere gli antidoti delle *febbri intermittenti* (14).

(14) Il consiglio del Sig. BUCHAN di variare questi *rimedj preservativi*, è consiglio favissimo. Non solamente l'uso continuo d'uno stesso *rimedio* risveglia la nausea, ma l'abitudine ancora ne rende gli effetti meno sensibili, e sovente ancora vuoti. Ne abbiamo tutto giorno l'esperienza nelle malattie lunghe, conosciute sotto il nome di *croniche*. Si masticcherà dunque la *chinachina* e gli *amari*, oppure si prenderanno alternativamente le due *infusioni*, ch'egli propone. Si potrà parimente a norma delle circostanze adoperarne o di più semplici, qual'è la seguente:

Prendete della miglior *chinachina* in polvere, un oncia.

Fatela *infondere* a freddo per sei in ott'ore dentro una pinta di *vino bianco*; si chiarisca, e si serbi per usarne.

Ovvero di più composte, come quella che segue.

Prendete della radice di *calamo aromatico*,) due oncie;
di *enula campana*,)

foglie di *centaurea minore*, una manata;

limature di ferro senza ruggine, due oncie.

Fate *infusione* a freddo per l'istesso tempo in due pinte di *vino bianco*.

Se vogliasi avere questa *infusione* più prontamente, si può tenere il tutto sulle ceneri calde, o dentro un *bagno di sabbia* per venti quattr'ore. Ma si è osservato che l'*infusione* a freddo, durante il tempo indicato, si carica di altrettanti principj *estrattivi*, quanto quella che ottiensì mediante il calore; e che nell'*infusione* col *vino*, il fuoco agindo sopra questo liquore, ne distrugge i principj, lo rende aspro, e lo dispone alla *fermentazione acida*.

Oltre questi *rimedj*, ci sono ancora degli altri *presidj*, de' quali devono far uso le persone che abitano de' luoghi, dove la natura dell'*aria* rende sì fatte *febbri* frequenti. Questi sono, per avviso del Sig. TISSOT, il bruciare di sovente dentro le stanze, segnatamente in quelle dove si dorme, alcune erbe o alcuni legni *aromatici*; il masticare ogni giorno alquanto coccole di *ginepro*, ed il servirsi per bevanda d'una *infusione fermentata* di queste coccole stesse. Questi due *rimedj* sono d'una grandissima efficacia a ristabilire gli *stomaci* rovinati, a prevenire le ostruzioni, ad agevolare la *traspirazione*. Siccome queste sono le cagioni che più pertinacemente mantengono sì fatte *febbri*, niente servirà a preservar-

L'uso continuo dei rimedj preservativi ne rende vuoti gli effetti: forza è dunque il variarli, quando si prendano come preservativi, e nelle malattie croniche.

Le infusioni nel vino devono essere fatte a freddo? Perché?

Altri mezzi che devono praticare coloro che soggiacciono alle febbri intermittenti.

§. VII.

Malattie periodiche ch' esigono la cura stessa delle febbri intermittenti.

IL governo or' ora esposto per le *febbri intermittenti*, conviene ancora a certe *malattie periodiche*, che ritornano in certi giorni e a certe ore precise. Tra il numero di queste malattie sono segnatamente le *doglie violente di capo*; de' *dolori eccessivi di denti*; de' *vomiti*; alcune *oppressioni di petto*; alcune *coliche crudeli*; delle *palpitazioni di cuore*; de' *dolori intollerabili sparsi sopra alcuno degli occhi*, sulla *palpebra*, il *ciglio*, e la *tempia dello stesso lato*, con *rosso* e *lacrimazione*, ec.

Si vedono sì fatti mali cominciare assai regolarmente a certe ore; durare presso poco il tempo d'un *acceso* di *febbre intermittente*, e finire senza *evacuazione* sensibile, per ritornare precisamente ad un' ora stessa nel giorno seguente, o il giorno appresso di questo. Imperciocchè si è osservato che questi seguono quasi sempre l'ordine delle *febbri cotidianae*, o *terzane*, e più di rado quello delle *febbri quattane*.

Niente reca sollievo durante l'*acceso*, e non v'ha che la *chinachina* che possa impedirlo. Essa si esibirà come l'abbiamo poc' anzi prescritta §. IV, di questo Capitolo.)

CAPITOLO QUARTO.

Della febbre continua acuta.

Qui sono quelli che sono esposti **Q**uesta *febbre* viene appellata *acuta*, *ardente*, o *infiammatoria* (1). Ella assale il più ordinaria-

sene più sicuramente, quanto questi ajuti che sono sì facili e sì poco dispendiosi.

(1) Le persone che anno di già qualche cognizione de' mali, faranno senza dubbio sorprese, che il Sig. BUCHAN con-

mente la gioventù, o quelli che sono nel vigore dell'età, massime coloro tra questi ultimi che

que-
sta
malattia

fonda sotto il nome di *febbre acuta continua*, la *febbre ardente* e l'*infiammatoria*. Gli antichi, diranno essi, le anno riconosciute per malattie distintissime. GALENO stando attaccato alla dottrina d'IPPOCRATE, e tutti i loro seguaci, anno particolarmente descritto la *febbre ardente* sotto il nome di *καυσὺν*, (causon), ec.

Non v'ha però Pratico veruno, che non sappia che la voce *καυσὺν*, (causon) che si è tradotta per *febbre ardente*, *febbre calda*, veniva alle volte adoperata da IPPOCRATE per significare una *febbre* gagliarda, una *febbre* viva, in una parola per additare non la specie, ma il grado della stessa *febbre*: e che d'ordinario se ne servivano per dinotare in generale le *febbri acute* pericolose e mortifere.

Cosa deb-
basi inten-
dere per
febbre con-
tinua acu-
ta.

La *febbre continua acuta*, della quale presentemente si tratta, ha tutti questi caratteri. Quindi i *sinomi* diversi che ne formano il corredo, fecero travedere gli Scrittori, che trasportati da un falso zelo la ridussero a tante differenti specie di *febbri*, ricavandone i nomi dai *sinomi*, da quali più si sentirono colpiti. Di qua sono venute tutte quelle *febbri* chimeriche, rammemorate nelle loro Opere: cioè *ardente*, quando un calore cocente vi dominava: *epiale*, allorchè si fatto calore predominante era accoppiato ad un senso di freddo nell'*estremità*: *lipiria*, qualora questo stesso calore sembrava essere più interno, e che il freddo si manifestava all'*esterno*: *comatosa*, quando v'era sopore: *singultosa*, allorchè vi s'univa il *singhiozzo*: *anelosa*, quando la *respirazione* riusciva difficile: *ansiosa*, quando il malato provava dell'*ansietà*: *sincopeale*, se cadeva in *sincope*: *tifode*, quando si struggeva in *sudori*: *biliosa*, allorchè era accompagnata da una evacuazione copiosa di *bile*, ec.

Divisione
chimerica
di questa
febbre.

Sarebbe da non venirne più a capo, qualora volessimo solamente recare i nomi di tutte le specie di *febbri continue acute*, che la vanità e l'ostentazione anno immaginato. Perciò lasceremo a parte tutte sì fatte inezie, che non tendono che ad intralciare la pratica. La prudenza non vuole che ad un vano nome si appoggi il metodo di guarire. Questo dee piantarsi sopra una più solida base.

Per la qual cosa si contenteremo di dire che la Natura non ci presenta se non due specie di *febbri continue acute*; la *benigna* e la *maligna*: distinzione fondata sul grado del pericolo, e sulla natura dei *sinomi*, ch'essendo familiari a questa ultima, non si osservano nella *benigna*: aggiungeremo però che questa stessa divisione non è sempre discernibile dall'occhio pratico il più esercitato; e che talvolta la *febbre continua*

Non v'ha
che due
specie di
febbre conti-
nua acuta: la
benigna e la
maligna.

vivono lautamente; che anno molto *sangue*; che anno le *fibre* forti ed *elastiche*.

in quale
ragione ci-
ta è più
frequente.

Questa *febbre* è propria di tutte le stagioni; ma è più frequente nella primavera e al cominciar dell' estate. (Leggete avanti di passar più oltre il Cap. I, e II, di questo Vol.)

§. I.

Cagioni della febbre continua acuta.

LA *febbre continua acuta* è cagionata da tutto ciò che può riscaldare il corpo, e aumentare la quantità del *sangue*, come dalle fregolatezze d'ogni genere. Così il fare un *esercizio* violento; dormire al sole; bere de' *liquori spiritosi*; mangiare degli *alimenti* conditi con *aromi*; darli al lusso della tavola, senza fare un sufficiente *esercizio*, ec. possono cagionare questa *febbre*.

Tutto ciò che può sopprimere la *traspirazione*, come il riposare sopra un terreno umido; il bere de' *liquori freddi*, quando si abbia caldo; il passare le notti in veglia, ec. può ancora darvi motivo.

§. II.

Sintomi della febbre continua acuta.

Sintomi
precursori.

LA *febbre continua acuta* è ordinariamente annunziata da un ristringimento o da un freddo generale, ch'è ben tosto seguito da un grande calore; da *polso pieno e frequente*; da *doglia di capo*; da *aridezza di pelle*; da *rossore agli occhi*; da *sembiante acceso*, e da *dolori nel dorso*, nei *reni*, ec.

Sintomi
caratteristi-
ci.

A tutti questi *sintomi* succede una difficoltà di *respirare*, dell'*ansietà*, e delle voglie di vomitare. Il

acuta benigna devia dal suo noto cammino; si rende pericolosa, e prende un aspetto di *maligna*, a cagione d'una *prava regola di vivere*, o d'un governo mal indicato, come lo dice qui subito l'Autore, e come lo dirà nel Cap. IX, dove tratta della *febbre maligna*.

malato si querela d'una gran sete; rigetta gli *alimenti solidi*; punto non dorme: per l'ordinario la sua lingua è nera e ruvida.

Il *delirio*; un'agitazione eccessiva; l'*oppressione di petto* ad un grado avanzato; la *respirazione laboriosa*; i *sussulti de' tendini*; il *singhiozzo*; il freddo dell'*estremità*; i *sudori vischiosi*; la *sortita involontaria dell'orine*, sono tutti *sintomi* che mettono in sommo spavento.

Sintomi pericolosi.

Siccome questa malattia è sempre accompagnata da pericolo, bisogna subito ch'essa si dichiara adoperare i migliori presidi dell'arte: imperciocchè nel cominciamento il Medico può essere assai utile al malato: ma se si lascia il male far de' progressi, tutto il suo sapere spesso diviene inutile: così nulla v'ha di più strano ad intendersi, quanto la condotta di coloro, che avendo la facoltà di avere tutti i soccorsi necessari, subito che la malattia si annunzia, attendono che il malato sia agli estremi per sovvenirlo.

Bisogna recare soccorso al malato come prima la malattia si dichiara. Perché?

In fatti in vano si spererà del sollievo dalla Medicina, allorchè la malattia sarà divenuta insanabile a cagione dell'indugio, o del pessimo governo, e che esauste saranno le forze dell'infermo. I Medici possono per verità aiutare la Natura; ma i loro sforzi saranno sempre inutili, allorchè ella non sarà più capace di secondarli (2).

(2) E' dunque di somma importanza, che i malati senza indugio chiedano il soccorso d'un Medico illuminato, massime quando sono afflitti da malattie tanto gravi, e di cui la cura è cotanto spinosa.

Quasi tutti gli uomini anno il pericoloso e colpevole costume di trattare di cosa frivola il cominciamento de' loro mali. Cercano anzi di farsi superiori al male: si vedono continuare i loro affari e la loro maniera di vivere, finchè oppressi dal peso del male non si possono più reggere in piedi.

Ma la malattia in allora ha già fatto de' progressi considerabili; e quella il di cui corso è estremamente rapido, ed è sommamente *acuta*, qual'è quasi sempre quella della quale di presente si tratta, giunta è omai al suo apice, quando non si ha per anco cominciato ad agire di concerto con la Natura per combatterla. Allorchè il Medico arriva, egli non può

§. III.

Vitto, che bisogna prescrivere a quelli, che sono presi di febbre continua acuta.

Quali sono le indicazioni da adempersi nella cura di questo male.

D All'apparato de' *sintomi* di questa malattia si fa evidente, che gli umori sono troppo *vischiosi*, troppo *acri*: che la *traspirazione*, le *urine*, la *scialiva*, tutte le altre *secrezioni* sono in copia troppo scarsa: che v'ha della *rigidità*, del ristringimento nei *vasi*, e che il calore di tutto il corpo è troppo forte. Tutto ci prova dunque la necessità d'un *vitto* capace di *diluire* il *sangue*: di distruggere l'*acrimonia* degli umori; di temperare il calore eccessivo; di cancellare lo stato *spasmodico* de' vasi, e quindi di eccitare le *secrezioni*.

Bevande diluenti acidulate.

Per soddisfare a tutte queste indicazioni importanti, il malato farà uso abbondante di bevande *diluenti*, quali sono la *tisana* di *avena*, o del *cremore di avena*; o il *siero* di *latte chiarificato*; la *decozione* d'*orzo*, di *pomi*, ec. Si renderanno acidule tutte queste *tisane* con del *succo* di *arancia*, o della *gelatina* di *uva spina*, di *lampone* o *mora* di *rovo*, ec:

Siero dilut. di aran.

Il *siero* di *latte* fatto col *succo* di *arancia* è una be-

che sentirne rammarico, perchè si abbiano perduti i primi giorni, da cui in tali casi dipende sempre l'evento. Egli prescrive il *vitto* e i *rimedj* relativi allo stato attuale della malattia; ma non si sono fatte precedere le bibite copiose, le *cacciate* di *sangue*, e gli altri *rimedj* convenevoli; e il malato, che al contrario non ha cercato che di far fronte al male, che s'è di sovente riempito di nodrimento, di *vino*, di *liquori*, di *elissiri*, di *seriaca*, e d'altre *droghe*, che non fanno che accendere il foco di cui avvampa, che introdurre maggiore acrimonia negli umori, aumentare la *rigidità*, e la *costrizione* de' vasi, muore, malgrado tutte le cure del Medico: o se sopravviva, gli *alimenti*, le cose *riscaldanti*, che a bel principio egli ha preso, gli lasciano il germe d'una qualche *malattia* di *languore*, che poco a poco prende vigore, e sviluppa a capo di qualche tempo, facendogli mercare con lunghi tormenti quella morte ch'egli si desidera come il termine de' suoi malori.

vanda eccellente in questi casi . Per prepararlo si fa bollire in parti eguali di latte e d'acqua un' *ayancia acida* tagliata in fettucce, finchè essa lo rappigli e lo separi . Se non si possono avere delle *ayancie*, un *cedro*, un *pizzico* di *cremore di lattaro*, o una cucchiata di *aceto* produrranno lo stesso effetto . Dopo che il *siero di latte* ha bollito , e ch'è chiarificato , si possono aggiungere secondo le circostanze due o tre cucchiariate di vino bianco . (Le circostanze ch' esigono il *vino* , sono assai rare nel principio de' mali acuti : D' ordinario questo eccellente *cordiale* non è indicato se non nei casi d' infievolimento , dopo le evacuazioni , ec.)

ciato: ma
niera di
prepararlo

Se il malato è ristretto il ventre, se gli darà una *tisana* fatta con un'oncia di *tamayindo*, due oncie di *ava secca*, e due o tre *fichi* . Si fanno bollire tutte queste sostanze in tre fogliette d'acqua, sino che si riducano ad un quarto. Questa *tisana* piace singolarmente al malato, e può berne a sua voglia. La *tisana pettorale comune* conviene egualmente in questi casi. Se ne porge una tazza ogni due ore, e anche più spesso, se il calore e la sete sieno violenti :

Tisana al-
lorchè il
malato è
ristretto il
ventre .

Tutte queste *tisane* devono essere bevute un poco calde . Non si danno nel cominciamento della *malattia* se non in piccola quantità ; ma a misura, ch' ella avanza, bisogna darle in dose più grande, e più spesso, a fine di aiutare la Natura ad espellere la materia morbosa per via delle differenti *escrezioni* .

Tutte que-
ste bevande
devono esse-
re un poco
calde . Co-
me devono
sommini-
strarsi .

Noi abbiamo prescritto un gran numero di bevande , acciocchè il malato sia in istato di scegliere quella che gli farà più gradevole , e affinchè quando egli sarà annojato dell' una, possa ricorrere ad al- tra .

Perchè si
prescrivano
parecchie
bevande
della me-
desima spe-
zie .

Gli *alimenti* del malato devono essere in piccola quantità e leggerissimi : se gl' interdirà ogni specie di nutrimento in cui entra della carne di manzo , non meno che lo stesso brodo di pollo : se gli permetterà solamente del *cremore di avena* , della *panasetta* , o del *pane leggero* bollito nell'acqua . Si possono aggiungere a questi *alimenti* alcuni granelli di *sale comune* , o un poco di *zucchero* per renderli più

Quali deb-
bano essere
gli alimenti
del malato .
Nessun bro-
do, nemme-
no di pollo &

sopportabili . Il malato può altresì mangiare alcuni *pomi cotti* con un poco di *zucchero* ; del pane abbrustolito , e acconcio con della *gelatina* di *uva spina* ; delle *prugna cotte* , ec. (3) .

Vantaggi
dell'aria
fresca .
Cautele
con le quali
bisogna
procurarla
al malato .

Non si può procurare al malato niente di più aggradevole dell' *aria* fresca , che si farà circolare nella sua camera , massime nei tempi caldi : ma non bisogna farlo senza le cautele necessarie , acciocchè egli non senta tanto di freddo , e non si *raffreddi* . (Ved. la Prima Parte Cap. IV , nota 5 .)

Pericoli
dell'aggra-

Si ha per consuetudine nelle *febbri* di aggravare il malato di copertine , ad oggetto di eccitare il *sudo-*

Prudenza,
con la qua-
le bisogna
ammini-
strare gli
alimenti in
questa ma-
lattia .

(3) Bisogna essere assai circospetti nell' amministrazione degli *alimenti* . E' certo che in questa malattia fa d' uopo proibire ogni cibo animale : nè pure si devono dare senza riflesso gli altri *alimenti* dal Sig. BUCHAN proposti . Per quanto semplici , per quanto facili a digerire che sieno , nel maggior numero de' casi , sarebbero perigliosi , allorchè il male è gravissimo . Forza è in allora che il malato se ne astenga assolutamente . La *febbre acuta continua grave* è una di quelle malattie , in cui si vedono i malati starsene sette , nove , undici , quattordici giorni con la sola *tisana* , senza provar genio per veruna specie di *alimento* .

Qual' è la
guida che
si dee se-
guire nell'
ammini-
strazione
degli ali-
menti .

In generale l' appetito è quello che ci dee guidare ; e più che il male è violento , meno l' appetito si fa sentire . Un malato che sarà persuaso del pericolo degli *alimenti* nelle malattie *acute* , rifiuterà tutti quelli che gli saranno esibiti , qualunque volta che il suo stomaco non li richieda ; e non li chiederà mai , o poco meno che mai , nel primo ingresso , nel progresso , e nello stato del male ; se però si eccettuino le *febbri biliose* , *nervose* , e *maligne* , dove la Natura ricerca d' essere sostenuta mediante alcuni *alimenti* , che sieno in oltre valevoli , sopra tutto in questa ultima malattia , a metter freno alla tendenza degli umori alla putridità . (Ved. Cap. I , nota 3 . e Cap. VIII , e IX , di questo Vol .)

E' dunque solo quando la Natura s' è liberata della materia morbosa per via dell' *evacuazioni* , che lo *stomaco* comincia a sentire qualche bisogno ch' è bene di soddisfare , come si dirà in seguito , somministrando degli *alimenti ristorativi* e di facile *digestione* .

Ne' mali però meno gravi , si potranno accordare sì fatti *alimenti* due volte al giorno ; e in quelli che non minacciano verun pericolo , se ne potranno esibire ogni ott' ore , o tre volte per giorno .

re, e di difenderlo dal freddo. Questa usanza non può avere se non delle fastidiose conseguenze. Ciò aumenta il calore del corpo, fiacca il malato, e lungi dall'agevolare, s'opponne alla *traspirazione*. (Ved. pag. 23, e nota 7. di questo Vol.)

vare il malato di coperte.

Allorchè il malato n'abbia la forza, può di tanto in tanto tenerfi a sedere. Questa mutazione di positura spesso produce degli effetti assai buoni: alleggerisce il capo, rallentando la velocità, con cui il sangue si porta al cervello. Tuttavolta questa positura non deve essere continuata troppo a lungo; e se l'infermo abbia della disposizione al *sudore*, sarà cosa più sicura il lasciarlo coricato, avendo solo avvertenza di alzargli il capo mediante de' guanciali.

E' vantaggioso al malato d'essere di tanto in tanto sedente, o di avere la testa alta.

Si riuscirà singolarmente a rinfrescare il malato irrigando la sua camera con dell'aceto e del *suco* di cedro, o con dell'aceto e dell'*acqua rosa*, ne quali si averà disciolto un poco di *nirro*. Fa d'uopo ripetere quest'asperfione spesse volte nella giornata, massimamente se la stagione sia calda. (Ved. la Prima Parte Cap. IV, nota 5.)

Maniera di rinfrescare la camera;

Si rinfrescherà la bocca del malato facendogli prender sovente una boccara di *mistura* fatta coll'*acqua* ed il *miele*, a cui si aggiungerà un poco di *aceto*. Una decozione di *fichi* nell'*acqua d'orzo* produrrà lo stesso effetto.

E la bocca del malato.

(Il malato prenderà questi liquori freddi, ne rinfaccerà con un gran sorso la bocca sino a tanto, che il liquore si sia riscaldato; allora lo rigetterà. Replicherà quest'operazione ogni mezz'ora, ogni ora, più o meno, per quanto ciò gli sembrerà grato. Con lo stesso oggetto può masticare uno spicchio di *melarancia*, di cui si avrà levata la scorza, e gettata la parte fibrosa. Un poco di *gelatina di uva spina*, o di *pomi* conviene egualmente; ma più che il malato berà, meno avrà bisogno di questi soccorsi.)

Fa di mestieri altresì d'immergere i piedi e le mani del malato nell'*acqua tiepida* parecchie volte per giorno, massimamente quando la testa sia incomodata.

Bagni de' piedi e delle mani.

(Se v'abbia molto calore, bisognerà aggiungere

Circostanze che indica.

Non di ag-
giungere
dell' aceto
all' acqua
di questi
bagni.

dell' *aceto* a quest' acqua : se ne metterà un mezzo *sestiere*. più o meno per bagno , secondo il grado di questo calore . Nell' intervallo di questi *bagni* ; che si ripeteranno almeno due volte per giorno , si applicheranno de' pannilini , o delle flanelle inzuppate parimente nell' acqua tiepida sulle gambe , sulle coscie , sul ventre del malato ; si rinovelleranno ogni qual volta saranno asciutte .)

Bisogna
che il ma-
lato sia
tranquillo,
che non
abbia com-
pagnia , ec.

Bisogna che il malato sia perfettamente tranquillo ; perfettamente agiato . La compagnia , lo strepito , tutto ciò ch'è capace di apportare del turbamento nell' anima , o negli spiriti , è nocevole : parimente una luce troppo viva , e tutto ciò che colpisce i sensi troppo fortemente , deve essere diligentemente evitato .

Non deve avere per servirlo , che il meno possibile numero di persone . (Ved. la Prima Parte , Cap. X , nota 1 ; e Cap. XI , nota 5 .) Quando queste gli accomodano , non devono essere troppo spesso cangiate .

Bisogna ,
ma con pru-
denza allet-
tare il go-
sto e i de-
sideri del
malato .

Si agirà con più prudenza nel soddisfare le sue fantasie , che nel contrariarlo . Accaderà altresì sovente , che la promessa di ciò ch'ei domanda , lo acquieti del pari che l' adempimento . (Ved. qui sopra Cap. II , di questo Vol. II , pag. 24 , e nota 8 .)

§. IV:

Remedj che bisogna somministrare ai malati di ogni età attaccati da febbre continua acuta .

Importan-
za della
emissione
di sangue
in questo
male .

LA *emissione* di *sangue* è di massima importanza in questa *febbre* , come pure in tutte quelle che sono accompagnate da *polsò vivace* , *duro* , e *pieno* : ella dee sempre essere eseguita nel momento che i *sintomi d' infiammazione* si manifestano . La quantità del sangue che si estrae , deve essere proporzionata alle forze del malato e alla violenza del male .

Quando è
quante vol-
te faccia
d' uopo ri-
peterla .

Se dopo la prima *cacciata* di *sangue* la *febbre* si aumenti , e se il *polsò* divenga più *duro* , sarà necessario di venire ad una seconda , forse ad una ter-

za, e ad una quarta eziandio, ciò che può asseguirsi ad un intervallo di dodici, dieciotto, vent'ore l'una dall'altra, o anche di più, se i *fenomeni* lo permettono. Ma se il *polsò* si mantenga *molle*; se il malato si trovi mediocrementemente in quiete dopo la prima *cacciata* di *sangue*, ella non deve mai essere ripetuta (4).

(4) L'intervallo, che quivi l'Autore propone tra cadaun *salasso*, può divenire troppo lungo in non poche circostanze. Ci sono alcuni casi ne' quali la prima *cacciata* di *sangue*, che dee farsi copiosa, (sempre però relativa alle forze del malato) richiede quattro o sei ore d'indugio, prima d'essere seguita da una seconda: tal'è la condotta che bisogna tenere ogni volta che il *polsò* resta *duro e forte*; e con molto più di ragione, come dice benissimo il Signor BUCHAN, qualora egli acquisti maggiore durezza e più di forza dopo questo primo *salasso*, il che avviene talvolta.

Se dopo il primo *salasso* il *polsò* conserva ancora queste stesse qualità, bisogna dieci o dodici ore dopo di passare ad un terzo, che spesso, e quasi sempre dee essere l'ultimo, quando tutti e tre sieno stati fatti dentro lo spazio delle ventiquattr'ore. Imperciocchè IPOCRATE non cacciava sangue per estinguere interamente la *febbre*, ma solamente per moderarne l'eccesso. La *febbre* è tanto necessaria per la *concozione* e la *risoluzione*, che spessissime volte nel corso della pratica, siamo sforzati ad eccitarne una artificiale, sia per sostenere o avvivare le forze della Natura nelle malattie *acute*, sia per impartire del movimento agli umori, che stagnano nelle malattie *croniche*. (Ved. nota seg.)

La diligenza e la moderazione, che furono le regole d'IPPOCRATE, devono dunque essere le nostre eziandio. Egli non cacciava mai *sangue* che nel bisogno e quanto era necessario. Si guardava dal prescrivere sì fatta operazione alle persone consumate e deboli, anche ne' mali *acuti*, siccome i Pratici fanno astenersene nel *vajuolo ordinario*, dove le forze della Natura di nulla eccedono, per la tema di opporsi all'espulsione della materia morbosa.

Questa prudenza d'IPPOCRATE è, dice il Sig. CLERC, un gagliardo rimprovero contro la condotta di que' Medici che stibondi di *sangue* spargono con temeraria baldanza quello dei loro malati. Non si può giammai far sortire tutto l'umore morboso con il *sangue*, qualora almeno non si esaurisca ordinamente. Questa espulsione dell'umore nimico è opera della sola Natura.

Per tanto non dobbiamo riguardare la *cacciata* di *sangue*, di

E' raro che
abbisogni
più di tre
salassi; im-
perciocchè
non convie-
ne cacciare
sangue fino
all'estinzio-
ne della feb-
bre. Per-
chè?

Pretensione
pericolosa
di coloro
che caccia-
no sangue
per evacua-
re l'umore
morboso.

Idea che si
dee formare.

Mistura
rinfrescante,
che si deve
prescrivere,
allorchè il
calore e la
febbre sono
assai gag-
liardi.

Se il calore e la *febbre* sono assai gagliardi, si darà al malato una *mistura* composta nella seguente maniera:

Prendete dell' *acqua rosa*, un' oncia;
acqua comune, due oncie;
sciloppo di aceto concio col *suco*
di *mora di rovo*, mezz' oncia.

Mescolate. Si può sostituire allo *sciloppo* un poco di *zucchero*.

Aggiungete dello *spirito di vitriolo* dolcificato, quaranta ovvero einquanta goccioline.

Si darà questa *pozione* ogni tre o quattr' ore, finchè la *febbre* farà violenta: basterà poscia il darla ogni cinque o sei ore (5).

in che con-
fissa l' oc-
cupazione
del Medico
nella mag-
gior parte
delle ma-
lattie acu-
te.

cui siamo troppo prodighi o troppo avari, (quando la ordi-
niamo solo per sistema o per consuetudine) se non che come
un *rimedio palliativo, calmante, e risolvente*.

(5) Vedesi che il Signor BUCHAN non intende, che si cao-
ci *sangue* finchè la *febbre* sia interamente estinta, poichè
prescrive una *pozione rinfrescative* per moderarla, allorchè do-
po le tre emissioni di *sangue* ella è ancora gagliarda. Non si
può dunque abbastanza ripeterlo: non bisogna mai tentare
di estinguere assolutamente la *febbre*. La *febbre*, come l' ab-
biamo già detto, non è che uno sforzo della Natura per li-
berarsi dalla materia morbosa. (Ved. di sopra la pag. 16.
di questo Vol.

Le nostre sollecitudini adunque devono limitarsi a *calmare i*
suoi sforzi, quando sono superiori alle forze del malato; a
lasciar agire la Natura, quando i di lei sforzi sono propor-
zionati alla resistenza che loro oppone il malato; ad avva-
lorare da ultimo le forze della Natura, quando questa resi-
stenza si rende a lei superiore. Ecco in poche parole, in che
consiste tutta la Medicina nelle *febbri acute continue*; nelle
febbri che sopravvengono all' *apoplessia* e alla *paralisi*; nel-
la *pleurisia*, *polmonia*, *schinanzia*, *vajuolo*, ec. Ecco tutto
ciò che s'è voluto dire in alcune migliaia di Volumi, che
sono stati scritti intorno questa parte della nostra arte: frat-
tanto ecco quanto c' insegna la semplice osservazione affittita
dalla riflessione.

E' cosa importante di qui osservare, che noi indichiamo il
genere de' mali in cui la *febbre* si rende l'istramento pri-
mario della guarigione, perchè ve ne sono alcune altre, do-
ve non solamente ella farebbe ostacolo alla guarigione, ma do-
ve diverrebbe anco mortale, se non si arrestasse, poichè da se
sola costituisce la malattia: a cagione di esempio le *febbri*

Se il malato si senta degli affanni di stomaco, e delle voglie di vomitare, bisognerà secondare gli sforzi della Natura, esibendogli una *infusione* leggiera di fiori di *camomilla*, o semplicemente dell'*acqua tiepida*. (Ma se con questi soli ajuti egli non vomita, e che gli sconvolgimenti persistano, converrà dargli quindici granelli d'*ipecacuana* in polvere in un bicchiere d'*acqua*, come lo abbiamo prescritto nota 4 del Cap. III, di questo Vol.)

Se il ventre è teso e stitico, il malato farà uso giornaliero d'un *elistere*, composto di metà di *latte* e d'*acqua*, d'un poco di *sale*, e d'una cucchiata d'*olio*, o d'un poco di *burro fresco*.

Che se il *clistere* non abbia l'effetto bramato, si aggiungerà di quando in quando nella bevanda dell'infermo un cucchiaino da caffè di *magnesia bianca*, o di *cremore di tartaro*. Si potrà parimente fargli prendere in questi casi de' *tamarindi*, delle *susine*, de' *pomi rossi*, ec. (6).

Cosa biso-
gna fare al-
lorchè il
malato ab-
bia delle
voglie di
vomitare.

Allorchè il
ventre è
teso e stit-
ico.

intermittenti semplici, e a più forte ragione quelle che sono irregolari, e i di cui *sinsemi* sono pericolosi, le *febbri nervose*, le *febbri maligne*, le *pusride* ec. Ognuno intende che in simili casi il malato non può guarire se non mercè il totale distruggimento della *febbre*.

Lo stesso avviene ancora della *febbre* che accompagna la *colica nefritica*. Ben lungi dal contribuire alla sortita della renella, o de' *calcoli*, che cagionano sì fatta *colica*, la *febbre* non serve il più delle volte che a figgerveli per via dell'*infiammamento* ch'essa suscita ne' *reni*. La *febbre* che accompagna la *pietra della vescica*; quella che soppravviene alle *operazioni chirurgiche*, alle *sconciature* o *fratture* di *ossa*, alle *piaghe*, alle *punture* o *lacerazioni* delle *carni*, dei *tendini*, dei *legamenti*, dei *nervi*, ec. non è meno pericolosa, e non elige meno, che siasi solleciti a sanarla, come si vedrà in cadaun degli Articoli che trattano di queste malattie.

(6) Abbiamo però fatto osservare (nota 3 di questo Cap.) che bisognava che gli *alimenti* fossero porporzionati all'intensità della malattia: che nella malattie gravissime, bisognava astenersene affolutamente: che nelle meno gravi, non se ne doveva porgere che due sole volte per giorno; e che in quelle di niun pericolo, non si poteva giungere a darne più di tre volte in ventiquattr'ore. Qualora vogliasi ottenere di sciogliere il ventre mediante le *prugne* e le *mela cotte*, ognun-

Giorno in
cui si giu-
dica la ma-
lattia: se-
gnal favoro-
voli;

Se verso il decimo, undecimo, o duodecimo gior-
no della malattia, il *polso* diviene più *molle*; se la
lingua comincia ad umettarsi; se le *urine* depongono
un *sedimento rossigno*, v'è gran motivo di sperare un
esito favorevole. (Ved. nella Tavola la voce *Crisi*,
e nota 7, pag. 68. di questo Volume.)

Latitanti.

Se in vece di tutti questi *simptomi* il malato è ab-
battuto; se il *polso* di più in più s'infievolisce; se
la *respirazione* diviene difficile con un intormentimen-
to nelle membra, un tremito ne' *nervi*, de' *sussulti*
dei *tendini*, ec. v'è ogni motivo di temere che l'e-
vento ne sia funesto.

Momento
di applica-
re i vesci-
catori;

Allora bisogna applicare i *vescicatorj* sia al collo,
sia alla noce de' piedi, sia nell'interno delle gambe,
delle coscie, ec. secondo le circostanze.

I senapif-
mi;

Si può ancora applicare sotto la pianta de' piedi
de' *cataplasmi* composti nella seguente maniera, (a
quali si dà il nome di *senapismi*.)

Prendete della *mollica* di *pane* sgretolato, quattr'oncie;
femi di *senape* polverizzati, due oncie;
aceto, quantità sufficiente.

Fate cuocere come i *cataplasmi* ordinarij.

Di porgere
de' cordiali.

Fa di mestieri nello stesso tempo di sostenere le
forze del malato con de' *cordiali*. Tali sono il *siero*
di *latte* concio col *vino generoso*; il *negus*, il *cremore*
di *sagou*, a cui si aggiunge del buon *vino*, ec.

§. V.

no accorgesi che non si potrà riuscire, se non esibendole in
una tal data quantità. Ora in questa dose esse produrranno
altrettanto più di male, quanto più sarà acuta la malattia.

Crediamo dunque di dovere ristringere questo consiglio al-
la *magnesia bianca*, al *sier* di *tarsaro*, ai *tamarindi*, che si
possono aggiungere alla *tisana*: o piuttosto al *siero* di *latte*
melato; al *siero* di *latte*, cui si aggiunge dello *sciloppo* di
virole, o quello di *fiori* di *perseo*, o di *cicorea* composto col
riobarbato. Crediamo altresì che potrebbe pervenire a non
aver bisogno di veruno di questi soccorsi, se in luogo d'un
solo *elistere* per giorno, se ne facessero due o tre. Si farà il
primo come lo consiglia l'Autore; si comporranno gli altri
coll'acqua semplice.

§. V.

Governo della convalescenza della febbre continua acuta.

LA regola di *vitto*, di cui abbiamo parlato al §. III, di questo Capitolo, è necessaria non solamente in tutto il corso della *febbre*, e della *malattia*, ma ancora nella *convalescenza*. Qualora si trascuri in questo ultimo periodo, si espone il malato a delle ricadute, o a degli altri mali che lo rendono cagionevole per tutta la sua vita.

Sebbene il malato sia debole nel seguito di questa *febbre*; tuttavia gli *alimenti* devono essere più *vilassanti* che nutrienti. Devesi evitare con la maggiore sollecitudine ogni specie di eccesso. Troppo di nodrimento, troppo di bevanda, di *esercizio*, gli diverranno nocevoli. Bisogna che il di lui spirito sia perfettamente tranquillo: non deve applicarsi nè allo studio, nè ad alcun'altra cosa che domandi una grande attenzione.

Se la *digestione* è tarda, se il *convalescente* provi di tempo in tempo alcuni piccoli risentimenti di *febbre*, deve far uso di *chinachina*, insula a freddo nell'acqua, (nella maniera seguente:

Circostanze che indicano la *chinachina*.

Prendete della miglior *chinachina* asciacciata, un'oncia; mettetela in una bottiglia; versatevi sopra una foglietta d'acqua fredda; turatela; lasciate l'*infusione* per sei oppure otto giorni a freddo, avendo cura di scuotere sovente la bottiglia; si chiarisce, e si serba per usarne. Se ne prende un mezzo bicchiere avanti il desinare, altrettanto prima di cena.) Questo rimedio fortificando lo *stomaco* termina di distruggere i morbosì residui della *febbre*.

Quando il *convalescente* comincia a ricuperare una parte delle sue forze, in allora fa di mestieri ch'egli prenda alcuni blandi *lassativi*, come il seguente:

Momento di purgare.

Prendete del *tamarindo*,

un'oncia;

Medicina

sena,

una dramma.

conveniente in questo caso.

Fate bollire per alquanti minuti in una foglietta d'acqua; ritirate il mescuglio dal fuoco.

Tomo II.

E

Aggiungete della *manna crassa*, un' oncia.
Fatela sciogliere, e feltrate.

Si dà un bicchiere di questo *purgativo* di ora in ora, fino a tanto ch'egli opera; dopo di che si getta via il resto.

Si ripete questa stessa medicina due o tre volte, lasciando cinque o sei giorni d'intervallo tra ciascuna volta che si vuole purgare (7).

Riflessioni
sul metodo
di cura che
di presente
s'è letto.

(7) Le persone intelligenti, che sono state testimoni della materiale condotta di que' *Consuetudinarij*, di que' *Medicastri*, che non conoscono altra maniera di curare i malati, che operimendoli di *rimedj*, faranno senza dubbio sorpresi, che in una malattia, la quale sovente diviene gravissima, il Sig. BUCHAN ne prescriva così pochi. Essi resteranno egualmente maravigliati dell'ordine e del tempo, in cui fa d'uopo che ciascheduno d'essi venga somministrato.

Maniera
con cui co-
munemente
si tratta la
febbre acu-
ta conti-
nua, mes-
sa in con-
fronto.

„ Non è poi, diranno essi, in tal modo, che si regola co-
lui che adotta il nostro governo: egli comincia dal cac-
ciar *sangue*, e ripete il *salasso* fino che la *febbre* sia af-
solutamente svanita. Il posdomane esibisce un purgativo;
due giorni dopo purga di bel nuovo, e ogni due giorni
ripurga fino a perfetta guarigione. Frattanto l'*emesico*,
le *polveri*, gli *elettuarij*, gli *apozemi*, le *pozioni*, ec. nien-
te vi si dimentica, niente vi si risparmia. Se gli accade
di non riuscirvi, ciò nasce perchè il male è più forte dei
rimedj. Ben ingiusta cosa sarebbe il fargliene il menomo
rimprovero: poichè egli cava sangue, purga, spessaggia
rimedj, antidoti, quanti mai può.

Con il me-
todo del
Signor Bu-
chan.

„ Ma Dio buono! se noi avessimo ad essere curati in seque-
la de' vostri consigli, noi periremmo tutti! Voi avete pau-
ra di permetterci una sola *missione* di sangue; e proibite
di oltrepassare giammai la terza nelle *febbri* le più *inflam-*
matiche. Dopo di ciò le *tisane*, i *clisteri*, i *bagni ai pie-*
di, li *fomenti*, sono i vostri soli *rimedj* in tutto il corso del-
la malattia. Se prescrivete una *pozione*, voi indicate con
tanto scrupolo le circostanze in cui bisogna usarla: e
poi favellate de' *vescicatorj*, (*rimedj* che non abbiamo ve-
duto apoperare giammai che negli estremi) avanti di *pur-*
gazione, che rimettete sul fine affatto della malattia; an-
zi volete ancora che il malato abbia ripreso una parte del-
le sue forze. Davvero, o la Medicina è cangiata d'affai, o
la follia di voler innovare ha preso furiosamente l'impero
sugli uomini, poichè essa li porta a farsi giuoco della stes-
sa vita de' loro simili „!

I suoi pre-
cetti sono

Si fatto linguaggio, si fatti discorsi, si fatte imputazioni si

Gli operaj, gli artefici, coloro che s'occupano in lavori faticosi, non devono dopo aver sofferto una simile malattia, riprendere troppo presto il loro la-

ripetono tutti i giorni, da quelli eziandio che il rango e le cognizioni dovrebbero differenziare, e porre al disopra dei stravolti pensamenti del volgo. Se, come lo desidera l'Autore patriota, la Medicina divenisse uno de' rami dell'educazione: se l'Opere de' nostri più esimii Scrittori di Medicina antichi e moderni fossero più famigliari, si saprebbe che i precetti del Sig. BUCHAN quelli appunto sono del padre della Medicina, del divino IPOCRATE: si vedrebbe, ch'ei non fa che concorrere con i BOERRHAAVE, i VAN-SWIETEN, i ROSEN, i PRINGLE, i LIEUTAUD, i DE-HAEN, i de BORDEU, i CLERC, ec. con tutti gli amici dell'umanità, a richiamare la Medicina al suo stato di semplicità primitiva: a fame una scienza, di cui i principj sicuri e certi possano illuminare tutti gli uomini, i quali tutti più o meno si trovano in bisogno de' suoi soccorsi.

quegli stessi
d' Ippo-
crate.

Per mettere questa verità fuori di dubbio, vediamo qual fosse il piano che seguiva IPOCRATE nelle malattie acute, e che seguono i Pratici, che scosso il giogo de' pregiudizj, e tenendo a vile ogni sistema, non si studiano che di guarire.

Ecco le stesse parole dell'Oracolo della Medicina: „ In una febbre semplicemente *acuta*, bisogna far prendere dell' *acqua calda*, dell' *idromele*, o dell' *ossimèle*. Il malato niente rischia nel berne in larga copia: imperciocchè se vengono queste bevande esibite un po' calde, esse discacciano gli umori viziosi per la via dell' *orine* o del *sudore*, e manterranno la *respirazione* libera, il che riesce assai salutare. In una *febbre più acuta* devonsi porgere al malato altrettanta *acqua* o *idromele*, quanto ne può bere „.

Metodo che
seguiva il
padre della
Medicina
nelle ma-
lattie acute
in differenti
gradi;

Nelle malattie estremamente vive, al sommo grado *acute*, egli non si limitava ai presidj semplici, di cui abbiamo ora favellato. Sin dal principio faceva uso del *salsaffo*; moltiplicava i *clisteri*; faceva bere copiosamente delle tisane *ad-dolcisive*, e *rinfrascanti*, come quelle indicate nei §. III e IV di questo Capitolo. Quando aveva ridotto la *febbre* ad un grado moderato, lasciava alla Natura la cura della *concozione* e della *crisi*.

Nelle ma-
lattie estre-
mamente
acute;

Ma se verso questo periodo della malattia, la Natura turbata sembrava indecisa, o anco pareva voler discostarsi dal cammino il più facile per l'*evacuazione* della materia morbosa, in allora metteva in opra degli altri sussidj. Leggesi nel sesto libro de' suoi Epidemj, che se gli umori tentano di gettarsi sopra una parte non conveniente, bisogna deviarne; che se al contrario prendono un corso salutare, si dee ajutar-

Allorchè il
cammino
irregolare
della Natu-
ra annun-
ziava del
pericolo.

voro: bisogna che si dimentichino l'opera, finchè abbiano riepurato la maggior parte delle loro forze e del loro vigore. (Ved. qui sopra il Cap. II, §. III, di questo Vol. e segnatamente la pag. 28, num. 10.)

li, aprendo i passaggi verso de' quali si portano. Egli accoppiava l'esempio al precetto, facendo in tai casi uso de' *purgativi*, de' *fumenti*, dei *bagni vaporosi*, dei *srofinamenti*, de' *senapismi*, de' *peffarj*, ec. secondo lo stato del malato e della parte travagliata.

Termine
ordinario
de' mali ac-
cuti.

Aveva osservato che un male *acuto* termina per via d'una o di più *evacuazioni*; ch'è quanto a dire, per via d'*urine*, di *sudore*, di *scarichi*, di *spessorazione*, mercè d'un qualche *ascesso*, o d'una *deposizione* di materia *critica*, d'un *vomitato*, d'una *emorragia*, ec. Il piano di sua condotta fondato sopra sì fatte osservazioni aveva uno scopo stabile e regolare; il suo metodo era conforme alle leggi della Natura. Quando i principj sono piantati sull'osservazione, le indicazioni lo sono del pari.

Sintomi,
giusta i
quali egli
faceva vo-
mitare, e
in qual
tempo della
malattia e-
gli lo fa-
ceffe.

Egli non eccitava il vomito nelle malattie, se non quando l'infermo aveva la *becca amara*, la *lingua sudicia*, de' *russi*, de' *sconvolgimenti di stomaco*, come accade soventemente nelle *febbri biliose e putride*; ma egli non faceva vomitare che nei principj. Ecco come si esprime: „ Fate vomitare nei principj della malattia, se v'abbia di bisogno. „ In allora il malato è ancora in possesso di tutte le sue forze: se vi lasciate scappare cotesta occasione favorevole, sarete sforzati a differire fino alla declinazione del morbo; ma in allora la lunghezza del male ha esaurito le forze dell'infermo. Quando la malattia è nel suo più alto grado di forza, è meglio il tenerli in riposo „.

Non pur-
gava in
tutte le ma-
lattie acu-
te. Perché?

Quanto alle *purgazioni*, ci ammaestra che ci sono alcune malattie nelle quali non sono necessarie. Nelle *febbri acute* che terminano per *risoluzione*, cioè senza veruna *evacuazione* sensibile, come avviene nella maggior parte delle *febbri benigne*; e soventemente nella *febbre continua acuta*, su cui di presente si versa, *IPPOCRATE* si asteneva dal purgare; perchè gli umori essendo divenuti *omogenei* e capaci d'una assimilazione perfetta mediante la *risoluzione*, non v'è timore di ricaduta. Se ne asteneva nelle malattie, la *crisi* delle quali è *perfetta*; ch'è quanto a dire, in quelle dove l'*evacuazione completa* seco via trasportavano tutta la materia morbosa; in guisa che nulla ci resta, di cui temer se ne possano le conseguenze. Il che si riconosce dallo stato buono in cui si trova incontante il malato, dalle forze e dall'appe-

CAPITOLO QUINTO.

Della Pleurisia vera, della Pleurisia falsa, della Parafrenitide.

§. I.

Della pleurisia vera, o infiammazione della pleura, o sia infiammazione di petto.

LA pleurisia vera è l'infiammazione di quella membrana, chiamata pleura, la quale veste tutto l'in-

Definizione della pleurisia

tito, che ricompariscono senza indugio; in fine da una convalescenza facile e prospera, in cui entra immediatamente.

Non purgava adunque se non nelle malattie che terminavano per via d'una crisi imperfetta, o di evacuazioni incomplete, per non lasciare punto di eterogeneo dentro la massa del sangue, ma non purgava che sul fine dei mali.

In quali malattie egli purgava, e in qual tempo.

La sola eccezione di questa regola è la *surgenza* o l'*orgasmo* degli umori. In questo solo caso dava da purgare, nel cominciamento eziandio della malattia: ma ciò di rado accadeva; imperciocchè, come lo dice egli stesso, la materia morbosa è radamente in impeto di *surgenza* nel principio d'una malattia. (Ved. nella Tavola le voci *orgasmo* e *surgenza*.)

Eccezione a questa regola.

Sono appunto gli errori che su tal proposito tutto giorno si commettono, quelli i quali anno fatto dire all' HOFFMANNO: „ Se noi vogliamo rendere omaggio alla verità, è spesso meglio per la guarigione de' mali, il riposarsi sulla sola Natura, che di affidarsi all' imprese ardite d'un Medico ignorante. Costui, che non conosce le vie che la Natura calca nella cura de' mali impiega tutti i mezzi opposti alla di lei direzione, e nocevoli al corpo; cosa che non può tornare se non in svantaggio e pregiudizio del malato „.

Conseguenze funeste della negligenza dei precetti ipocratici.

Tale era la pratica d'IPPOCRATE: tale è quella di cui veggiamo servirsi il Sig. BUCHAN nelle *febbri continuae acute*, e di cui lo vedremo servirsi in tutte le *malassie acute*. La negligenza o il disprezzo di queste regole sopra l'uso delle bevande, del salasso, de' vomitivi, de' purganti, ec. sono, dice il Sig. CLERC, le vere cagioni degl' infortuni, della maggior parte dei Medici. Una malattia semplice da ciò diviene complicata, e lunga, e cronica. I malati dopo di avere ni-

vera. Come ella si divide.

terno del petto (1). La vera pleurisia si divide in *pleuritide umida*, e in *pleuritide secca*. Nella prima il malato sputa facilmente; nella seconda non sputa se non poco, o niente affatto. V'è parimente un'altra specie di *pleurisia*, che si appella *falsa* o *spuria*, nella quale la doglia è più esterna, ed affetta particolarmente i *muscoli intercostali*. (Ved. qui appresso §. II, di questo Cap.)

Chi sono quelli, che sono esposti alla pleuritide.

Gli artefici e gli operaj sono i più soggetti a questa malattia. Ella assale coloro segnatamente che lavorano all'aria aperta, e che sono d'un temperamento *sanguigno*. (Questa malattia è propria di tutte l'età e di tutti i sessi. CELIO AURELIANO ha osservato ch'ella attacca più spesso gli uomini, che le femmine.)

Tra gli uomini quelli che sono i più esposti alla *pleurisia*, sono le persone magre e secche; coloro di cui il *temperamento* è *bilioso*, i *pletorici* più di tutti; gli abitanti della campagna; quelli in fine, cui la

feramente languito, cadono nelle *cachessie*, nell'*isterizie* insaniabili, che vanno nella susseguente primavera a finire in *idropisie* o in *dissenterie putride*, alle quali tutta la scienza umana non è valevole di apportare rimedio. (Ved. qui in seguito il Cap. V, nota 4.)

Tutte le parti del corpo sono avvolte da membrane. Nomi, che esse portano.

(1) D'uopo è di sapere che tutte le *viscere*, tutti i *muscoli*, tutte le *ossa* sono coperte e avvolte da pellicole più o meno fitte, d'ordinario addoppiate, alle quali viene dato il nome generico di *membrane*. Cotesse *membrane* sono in riguardo a queste parti, ciò ch'è la pelle riguardo all'esteriore del corpo. Parecchie di queste *membrane* anno de' nomi particolari, laddove alcune altre non anno che quello di *membrana*.

Il pericranio: quella che ricopre immediatamente le *ossa*, appella *pericranio*: quella che copre il *cranio*, si chiama *pericranio*: quelle che involgono il *cervello*, diconsi particolarmente *meningi*, nome che non significa altra cosa che *membrane*; esse però si nominano più comunemente *pia* e *dura madre*: quella che circonda il *fegato*, la *milza*, quasi tutte le *viscere* del ventre inferiore, si chiama *peritoneo*: quella finalmente ch'è stesa le parti interne del *petto*, sopra la parte convessa del *diaframma* e sopra tutti i *polmoni*, si denomina *pleura*; donde viene che l'*infiammazione* di questa parte addomandasi *pleurisia*.

Natura o le fatiche anno rendute le fibre forti ed elastiche. Di questo numero sono i cacciatori, i soldati, i corrieri, i bajuli, i suonatori di corno da caccia, di tromba, ec.

L'età la più soggetta a questa malattia è dopo gli ott'anni fino ai quaranta. Tuttavolta i vecchi non ne vanno esenti; ma sembrano liberarsene più facilmente degli adulti: locchè avviene, perchè le loro fibre essendo più dissecate, sono meno disposte ad una forte infiammazione.

Coloro che sono lubrici per consuetudine, e quelli che portano de' cauterj, sono di rado assaliti da pleurisia. Tutte le separazioni abituali, massime se sono sanguigne, mettono al coperto da questo male. Ecco senza dubbio, perchè le femmine ci vanno meno soggette degli uomini, e che ne sono egliu stessi esenti, allorchè anno l' *emorroidi* abituali.

Quelli che anno di già sofferto questa malattia, contraggono una disposizione che ve li rende molto soggetti in seguito, e non v'ha dubbio che per queste persone ella non divenga sempre più pericolosa.)

La primavera è la stagione, in cui apparisce con più frequenza. (Leggete il Cap. I, e II, di questo Volume.)

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni della pleurisia vera.

LA pleurisia può essere cagionata da tutto ciò, ch'è capace di sopprimere la traspirazione. Per la qual cosa i venti freddi settentrionali, la bibita de' liquori freddi, quando si abbia caldo, il dormire all'aria aperta sopra un terreno umido, i vestiti bagnati, ec. espongono a questa malattia.

Si corre altresì rischio di soggiacervi, allorchè essendo in sudore, esponesi all'aria, o tuffasi nell'acqua fredda.

Questa malattia può parimente essere cagionata dal bere de' liquori spiritosi, dalla soppressione di qualche evacuazione consueta, come di ulcere invecchiare, di

cauterj; in fine del sudore de' piedi, delle mani, o delle ascelle, ec.

Ella s'è veduta ancora prodursi dal subitaneo retrocedimento di qualche *eruzione*, come della *scabbia*, della *rosolia*, del *vajuolo*. Le persone che anno l'usanza perniciofa di farsi cavar sangue in certe stagioni dell'anno, sono fuscettibili ad acquistar questo male, qualora trascurino di farlo. (La morficatora della *vipera caudiffona* sembra produrre in America una vera *pleuritide*.) (Ved. Cap. XLVIII, §. III, Art. II.)

Il tenerfi troppo caldi, sia per la quantità, o la qualità degli abiti, con cui ricopresi; sia pel fuoco degli appartamenti in cui abitasi, dispone ancora singolarmente a questo male.

In fine la *pleurisia* può essere suscitata da un violento *esercizio*, come dalla corsa, dalla lotta, dal saltare, e dal portare de' gran fardelli, ed anche da alcune percosse ricevere sul *petto*.

La sola conformazione del corpo, come un *petto* troppo stretto, e la poca capacità dell'arterie della *pleura*, rendono alcune persone soggette a questo morbo. (Così non sembra punto dubbioso che i *busfi* di *balena* non sieno una cagione rimota della *pleuritide*; l'effetto, che producono, essendo di diminuire la capacità del *petto*, di cagionarne la ristrettezza, e di opprimere le viscere ch'ei contiene.) (Ved. Parte I, Cap. I, §. III, nota f, e 13.)

ARTICOLO SECONDO.

Sintomi della pleurisia vera.

Cosa sia
ciò che
chiamasi
punta.

LA *pleuritide*, come la maggior parte dell'altre *febbri*, in generale comincia da *brividi* e *tremiti*, che sono susseguiti da calore, da sete, e da *vigilia*. Si prova in seguito un dolore violento e *pungitivo* in uno de' lati tra le costole, (questo è ciò, che volgarmente chiamasi *punta*.) Talvolta il dolore si stende sino verso la *spina* del *dorso*; talora sino il davanti del *petto*, e tal'altra volta parimente sino verso le *spalle*. In generale questo dolore è più acu-

Regola di vitto, che bisogna prescrivere, ec. 73
to nel momento che il malato fa il moto d'*inspirazione*, e allorchè egli tosse.

Il *pulso* in questa malattia per l'ordinario è *duro* e *veloce*: le *urine* sono cariche di colore.

Il *sangue* dopo essere sortito dalle vene si copre d'una *crosta* dura, o d'una specie di *costrua*. Gli *sputi* non anno sulle prime alcun distinto carattere; ma ben presto s'ispessiscono, e divengono sovente sanguigni. (Ved. Cap. I, e II, di questo Vol.)

Caratteri
del sangue
nella pleu-
ritide.

ARTICOLO TERZO.

*Regola di vitto che bisogna prescrivere a quelli
che sono attaccati da pleuritide vera.*

LA Natura ordinariamente tenta di liberarsi da questa malattia pel mezzo d'un' *evacuazione critica* di *sangue* da qualcheduna delle parti del corpo; o per via d'una *espettorazione* e di *sputi* copiosi; o per via del *sudore*, di alcune *dejezioni* scrose, di *urine* cariche, ec.

Per quali
mezzi la
Natura cer-
ca di libe-
rarli da
questa ma-
lattia.

Nostro dovere è dunque di secondare le sue intenzioni moderando l'impeto della *circolazione*; allentando i *vasi*; diluendo gli umori, e agevolando l'*espettorazione*.

Quali sono
quelli che
noi dob-
biamo met-
tere in o-
pra.

Per conseguenza il *vitto* vuol essere, come nella malattia precedente, *leggiere*, *rinfrascativo*, e *diluente*. Il malato deve evitare gli *alimenti viscosi*, di difficile *digestione*, o assai nutritivi, come la carne, il burro, il formaggio, le ova, il latte, ec. Schiverà egualmente gli *alimenti* di natura *riscaldante*.

Cosa deb-
basi evita-
re dal ma-
lato.

La sua bevanda farà il *siero* di *latte ordinario*, o la *zizana* *pettorale comune*, o delle *infusioni* di piante *pettorali*, e *balsamiche*.

Qual deb-
ba esser la
bevanda.

La *decozione* di *orzo*, alla quale si aggiunge un po' di *mele* o di *gelatina* di *uva spina*, è parimente una bevanda convenevole in questo male. Ella si fa nella maniera seguente.

Maniera
di prepara-
re la deco-
zione d'or-
zo.

Prendete dell' *orzo perlato*, un'oncia.
Fatelo bollire in tre fogliette d'acqua fino alla riduzione d'un terzo; feltrate; aggiungetevi più o meno di *mele* a tenore del gusto dell'infermo.

La decozione di fichi, di uva secca, e di orzo, in vece di samarindo, raccomandata nella malattia precedente, conviene egualmente nella *pleurisia*.

Le bevande devono essere prese in piccolissima quantità alla volta, e un poco calde.

Qualunque sia la bevanda, che il malato scelga, non bisogna ch'egli la prenda in troppo grande quantità per volta. Fa di mestiere al contrario che ne bea in certo modo a forsi, ma continuamente, a fine d'aver incessantemente la bocca e le fauci umettate. La bevanda e gli alimenti del malato devono tutti essere presi un poco caldi.

Si deve tenere l'infermo tranquillo in una temperatura moderata, e più agiatamente che sia possibile, come lo abbiamo prescritto nella malattia precedente.

Bagni giornalieri de' piedi e delle mani.

Bisogna ogni giorno tuffargli i piedi e le mani nell'acqua calda. Si può talvolta tra giorno farlo stare sedente per qualche tempo; questa positura gli alleggerirà il capo, e faciliterà la respirazione. (Ved. il §. III, e IV, del Cap. precedente.)

ARTICOLO QUARTO.

Rimedj della pleuritide vera convenienti a tutte l'età.

Necessità della cacciata di sangue.

NON v'è quasi persona che non sappia, essere necessaria la cacciata di sangue in una febbre accompagnata da doglia violenta di lato, e da un polso vivace e duro. Quando questi sintomi sono manifesti, più che si caccia sangue prontamente, meglio è pel malato.

La prima emissione di sangue deve essere copiosa.

Fa di mestiere, che questa prima emissione di sangue sia assai copiosa, purchè l'infermo per altro vi possa reggere. Un'abbondante cacciata di sangue nel cominciare d'una pleuritide fa infinitamente più effetto, di quello che alquante piccole cacciate ripetute parecchie volte nel corso del male. Si può cavare ad una persona di età virile dodici o quattordici oncie di sangue, come prima s'abbia sicurezza che sia attaccata da una pleurisia. Se ne leverà meno, come ben si vede, ad una persona più giovane o più delicata.

Se dopo il primo *salasso* la violenza della *punta* e degli altri *sintomi* continua, sarà d'uopo a capo di dodici o dieci ore, trarre ancora otto ovvero nove oncie di sangue. (Ved. qui sopra Cap. IV, nota 4. di questo Vol.) Se dopo questa seconda *emissione* di sangue, i *sintomi* non ancora si minorano, e che il sangue tuttavia si copra della *cotenna*, (di cui abbiamo parlato di sopra, pag. 73. di questo Vol. e che descriveremo alla parola *cotenna* nella Tavola) abbisognerà in allora un terzo e anche un quarto *salasso* (2).

Quando e quante volte si debba ripeterla.

(2) Egli è un pregiudizio molto funesto, dice il Sig. CLERC, quello di prescrivere il *salasso* nelle malattie *infiammatorie*, fino a tanto che la *cotenna* che si riguarda come un segnale d'*infiammazione*, più non si lasci affatto vedere. Questa *cotenna*, non sempre caratterizza l'*infiammazione*. Ella si osserva in un semplice *infreddamento*, e nel sangue dei *gotosi*. È comune nei *reumatismi*, nelle *gravidezze*; l'ho veduta, soggiunge egli, sul fine, come sul principio de' *mali acuti*.

Quanto sia funesto il pregiudizio, che conduce a cacciar sangue finché la cotenna più non apparisca.

Questa *cotenna* per tanto non è una ragione per progredire troppo innanzi coi *salassi*: se la legge generale è vera, ella presenta dell'eccezioni che bisogna rispettare: senza questa saggezza si può levare tutto il sangue d'un malato, anzi che la *cotenna infiammatoria* si dissipì; se per avventura alcuno sopravviva a questa dannevole pratica, non si dee allegarsene; cotesta specie di risorgimento non è che un'agonia prolungata.

Effetti infelici dei salassi soverchiamente moltiplicati.

Secondo il Sig. TISSOT, *Avis au peuple*, pag. 80. ec. questa *crosta*, che per altro non sempre si forma nella *pleurisia*, e nelle *infiammazioni* le più violente del *petto*, dipende da tante circostanze, che imprudenza sarebbe il fondarsi unicamente su questa *crosta* per regolare i *salassi*: e in generale non bisogna troppo credere, che la condizione del sangue nello scodellino possa farci giudicare con sicurezza del vero suo stato dentro del corpo.

Tocca dunque all'intensità de' *sintomi* a guidarci. Qualora sieno tali, come l'Autore si dispone a dipingerli, non conviene più cacciar sangue. In generale, se i due o tre primi *salassi* sieno stati a tempo eseguiti, vale a dire nei primi giorni con poca distanza l'uno dall'altro, è di rado necessario di passare ad un quarto, massime se indipendentemente dalle *emissioni* di sangue, si faccia uso degli altri presidi, quali sono quelli che il Sig. BUCHAN ha già indicati, e che si propone d'indicare nel seguito di questo Articolo.

La sola intensità dei sintomi deve condurci a ripetere il salasso.

Tempo in cui bisogna desistere dal cacciar sangue.

Ma subito che la doglia del lato minorasi; che il polso diviene più molle; che il malato comincia a sputare liberamente, la cacciata di sangue non è più necessaria. Questo rimedio di rado è utile dopo il terzo o quarto giorno del male; e dopo questo tempo non deve mai essere usato, qualora almeno delle circostanze pressanti non lo esigano.

(A cagione di esempio, sebbene sieno già parecchi giorni, dacchè il male continua, allorchè si comincia a curarlo, e sia la febbre gagliarda, e la punta ancora violenta; se la respirazione è difficile; se il malato non isputa, o se spura troppo di sangue, bisogna senza prendersi fastidio della giornata, fare un salasso, fossi questo eziandio il decimo giorno, sull' esempio d' Ippocrate, il quale mercè d' una emissione di sangue fatta nell' ottavo giorno ha salvato Anassagora dalla suppurazione e dalla cancrena.)

Altri mezzi che concorrono con il salasso a diminuire la viscosità del sangue.

Del resto si può diminuire la viscosità del sangue per molti altri mezzi, senza ricorrere alle moltiplicate emissioni di sangue. Si può parimente alleviare la punta per via di differenti rimedj senza il soccorso di queste.

I fomenti ammollienti.

Modo di prepararli.

Questi rimedj sono li fomenti ammollienti, che si applicano alla parte malata dopo la prima o la seconda cacciata di sangue. Si fatti fomenti si compongono nella maniera seguente.

Prendete de' fiori di sambuco
di camomilla
di malva
di ciascuno una manata.

Fate bollire queste piante, o qualsivoglia altra di quelle che sono calmanti, dentro una quantità sufficiente d'acqua.

Tre salassi sono bastanti.

Come si debba regolarsi riguardo alle femmine che anno attualmente i loro flussi menstruali.

Di rado, dice il Sig. Tissot, mi fu d'uopo di più di tre salassi, e frequentemente mi attengo ai soli due primi.

Si dee osservare relativamente alle femmine, che d'altronde sono meno soggette a questa malattia, e in generale a tutti i mali infiammatori, che se si trovino travagliate da una pleuritide, da una polmonia, ec. nel tempo stesso dei loro flussi menstruali, questa circostanza non dee impedire i salassi, qualora sieno bene indicati, nè indurci a cangiare la cura.

Mettete queste piante così bollite tramezzo di due pannilini, o dentro un sacco di flanella, e applicatele affatto calde sul lato infermo.

Di applicarli.

S'immolla parimente una flanella, e in sua mancanza una salvietta, nella decozione di queste piante; e dopo averla leggermente spremuta, si applica alla parte addolorata tanto calda, quanto il malato può soffrirla. A misura che la flanella si raffredda, bisogna cangiarla, e avere grande avvertenza che il malato non prenda il menomo freddo nel corso di questa operazione.

Altra maniera di applicarli.

Se questa specie di *fomenti* sembrasse malagevole, si prenderà semplicemente una vescica piena di latte e d'acqua, e si applicherà affatto calda sul lato.

Altri *fomenti*.

I *fomenti* non solo acchetano i dolori, ma ancora rilassano i vasi, e s'oppongono allo *stagnamento* del sangue e degli altri umori.

Avvantaggi di questi *fomenti*.

Si può eziandio strofinare soventi volte per giorno il lato infermo con un poco del *lenimento volatile* seguente.

Lenimento volatile con cui si strofina il lato.

Prendete olio di mandorle dolci, o d'oliva, due oncie; spirito di corno di cervo, un'oncia. Mettete tutto dentro una bottiglia: scuotete gagliardamente fino a tanto che queste due sostanze sieno perfettamente rimescolate insieme.

Se ne versano alcune goccioline sul lato infermo: si distendono con la mano calda, e si stropiccia fortemente, fino a che abbiano interamente penetrato.

Maniera di applicarlo.

Se ne versa di nuovo, e si stropiccia fino tanto che si abbia impiegato la quantità d'un cucchiaino da caffè di questo *linimento*. Si ripete questa operazione tre o quattro volte per giorno.

(Si può in luogo di questo *linimento*, o allorchè non se ne potrà avere, adoperare nella stessa dose e nella stessa maniera la *sinsura* di *canterelle*, che produce lo stesso effetto, e anco più prontamente.)

La natura di canterelle.

Si raccomandano alle volte dei *fomenti* secchi, composti d'*avena abbruciata*, di pane abbrustolito, ec. Tuttochè possano essere di qualche utilità, pure essi non sono tanto convenevoli nella malattia di cui si tratta, quanto li *fomenti* umidi.

I *fomenti* secchi sono meno vantaggiosi degli umidi.

S'è ricavato del gran vantaggio nella *pleurisia* dal-

Cacciata di sangue lo-

cale con le mignatte, o con le coppette: loro vantaggi. la cacciata di sangue locale, che si fa o con un numero conveniente di mignatte, o con delle coppette, applicate sopra la parte malata; e s'è osservato che gli effetti di queste cacciate di sangue erano e molto più pronti, e molto più sicuri.

Si può ancora applicare con vantaggio alla parte ammalata le foglie di parecchie piante. Ho veduto sovente nella *pleurisi* de' grandi effetti dalle foglie de' cavoli novelli, applicate affatto calde sul lato: non solamente ammoliscono le parti, ma eccitano altresì un blando *madore*, e possono salvare il malato dalla necessità del *vescicatorio*, al quale bisogna in fine ricorrere, quando gli altri presidi non sieno riusciti.

Se la *dolia pungitiva* persiste dopo le ripetute cacciate di sangue, dopo li *fomenti*, e gli altri mezzi raccomandati nell'articolo del vitto, e in quello de' rimedj, bisogna applicare un *vescicatorio* sulla parte inferma, e lasciarvelo pell'intervallo di due giorni. Egli suscita non solamente una *evacuazione* in questa parte; ma ancora ne distrugge lo *spasmo*, e per conseguenza aiuta la Natura ad espellere la causa del male.

Per prevenire la *stranguria*, alla quale i *vescicatorj* danno spesso motivo, si farà bere abbondantemente al malato della seguente *emulsione* di *gomma arabica*.

Prendete delle *mandorle dolci*, due oncie. Mettetele dentro l'acqua calda, per poterne levare la scorza; pestatele fortemente in un mortajo con una eguale quantità di *zucchero*; abbiate due pinte di *decozione* d'orzo calda, alla quale aggiungerete di *gomma arabica* mezz'oncia;

Dimenate per farla sciogliere; lasciate freddarsi; versate questo liquore a poco a poco sopra le *mandorle* ed il *zucchero*; tritate insieme, avendo l'avvertenza di rimescolare perpetuamente sino a che il liquore divenga egualmente bianco o lattato; seltrate. Il malato ne farà la sua bevanda ordinaria.

Se il malato è *stitico*, se gli applicherà in ciascun giorno un *serviziale* composto di *cremore* acquoso di *avena*, o d'*acqua* d'orzo, in cui si avrà fatto bollire della *malva*, o qualsivisa altra *pianta mollitiva*. Si fat-

Foglie di cavolo novello. Maniera di applicarle. Loro effetto.

Momento di applicare un vescicatorio, e quanto tempo bisogna lasciarlo sulla parte malata.

Bevanda che deve darsi finchè il vescicatorio resta applicato.

Mezzi di lubrificare il ventre.

to *clistere* non solamente evacuerà gl' *intestini*, ma produrrà parimente l'effetto dei *fomenti* caldi applicati alle *viscere* del *ventre inferiore*, e quindi cagionerà una derivazione degli umori dal *petto* (3).

Per eccitare l'*espettorazione* o gli *sputi*, si porgeranno de' *rimedi incisivi oliosi*, *mucilaginosi*, come il seguente.

Mezzi
ond' ecci-
tare l'ef-
pettorazio-
ne.

Pigliate dell' *offimele* o dell' *aceto scillitico*, un'oncia;
decozione peccorale, sei oncie.

Mescolate; il malato ne prenderà due cucchiaini ogni due ore.

Se i *medicamenti scillitici* ripugnassero allo *stomaco* del malato, se gli darà dell' *emulsione oliosa*, (Ved. questa parola nella Tavola) o in sua vece il rimedio che segue.

Prendete olio di mandorle dolci,) di ciascuno due
o d'oliva,) oncie. Elettuario
sciloppo di viole,) oliofo.

Mescolate; aggiungete tanto *zucchero candito*, quanto farà necessario per fare un *elettuario*, che abbia la consistenza del *mele*.

Il malato ne prenderà sovente una piccola cucchiainata, massime se sia stancato dalla *tosse*.

(3) Questa ragione deve fare capire la necessità de' *lavativi* in questa malattia, come pure in tutte quelle che sono *infiammatorie* e accompagnate da *puridità*: crediamo pertanto di dover consigliare in queste malattie, di usare in ciascun giorno per i cinque primi giorni un *lavativo*, quando anche il malato non fosse *stitico*; e nei casi che lo fosse, di farne uno mattina e sera.

Necessità
de' servi-
ziali nella
pleurisia.

Al popolo, dice il Sig. TISSOT, non vanno a genio i *lavativi*: e pure non ci sono *medicamenti* più utili nei mali *febrili*, segnatamente se l'*urina* non sieno *abbondanti*, o non sieno *rossigne*: se il malato abbia qualche *alienazione di mente*: se la *febbre* sia *gagliarda*: se le *dolgie testa* e di *reni* sieno *considerabili*: se il *ventre* è *addolorato*; in tutti questi casi i *clisteri* apportano ordinariamente più sollievo, che se si bevesse quattro o cinque volte la stessa quantità di liquido. Ma non bisogna più usarne, passata che sia la quinta giornata, perchè le copiose *evacuazioni* farebbero ostacolo all'*espettorazione*. IPOCRATE anzi le sopprimeva nella *pleurisia* e nella *polmonia*, tosto che il malato *espettorava*. (Ved. nota 2 del Cap. seg.)

Sintomi
che indica-
no i clisteri
nelle ma-
lattie feb-
brili.

Ci sono delle persone cui gli olj recano incomodo, e alle quali suscitano delle *nausee*; e questi casi succedono di frequente: allora bisognerà in loro vece esibire una *soluzione di gomma ammoniaco nell'acqua d'orzo*.

Ecco la maniera con cui ella si appresta.

Soluzione di gomma ammoniaco.

Prendete *gomma ammoniaco*, due dramme. Tritate perfettamente in un mortajo; versate poco a poco, dimenando sempre, un mezzo sestiere di *decozione d'orzo*, fino a che la *gomma* sia interamente disciolta. Si possono aggiungere tre o quattr'once di *acqua stillata semplice di puleggio*.

Il malato ne prenderà due cucchiaj tre o quattro volte per giorno.

Mezzi d'eccitare l'orine e la traspirazione.

Se l'infermo non *traspira*: se al contrario, un calore ardente si fa sentire sulla *pelle*; e se orina pochissimo, si daranno alcune piccole dosi di *nitro purificato* e di *canfory*, combinate nella maniera seguente.

Pigliate *nitro depurato*, due dramme;
canfory, cinque o sei grani.

Tritate in un mortajo queste due sostanze; mescolate perfettamente; dividete in sei dosi eguali.

Il malato prenderà una di queste dosi ogni cinque o sei ore, dentro una cucchiata della sua bevanda ordinaria.

Decozione di senega.

Noi non faremo più menzione che d'un solo *rimedio*, che alcune persone riguardano come specifico nella *pleurisia*; ed è la decozione di *senega*, o *radice contra la morsicatura della vipera caudifera*, chiamata *poligala virginiana*. (Ved. questa voce nella Tavola.)

Prendete radice di *senega*, un'oncia. Farela bollire in un sestiere e mezzo d'acqua, fino alla riduzione d'una foglietta; lasciate in riposo; feltrate.

Quando e come bisogna prescrivere.

Dopo aver fatto le convenienti *cacciate di sangue*, e avere provveduto all'altre *evacuazioni*, si dà al malato due, tre, o quattro volte per giorno, tre o quattro cucchiaj di questa *decozione* più o meno, secondo che il suo stomaco può tollerarla.

Se questo *rimedio* risveglia il vomito, bisognerà meschiare

schiare a questa decozione due o tre oncie di acqua di cannella semplice ; o esibirla in dose più piccola .

Siccome questa decozione favorisce la traspirazione , eccita l'orine , e lubrica il ventre , ella è adattata a soddisfare alla maggior parte dell'indica^{Importan-}zioni nella cura della pleurisia , e dell'altre malattie infiammatorie del petto . ^{za di que-}
^{sto rim-}
^{edio .}

Nessuno senza dubbio s'immaginerà che abbisogni far uso di tutti questi rimedi . Se noi ne raccomandiamo parecchi , ciò è a fine che si possa scegliere , e che se non si può procurarsi quello per cui taluno s'è determinato , si possano almeno adoperarne alcuni altri . D'altra parte i differenti periodi d'una malattia dimandano differenti rimedi ; e quando l'uno non abbia il successo che se ne aspetta , o che ributti al malato , forza è di ricorrere ad un altro (4) .

Perchè si prescriva un certo numero di rimedi in una stessa malattia .

(4) Questo avviso è di somma importanza . Per quanto eccellenti sieno questi rimedi , si esporrà il malato a pericolo , ogni volta che si esibiranno senza ordine e inconsideratamente . Abbiamo già detto : i rimedi anche i più validi non riescono , se non in quanto all'applicazione convenevole che se ne fa . Bisogna dunque , dopo d'esserli imbevuti del metodo esposto , (nota 7 del Cap. IV di questo Vol.) metodo praticato da IPPOCRATE nel governo de' mali acuti , non perdere giammai di vista l'ordine , col quale il Sig. BUCHAN prescrive i suoi rimedi .

Non devono essere amministrati senza ordine .

Abbiamo veduto nella febbre acuta continua , lo vediamo nella pleurisia , e lo vedremo in tutte le malattie infiammatorie , che il suo primo rimedio è la cacciata di sangue , la quale non può iterarsi , passati che sieno i due o tre primi giorni . Abbiamo veduto che nelle febbri intermittenti , e lo vedremo in tutte le malattie umorali o del genere putrido , primo rimedio è il vomitorio , che non può essere egualmente replicato , se non nei due primi giorni ; perchè i salassi e i vomitivi sendo rimedi , di cui gli effetti pronti sono accompagnati da maggiore o minore violenza , essi esigono per parte del malato un certo grado di forze , che vien ben tosto esaurito dalla malattia .

Qual è quello che si dee scegliere nelle malattie infiammatorie e umorali ;

Nelle malattie acute che presentano dei sintomi misti , vale a dire dei sintomi che additano l'infiammazione e la sovrabbondanza degli umori , come è assai comune l'osservarlo

In queste due specie di malattia complicata insieme .

*Esprimere
dalla Gra-
fica l'or-
gismo ca-
gionato*

L'istante il più avanzato d'una malattia *acuta*, che si appella *crisi*, (Ved. questa voce nella Tavola) è talvolta accompagnato da difficoltà grandissi-

nella pratica, fa di mestiere dar principio dall'investire i sintomi i più urgenti. Se domina l'*infiammazione*, si comincerà dal *vomitario*, riferbando il *salasso* per il dì susseguente. Di rado trovasi in tali casi obbligato di replicare l'uno o l'altro di questi così fatti *rimedj*, perchè le forze della Natura distribuite tra le due cagioni differenti, non possono avere che un grado di mediocre energia.

*Bisogna
attendere
l'effetto
del rimedio
prescritto
avanti di
passare ad
un altro.*

Ma tosto che una volta si abbia prescritto l'uno o l'altro di questi *rimedj*, o tutti e due, come nei casi di cui abbiamo testè favellato, non è bene di porgerne verun altro. Devonsi attenderne saggiamente gli effetti: bisogna solamente avvalorarli con le copiose bevande, coi *serviziali*; coi bagni dei piedi, cogli altri mezzi, che dipendono dal *visito*, a cui volger si dee il pensiero dal principio del male fino alla *convalescenza*. (Ved. Cap. II, §. III di questo Vol.) Imperciocchè sì fatti oggetti non sono che de' *coadiuvanti*, che dispongono il corpo all'effetto dei *rimedj*, che favoriscono la loro operazione, e che se vengano presi nella quantità e pel corso di tempo convenevole, ci mettono soventemente nel caso di far a meno di tutti gli altri.

*Ordine che
bisogna se-
guire nell'
amminis-
trazione
dei rimedj
contro la
pleurisia.*
*Legge ge-
nerale per
tutte le
malattie
acute.*

Tuttavolta se nella *pleurisia*, malattia su cui versa il presente Capitolo, il dì susseguente al *salasso*, o all' ultimo di questi, supposto che abbia abbisognato il replicarlo, non si discopre che i *sintomi* abbiano scemato di violenza: se per lo contrario appalessi che aumentino d'intensità, bisognerà porre in uso i *fomenti* o i *cataplasmi*; e se a capo di ventiquattr'ore essi non producono miglioramento veruno, sarà d'uopo passare al *lenimento*, pag. 77 di questo Vol. Imperciocchè legge generale, donde non conviene allontanarsi giammai nel maggior numero dei mali, massime negli *acuti*, è quella di cominciare sempre dall'impiegare i *rimedj* i più semplici, e di non far passaggio ai più attivi, se non quando i primi non sono riusciti. Si vede dunque che non si dovrà venire ai *vesicatorj* con le cautele prescritte, se non nel caso che il *lenimento* e gli altri presidi avranno mancato del loro effetto.

Quanto agli altri *rimedj* propri ad eccitare li *spusi*, qualora almeno i sintomi non sieno di troppo pressanti, forza è d'attendere che i *fomenti*, o i *cataplasmi*, o il *lenimento*, o i *vesicatorj* abbiamo operato, di che non puossi accertarsene, che a capo d'uno o due giorni: allora si metterà in opra l'uno dei tre *rimedj* proposti (pag. 79 e 80 di questo Vol.) che più aggradirà all'infermo, o che si potrà avere più age-

ma di respiro ; da polso irregolare ; da movimenti convulsi , ec. *sintomi* che sono moltissimo atti a spaurire gli assistenti , e che l'inducono sovente a fare delle cose contrarissime al malato , come di cacciarli sangue , di dargli de' rimedi forti e irritanti , ec.

dalla crisi d'una malattia acuta .

Nondimeno tutti questi *sintomi* non sono prodotti che dagli sforzi della Natura per vincere la malattia ; sforzi che fa d'uopo di secondare con delle copiose bevande *diluenti* , che allora sono singolarmente necessarie . Se però le forze dell'infermo fossero molto esauste dal male , si possono in questo periodo sostenere con un po' di siero di latte vinoso , di negus , ec.

Come bisogna di portarsi nell'istante della crisi .

Allorchè i dolori e la febbre saranno dileguati , e che il malato avrà ricuperato un poco di forze , se gli somministreranno alcuni *blandi purgativi* , come quelli che abbiamo consigliato nella fine delle febbri acute continue . (Ved. pag. 62 di questo Vol.) Nella *convalescenza* i cibi saranno sempre leggieri e di facile *digestione* : il malato prenderà per bevanda del latte di burro , del siero , o ogni altro liquido di natura *detersiva* . (Ved. come si debbano regolare i convalescenti Cap. II , §. III di questo Vol.)

Momento di purgare

volmente . Non si esibirà la polvere composta di nitro e di canfora , che nei casi indicati dal Sig. BUCHAN : in quanto al *senega* , se ne farà uso , ogni qual volta s'abbia l'opportunità di procurarselo .

Tal'è la via che conviene seguire nell'amministrazione dei rimedi di questa malattia . Ella deve servire di base per tutte le malattie acute .

Avremmo oltrepassati i limiti che ci siamo prescritti , se avessimo intrapreso di far parola di tutte le altre malattie . Per quanto poco abbiasi di perizia , si saprà fare l'applicazione di tutto ciò che abbiamo di presente esposto , al governo de' mali seguenti . Non abbisogna che di tenere dietro esattamente all'ordine , con cui i rimedi sono indicati .

Frattanto non possiamo negare che per quanto semplice sia questo cammino , egli ancora richiede un'attenzione di cui non tutti sono capaci . L'Autore ha dunque ragione di dire , che se il *visso* può essere amministrato da tutti gli uomini , i rimedi non devono esserlo , che dalle persone le più prudenti e le più illuminate . (Ved. Cap. I , nota 4. di questo Volume .)

Attenzione e prudenza ch' esige l'amministrazione dei rimedi .

Della pleurisia falsa o spuria.

Carattere
di questa
specie di
pleurisia.

SI dà il nome di *pleurisia falsa*, o di *pleurisia spuria*, a quella di cui la sede del dolore è più esterna, che nella *pleurisia vera*, *secca* o *umida*, della quale abbiamo poc' anzi trattato. Così nella *pleurisia falsa* il dolore si fa sentire principalmente nei *muscoli intercostali* (5).

Chi sono
quelli che
ne sono
fogggetti.

Le persone, che vanno soggette all' altre due specie di *pleuritidi*, sono sottoposte a questa egualmente. (Ved. pag. 70. di questo Vol.)

ARTICOLO PRIMO.

Sintomi della pleuritide falsa.

Ella si manifesta da una *tosse secca*; da *polso vivo*; e da difficoltà di poggiare sul lato infermo: *sintomo* che merita tanto più d'essere notato, quanto ch'egli non sempre si rincontra nella *vera pleuritide*.

ARTICOLO SECONDO.

Cura della pleuritide falsa.

Come ella
si guarisce.

Ella si guarisce col custodirsi al caldo per l'intervallo di alcuni giorni; prendendo delle copiose bevande *diluenti*, e che determinano gli umori verso

(5) Il *petto*, il quale serve di barricata ai *polmoni*, è composto di ventiquattro *costole*, fornite d'una mobilità, che debbono alla maniera con cui sono connesse colla *spina* del *dorso*; e queste *costole* vengono ajutate nei loro movimenti da un gran numero di *muscoli*, de' quali una gran parte ne formano gl' *inter-costali*: posciachè i muscoli del *torace* sono di tre sorte: i *sopra-costali*, che sono posti immediatamente sopra la superficie esterna delle *costole*; gl' *inter-costali*, fraposti a cadauna *costola*; e i *sotto-costali*, situati sulla superficie interna delle *costole*.

Della parafrénitide, o infiammazione, ec. 85
 la pelle, come l'infusione di fiori di sambuco; ec. osservando una regola appropriata di vitto; quale si è prescritto nell'Art. III del §. I di questo Cap.

Nulladimeno questa malattia diviene talvolta ostinata. In tal caso fa di mestiere ricorrere al salasso; alle coppette, alle scarificazioni della parte malata, e agli altri mezzi proposti contro la pleurisia vera, Art. IV del §. I di questo Cap. Questi rimedj, e l'uso delle bevande nitrate e rinfrescanti, mancano di tado di guarirla.

Rimedj necessari quando ella è ostinata.

§. III.

Della parafrénitide, o infiammazione del diaframma.

LA parafrénitide, o infiammazione del diaframma tanto da vicino s'accosta alla pleuritide; e per i sintomi e per il governo, che appena è necessario di considerarla come una malattia a parte (6).

Relazione che passa tra questa malattia e la pleuritide.

ARTICOLO PRIMO:

Sintomi particolari della parafrénitide.

ELLA è accompagnata da una febbre acutissima; da un dolore violento nella parte malata; che in generale si accresce nel tossire, nello starnutare, nel respirare, ingojando degli alimenti, scaricando il ventre, orinando ec. Così pure il malato ha la respira-

(6) Il diaframma è uno degli organi della respirazione: è ricoperto dalla pleura dal lato che riguarda il petto; egli è dunque più o meno affetto nelle malattie di questa parte del corpo: ed è altresì per questa ragione, che la parafrénitide offre più o meno i sintomi che caratterizzano la pleurisia, e che il Sig. BUCHAN dice che adoperandosi a guarire quest'ultima, si guarirà la prima.

La parafrénitide è malattia acutissima e affai dolorosa; perchè il diaframma, ch'è d'una struttura in parte tendinosa, è in oltre fornito d'una grandissima quantità di nervi; quindi la sua grande sensibilità, e la violenza dei sintomi che appalessano le malattie da cui è travagliato.

zione breve : manda il fiato dal ventre per prevenire la *contrazione* del *diaframma* : non può dormire : la *tosse* è secca : è molestato dal *singhiozzo* , e sovente *delira* . Il *riso sardonico* , o piuttosto una specie di *smorfia* o *sberleffe involontario* , è un sintomo comunissimo in questo male ,

ARTICOLO SECONDO.

Cura della *parafrenitide* .

Cosa deb-
basi sopra
tutto pre-
venire in
questo ma-
le .

IN questo caso si dee tutto mettere in opra onde prevenire la *suppurazione* del *diaframma* ; perchè se questo malore arriva , è impossibile di salvare il malato .

Il *vitto* e i *rimedj* sono per tutti i conti gli stessi , che quelli per la *pleurisia* , esposti negli Art. III, e IV del §. I di questo Cap.

Necessità
de' clisteri
mollitivi .

Aggiungeremo solamente , che in questo morbo i *clisteri mollitivi* sono singolarmente utili , perchè rilassando gl' *intestini* , deviano l'umore dalla parte inferma .

CAPITOLO SESTO.

Delle diverse specie di peripneumonia , o infiammazione di polmone , o delle flussioni di petto .

§. I.

Della peripneumonia vera , o infiammazione di polmone .

Qual' è la
sede di que-
sto male .

Siccome questa malattia attacca un organo assolutamente necessario alla vita , poichè il *polmone* , (Ved. questa voce nella Tavola) è quello che ne forma la sede , ella è sempre accompagnata da pericolo .

Chi sono
quegli che
ne vanno
soggetti .

Le persone che abbondano di *sangue* ; quelle che anno il *sangue* denso ; di cui le fibre sono tese e ri-

gide ; quelle che si nutrono di *alimenti* grossolani , che bevono de' *liquori* gagliardi e *viscosi* , sono molto soggetti alla *infiammazione* nel *petto* . Ella è ordinariamente pericolosa per coloro che anno il *petto* appianato , o troppo angusto ; (Ved. pag. 72 di questo Vol.) o che sono molestati da *asma* , principalmente nel declinar dell'età .

Talvolta l'*infiammazione* non assale che una metà del *palmone* ; altra volta lo attacca tutto intero , e in questo ultimo caso è quasi sempre funesta .

Allorchè questa malattia è cagionata da una *pituita viscosa* , che ingorga e ostruisce i *vass* del *palmone* , ella si chiama *peripneumonia falsa* , o *spuria* . Se dipenda da una sorgente d'umori acri dentro i *palmoni* , si appella *peripneumonia catarrale* , ec.

Come ella si divide .

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni della peripneumonia vera .

Alle volte la *peripneumonia* o *flussione di petto vera* è la malattia *principale* o *essenziale* : talvolta non è che *sintomatica* , o la conseguenza d'altre malattie , come d'una *schinanzia* , d'una *pleuritide* , ec. Ella riconosce le stesse cagioni che la *pleuritide* , cioè la soppressione della *traspirazione* , cagionata dal freddo , dagli abiti umidi ; ec. il moto del *sangue* accelerato da un *esercizio* violento , dall'uso degli *aromi* , de' *spiriti ardenti* , ec.

Elleno sono le medesime come quelle della pleuritide .

La *pleuritide* e la *peripneumonia* sono soventemente complicate insieme ; allora la malattia che ne risulta , si appella *pleuro-peripneumonia* .

Quando si debba chiamarla pleuro-peripneumonia .

ARTICOLO SECONDO.

Sintomi della peripneumonia vera .

LA maggior parte de' *sintomi* della *pleuritide* si riscontrano nella *peripneumonia* . (Ved. §. I, Art. II del Cap. precedente.) In questa ultima per altro il *pulso* è più *molle* , e il *dolore* è meno *acuto* ;

In che differiscono da quelli della pleuritide .

ma la difficoltà di respirare e l'oppressione del petto sono in generale più grandi (1).

ARTICOLO TERZO.

Cura della peripneumonia vera per tutte l'età.

Il gover-
no e lo
stesso di
quello del-
la pleuriti-
de.

Siccome il vitto e i rimedj sono per ogni riguardo gli stessi nella *peripneumonia vera*, come nella *pleurisia*, per non avere a ripetere, rimandiamo il Lettore alla cura della *pleurisia*. (Ved. §. I, Art. III, e IV del Cap. precedente.)

Gli alimen-
ti devono
essere più
blandi.

Crediamo però che non sia inutile di aggiungere, che gli *alimenti* devono essere più blandi; più leg-
gieri nella *peripneumonia vera*, che in qualunque al-
tra malattia *infiammatoria*.

Importan-
za del siero,
della deco-
zione d'or-
zo, o dell'
infusione di
finocchio
col latte.

Il dotto ARBUTHNOT dice, che il solo siero di latte basta per sostenere il malato, e che la decozione d'orzo, o l'infusione di radice di finocchio dentro dell'acqua e del latte, possono servire di bevanda e di alimento.

Vapore
dell'acqua
calda intro-
dotto nel
petto.

Egli raccomanda parimente il vapore dell'acqua calda introdotto nel petto per via d'un imbuto. Questo riesce riguardo al polmone, ciò che sono riguardo alle parti esterne del corpo li fomenti consigliati nella *pleurisia*, pag. 76 e seg. di questo Vol. Questo vapore attenua gli umori ispessiti che ingor-
gano quest'organo.

Suoi effet-
ti.

Non biso-
gna soffer-

Se il malato ha il ventre lubrico, di maniera per

La peti-
pneumo-
nia, e la
pleurisia
non disse-
riscono tra
loro che
per la in-
tenità dei
sintomi.

(1) Il carattere essenziale che distingue la *peripneumonia* dalla *pleurisia*, non è dunque che l'intensità dei sintomi relativi alla *respirazione*: per tutti gli altri riguardi elleno si confondono nella pratica. Questo è appunto ciò che ha fatto dire al Sig. TISSOT, e a tutti gli altri Pratici migliori, che queste due malattie non sono l'una dall'altra differenti: che nell'una e nell'altra la cagione è l'*infiammazione del polmone*, e che nella *pleurisia* questa *infiammazione* è forse più esteriore. Per la qual cosa il Sig. LIEUTAUB assicura, che tra un gran numero di soggetti morti da *infiammazione di petto*, non ne ha trovato che soli due, i quali erano stati to-
sti da vera *pleurisia*.

altro che questa *evacuazione* non lo indebolisca di troppo, bisogna ben guardarli dal sopprimerla; fa di mestieri al contrario di mantenerlo in questo stato mediante de' *serviziali ammollienti*.

Se il malato non *isputa punto*, si caccierà sangue, e si replicherà questa operazione altrettante volte, quante le di lui forze lo permetteranno (2).

ma l'eva-
cuazioni
del ventre,
allorchè
non infe-
voliscono
il malato.
Quando e
quante vol-
te si debba
cacciar
sangue.

(1) Avvertite che l'Autore dice: *Se il malato non isputa punto*; poichè se egli sputa, il *salasso* diviene contrario. Tra i sei casi citati dal Sig. CLERC (Cap. II, nota 8 di questo Vol.) ne quali la *missione di sangue* cagiona sovente la perdita del malato, abbiamo veduto ch'egli ha compreso la *peripneumonia*, o *flussione di petto*, in cui l'infermo sputa facilmente, ancorchè la *febbre* sia gagliarda.

Pericoli
dal salasso
quando l'
infermo
sputa fa-
cilmente.

La ragione n'è, che in Natura una *evacuazione* qualunque non può aver luogo senza detrazione d'un'altra; e l'*offer- vazione* ha fatto vedere che questa verità, accertata in ri- guardo delle *evacuazioni sanguigne*, lo era egualmente in ri- guardo a quelle di altro genere. Si vede la *emissione di san- gue* arrestare alcune *scorrenze di ventre*, soppressione però che ha generato alcune *febbri putride*. Ho veduto due grani di *emetico*, ordinati da un ignorante per agevolare l'azione d' un *purgativo*, che aveva stentato di operare, perchè era trop- po forte, sospenderne tutto ad un tratto l'effetto escitando il vomito.

Perchè?

Per tanto se giungasi a cacciar sangue in una *peripneumo- nia*, allorchè l'*aspezzatura* è omai incamminata, e che gli sputi sortono agevolmente, non è egli poi certo ch'indi- pendentemente dalle forze, di cui si priva necessariamente il malato, si rischia di sopprimere cotesta *evacuazione*, ch'è quella che d'ordinario forma la crisi di questa malattia; e che da sì fatta soppressione ne dee risultare, o che la materia degli sputi farà passaggio nella massa dei fluidi, dove risve- glierà più o meno di disordini; o che stagnerà dentro al pe- tto, e allora produrrà un *asarro*, che se non soffoca il ma- lato, lo condurrà almeno alla *tisichezza*.

Effetti della
soppres-
sione degli
sputi che
cagiona-
rebbero i
salassi.

Quante *tisichezze* non debboni all' abuso delle *emissio- ni di sangue*? Qual'è la *peripneumonia* che si osi curare senza toccar la vena? Tuttavolta quante mai non sono quel- le in cui l'infermo sputa agevolmente? Non v'ha poi bifo- gno di aver veduto gran numero di malati per restare con- vinto di questa verità. Quanto a me, ho avuto di buon'ora occasione di avvedermene. Incaricato ancor giovine da un Me- dico della Facoltà di Parigi di attendere ad una parte dei ma- lati d'una grande Parrocchia, non tardai ad averne a cura

Ci sono
molte pe-
ripneumo-
nie che si
devono
curare
senza levar
sangue.

Zaffarini e
clisteri.Si darà un leggiero *lassativo*, e si manterrà il ventre lubrico col mezzo de' *clisteri*.

re di quelli aggravati da *peripneumonia* di qualunque specie, essendo questa malattia comunissima tra coloro che si occupano in lavori faticosi.

Ho sempre veduto, che una o due *cacciate* di *sangue* bastavano in quelle dove l'infermo non ha la menoma traccia di sputo, o che non isputa se non del *sangue*. Per lo contrario ho veduto ch'esse davano origine ai più gravosi accidenti in quelle dove l'infermo sputava agevolmente. Tra tutti gli esempj che potrei citare, ne riferirò uno solamente, il quale prova al tempo stesso e ciò che avanzo, e il potere della Natura nella guarigione de' mali.

Osservazio-
ne.

M. G... di Grenoble cadde malato li 14 febbrajo 1776. Viene chiamato un giovane Cerusico del vicinato: ordina una *risana*, e una soluzione di *elis* di *mandorle dolci* con uno *sciloppo*: si continua lo stesso rimedio nel dì seguente. Ma sia poi timore, sia prudenza, egli non tocca la vena, e chiede nel terzo giorno l'assistenza d'un Medico. Trovai il malato con una *febbre* assai forte; ma il *polsò* benchè *frequente e pieno*, era *molle e arrendevole*: la doglia del lato era *acutissima*, massime durante la tosse, che svegliavasi frequentissima; gli *sputi* però erano copiosissimi, ben legati, *viscosi* e di colore rossigno. L'infermo pativa di sete, sentiva alcune doglie di capo, nel dorso, ne *venì*, e niente dormiva. Intesi che da circa sei mesi aveva sofferto una *tosse* abituale, e assai frequente, segnatamente nella mattina, nel qual tempo era seguita da sputi copiosi.

Lo misi alla *dieta* la più austera, proibendogli per sino li brodi; ordinai una *risana* d'*orzo perlato* con il *miele*, che si acidulava colla *gelatina* d'*uva spina*. Feci stropicciare il lato parecchie volte per giorno con la *tintura* di *canserelle*: prescrissi una *mistura* composta nella maniera seguente.

Prendete *acqua stillata* di *borragine*, oncie quattro;
 ossimela scillitica, oncie una;
 hermes minerale, grani quattro.

Mescolate.

Il malato ne prendeva un cucchiajo di due in due ore.

Gli feci immergere i piedi nell'acqua calda due volte al giorno. Se gli facevano due *lavativi* alla giornata, e beveva un mezzo bicchiere di *risana* ogni quarto d'ora.

La notte fu molto più placida della precedente: dormì due ore in diverse riprese. La mattina del dì seguente tutti i sintomi erano diminuiti d'intensità, e gli *sputi* più abbondanti erano più carichi di colore. Il posdomane ch'era la quinta giornata del male, verso le cinque ore dopo il mezzodì l'amo-

Si ecciterà l'*espettorazione* esibendo ogni quattr' ore ^{Mezzi di} due cucchiariate della *soluzione* di *gomma ammoniaco*, ^{eccitare la} raccomandata nella *pleuritide*, pag. 80 di questo ^{espettorazione.} Vol.

malato fu preso da *raddoppiamento* violentissimo di *febbre*, che durò fino alla mattina del dì seguente. Durante questo *raddoppiamento* gli *spusi* sempre abbondanti erano *cruenti*; ma passato che fu l'*accesa febbrile*, il malato si sentì meglio che mai, e la *febbre* era notabilmente impiccolita. Questo giovamento durò tutta la notte seguente, nel corso della quale il malato dormì più di quattr' ore in due tempi. Gli *spusi* avevano ripreso la loro tinta primiera.

La mattina del settimo giorno il malato si sentiva egregiamente; ma era debile. Gli feci dare un brodo, che si replicò sul mezzo giorno, proibendo di dargliene nel resto della giornata, perchè mi stava preparato ad un nuovo *assalto* di *febbre*, come in fatti accadde, ma più tardi di quella del quinto giorno, e infinitamente più mite e più corto. Questo cessò sulle due ore dopo la mezza notte. Il malato domandò un brodo, e dormì tre ore di seguito. Nello svegliarsi non aveva più dolore nè alla testa, nè al dorso, nè sul lato: molto sputava tuttora, ma presso che senza tosse; e gli *spusi* ch'erano sommatamente diluti, più non avevano che un colorito leggermente rossigno. Non v'ebbe traccia alcuna di *raddoppiamento* di *febbre* nel nono giorno, che fu l'epoca dello sparire di tutti i *simptomi*.

Siccome i *clisteri*, che non erano che d'acqua semplice, avevano prodotto un effetto prodigioso in tutto il corso del male, e da alquanti giorni tenevano aperto l'adito alla sortita di copiose *materia concotta*, cioè assai *viscida* e d'un giallo dilavato, ordinai un *lassativo* per la mattina susseguente; si replicò nella decima terza e decima quinta giornata del male; e l'infermo senza provare le debolezze ordinarie ai convalescenti in seguito d'una simile malattia, uscì di casa due giorni dopo la terza *purgazione*.

Noi potremmo corredare questa nota, omai lunghissima, d'un buon numero di riflessioni. Le tralasciamo per tema di abusare della pazienza del Lettore. Ci faremo soltanto lecito di osservare che il corso regolare di questa malattia, il suo evento, e la poca durata della *convalescenza*, da cui fu seguita, si debbono del pari alla semplicità e allo scarso numero de' rimedj di cui feci uso, che alla docilità del malato, ch'essendo da se stesso persuaso della necessità del metodo del vivere, delle bevande, e de' *serviziali* in questo caso, vi si adattò con scrupolosa esattezza.

La peri-
pneumo-
nia che non
cede ai ri-
medi ter-
mina in
ascesso.

Quando la *peripneumonia* non cede nè al *salasso*, nè ai *vesicatorj*, (Ved. qui sopra pag. 76 di questo Volume) nè all'altre *evacuazioni*; ella termina ordinariamente in un *ascesso*, ch'è più o meno pericoloso a misura della parte del petto in cui è formato.

Diverse
maniere di
guarire si
fatti asces-
si.

Se l'*ascesso* si stabilisce nella *pleura*, talvolta si manifesta al di fuori, e forma una *piaga* all'esterno, mercè della quale si guarisce: se sia situato nella sostanza del *pulmone*; la materia può evacuarsi per *ispisso*: ma se la *marcia* s'ammassa dentro la cavità del petto, tra la *pleura* e i *pulmoni*, allora non si può evacuarla che facendo un'apertura tra le *coste*. (L'Auttore tratterà di queste tre maniere, con cui si evacua la materia dell'*ascesso*, alla fine del Capitolo seguente.)

Segui che
danno luo-
go a teme-
re che que-
sta malat-
tia vada a
finire nella
tuber.

Ma allorchè tutte le apparenze annunziano che l'*infiammazione* è dissipata, e che nondimeno le forze del malato non ritornano; che il *polso* tutto che *molle*, continua ad esser *veloce*; che la *respirazione* è tuttavia difficile, e che l'*oppressione* sussiste costantemente; che il malato prova di tanto in tanto de' *brividi*; che i pomi delle guancie divengono rubicondi, le labbra asciutte, e che si querela d'essere affettato, e di mancare di appetito, v'è motivo di temere che la *suppurazione*, che questo stato annunzia, venga seguita dalla *tifidezza*, malattia chiamata volgarmente *intacco di pulmone*, e di cui noi ci occuperemo dopo di aver detto qualche cosa della *peripneumonia falsa o spuria*.

§. II.

Della peripneumonia o flussione di petto spuria.

Caratteri
di questa
specie di
flussione di
petto.
Chi sono
quei
ne sono
soggetti.

Abbiamo già osservato che la *peripneumonia falsa o spuria* è cagionata da una *pituita acra e viscosa*, che ingorga i vasi del pulmone. Ella non attacca che i vecchi, gl'infermicci, e coloro che sono d'un *temperamento flemmatico*, massimamente nell'inverno, e durante i tempi umidi.

ARTICOLO PRIMO.

Sintomi della peripneumonia spuria.

AL cominciare della malattia, il malato sente freddo e caldo a vicenda: il suo polso è piccolo e veloce: sente un peso sul petto: la respirazione è difficile. Si lagna talvolta di dolore di capo, accompagnato da vertigine; tuttavia il colore del suo sembianza è pochissimo cangiato; le sue urine sono ordinariamente pallide.

ARTICOLO SECONDO.

Vitto, che bisogna prescrivere nella peripneumonia spuria.

IL vitto in questa malattia, come nella peripneumonia vera, deve essere leggierissimo. Gli alimenti non consistiranno che in brodi tenui, acconci con suco di cedro o di melarancia, ec.

Quali debbano essere gli alimenti;

La bevanda sarà del cremore di avena acquoso addolcito col mele; o una decozione di radice di finocchio e di regolizia. Si prende un'oncia di ciascheduna di queste ultime sostanze; si fanno bollire in tre fogliette d'acqua, che si lasciano ridurre ad una pinta; si acidula con della gelatina di uva spina, ec.

La bevanda.

ARTICOLO TERZO.

Rimedi, che si devono prescrivere nella peripneumonia spuria.

IL salasso (3), gli emetici, e i purganti convengono in generale nel cominciamento di questo morbo;

Quando abbisogni cacciarsela.

(3) Le cacciate di sangue in questa malattia non si possono fare, se non con riserva. L'età e il temperamento delle persone che suole assalire; la stagione in cui ella si manifesta; i sintomi che la corteggiano, d'ordinario contraindica- il salasso è di rado necessario in questa malattia.

que e pur-
bare .

ma divengono superflui , se gli *sputi* sono densi , o ciò che dicesi *concotti* (4) : in allora basta ajutare l' *espettorazione* col mezzo di alcuni de' *rimedj balsamici* dolci , raccomandati a tal uopo nella *pleurisia* ; come l' *offimele scillitico* , la *soluzione della gomma ammoniaco* , ec. (Ved. pag. 79 e 80 di questo Vol.)

Importanza de' vescicatorj applicati per tempo.

I *vescicatorj* sono in generale d' un grand' effetto , e devono essere applicati di buon' ora . Si applicheranno sia alla nuca , sia a' polpacchi delle gambe o delle coscie , come a tutti tre cotesti luoghi ad uno stesso tempo , se le circostanze lo esigano (5) .

L' *ipecacuana* v' è più spesso indicata, come pure i *laffativi* e i *clisteri* .

no questa operazione. Il *salasso*, dice il Sig. LIEUTAUD, v' è rade volte necessario, sebbene il grado di *oppressione* spesso sembri richiederlo. Egli è per verità valevole a procurare un sollievo passeggero; ma rende la malattia più grave, e sposta estremamente i malati. Si ritrarrà assai più d' utile dall' *ipecacuana*, segnatamente se il malato abbia delle *nausee* e delle propensioni al vomito. Ma i *laffativi*, il *mela* sopra tutti, e i *clisteri purgativi* reiterati, vi si mettono in opera sempre con frutto.

Carattere degli sputi che si appellano concotti .

(4) Ecco i caratteri degli *sputi concotti* : bisogna che sieno *viscosi* ; che sieno d' un bianco gialliccio, densi , e che sembrino d' essere formati d' una sola materia, benchè in fatti di parecchie sorte ne concorrano a comporli. Richiedesi che vengano mandati fuori prontamente, facilmente, e che arrichino sollievo al malato.

I vescicatorj non mancano la maggior parte delle volte del loro effetto, se non perchè si applicano troppo tardi.

(5) Questo consiglio è di massima importanza relativamente a questo male , e ad alcuni altri che non si dimenticheremo di porre sott' occhio , sopra tutto in quei che non sono accoppiati ad *infiammazione*. E' certissimo che i *vescicatorj* il più delle volte non mancano dei loro effetti, se non perchè si applicano troppo tardi. Se i *sinismi* della *peripneumonia spuria* sono troppo violenti, onde temere che non cedano agli altri *rimedj*, forza è senza tentare l' effetto di questi ultimi, di ricorrere ai *vescicatorj*, e applicarli ai tre siti in un colpo, qualora ciò venga giudicato necessario.

CAPITOLO SETTIMO.

*Delle diverse spezie di tabe, e dell' atrofia o
consumazione.*

§. I.

Della tabe, o tifichèzza propriamente detta.

L *A tabe* è una malattia, che corrode e consuma tutto il corpo (1). Ella è l'effetto o d'un *ulcere*, o di *tubercoli*, o di concrezioni nei polmoni (2): ella può ancora essere prodotta da un *empiema*, da un' *atrofia nervosa*, da una *cachessia*, ec.

Caratteri della *tabe*.
Malattie di cui ella è l'effetto.

Il dotto ARBUTHNOT osserva, che a' suoi tempi la *tabe* cacciava dal mondo più d'una decima parte delle persone, che morivano in Londra e ne' suoi contorni. Si può credere che oggi giorno ella ne levi di vita un numero ancora maggiore; e noi siamo certi che in alcune altre Città dell'Inghilterra essa non è meno funesta che a Londra.

Quanto sia micidiale questa malattia.

I giovani tra i quindici e trenta anni, che sono di macilente corporatura, che anno il collo lungo, le spalle elevate, il petto stretto ed angusto, sono i più esposti a questo morbo.

Chi sono quelli che ci sono i più esposti.

(1) E' probabile che da questi effetti gl'Inglese diano il nome di *consumazione* a questo morbo. Per la stessa ragione i Medici la chiamano *phthisis*, voce derivata dal greco *φθίσις*, che significa appassire, struggerli di languore. I Francesi comunemente l'appellano *polmonia*, perchè la sede del male sta dentro i polmoni.

Nomi diversi, che vengono dati alla tifichèzza.

(2) E' affai difficile di accertarsi dell'esistenza dei *tubercoli* dentro i polmoni. La *tosse* secca e abituale è il *sintomo*, che li indica con più di certezza: tuttavia questa tosse ha alle volte luogo, quantunque non ci sieno *tubercoli*, e che per lo contrario il *torace* sia inondato di marcia. Ci sono alcuni malati che cogli *spuri* cacciano fuori de' *tubercoli*, e questa è la sola circostanza in cui si possa assicurare che positivamente ve n'abbiano.

La tabe
è più ge-
nerale in
Inghilter-
ra che al-
trove?
Perchè?

La *tabe* è più generale in Inghilterra, che in tutte le altre parti del mondo: ciò viene forse cagionato dall'uso soverchio di nodrimento animale e de' *liquori spiritosi*; dai lavori sedentarij, e dalla grande quantità di carbone fossile, che si abbrucia in questo regno. Aggiungasi a tutte queste cagioni le vicende perpetue dell'atmosfera, o l'incostanza delle stagioni (3).

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni della tifichezza.

Tutte
quelle del-
la infiam-
mazione
del petto.

Abbiamo già fatto osservare che l'*infiammazione del petto* termina soventemente per via d'un *ascesso*. Per la qual cosa tutto ciò, che dispone alla *peripneumonia*, vale a dire alla *infiammazione del petto*, può essere considerato come cagione di *tifichezza*.

Malattie
che posso-

Alcuni altri mali viziando gli umori possono altresì

Cagioni
per le qua-
li essa di-
viene co-
mune in
Francia.

(3) Sebbene questa malattia riesca meno comune in Francia, tuttavia non v'è persona che non si accorga, ch'essa è più che altra volta, oggigiorno frequente. Le Città ce ne esibiscono degli esempj giornalieri, e le campagne stesse non ne vanno esenti. Eppure noi non possiamo accagionarne nè le sostanze animali, che noi mangiamq in quantità infinitamente minore dei nostri vicini: nè il carbone fossile, di cui noi non facciamo uso; nè le vicende dell'atmosfera, sendo riguardo a ciò il nostro clima uno dei meglio distribuiti. M^a bisogna incolparne i nostri lavori sedentarij; le nostre fregatezze d'ogni genere; i nostri stravizzi d'ogni specie; l'abuso del caffè; l'uso micidiale delle *fisce* e dei *huisti* di *bale-na*. (Ved. Part. I, Cap. I, not. f, e 13.; e Cap. V, §. I^o Art. I di questo Vol.) Forza è di accusarne il libertinaggio, e segnatamente quella abominevole pratica, a cui si danno in preda i giovani, quasi dal fortir dell'infanzia. Sarebbe a desiderarsi che i Maestri e gl'Institutori invigilassero più da vicino su ciò che viene fatto nei dormitori; e nel rimettere ai padri e alle madri de' giovani ammaestrati nelle lettere, loro altresì rendessero degli uomini penetrati d'orrore per un delitto, che fa ingiuria del pari ai costumi che alle religioni, e che fa arrossire la Natura di cui n'è l'assassino a (Ved. Tom. IV, Cap. LVII, §. III, Art. IV.)

tressi cagionarla. Tali sono lo *scorbuto*, le *serofole*, no cagiona
il *male venerico*, l'*asma*, il *vajuolo*, la *rosolia*, ec. mare la tifsichezza.

Siccome quasi mai si giunge a sanare la *tifsichezza*, Cagioni
noi ci accingiamo ad indicarne le cagioni d'una particolare.
maniera più particolare, a fine di mettere più gli
uomini in istato di evitarla.

Queste cagioni sono 1. l'*aria* riserrata o malfana. L'aria
L'aria che stagna in un luogo, che abbonda di va- riserrata
pori *metallici* o *minerali*, nuoce segnatamente ai *pol- o malfana;*
moni, di cui ne corrode e straccia sovente i vasi te-
neri e delicati (4).

2. Le *passioni* violente, gli sforzi della mente, le Le passio-
affezioni dello spirito, cioè la tristezza, il *rammarico*, ni violenti,
co, il cordoglio, così pure l'applicazione ostinata al- le affez-
lo studio d'un arte o d'una scienza difficile, ec. zioni
dello spi-
rito, ec.

3. Le *evacuazioni* eccessive, tali sono i *sudori* ab- Ogni spe-
bondanti, le *scorrenze* ostinate di *ventre*, il *diabete*, l' cie di eva-
abuso dei piaceri di amore, i *fluori bianchi*, le *perdite cuazione*
di *sangue*, l'allattamento prolungato troppo a lun- eccessiva;
go, ec.

4. La *soppressione* subitanea di qualche evacuazione La sop-
consueta; qual'è quella delle *emorroidi aperte*, del preffione
sudore ai piedi, del *flusso* di *sangue* dal naso, de' *flussi d'una eva-*
mestruali, de' *cancerj*, dell'*ulceri*, o d'una *eruzione* cuazione
qualunque consueta;

5. Gli accidenti nati da cagioni esterne; la *pie-* Alcuni ac-
tra, ec. Ho veduto una *tifsichezza* confermata, ch'era cidenti na-
prodotta da un officino arrestato nella trachea, o ti da ca-
dentro i *bronchi*. Il malato rigettò alla fine questa gioni est-
porzione d'osso con una grande quantità di *marciume* ec. Ejem-
e, e ricuperò la salute, mediante un *visto* appro- pio.
priato, e l'uso della *ebinachina*.

(4) Il *rame*, siccome il *metallo* il più comune di quelli Perché gli
che si lavorano nelle Città, ci fornisce tutto giorno di esem- artigiani
pi segnalati di questa verità. Non è raro il vedere degli *ori-* che adope-
volaj, de' fabbricatori d'istrumenti di matematica, ec. perire il *ra-* rano il ra-
me, sieno
questi artefici, che le loro officine sieno costrutte in guisa che soggetti
l'*aria* possa circolarvi per tutte le parti, e che non s'inten- alla tifs-
tengano troppo lungo tempo di seguito al loro lavoro. (Ved. chezza.
Par. I, Cap. II, §. III, e Cap. IV.)

La sop-
pressione
della traf-
pirazione ;

6. Il passaggio improvviso da un clima caldo ad un altro freddissimo ; il cangiamento de' vestiti , o di tutto ciò che può cagionare una diminuzione notabile nella *traspirazione* .

Tutti gli
eccelli ;

7. Le fregolatezze frequenti ed eccessive ; le veglie prolungate , e la bevanda de' *liquori spiritosi* , e ciò che ordinariamente ne segue , per lo meno in Inghilterra , non possono a meno di non intaccare i *polmoni* : così colui cui si dà il nome d'un *buon compagno* , muore soventemente vittima di questo morbo . (Ved. qui sopra nota 3. di questo Cap.)

La conta-
gione ;

8. La *contagione* . La *tifischezza* si acquista spesso coricandosi in compagnia d'una persona attaccata di questo malore : ciò dunque si deve con ogni sollecitudine evitare . Niente di buon utile può ridondarne al malato , e ciò può essere molto pericoloso per le persone in salute . (Ved. Parte Prima Cap. I , nota 8.)

Certi me-
stieri e cer-
te profes-
sioni ;

9. Le diverse occupazioni della vita . Gli artefici che restano lungamente sedenti , che stanno perpetuamente incurvati , o che premono il loro *stomaco* e il loro *petto* contro un qualche duro ostacolo , tali sono i coltellinaj , i farti , i calzolaj , ec. muojono spesso di *tifischezza* . I cantatori , le cantatrici , tutti coloro che sforzano con frequenza l'azione de' *polmoni* , ne periscono più o meno prontamente .

Il fred-
do , l'umi-
dità ;

10. Il freddo . I principj della *tifischezza* più di sovente derivano dall'umidità de' piedi , de' letti , degli abiti , dall'aria notturna , ec. che da qualsivia altra cagione .

Gli ali-
menti sala-
ti e riscal-
danti ;

11. Gli *alimenti* salati , conditi , *aromatizzati* , che ci riscaldano , accendono il *sangue* , sono altresì cagioni frequentissime di questo male .

Un vizio
ereditario .

12. Finalmente la *tifischezza* riconosce l'origine da un vizio ereditario ; e in questo caso ella è in generale incurabile .

ARTICOLO SECONDO.

Sintomi della tifsichezza.

LA *tifsichezza* ordinariamente comincia da una *tosse* secca, che sovente continua per alquanti mesi. Se in questo caso il malato prova delle voglie di vomitare dopo aver mangiato, v'è ancora più ragione di temere una vicina *tifsichezza*.

Sintomi
della tifi-
chezza in-
cipiente.

L'infermo in allora si lagna d'un grado di calore più notabile di quello d'uno stato naturale; d'un dolore e d'una oppressione di *petto*, massimamente dopo di aver fatto qualche movimento. I suoi *sputi* sono d'un sapore falso, e spesso mescolati di sangue.

Egli è di spesso tristo e *melanconico*: il suo appetito è alterato: si sente assetatissimo: frattanto il *polso* è per l'ordinario *frequente*, *molle*, e *piccolo*; talvolta pure egli è assai pieno; talvolta ancora duro. Tali sono i segni i più ordinari che accompagnano il primo ingresso della *tifsichezza*.

Gli *sputi* cominciano ben tosto a prendere una tinta verdastra, albiccia, o sanguigna. Il malato vien consumato da una *febbre etica*, o da sudori *colliquativi* che si succedono alternativamente, cioè l'una verso la sera, e gli altri verso il mattino. Egli è ancora sfinite dalle *scorrenze di ventre* e da un *flusso eccessivo d'urina*; *sintomi fastidiosi*, che in questa epoca spesso si osservano.

Sintomi
della tifi-
chezza
conferma-
ta.

Risente un calore cocente nelle palme delle mani: le gote dopo il pranzo se gli ricoprono d'un carico rossore: le dita si fan sensibilmente sottili; le unghie incurvate, e i capelli cadono.

In fine la gonfezza de' piedi e delle gambe; la perdita totale delle forze; gli occhi incavati; la difficoltà dell'inghiottire; il freddo dell'estremità, annunziano la morte imminente, cui il malato tuttavia di rado si crede essere sì da vicino.

Sintomi
dell'ulti-
mo grado
della tifi-
chezza.

Tal è l'andamento ordinario di questo morbo crudele, il quale se non sia prontamente arrestato nei suoi principj, trionfa comunemente di tutti i *rimedj*.
(Ved. Cap. I, e II di questo Vol.)

ARTICOLO TERZO.

Regola di vitto che devono seguire i tifici,

Cangia-
mento d'
aria.

Bisogna sulle prime apparenze di *tifichessa* che il malato abbandoni senza esitanza la sua abitazione, se vive dentro una grande Città, o in un luogo dove l'aria sia racchiusa, per andare a dimorare in campagna, in un luogo dove l'aria sia pura, asciutta, e dove essa vi circoli liberamente.

Esercizio,
e in prefe-
renza quel-
lo a ca-
vallo.Regole
da seguirsi
nel moto
a cavallo.
Sua impor-
tanza, e
suoi effet-
ti, quan-
do si metta
di buon'ora
in opra.

Colà ei non deve restare nell'inazione; ma al contrario fare ogni giorno tanto *esercizio*, quanto lo stato suo potrà permetterglielo. Il migliore *esercizio* in questo caso è quello del cavallo, perchè questo mette nel corpo molto movimento, senza cagionare molta stanchezza. Coloro che non possono godere di questo *esercizio*, devono condursi in vettura.

Non monterà a cavallo che la mattina, e avrà l'avvertenza di scenderne una mezz'ora al più tardi avanti del desinare; senza di che questo *esercizio* gli recherà sovente più di male che di bene: ma bisogna a qualunque costo ch'egli usi di questo *esercizio*: da questo la sua vita dipende. Si può riguardarlo come un rimedio poco meno che infallibile, quando si metta di buon'ora in opra, e che si continui per un tratto convenevole di tempo (5).

Il moto
a cavallo è
uno speci-
fico contro
la tificessa,
qualora
venga fat-
to nei prin-
cipi, e con-
tinuatoper
un tempo
convenien-
te.

(5) Veggasi ciò, che s'è detto circa il *moto a cavallo*. (Parte I, Cap. V, nota 2.) Specialmente in questo primo periodo della malattia così fatto *esercizio* riesce un vero *specifico*. Il popolo ignaro, dice il Sig. TISSOT, non riguarda come *rimedio*, che ciò ch'ei prende per bocca. Ha poca fiducia nella regola del *vitto* e negli altri soccorsi *dietetici*, e rimira come inutile cosa il *moto a cavallo*. Periglioso errore si è questo, di cui vorrei sgannarlo davvero. Questo *sulfidio* è il più efficace di tutti: quello si è, senza il quale non si può sperare di fuggire il male, quando sia grave; quello che può quasi solo guarirlo, purchè non si prenda verun *alimento* contrario. In somma con affai di ragione fu riguarda-
to qual verace *specifico* di questo morbo.

Tempi
della ma-

Si dee però osservare che più non conviene, tosto che la *febbre* è forte e continua; qualora l'infermo si senta debolis-

Regola di vitto contro la tifezza. 101

Egli è molto increscevole, che coloro che reggono i malati infetri di questo morbo, non raccomandino quasi mai il *moto a cavallo*, se non quando l'infermo non è più in istato di sopportarlo, o quando il male è divenuto incurabile.

In genere le si consiglia troppo tardi il moto a cavallo.

I malati dal canto loro sono pur troppo portati a riguardare con indifferenza i mezzi di guarigione che essi anno tra mano, e che da esso loro dipendono. Non fanno persuaderli che un *esercizio* sì comune divenga un *rimedio* in una malattia sì contumace: quindi lo rigettano, mentre che ricercano avidamente de' soccorsi nella Medicina, per la sola ragione che non la intendono: (Ved. la nota precedente.)

Indifferenza de' malati per tutto ciò che non porta il nome di rimedio.

I viaggi d'una certa estensione, ricreando lo spirito per via del cangiamento continuo degli oggetti, sono preferibili alle piccole corse, con le quali si passa e ripassa sopra lo stesso terreno. Frattanto il malato deve aver riguardo di non *raffreddarsi* per via di tali corse, o per via de' letti, degli abiti umidi, ec.

I viaggi terrestri.

Coloro che avranno la forza e il coraggio d' intraprendere un viaggio assai lungo per mare, ne ritrarranno un massimo vantaggio: Ho veduto sovente

Viaggi per mare, utili allora eziandio

fino; perchè in questo periodo ogni movimento diviene nocivo.

I segni sicuri, da' quali si riconosce che il *moto a cavallo* reca del beneficio; è quando in luogo di affrettare la velocità del *polsò*, anzi la rallenta, vale a dire, che il *polsò* deve trovarsi meno frequente una mezz'ora dopo d'essere smontato da cavallo, che avanti di esservi asceto: ciò è appunto che aumenta le forze, che procura uno stato prospero, che sminuisce la *soffe* e l'*oppressione*, ec.

lattia, dove più non conviene. Segni, da' quali si riconosce che il moto a cavallo reca del beneficio.

Non si dee montare a cavallo che la mattina, all'ora in cui non v'abbia orma di *febbre*, o quando essa è meno sensibile: ma giammai nè immediatamente dopo di aver mangiato; nè durante il raddoppiamento febbrile della sera.

Ora del giorno, in cui conviene montare a cavallo.

Sarebbe inganno il credere che bastasse il montar a cavallo per risanarli. Gli *specifici* i più accertati, come il *mercurio* e la *chinachina*, non riescono utili ne' mali stessi, di cui ne sono il vero *rimedio*, se non in quanto che sono saggiamente diretti: lo stesso ne avviene dell'*esercizio del cavallo nella tifezza*, che ben sovente supera le forze de' migliori antidoti.

che la tifi-
chezza è
giunta al
grado suo
ultimo.

questo mezzo riuscire nel tempo stesso che la rischezza sembrava secondo tutte le apparenze nel grado suo ultimo, e dove tutti i *rimedj* erano stati frustranei. Per la qual cosa sembra ragionevole di concludere, che se a tempo s'intraprendesse un viaggio marittimo, di rado questo mancherebbe del suo effetto, cioè di guarire questo male.

Provvisio-
ni necessa-
rie ai tifici
nei viaggi
marittimi.

Le persone che tentar vorranno sì fatto mezzo, devono provvedersi di tutte le sostanze fresche, di cui potranno avere bisogno per tutto il tempo che resteranno in mare. Siccome in questo caso non si può fare la sua provvisione di *latte*, farà di mestiere ch'essi vivano di frutta, di brodi di pollo, o di qual siasi altro giovane animale, che può mantenersi a bordo. (Ved. la Prima Parte Cap. II, §. I, Arr. II, e nota 11.)

Stagioni
nelle quali
devono in-
traprender
si, e verso
qual climi.

E' inutile d'aggiungere, che questi viaggi devono effettuarsi, per quanto è possibile, nella bella stagione, e che devono sempre esser diretti verso paesi caldi (6).

Cosa deb-
bano fare
coloro che
non posso-
no viaggia-
re per ma-
re.

Coloro che non anno il coraggio d'intraprendere sì fatti viaggi per mare, devono trasportarsi ne' climi meridionali, come nel Sud della Francia, in Spagna, in Portogallo, ec.; e se l'*aria* di queste regioni loro si confà, dovranno restarvi fino a tanto, che la loro salute siasi onninamente ristabilita.

Qual deve
essere la
dieta del
malato.

Dopo un'*aria* buona e l'*esercizio*, dobbiamo raccomandare un'attenzione particolare alla *dieta*. Il malato non deve mangiare cosa che sia riscaldante o di difficile *digestione*: la sua bevanda deve essere di

(6) Il consiglio che porge l'Autore d'intraprendere un viaggio marittimo per guarire dalla *rischezza*, non è dato a caso. Il Dottore GILCHRIST compatriota del Sig. BUCHAN ha pubblicato nel 1771 un'Opera, che ha per oggetto l'utilità di sì fatti viaggi; e prova con copioso numero di osservazioni tutte l'une dell'alire più interessanti, che questo *rimedio* importante è riuscito in mille circostanze, dove tutti gli altri erano stati infruttuosi. Non è permesso di dubitare della verità di queste osservazioni. L'Autore conosciuto per i suoi lumi e per la sua probità, non riferisce che le sue proprie, e quelle dei Medici i più degni di fede.

qualità *addolcitiva* e *rinfriscante*. Siccome tutto lo scopo della *dietà* deve essere di diminuire l'*acrimonia* degli umori; di nutrire il malato, e di sostenere le sue forze languenti; forza è in conseguenza d'usare principalmente di sostanze *vegetabili*, e di *latte*.

Il *latte* solo ha più di virtù in questo male, che tutti i *rimedj* della *Materia Medica*. Viene generalmente accordato che si debba preferire il *latte asinino* a qualunque altro; ma non sempre si ha la facilità di averne. Di più prendesi ordinariamente in troppo piccola quantità; laddove, acciocchè questo *latte* produca degli effetti notabili, è d'uopo ch'egli formi una gran parte della nutrizione del malato.

Taluni vogliono che un mezzo sestiere o due di *latte asinino*, bevuto nell'intervallo di venti quattro ore, sia capace di produrre un cangiamento considerabile negli umori d'un adulto; e quando non ne scorgono prontamente gli effetti, si perdono di coraggio e lo abbandonano. Il perchè avviene che questo *rimedio*, sebbene eccellente, produce di rado la guarigione. La ragione n'è chiara; pigliasi ordinariamente troppo tardi, in quantità troppo scarsa, e si abbandona troppo presto.

Ho veduto degli effetti straordinarj dal *latte asinino* nelle *rossi* contumaci che minacciavano la *tifezza*; e credo fermamente che se si prescrivesse in questo periodo della malattia, di rado mancherebbe di produrne la guarigione. Ma qualora si aspetti per mettere in opra questa specie di *latte*, o qualsiasi altro, che l'*ulcere* del *palmone* siasi formato, come è pur troppo il solito, qual successo se ne può mai attendere (7)?

Le diverse specie di latte. Latte di asina. Bisogna ch'egli componga una gran parte della nutrizione.

Perchè di rado produca l'effetto, che se ne deve attendere.

In qual tempo della malattia bisogna amministrarlo.

(7) Ben lungi dall'attendere dell'utile, si dee temerne i maggiori disordini, se si porga quando la *suppurazione* è stabilita: poichè non v'è *suppurazione* senza *febbre*; e l'esperienza ha fatto vedere ad IPPOCRATE, (*Affor.* 64. *Sec.* V.) e a tutti i Medici, che il *latte* precipitava i febbricitanti, ben lungi dall'esserne salutare. Dunque nel primo stato della *tifezza*, allorchè si presentano i *simptomi* descritti nel prin-

Il latte in generale più non conviene quando s'abbia febbre.

Di qual
calore, e
in quale
quantità
debba
prendere il
latte asini-
no.

Il latte asinino dee berfi, per quanto è possibile, del suo calore naturale, ch'è quanto a dire nel grado di calore, ch'egli ha nel momento che viene munto; e un adulto ne dee prendere un mezzo festiere per volta. In vece di ripetere questa quantità la sera e la mattina solamente, deesi prenderne quattro volte per giorno, o tre almeno: si mangierà con questo latte un po' di pane leggiero, affinchè serva alle veci di pasto.

Cosa biso-
gna fare,
quando rie-
sce purga-
tivo.

Non biso-
gna pren-
derlo nè
caldo, nè
in letto.

Qualora avvenga che questo latte sciolga il ventre; vi si aggiungerà della *conserva* vecchia di *rose*, e in sua mancanza della polvere di *zampe* di *granchio*.

Si ha costume di ordinare di bere il latte asinino caldo, e stando a letto; ma preso in questa maniera, eccita ordinariamente il sudore; per conseguenza meglio forse sarebbe il prenderlo dopo essersi alzato.

Latte di
donna.]

Abbiamo delle guarigioni maravigliose di questa malattia prodotte dal latte muliebri. Qualora se ne potesse avere una quantità sufficiente, noi lo raccomandaremmo, come preferibile a qualunque altro: ma sarebbe più vantaggioso che il malato lo suggesse dalla stessa mammella, di quello che dopo averlo munto.

Osserva-
zione so-
pra gli ef-
fetti eccel-
lenti di
questo lat-
te.

Ho conosciuto un uomo ridotto a tal grado di sfinimento dalla *rischezza*, ch'era incapace di girarsi pel letto: Sua moglie, che a quel tempo nutriva un fanciullo, ebbe la sventura di perderlo. Questo uomo in allora si mise a poppare da sua moglie, unicamente per recarle sollievo, e non mai col pensiero di ritrarre alcun beneficio dal di lei latte. Frattanto avendo provato un sollievo notabile, continuò a poppare, finchè si trovò perfettamente ristabilito; in fine questi è al dì d'oggi un uomo forte, e pien di salute (8).

cipio dell' Art. II, di questo Cap., richiedesi l'amministrazione del latte, sia l'una o l'altra specie di quelli che passiamo a prestrivere.

Pregiudizj
ridicoli sul-
la manie-
ra, con cui

(8) La vera maniera di prendere il latte muliebri, è poppando. Si sente la maggior parte delle persone a rigettare siffatta proposizione. D'onde può una tal ripugnanza procedere.

Ci sono di quelli che preferiscono il latte di *bu-*
siro ad ogni altro; ed è questo un *rimedio* eccellen-
te, quando lo stomaco può sopportarlo. Siccome pe-
rò a bella prima egli non è confacevole a tutti gli
stomachi, vi sono delle persone che lo abbandonano,
senza averne fatto un uso bastantemente lungo.

Devesi cominciare dal prenderlo in piccole dosi;
se ne aumenterà la quantità gradatamente, fino a
che se ne faccia la sola sua nutrizione. Io non l'ho
veduto giammai riuscire, se non quando il malato
abbia di questo unicamente vivuto.

Il latte *vaccino* il più comune di tutti, sebbene il
meno facile a digerirsi di quello *asinino* o *equino*, può
rendersi leggiero tagliandolo con parti eguali d'acqua
d'*orzo*, o lasciandolo riposare per alquante ore, on-
de poterne levare la *crema*. Se indipendentemente da
queste precauzioni si trova ancora pesante allo *stoma-*
co, si potrà aggiungere sopra un mezzo sestiere di
questo stesso latte un cucchiaino ordinario di *rum*, o
d'*acquavite*, e un po' di zucchero.

Non è dunque da maravigliarsi che il latte non
appaia convenire ne' primi tempi ad uno *stomaco*, che
non è accostumato che a digerire della carne, e a
bere de' *liquori spiritosi*; il che è segnatamente il ca-
so d'un gran numero di persone, che divengono *ti-*
siche.

Nostra opinione dunque non è che i malati, avvez-
zi alla nutrizione *animale* e a sì fatti *liquori*, li ab-

Latte di
burro.

In qual
dose deve
prenderlo.
Bisogna,
che il ma-
lato ne vi-
va unica-
mente.

Latte vac-
cino. Me-
zi di ren-
derlo leg-
giere.

Perchè il
latte non
sembra
sempre
convenire
nei princi-
pi di usarsi.

Cautela
da usarsi
nel princi-

E non ci anderà mai a genio, se non ciò ch'è fuori di noi.
Degli *alimenti* impastati e maneggiati da alcuni mercenarij,
per i quali sovente si sente il più vile disprezzo, si trovano
tutto giorno squisiti, deliziosi; e poi ripugna il prendere una
sostanza, che la Natura si dà ella stessa la cura di prepara-
re, e che deposita in serbatoj che s'è compiaciuta di abbelli-
re! Quale contraddizione! Ella però non forma, che un'ag-
giunta al gran numero di quelle di cui siamo lo scherno.

Del resto si osserverà che l'istante, in cui il latte *mulie-*
bre riesce migliore, è quattro o cinque ore dopo il pasto del-
la nutrice: prima di questo tempo egli ha una specie di cru-
dità, e qualche cosa ritiene dalla natura degli *alimenti*: più
tardi si scioglie e ingiallisce; contrae ancora un odore di
orina.

si dee pren-
dere il latte
muliebre.

In qual
tempo del-
la giornata
bisogna
poppare da
una nutri-
ce,

Me dell'uso
del latte.

bandonino assolutamente di sbalzo: questa privazione potrebbe divenire pericolosa. Noi li consiglieremo al contrario di mangiare una volta al giorno una scarsa porzione di qualche giovane animale; o quel che meglio farebbe, di far uso di brodi di pollo, di vitello, di agnello, ec. Si può ancora bere un po' di vino meschiato col *negus*, o temperato con due o tre parti d'acqua; ma se ne scemerà poco a poco la quantità, finchè si possa abbandonarlo del tutto.

Bisogna il
più presto
possibile
farne la
principale
sua nutri-
tura.

Alimenti,
di cui de-

Frattanto non si dee usare di questa maniera di vitto, se non per prepararsi ad una *dieta* più semplice, e formata principalmente di *latte* e di *vegetabili*; e quanto più presto il malato sarà in istato di adattarsi, tanto meglio sarà.

Il *riso* e il *latte*, o l'*orzo* bollito col *latte* (9), a'

Non biso-
gna far
bollire il
latte, né
schiumare
il mele.

Bisogna
prestar at-
tenzione
al nodri-
mento dell'
animale
che som-
ministra il
latte.

(9) In generale, dice il Sig. CLERC, il *latte* lungamente bollito contrae un gusto un po' acre, un odore di urina; e coloro che prescrivono ai malati un *latte* in tal guisa bollito, non sono meglio istruiti di colui che fa bollire e schiumare il mele.

Un'attenzione che bisogna ancora avere quando si prende il *latte*, è d'informarsi del pascolo dell'animale da cui si trae. Vedo benissimo che a Parigi, e in tutte le altre Città grandi, ciò sembra difficile, almeno per il popolo. Ma in campagna niente v'è di più facile; e le persone ricche possono altresì assicurarsene nelle Città. Questa attenzione diviene tanto più importante, quanto che il *latte* conserva il colore, l'odore, il sapore, e le proprietà degli *alimenti* che lo formano. Ognuno sa che l'uso del *zafferano* lo tinge in giallo, e la *robbia* in rosso; che prende il colore del *vino*, della *birra*, della *cassa*, ec. Il *latte* delle pecore, che mangiano il *simo*, ne manda l'odore; l'*aglio* gli comunica il suo sapore; l'*assenzio* lo rende amaro; la *graxiola*, quando sia secca, rende *purgativo* quello di vacca; ec.

Ognuno avvedesi che qualora si lasci l'animale vivere in sua libertà, il di lui *latte* potrà avere delle qualità affatto contrarie a quelle ch'esige la malattia, e che allora ben lungi dal guarire, non farà che aumentare il male, in proporzione che le sostanze, di cui si pasterà, saranno più opposte a quelle che si desiderano.

Piante di
cui deve
pascere l'a-
nimale che

Per non distaccarsi dalla *risicchezza*, su cui di presente si versa, sarebbe dunque da desiderarsi che l'asinella, o la vacca non si pascessero che di piante *incisive*, *vulnerarie*, e bal-

quali si aggiunge un poco di zucchero, formano degli alimenti convenientissimi. Le frutta ben mature e cotte al fuoco, nel forno, o bollite, convengono parimente. Coteſte frutta ſono ſegnatamente l'*uva ſpi-*

vedi far uſo
nella tifi-
chezza.

famiche. Tali piante ſono l'*iſopo*, il *marrobio bianco*, l'*abro-*
zano, il *tanaceto*, la *veronica*, la *cicoria ſilveſtre*, l'*indi-*
via, l'*ortica bianca*, il *ſummoſerno*, la *verga aſtea*, il *lu-*
pulo, o ſia *bruſcandolo*, la *centaurea vinoro*, le tre ſpezie
di *aſſenzio*, il *naſturzio ortenſe* e l'*acquatico*, il *ſio*, (o
appio paluſtre) la *menta*, la *ſalvia*, le piante conoſciute
ſotto il nome di *capillari*, quali ſono il *capelvenere comu-*
ne, o *filicula*, l'*adianto*, o *capelvenere di Montpellier*, l'*adian-*
to, o *capelvenere del Canada*, la *polivaca*, la *ruſa mura-*
ria, la *ceſtracca*, (o *ſcolopendro vero*) la *pulmonaria*, la
pulmonaria arborea, l'*iperico*, l'*alchimilla*, la *verbena*, l'
edera terreſtre, il *cardo ſanto*, la *burſa paſtoris*, la *pervin-*
ca maggiore, la *minore*, il *piantaggine*, il *piantaggine mi-*
nore, il *millefoglio*, la *numularia*, il *cinquefoglio*, il *gera-*
nio Roberziano, ec. (Ved. la deſcrizione di tutte queſte
piante ai riſpettivi Articoli nella *Tavola*).

ſommini-
ſtra il latte
ai tifici.

Queſte piante per quanto numeroſe eſſe ſembrino, ſono pe-
rò delle più comuni. Si rincontrano da per tutto ſia l'una,
ſia le altre, nei prati, nelle maremme, nelle pianure, nei
boſchi, ſulle montagne, ſulle ſponde dei fonti, dei fiumi,
ſulle muraglie, ec.

Queſte
piante ſi
trovano da
per tutto.

Cogliendo coteſte piante da ſe ſteſſo, o conducendo l'ani-
male nei luoghi dove creſcon copioſe, oltre che ſ'impedirà
che non ne mangi di contrarie, v'è ch' eſſe produranno un
latte veramente medicinale, in ſingolar modo appropriato al-
la malattia. Il Sig. CLEXER riferiſce la ſtoria d'una Signora
ch'egli ha riſanato d'una tifichezza col *latte* preparato con
medicamenti. Queſto fatto, e parecchi altri ch'ei cita, de-
vono, ſoggiunge egli, impegnarci a moltiplicare l'eſperienze
di queſto genere. La maniera di ammazzare gli uomini, è
per ſventura pur troppo cognita dappertutto: quella di con-
ſervarli, non lo è per anco abbonſanza. Gli occhi dei Me-
dici o di tutte le perſone intelligenti devono verſo eſſa diri-
gerſi.

Si riſetterà ch'eſſendo il *latte vaccino* più difficile a dige-
rirſi di quelli, de' quali ſ'è poc'anzi favellato, ſi dee ſtare
ancor più guardinghi di non preſcriverlo che nel principio del
male, e allorchè le forze dei malati ſono ancora intatte; o
nella convaleſcenza, quando il pericolo è evidentemente ri-
moto, ch'è quanto a dire, quando l'infermo ha ripreſo una
parte delle ſue forze.

na, le poma cotte dinanzi il fuoco, o nell'acqua; cui si aggiunge quando sieno cotte un po' di latte, ec. Le *gelatine*, le *conserve*, le *confetture* di frutta mature atideste possono esibirsi al malato a suo talento. Tali sono quelle di *uva spina*, di *rose*, di *prugna*, di *ciliegie*, ec.

Unico vit-
to su cui
si dee fon-
darsi nella
tisichezza
incipiente.

Un'aria pura, un esercizio moderato, degli alimenti composti particolarmente di frutta, che abbiamo ora nominato, o d'altre simili col latte formano il solo vitto, su cui si possa fondarsi nella *tisichezza* incipiente. Se il malato ha forza e coraggio bastevole per persistervi, farà di rado deluso nella sua speranza d'esser guarito.

Osserva-
zione.

In una Città popolarissima dell'Inghilterra, (*Sheffield*) dove la *tisichezza* è comunissima, ho sovente veduto de' *tisici* ch'erano stati inviati alla campagna, prescrivendo loro di montare a cavallo; di vivere di latte e di *vegetabili*, ritornarsene a capo di alcuni mesi, liberi da ogni incomodo, avendo pure riacquisitato buone carni e buon colore.

Per verità questa maniera di vitto non era sempre accompagnata da esito felice, massimamente quando il male era ereditario, o molto avanzato: tuttavolta questo era l'unico che potesse riuscire; e quando sventuratamente questo diveniva frustraneo, i rimedj niente meglio riuscivano: almeno io non ne ho giammai veduto esempio alcuno felice.

Vitto al-
lorchè le
forze e il
coraggio
del malato
sono ab-
battute.

Se le forze e il coraggio del malato sono abbattute, bisogna trovar maniera di sostenerlo con de' brodi sostanziosi, delle *gelatine*, ec.; taluni raccomandano in questo male i *testacei*, e ciò non è fuor di ragione, poichè eglino sono molto nutritivi e assai *restorativi* (a).

Avvantag-
gi ricavati
dall'uso
dell'*ostriche*.

(a) Ho spesso volte veduto de' *tisici*, i sintomi però de' quali non erano gravi, ritrarre un gran vantaggio dall'uso dell'*ostriche*. Le mangiavano d'ordinario crude, e bevevano il liquore che ritrovasi nel loro guscio. (Ho veduto parecchi esempi dei buoni effetti dell'*ostriche* in altre circostanze, come ne' vomiti cagionati da *gravidanza* e da *agrezze di stomaco*.) (Ved. in seguito Cap. XXII, §. IV, Art. IV, nota 4; e Art. VIII, nota 5 di questo Vol.)

Del resto gli *alimenti* e le bevande devono sempre esser prese in piccola quantità alla volta, per tema che una troppo grande abbondanza di *cibo* novello non opprima i *polmoni*, e non acceleri di troppo la *circolazione* del *sangue*. (Ved. Parte Prima, Cap. II, not. 7.)

Gli *alimen-
ti* e le be-
vande de-
vono pren-
dersi in pic-
cola quan-
tità alla
volta. Per-
chè?

Bisogna tenere lo spirito del malato tanto lieto e tanto tranquillo, quanto è mai possibile; essendo la *tifsichezza* soventemente prodotta, e sempre aggravata dalle vicende di uno spirito *melancolico*. Il perchè la *musica*, una società dolce e gradita, e tutto ciò che può ispirare della gioia, sono di massima importan-za in questa malattia. Di più bisogna lasciare il ma- lato radamente solo; le riflessioni sopra l'infelicità di sua situazione non possono che rendere il suo sta- to più pericoloso.

Avvantag-
gi dell' al-
legria, della
musica, ec.
nella tifs-
ichezza.

ARTICOLO QUARTO.

Governo che devono seguire i malati ne' differenti gradi di tifsichezza.

Sebbene la guarigione di questa malattia dipenda in gran parte dalla regola del *vitto*, e dalla co- stanza del malato in seguirla, noi imprendiamo tut- tavia a parlare del piccolo numero de' *rimedj*, che possono servire a calmare la violenza de' *sintomi* prin- cipali.

Rimedj del primo grado di tifsichezza.

Nel primo grado della *tifsichezza*, si può talvolta mitigare la *tosse* mercè la *cacciata di sangue* (10), e

(10) E' molto dubbioso se la *cacciata di sangue* sia utile, anche nel primo grado della *tifsichezza*; massimamente se es- sa debba l'origine all'una o l'altra delle malattie enunziate nell' Articolo I di questo Paragrafo. Se si è posto attenzione a quanto abbiamo detto nel §. I nota 2 e 3 del Cap. VI di questo Vol., si deve apprendere che questo *rimedio*, il quale non vale che a procacciare un sollievo passeggero, può

Con quali cautele si deve pre- scrivere il salasso nella tifsichezza.

facilitare l'*espettorazione* per via de' *rimedj* seguenti .

Pillole pet-
torali in-
cidenti .

Pigliate *cipolla squilla fresca* ,) di ciascheduno
 gomma ammoniac ,) due dramme.
 semi di cardamomo ,)

Pestate tutto insieme in polvere, in un mortajo . Se questa massa è troppo consistente per poterne far delle *pillole* di mezzana grossezza , aggiungete un poco di *giulebbe comune* .

Si danno tre o quattro di queste *pillole* due o tre volte per giorno , secondo che lo *stomaco* del malato può tollerarle .

Latte am-
moniacale .

Il *latte ammoniacale* , o sia il *latte* di *gomma ammoniac* , è ancora un *rimedio* convenevole in questo primo periodo della malattia . Questo si prepara e si amministra come lo abbiamo consigliato nella *pleurisia* . (Ved. Cap. V , §. I , Art. IV , pag. 80 di questo Volume .)

Mistura
calmante .

Si può ancora far uso d'una *mistura* fatta con parti eguali

di ottimo *mele* ,

e di *giulebbe* di *papavero* .

Si prendano quattr' oncie di ciascheduna di queste sostanze ; si mettano insieme in un padellino ad un lento fuoco ; si facciano riscaldare sino che questa massa liquida si metta in agitazione . Se ne dà un cucchiaino al malato , ogni qual volta sia incomodato dalla *tosse* .

Pericoli de'
rimedj olio-
si , e bal-
samici .

Si ha il costume di aggravare , nel primo grado di questo male , lo *stomaco* dell' infermo con *rimedj* *oliofi* e *balsamici* ; ma sì fatti *rimedj* ben lungi dal distruggere la cagione della malattia , non fanno che

divenire uno de' più funesti , diminuendo le forze , e radican-
do il male più a fondo .

Non temerò di dire che la *cacciata* di *sangue* nel maggior numero de' casi deve esser esclusa da sì fatta cura , come l' Autore è disposto a rigettare tutti i *rimedj* *oliofi* e *balsamici* ; almeno non può ella prescriversi che da un Medico sperimentatissimo , che sapendo valutare la forza dell' indicazioni , non si determinerà se non in seguito de' segni , che mostrandogli il bene che può recare , gli metteranno egualmente in vista il male che dee evitare .

Cura del primo grado di tifezza. III

augmentarne la forza, riscaldando il *sangue*. Nel tempo stesso rintuzzano l'appetito, rilassano i *solidi*, e sono per ogni conto nocevoli.

Tutto ciò che si può mettere in opra per calmare la violenza della *tosse*, oltre l'*esercizio del cavallo*, e le altre parti convenevoli del *vitto*, deesi ristringere a de' *rimedj* d'una qualità un poco *acida e deterfiva*, come l'*offimele*, il *giulebbe di limoncelli*, ec.

Soli rimedj che si possono esibire contro la violenza della tosse.

Gli *acidi* sembrano avere degli effetti saluberrimi in questo morbo, siccome *rinfriscanti*, e molto adattati a smorzare la sete. I *vegetabili acidi*, come i *pomi*, le *arancie*, i *cedri*, ec. sono i più convenevoli. Ho veduto de' malati ritrarre un grande vantaggio dal succo di *cedro*; ne succhiavano parecchi per giorno. In forza di queste osservazioni noi raccomandiamo l'usare di questi *acidi vegetabili* in quantità altrettanto grande, quanto lo stomaco del malato potrà sopportarlo.

Vantaggi degli acidi vegetabili.

Quanto alle *bevande*, raccomandiamo le *infusioni delle piante amare*: tali sono l'*edera terrestre*, la *centaurea minore*, i fiori di *camomilla*, o il *trifoglio palustre*. Si usano a talento: esse fortificano lo stomaco; facilitano la *digestione*; purificano il *sangue*, e nel tempo stesso soddisfanno alle *indicazioni* di umettare, e di estinguere la sete, infinitamente meglio che tutte le cose dolci o sugose.

Infusioni delle piante amare.

Ma se il malato sputa *sangue*, la sua bevanda ordinaria deve essere una *infusione*, o una *decozione* di radici di piante *vulnerarie*, ec. come la seguente.

Bevanda allorché il malato sputa sangue.

Prendete della radice di *consolida maggiore*, un'oncia.
di *regolizia*,) di ciascheduna
di *altea*,) mezz'oncia.

Fate bollire in due pinte d'acqua comune per alcuni minuti; lasciate che si raffreddi.

Si può aggiungervi un cucchiaino da caffè di *spirito di vitriolo*: se ne bee una tazza tre o quattro volte per giorno.

Ci sono molte altre piante, molte altre radici *mucilaginosi*, di qualità *consolidante* e *conglutinante*, di cui se ne preparano delle *decozioni* o delle *infusioni*. Tali sono l'*orchide*, i *semi di mela cospina*, la *tussilagine*, i *semi di lino*, la *salsapariglia*, ec. E

inutile il descriverne le *ricette*; la loro semplice *infusione*, o la loro *decozione*, è tutto ciò ch'è necessario, e il malato può prenderne a suo talento.

Vantaggi
della con-
serva di
rose presa
in gran do-
se.

La *conserva di rose* conviene singolarmente in questo stato di male, cioè nel primo grado. Ella si somministra dentro l'uno o l'altro de' *beveraggi* poc' anzi prescritti, o se ne mangia a cucchiaj. Non se ne può attendere vantaggio veruno, qualora non si prenda che in piccole dosi. Io non la ho giammai veduta riuscire, quando almeno non si somministrò a tre o quattr' oncie per giorno, e per un tempo considerabile. In questa dose la ho veduta produrre degli effetti straordinarij; e la ordinarei volentieri in tutti i casi in cui vi fosse *sputo di sangue*.

Rimedi del secondo grado di tifichezza.

Chinachina.
84.

Allorchè gli *sputi densi*, l'*oppressione di petto*, la *febbre tifica*, e tutti i *sintomi*, che l'accompagnano, annunziano che v'ha un *ascesso* formato nei *polmoni*, io ordino la *chinachina*; sendo che questo *rimedio* è l'unico, per mezzo del quale si possa in allora sperare di opporsi alla tendenza generale degli umori alla *putrescenza*. Io lo prescrivo nella seguente maniera.

Maniera
di ammi-
nistrazione.

Prendete della migliore *chinachina*, un'oncia. Riducetela in polvere finissima; dividetela in dieciotto o venti prese eguali.

Il malato ne prenderà una parte ogni tre ore, unendola ad un qualche *sciloppo*, per farne de' bocconcelli, oppure dentro un bicchiere della sua bevanda ordinaria.

Se accada che la *chinachina* purghi, si formerà un *elettuario* con la *conserva di rose*, in questa maniera.

Elettuario
di chinachina
che si dee por-
gere allorchè
ella muove il
ventre pre-
sa in pol-
vere.

Prendete *conserva di rose*, quattr' oncie;
chinachina della più scelta, un'oncia;
in polvere, *sciloppo di arancia*, o di *limone*, quanto
abbisogna per dare a tutta la massa
la consistenza del *miele*.

Mescolate,

Maniera
di prendere.

Il malato prenderà questa dose in quattro o cinque

que giorni, cioè un' oncia e mezzo di questo *elettuario* per giorno, in tre o quattro volte. Quando questa quantità sarà consumata, ella si ripeterà, se le circostanze lo richiedano.

Coloro che non potranno prendere la *chinachina* in sostanza, cioè in polvere, o in *elettuario*, ne faranno infondere nell'acqua fredda. Sembra anzi che l'acqua fredda sia il miglior *mestruo* per estrarre le virtù di questa sostanza. (Ved. questa voce nella *Tavola* .)

Si fa infondere per ventiquattr'ore una mezz'oncia di *chinachina* in polvere dentro un mezzo sestiere d'acqua fredda; si passa per pannolino sottile: il malato prenderà questa quantità in tre o quattro volte dentro la giornata.

Finchè v'abbia qualche *sintomo* d'*infiammazione*, noi crediamo la *chinachina* contraria. Ma qualora si sia accertato che esiste del marciume nel *petto*, ella è certamente in allora uno de' migliori *rimedj* che adoperare si possa. Vero è che poche persone sono risolte abbastanza per fare un uso convenevole di *chinachina* in questo periodo di male; altrimenti abbiamo luogo di credere che si potrebbe ritrarne de' grandi vantaggi (11).

(11) La *chinachina*, la quale certamente è uno squisito *rimedio* in questo periodo della malattia, non è convenevole, come l'osserva benissimo il Sig. BUCHAN, allorchè v'abbiano de' sintomi d'*infiammazione*, nemmeno quando il malato abbia una *costituzione* disposta a sì fatti *sintomi*. Ho veduto un malato, cui la *chinachina*, a capo di quindici giorni o tre settimane del di lei uso, risvegliò un calore e un' *irritazione* nel *petto*, cui per ben due volte succedè uno *spurgo* di *sangue*. Si sospesero e si calmarono questi accidenti con dodici bottiglie d'acqua minerale di *Bonnes*, ch'egli prese successivamente una per giorno in ciascheduna mattina. Una malata soffersse gli stessi accidenti, ancorchè fosse ridotta a prendere otto grani di sale essenziale di *chinachina* per giorno, dopo di aver cominciato dalla dose di sedici. Le *acque* di *Bonnes* le procurarono un eguale sollievo.

Le *acque* di *Bonnes* sono per se stesse salutarissime nella *tischezza*. Ho veduto un malato tra gli altri provarne degli effetti eccellenti, dopo averle prese pel corso di sei settimane

Cosa biso-
gna fare
allorchè si
sia accer-
tato, che
v'abbia un

Quando siasi accertato che v'abbia un *ascesso* den-
tro i *polmoni* (12), e che si vede che non si evacua
per via di *sputo*, nè se ne guarisce per *risoluzione* ;
fa di mestieri tentare di farlo scoppiare internamen-

o di due mesi di seguito ; e non dubito che ne avrebbe ricava-
to de' maggiori vantaggi, se avesse voluto usarle nelle due
stagioni, come n'era stato consigliato.

Rassegnazione, e
pazienza
per parte
del mala-
to.

La *tisfechezza*, come le malattie *nervose*, e tutti gli altri
morbi lunghi o *cronici*, esigono per parte del malato molta
rassegnazione e pazienza ; e questo pure è ciò che rarissime
volte s'incontra. Il più di sovente i *tisici* sono indocili e ri-
calcitranti a segno di sforzare il Medico ad abbandonarli .
Non anno in allora più rifugio veruno che nei cerretani, i
quali anno sempre de' *rimedj* da offerire, e che li precipita-
no nella tomba per la via della speranza.

Condiscen-
denza per
parte del
Medico.

D'altra parte i malati difficili, e che malgrado la fiducia
che attestano al Medico, non possono vincere la ripugnanza
che anno per le *droghe*, richiedono dalla parte di colui che
li governa, molta condiscendenza e riguardo. Tocca a lui il
cercare nel *visto*, di che supplire ai *rimedj*, o almeno cosa
che tenga luogo di quelli che riescono ingrati, e d'una mag-
gior copia degli altri.

Vescicato-
rio, e fon-
tanella.

Ora si troveranno tutti questi vantaggi in un ampio *vesci-
catorio* posto tra le due spalle, che si farà fortemente spun-
gere, finchè darà indizio di mandar *marcie*. A questo *vesci-
catorio* si farà succedere una *fontanella* al braccio, che si man-
terrà aperta per tutto il corso della malattia, e due anni an-
cora dopo che sarà interamente terminata.

Vantaggi
di questi
due rime-
di.

Sebbene il Sig. BUCHAN non faccia menzione in questo Ar-
ticolo nè del *vescicatorio*, nè del *cauterio*, noi possiamo tut-
tavia assicurare, che non v'è rimedio alcuno egualmente va-
lido contro questa malattia, e che se loro si affocia la *china-
china*, come *ansiputrido* e *corroborante*, si accelera singolar-
mente la guarigione del malato.

Cosa indi-
chi la ef-
frenza di
questo a-
scesso.

(12) Non sarà permesso di dubitare, se nel decimo quar-
to giorno, che suol durare la *fiussione di petto*, non si abbiano
ottenute dalla Natura l'*evacuazioni* necessarie ; ch'è quanto a
dire, se il malato non abbia sputato, o non abbia avuto del-
le *dejezioni* copiose, o non abbia reso delle *urine* cariche e
qualora dopo questi quattordici giorni l'infermo non sia per
anco guarito ; nè pure notabilmente sollevato ; se per lo con-
trario la *febbre* continui a essere gagliarda ; se la *respirazio-
ne* non cessi d'essere oppressa ; se l'ammalato risenta di tan-
to in tanto de' *brividi*, e *raddoppiamenti* di *febbre* verso la sera ;
se le gote divengano rosce e le labbra asciutte ; qualora
v'abbia dell'arsura di bocca, se l'infermo è inquieto.

te. A questo effetto si farà respirare frequentemente al malato il vapore d'acqua calda o di aceto: si farà toffire, ridere, gridare, ec. (13)

Se l'*ascesso* scoppia dentro il polmone, il *marciume* può essere rigettato per la bocca. E' vero che talvolta lo scoppio della *vomica* cagionò una morte subitanea, soffocando il malato; e questo è ciò che

ascesso dentro il petto.

Accidente che accompagna talvolta la rottura della vomica.

L'aumento della violenza di tutti cotesti *sinsemi* annunzia che la *vomica* (tale si chiama l'*ascesso* dentro i polmoni) è omai formata.

Cosa sia, che si chiama vomica.

La *soffe* diviene più continua; ella raddoppiasi ad ogni menomo movimento, o tosto che il malato abbia preso qualche nodrimento. Non può stare colcato che sul lato infermo; sovente non può per verun modo decumbere; ed è sforzato di restare giorno e notte sedente. Non può dormire; è inquieto, smanioso; passa de' momenti in angosce terribili, accompagnate e seguite da sudori sul petto, e segnatamente sul viso. Spreme fuori de' sudori notturni; prova spesso un sapore ingrato di bocca, simile soprattutto a quello dell' uova fraccine. Dimagra a vista l'occhio; ha la bocca e la lingua aride; niente vale a disfarlo. La sua voce ha suono languido o rauco; i suoi occhi sono incavati. Si scorge talvolta sul petto dal lato infermo una lieve gonfiatura, e un cangiamento di colore presso che insensibile. Si può in alcuni soggetti risentire dell' enfiagione col premere la *forcilla* del *petto*, massime quando l'ammalato tosse.

Sintomi della vomica.

(13) Se gli farà prendere una grande quantità di liquido *ammolliente*; tal' è la tisana d'orzo e di mele; del brodo lungo di vitello; del *lasso* tagliato coll'acqua. Questa massa di liquido tenendo lo *stomaco* sempre ripieno, oppone ai *polmoni* una resistenza, che sforza la materia della *vomica* a portarsi alla volta della gola.

Se gli farà fiutare dell' *aceto* caldo; se gli introdurrà in gola dell' *aceto* e dell'acqua, per eccitare la *soffe*. Si può fare altresì prendere al malato ogni due ore un succhiato della *porzione* seguente.

Prendete *ossimela scillitica*, un'oncia;
infusione forte di *fiore di sambuco*, cinque oncie.

Miscolate.

Se questi presidj non riescono, e che l'infermo si trovi in istato, bisognerà porlo in una vettura e farlo scuotere un poco; e a tale oggetto si farà scorrere sopra un campino scosso, ma sempre dopo che il malato abbia riempito lo stomaco di bevanda.

accade, allorchè la quantità della *marcia* è straboechevole, e che le forze sono omai esauste.

Cautela, che bisogna avere in questo caso.

In tutti i casi bisogna munirsi d' *acqua spiritosa*, o di *sali volatili*, per farne respirare al malato, perchè questa rottura non manca giammai di farlo almeno cadere in una *sincope*.

Segui, che danno qualche speranza di guarigione. Vizio e rimedi, che bisogna prescrivere allorchè il malato avanzava verso la guarigione.

Se la materia che il malato rigetta è densa; se la *tosse* si diminuisce; se la *respirazione* diviene più facile, si può concepire qualche speranza di guarigione.

Gli alimenti in allora devono essere leggieri, ma *ristoranti*. Quelli che meglio convengono in questo caso sono li brodi leggieri di pollo, la *decozione* di *cremore d'avena*, o di *sagou*, il *cremore* di *riso*. Se gli darà per bevanda del *latte* di *butirro*, o del *siero* concio col *mele*. Questo tempo della malattia è quello altresì, in cui fa di mestieri di mettere in opra la *chinachina*, sotto la forma, e nella maniera qui sopra descritta. (Ved. pag. 112 e 113 di questo Vol.) (14)

Quanto tempo dee durare la regola del vizio.

(14) Noi crediamo dovere soggiungere, che la *regola di vivere* quivi prescritta dal Sig. BUCHAN, essendo, come lo dice al principio di questo Articolo, (pag. 109 e seg.) la base della cura, deve essere non solamente osservata rigorosamente in tutti i tempi della malattia, ma ancora continuata molto al di là del tempo in cui il malato si crede ristabilito. Le ricadute nella *insicurezza* non sono frequenti, se non per causa degli errori che si commettono nel *metodo di vivere*.

Errore che si commette in questo proposito.

Un malato non soffre più incomodo nel petto: respira facilmente: dorme placidamente la notte: accorgefi di avere recuperato una parte delle sue forze: si sente qualche appetito, ec.: tosto si reputa fornito d'una salute egualmente perfetta che prima di cadere malato; ed eccolo a darsi in preda a' suoi antichi piaceri, e soventemente a delle fregolatezze. Egli ricade malato, e si grida contro del Medico, che ha troppo prontamente annunziata una guarigione, che dice si non essere stata che immaginaria; mentre non stava che in potere dell'ammalato di renderla reale e stabile, persistendo nella sua *regola di vizio* sei mesi uno e anche due anni di più.

Osservazione.

Un uomo di trenta sei anni, forte e robusto, viene afflittito da *peripneumonia*, che si cura con le *iterate emissioni di sanguis*, e con l'*emesico* diluto, che tuttavia non la estin-

Se la vomica, o l'ascesso si rompe nella cavità del petto, tra la pleura e i polmoni, la sola maniera di far evacuare la materia, è, come lo abbiamo già detto, di fare una incisione tra le coste. Ma siccome questa operazione, chiamata *empiema*, deve sempre farsi da un Cerusico, è inutile di qui descriverla. Noi ci contenteremo soltanto di osservare che non è poi tanto formidabile, come ordinariamente taluno s'immagina, e che in sì fatta circostanza ella è il solo rifugio, che abbia il malato onde riaversi in salute:

Cosa bisogna fare allorché la vomica scoppia nell'intercosto del petto.

§. II.

Della Tificchezza sintomatica:

Questo morbo non può essere guarito, se non si sia prima risanata la malattia che lo ha cagionato. Così quando questa specie di tificchezza procede da un vizio scrofoloso, o da scrofole attuali, dallo

Uopo è in questa specie di tificchezza cominciare dal guarire la malattia.

guono; ma la convalescenza è delle più penose; e a capo di alquanti mesi vi si dichiara una tificchezza incipiente. Chiede prontamente soccorsi, e osserva scrupolosamente la regola di vitto che gli viene prescritta. Ciò accade nell'entrar dell'autunno; e sebbene questa stagione, e quella del verno sieno sempre avverse in simili casi, egli si trova nella primavera susseguente assai bene per riputarsi guarito. Si abbandona per tanto alle sue antiche consuetudini, sopra tutto ai piaceri della tavola. Ma al ritorno dell'autunno susseguente soffre uno spunto di sangue, cui tengono dietro gli stessi sintomi dell'anno precedente. Si rimette di bel nuovo al vitto e ai rimedi convenevoli, che lo ristabiliscono dentro lo stesso spazio di tempo; di maniera che nella seconda primavera si sarebbe altresì creduto perfettamente guarito, se non fosse stato nel passato incontro vittima di questa stessa credenza. Egli non abbandona adunque in verun conto il suo metodo; ma non lo segue esattamente abbastanza, onde l'autunno in appresso non provi ancora un risentimento assai grave, che alla fine lo rende persuaso ch'egli non dee da qui innanzi più vivere che col metodo esatto; e non fu possibile se non dopo una astinenza completa di tutto ciò ch'è capace di riscaldare, che egli ricuperasse una sanità costante; ma che giudiziosamente risparmi, interdicendosi ogni specie di fregolatezze.

Ma che l'
ha cagio-
nata.

scorbuto, dall' *asma*, da una *malattia venerea*, ec. fa di mestieri rivolgere dapprima ogni pensiero alla malattia che l'ha cagionata, e in conseguenza ordinare il *vitto* e i *rimedj* che gli sono proprij.

Cosa sia da
farli allor-
ché ella di-
penda dal-
le evacua-
zioni ec-
cessive.

Allorchè questa malattia dipende da alcune *evacuazioni* eccessive, di qualunque natura esse sieno, conviene non solamente arrestarle, ma ristabilire eziandio le forze dell' infermo, mediante un *esercizio* convenevole, una *dieta* nutritiva, de' *cordiali*, ec.

Consigli
alle madri,
che inciam-
pano in
questo ma-
le dal por-
gere a pop-
pare trop-
po a lun-
go.

Alcune madri delicate e giovanissime, sono sovente assalite da questo male, dal porgere a poppare troppo a lungo. D' uopo è dunque, come prima si avveggon che le forze e l' appetito cominciano a scemare, che spoppino i lor figliuoli, o che ritrovino un' altra nutrice, altrimenti non possono sperarne la guarigione (15).

Si vede ch'è impossibile di fissare il tempo che dee durare il *metodo di vivere*. Il più sicuro per una persona, che sia stata minacciata da questa funesta malattia, è di non abbandonarlo che a capo di parecchi anni; e non deesi giammai lasciarlo tutto ad un tratto. Se l' Autore prescrive delle cautele per cominciarlo, (Ved. di sopra pag. 107 di questo Vol.) forza è senza dubbio di usarne assai più per abbandonarlo; e queste cautele sono tanto più necessarie, quanto più la *regola di vitto* è stata a lungo continuata, e fu più rigorosa.

Riflessioni
sopra que-
sto confi-
glio.

(15) E' importante di riflettere, che l' osservazione dell' Autore non riguarda che le madri, le quali nutricano soverchiamente a lungo. Imperciocchè per quelle che non nutricano se non il tempo prescritto dalla Natura, la tema di cadere in questa malattia non deve impedirnele. Abbiamo fatto vedere (Parte I, Cap. I, nota 2) che tutte le madri devono adempiere questo indispensabile dovere, e detto abbiamo che il celebre MORTON aveva osservato, che alcune genitrici minacciate in apparenza da *rischezza*, per la loro gracilità e delicatezza, se n'erano liberate col nutrire. Se l' allattamento diviene un *rimedio* in questa malattia, come mai concepire che possa divenire cagione di questo medesimo morbo!

La ti-
che non
e che di
vado cagio-

Quindi egli non lo è quasi mai. Se si rincontrino alcuna volta di tali femmine, che sieno costrette ad abbandonare l' *allattamento* per motivo di malattia, cotesto male ha sempre una cagione più lontana, che bisogna rintracciare o nel

§. III.

Dell' atrofia o tischezza nervosa.

Questa malattia è una emaciazione insensibile di tutto il corpo, senza un grado notabile di febbre, senza tosse, senza difficoltà di respirare.

Carattere di quello male.

modo di vivere ch'esse anno osservato avanti di nutrire, nata dall' o nella loro costituzione, o in quella dei loro genitori.

Non v'è chi non sappia che l'allattamento è il più efficace di tutti i rimedj, onde prevenire gl'ingorgamenti delle mammelle; le conseguenze del putridio, chiamate latte sparso; le deposizioni di latte; le infiammazioni del ventre inferiore; le aposteme; le ulcere della matrice, ec. malattie cotanto comuni, e sì terribili nelle femmine di parto.

Più che si studia la Natura, più si resta persuasi di questa verità; ch'ella non ci prescrive legge giammai, che noi non siamo valevoli di adempire. Ella fa concepire ad una femmina: questa per quanto piccola, per quanto delicata e debbole che siasi, nutre, porta nove mesi il suo bambino dentro il proprio seno; e partorisce del pari che la femmina la più vigorosa, e spesso più felicemente. Senza dubbio che se fosse in potere delle femmine l'esentarsi da questo travaglio, se ne vedrebbe un gran numero a rimettersi alle cure dell'altre, per far germogliare il frutto del loro piacere; ma la Natura vi ha messo ordine. La matrice, che lo riceve, è il solo soggiorno dove egli possa animarsi e svilupparsi; e per questo effetto gelosa, per così dire, del tesoro ch'essa possiede, si riserra del tutto isolato, per riaprirsi solamente, quando il bambino pervenuto al suo ultimo termine, non lascia più luogo alla sua dilatazione.

La Natura non prescrive legge giammai che adempire non si possa. Le femmine incinte proposte in esempio.

Il bambino viene alla luce. Che fa la Natura per prevenire gli accidenti e la morte, cui l'esporrebbero gli alimenti usati dagli adulti? In piccol'ora dopo il parto ella devia il corso della sostanza che nutrive il bambino nel seno materno; la deposita in due serbatoj, dove la quantità del latte che d'ordinario vi abbonda, si trova quasi sempre proporzionata all'appetito del bambino, che più o meno forte, ha più o meno bisogno di nutrimento.

Insistere di vantaggio su tal punto del dovere delle femmine, sarebbe superfluo: imperciocchè se la Natura avesse voluto ch'esse si esentassero dal nutrire i loro figli, essa le avrebbe private delle mammelle, o non avrebbe accordati a questi organi la sostanza, alla cui sola secrezione vengono destinati:

Prove che le femmine devono esserle nutrici: se i loro bambini.

Ella è accompagnata da debolezza, mancanza d'appetito, indigestione, ec. (16)

Chi sono
quelli che
ci sono ef-
fetti.

Coloro che sono d'un carattere inquieto e impaziente; che usano senza ritegno de' liquori spiritosi, o che respirano un'aria malsana, ci sono i più esposti.

Cura da usarsi in questo male.

Vitto.

Noi raccomandaremo volentieri, e principalmente nella cura di questo male, una *dieta* leggiera e nutritiva; molto esercizio all'aria aperta, e l'uso degli amari, che anno la proprietà di assodare e invigorire lo stomaco.

Rimedi:
chinachi-
na, gen-
ziana, ca-
momilla,
ec.

Tali sono la *chinachina*, la *genziana*, la *camomilla*, ec. Se ne fa infondere nell'*acqua* o nel *vino*, come l'abbiamo poc' anzi raccomandato pag. 112 e 113 di questo Volume, e il malato ne prende un bicchierino frequentemente tra giorno.

Elisire di
vitriolo.

Ma un rimedio che ristabilirà singolarmente le *digestioni*, e che molto contribuirà alla guarigione, è l'*elisire* di *vitriolo* preso in dose di venti o trenta goccioline, due volte al giorno, in un bicchieretto d'*acqua* o di *vino*.

Vino ac-
ciaiato.

Il *vino acciaiato* è ancora un rimedio eccellente in simil caso; fortifica i *solidi*, e ajuta singolarmente la Natura nel lavoro d'un buon sangue. Ecco la maniera di preparare questo vino.

il che rarissime volte accade, e non accaderebbe giammai, se le femmine fossero nutrite ed allevate giusta i precetti della Natura e della sana ragione.

Concludiamo adunque che intenzione della nostra comune madre Natura, è che tutte le femmine allattino elleno stesse i loro figli; che tutte sono destinate a questa opera sacra; che nessuna può esentarsene senza rendersi colpevole verso il Creatore, che ha preso cura egli stesso di fornirle di tutte le facoltà necessarie, acciocchè possano adempiere comodamente questo dovere salutare, e che ha voluto ch'esse si esponessero a mille malattie, qualora avessero l'ingratitude e la barbarie di sdegnare un tal obbligo.

(16) Dalla enumerazione di questi *simptomi* si vede, che questa specie di *sabe*, è, a propriamente parlare, quella che appellasi *Confunzione Inglese*.

Prendete della limatura di ferro o di acciaio, tre oncie. Ponetela in una bottiglia. Versatevi sopra una pinta di vino bianco; lasciate in *digestione* pel corso di tre settimane, avendo l'avvertenza di scuotere la bottiglia due volte per giorno; feltrate il mescolglio per carta sugante.

Maniera
di prepa-
rario;

Il malato ne prenderà la quantità d'un cucchiaino da tavola due o tre volte per giorno.

Da pren-
derle.

Ma gl'intertenimenti piacevoli, la società di persone festose e giovali, il *moto a cavallo*, sono preferibili in questa malattia a tutti gli altri *rimedj*. Per la qual cosa tutte le volte, che le facoltà del malato glielo permetteranno, noi lo consigliamo d'intraprendere un lungo viaggio a suo piacere, siccome il mezzo il più proprio a restituirgli la sanità. (Ved. nota 5 e 6 di questo Cap.)

Importan-
za de' di-
vertimen-
ti, del mo-
to a caval-
lo, de'
viaggi, &c.

(Un altro consiglio niente meno importante si è di osservare la più rigorosa continenza, massimamente se il libertinaggio abbia cagionato la malattia. In generale questo è uno di que' precetti, che questa sorta di malati segue il meno volentieri. La maggior parte della gioventù, in preda alle femmine e al vizio nefando dell'*onanismo*, non vi rinunziano d'ordinario che quando le loro forze più loro non permettono di prestarvisi, e allora appunto la malattia è divenuta incurabile. Io ne ho un esempio notabile d'un giovane di ventidue anni, cui i consigli i più saggi, e dati anco da persone che sembravano avere il maggiore dominio sul di lui spirito; non poterono mai fargli perdere questo infame costume. Vi si abbandonava nel tempo stesso eziandio, che per via del *vizio* e de' *rimedj* si attendeva a guarirlo di questo morbo crudele. Egli però, senza che si abbia potuto procurargli verun sollievo. (Ved. Cap. LVII, §. III, Art. IV, del Vol. IV.)

Della con-
tinenza la
più rigoro-
sa.

In generale in questa malattia, e in tutte le altre, il primo de' *rimedj* è di fuggire le cagioni che vi anno dato origine, e tutte quelle che potessero aggravarla.)

Il primo
de' rimedj
in una ma-
lattia è di
fuggire la
cagione
che l' ha
prodotta.

§. IV.

Mezzi di preservarsi dalle diverse spezie di tifichezza, e dalla atrofia.

I preservativi di queste spezie di mali sono l'esercizio, l'aria buona, e la sobrietà.

NON possiamo por termine a questo Capitolo senza raccomandare assai seriamente a tutti coloro che cercano di preservarsi da tutte le spezie di *tifichezza*, di fare altrettanto *esercizio* all'*aria* aperta, quanto mai ne potranno; di evitare ogni *aria* malsana, e di osservare la più austera sobrietà.

Se la *tifichezza* è divenuta oggidì tanto frequente, non si deve accusarne poco la moda di coricarsi ad ore tarde; di fare delle cene fontuose, e di passare le notti intere a tracannare del vino, o intorno ad un catino di *punch*, ec. Sì fatti liquori, qualora se ne faccia un uso smodato, non solamente nucono alla *digestione*, e tolgono l'appetito, ma infiammano altresì il *sangue*, e accendono il fuoco nella *costituzione*.

CAPITOLO OTTAVO.

Delle febbri lente o nervose.

Perchè quelle febbri sono oggidì comuni; e chi sono quelli che ci sono i più esposti.

LE *febbri nervose* sono oggidì tra noi comunissime. Elleno senza dubbio da null'altro dipendono, che dal cangiamento che s'è fatto nella nostra maniera di vivere, e dalla molteplicità de' lavori sedentari: imperocchè le persone che ci stanno più esposte, quelle sono che anno una *costituzione* debole e fiacca; che trascurano l'*esercizio*; che cibansi di *alimenti* troppo poco solidi; che si danno allo studio con troppo di affiduità, o che si fanno lecite un uso soverchio di *liquori spiritosi*. (Leggete avanti di passar oltre i Cap. I, e II di questo Vol.)

§. I.

Cagioni delle febbri lente-nervose .

LE *febbri nervose* possono essere cagionate da tutto ciò ch'è capace di abbattere il coraggio , o d'impoverire il *sangue* . Così la *mestizia* , il *timore* , le inquietudini ; la mancanza di sonno ; le meditazioni profonde ; gli *alimenti* poco nutritivi e troppo acquosi ; le frutta acerbe ; i *cocomeri* ; i *meloni* ; i *funghi* , ec. possono darvi motivo .

Le passioni affettive , i stravagii dello spirito , gli alimenti insalubri ;

L'aria umida , riserrata e malsana può ancora cagionarle . Il perchè si vedono con più di frequenza nelle stagioni piovose , e riescono più funeste per coloro che vivono dentro abitazioni immonde e basse ; nelle strade anguste ; negli spedali ; nelle prigioni , ec.

L'aria umida , riserrata e malsana ;

Le persone il di cui *temperamento* è snervato dagli eccessi de' piaceri sensuali ; dalle frequenti *salivazioni* ; dai *purganti* troppo ripetuti , o da qualsivisa altra *evacuazione* eccessiva , sono molto soggette a sì fatto male .

Le evacuazioni eccessive ;

Esponesi ancora alle *febbri nervose* , qualora si portano de' vestiti bagnati ; se corichisi sul terreno umido ; se esponesi a delle fatiche violenti ; in fine tutte le volte che alcuno si riduca al caso di provare una *soppressione* di *traspirazione* , o un *costringimento spasmodico* nei solidi . (Ved. Parte Prima , Cap. XII , §. III.)

La soppressione della traspirazione ;

Aggiungiamo ancora che vi si resta egualmente esposto dalle troppo grandi e troppo frequenti irregolarità del *vitto* : una soverchia astinenza non è meno nocevole che gli stravizzi . Niente contribuisce di vantaggio a mantenere il corpo in uno stato sano , quanto il *vitto* regolato ; niente parimente contribuisce di più a produrre le *febbri* del più *perverso* carattere , quanto il suo contrario .

L'irregolarità nel vitto ;

(Aggiungeremo a tutte queste cagioni , quelle che sono tanto familiari alla gioventù ; la intemperanza carnale e la frequente effusione del *seme* . Così gli sposi novelli , i libertini , i mal avventurati , che

La intemperanza carnale , l'onanismo , ec.

sono dediti al vizio abominevole dell'*onanismo*, sono i più sottoposti a questo male.) (Ved. Tom. IV, Cap. LVII, §. III, Art. IV.)

§. II.

Sintomi delle febbri lento-nervose.

Sintomi
precursori.

L' Abbatimento; la perdita d'appetito; la debolezza; la fiacchezza dopo il menomo movimento; le *vigilie*; i sospiri profondi; l'avvilimento dello spirito, sono in generale i forieri di questa malattia. A questi *sintomi* succedono un *polso* piccolo e frequente, il seccore della lingua, senza che l'infermo sia notabilmente assetato; egli prova della frescura e del calore a vicenda, che si manifesta dal rossore del viso, ec.

Sintomi
caratteristici.

Ben tosto il malato si querela di *vertigine* e di *dolgia* di capo; ha delle *nausee* con voglie di vomitare: il suo *polso* è *veloce*, e talvolta *intermittente*: le *urine* sono pallide, rassomiglianti alla birra leggiera guasta: egli respira difficilmente: il suo petto è oppresso: ha delle leggiere alienazioni di spirito.

Sintomi
che annun-
ziano una
crisi favo-
revole.

Se verso il nono, decimo, o duodecimo giorno la lingua si umetta; se gli *sputi* divengono copiosi; se appajono delle leggiere *evacuazioni* pel basso, o una lieve umidezza di pelle; o se accada qualche *passo* all'uno o all'altro orecchio, o alcune grosse *pustole* sulle labbra o sul naso, si può sperare qualche *crisi* favorevole.

Sintomi
sfavorevoli.

Ma se il malato ha una eccessiva *scorrenza* di *venere*; se patisce de' *sudori colliquativi*, seguiti da frequenti *accessi* di *sincope*; se la lingua tremola; se l'*estremità* sono fredde; se il *polso* è *tremalo*, o *formicante*; se il malato ha de' *sussulti* nei *tendini*; se la *vista* e l'*udito* sono poco meno che estinti; se rende involontariamente i suoi escrementi, v'ha luogo a temere una morte vicina.

§. III.

Vitto da prescriversi a coloro che sono affaliti da febbre lenta-nervosa.

IMporta moltissimo che il malato sia tenuto frescamente e tranquillo; il menomo movimento lo faticerebbe, gli cagionerebbe della fiacchezza, e de' svenimenti eziandio.

Il malato deve essere tenuto fresco e tranquillo. Perché?

Bisogna non solo sostenere il suo coraggio, ma ancora lusingarlo e avvivarlo colla speranza d'una pronta guarigione. Niente è più nocevole nelle febbri di questa specie, quanto il rappresentare all'immaginazione del malato delle idee tristi e spaventevoli. Si fatte idee avendo soventemente cagionato delle febbri nervose, non si può dubitare ch'esse non possano parimente aggravarle.

Bisogna sostenere il di lui coraggio, e lusingarlo colla speranza di guarire.

Bisogna guardarsi dall'indebolire il malato; conviene al contrario sostenere le di lui forze, e invigorirle con una dieta nutritiva, con de' cordiali. Perciò il *cremore d'avena*, la *panatella*, tutti gli *alimenti* che se gli porgeranno, devono essere meschiati col *vino*; avendo però sempre riguardo alla natura e all'intensità dei *sinomi*.

La dieta deve essere nutritiva e cordiale.

Del *siero di latte* apprestato col *vino*, del *negus legiero*, concio con del *suco d'arancia*, o di *cedro*, converranno per bevanda ordinaria. Il *siero di latte* apprestato col *senape* sarà del pari una bevanda convenevole in questa *febbre*.

Bevanda.

Il *vino*, qualora se ne potesse avere di naturale, sarebbe quasi il solo rimedio in questa malattia; imperocchè il buon *vino* possiede tutte le virtù de' cordiali, senza avere nessuna delle loro nocive qualità: dico il buon *vino*; perchè sebbene il lusso abbia reso questo liquore comune, è tuttavolta rarissimo di averne che sia naturale, pei poveri segnatamente, che non possono comperarne che in piccola quantità per volta (1).

Importanza del vino in questa malattia.

(1) I mali terribili, che risultano dalla maniera di adulterare i vini, e che sarebbe troppo lunga cosa il volere in que-

Ho spesso veduto de' malati attaccati di *febbre nervosa*, a' quali non si trovava quasi più *pulso*; avevano un *delirio* continuo; l'*estremità* fredde; in fine poco meno che tutti i *sintomi* della morte; pur tuttavia si ristabilirono, bevendo ciascun giorno una bottiglia di buon *vino* dentro il *siero* di *latte*, nel *cremore* *acquoso* di *avena*, nel *negus*, ec.

Si dee preferir il vino di Bordeaux vecchio.

Il buon *vino* di *Bordeaux* vecchio, è quello che conviene meglio in questi casi. Si può secondo le circostanze esibirlo puro, o meschiato colle bevande che abbiamo testè nominato.

In corto dire il grande affare in questa malattia sta nel sostenere le forze del malato, dandogli soventemente, e in piccole dosi, le bevande che abbiamo poc'anzi indicato, o qualsiasi altra di qualità calda e *cordiale*.

Bisogna guardarli dal troppo riscaldare il malato.

Bisogna per altro guardarsi bene dal riscaldare soverchiamente il malato, sia mediante le bevande, sia mediante le copertine, ec. Finalmente gli *alimenti* devono essere leggieri e dati in piccola quantità.

§. IV.

Rimedi che bisogna prescrivere nelle febbri lente-nervose.

Ipecacuana. Quando abbisogni ripeterla.

SE nel principio di questa malattia l'infermo soffre del peso e del dolore di *stomaco*; se sente delle voglie di vomitare, sarà necessario di dargli un blando *vomitivo*: quindici o venti grani d'*ipecacuana* in polvere finissima, o alcuni cucchiari di *sciloppo americo* corrisponderanno per lo più perfettamente a questa *indicazione*: si ripeterà la stessa dose il dì seguente, o il posdomane, sempre dentro i tre o quattro primi giorni, se i *sintomi* persistano.

Importanza de' vomitivi

Non solamente i *vomitivi* ripuliscono lo *stomaco*, ma ancora la *scoffa*, che ordinariamente cagionano,

sto luogo partitamente descrivere, meritano sempre più la vigilanza e l'attenzione del Governo. (Ved. Parte I, Cap. III, nota 9, 10, e 11.)

provoca la *traspirazione*, e procura molti altri eccellenti effetti nelle *febbri nervose*, dove non v'ha segno veruno d'*infiammazione*, e dove la Natura richiede d'essere rattivata.

Coloro che non vorranno cimentare un vomitivo, prescriveranno per ripulire le *prime vie*, una piccola dose di *rabarbaro* (2), o una infusione di *sena* e di *manna*.

Purgativo per coloro che non vorranno prendere l'emetico.

(Si può comporre cotesto *purgante* nella maniera seguente .

Maniera di manipolare questo purgante .

Prendete *sena*, due dramme ;
manna grassa, dalle due fino alle tre oncie .

Fate infondere dentro una pinta d'acqua bollente per due ore ; feltrate . Il malato ne prenderà d'ora in ora un bicchiere , fino che si senta muovere il ventre .)

In tutte le *febbri* il gran punto sta nel regolare il corso de' *simptomi* in maniera d'impedire, che non sieno estremi, nè in difetto. Così nelle *febbri* di genere *infiammatorio*, dove la forza della *circolazione* è soverchia, dove il *sangue* ha troppo di consistenza, e le *fibre* troppo di *rigidità*, la *cacciata di sangue* e le altre *evacuazioni* divengono necessarie : ma nelle *febbri nervose*, dove la Natura ha perduto il vigore, dove il *sangue* è disciolto, e senza consistenza, dove in fine i solidi sono indeboliti, devesi necessariamente evitare il *salasso* ; e deesi al contrario porgere il *vino* e gli altri *cordiali* in dosi generose .

Confronto tra il governo delle febbri infiammatorie con quello che conviene nella febbre lenta-nervosa .

Egli è tanto più necessario di raccomandare di non cacciar mai *sangue* in questo male, quanto più generalmente si osserva nei principj un *ristringimento* universale nei vasi, e talora al tempo stesso una *oppressione* e una difficoltà di *respirare*, che dà motivo di credere che v'abbia della *plethora*, cioè troppo *sangue*. Ho trovato delle persone, anche dell'arte, talmente ingannate su questo proposito dalle loro

La cacciata di sangue è assolutamente contraria a questa malattia, sebbene per qualche riguardo ella sembri indicata .

(2) Allorchè in tal caso si prende il *rabarbaro* solo, la dose ne è da una dramma fino alle due, infusa in uno o due bicchieri di *siero di latte vinoso*. Io l'ho parecchie volte adoperato in questa maniera con buon successo.

proprie sensazioni, che insistevano nel voler essere salassate, mentre era evidente che la *emissione* di *sangue* loro diveniva affatto contraria (3).

Ma

Neova
prova della
necessità di
stare atten-
tissimi ai
sintomi ca-
ratteristici
delle ma-
lattie.

(3) Queste riflessioni dell'Autore provano quanto bisogna stare attenti ai *sintomi* caratteristici delle malattie, e quanto moltiplicati debbano essere gli errori di coloro, che non anno dubbio su niente, e che dal primo istante che vedono un malato, francamente decidono del di lui stato. Noi vorremmo, e con tale intenzione fu appunto composta la presente Opera, ispirare nel cuore delle persone sensate, oneste, e caritatevoli della diffidenza in riguardo di quegli imprudenti che operano anzi di riflettere, o che non riflettono che per trarre applausi alle sciocaggini che commettono, con un'audacia che non ha esempio.

Errore in
qui strasci-
na la ne-
gligenza di
questo pre-
cetto.

Osserva-
zione.

Fui un giorno chiamato in campagna a vedere una giovane da alquanti giorni malata. Interrogo questa giovane, la esaminano con tutta l'attenzione di cui sono capace. Ripeto parecchie volte le mie domande, e nulla più scopro che una tristezza profonda e una noia estrema. Costesta giovane d'una *complexione* bastantemente forte, ma singolarmente sensibile, era priva del piacere di vedere un tale di cui n'era fortemente invaghita. Questo villaggio non era quello del soggiorno di sua famiglia; ma vi si era mandata solo perchè volevasi trovar maniera di cancellare dal di lei cuore delle impressioni che si vedevano con dispiacere.

Questo è quanto compresi dalle persone di casa, allorchè feci intendere, che questa giovane non era in verun conto ammalata; ma che aveva bisogno di distrazione e di allegria. Mi fu risposto in allora con sorpresa, che nel mentre aspettavano la mia venuta, un Cerusico aveva detto che questa giovane aveva della *febbre*; che bisognava senza indugio *cacciare le sangue*, e che le darebbe un pajo di medicamenti, per prevenire una malattia grave, da cui, per quanto soggiunse, era minacciata. Io insistei nel mio parere. Si ricondusse al suo paterno soggiorno questa pretesa malata, che rivedendo l'oggetto amato, ne rimase guarita.

Quali disordini non avrebbe cagionata una *cacciata di sangue* e de' *purgativi* in una persona data all'abbandono di se medesima, e stracciata dal dolore? In simile momento la Natura è senza sostegno, e le *fibre* sono nel rilassamento il più grande. In luogo di pensare ad evacuare, bisognava ravvivare e invigorire; e certamente non v'era *cordiale* più valido per questa giovane, che la vista dell'oggetto bramato.

D'altra parte, di che non è capace un uomo che ha la temerità di supporre una *febbre*, per dar luogo ad una *cacciata di*

sangue

Ma se la cacciata di sangue è in generale contraria in questo male, i *vescicatorj* ci sono assolutamente necessarj. Essi possono essere applicati con massimo vantaggio in tutti i tempi della malattia. Se il malato è preso da *delirio*, bisogna applicare i *vescicatorj* al collo o alla testa; e finchè la stupidità continua, ciò che v'ha di meglio a fare è, che appena lo spurgo del *vescicatorio* si diminuisce, applicarne un altro in sito diverso, a fine d'intertenervi con ciò una *evacuazione* perenne, fino a tanto che l'infermo si trovi fuor di pericolo.

Non v'ha malattia alcuna, dove abbia osservato gli vantaggi de' *vescicatorj* in una maniera così sensibile, come nella presente. Non solo eccitano la *circolazione* collo stimolare i *solidi*, ma cagionano eziandio una *evacuazione* continua, che può in qualche guisa supplire alle *evacuazioni critiche*, che sono rarissime in questa specie di *febbre*.

Che che ne sia, il momento il più convenevole per applicarsi è verso il principio della malattia, o quando s'annunzi un certo grado di *stupidità*, nel qual caso devonfi applicare sopra il capo (4).

I vescicatorj ci sono necessarj. Dove debbansi applicare.

Bisogna mantenere lo spurgo de' vescicatorj finchè il malato sia fuor di pericolo. Avvantaggi de' vescicatorj in questo male.

In qual tempo del male si debbano applicare.

sangue, e di dire che una grave malattia minaccia, per vendere de' medicamenti? Giacchè si sa che ne' Villaggi, ne' Borghi, ed anche nelle piccole Città, i Chirurghi, ec. preparano da loro stessi i *rimedi*, per venderli in seguito ai malati.

Era senza dubbio un ignorante di questa specie, colui che a ciò che alcuno fortemente gli rinfacciava di voler rendere malate le persone, per avere il piacere di curarle, rispondeva, tra le altre cose: Del resto, o Signore, bisogna che ciascheduno viva del suo stato. Certamente che costui non aveva nè pure la prima idea d'un'Arte ch'egli disonorava e profanava.

(4) I *vescicatorj* sembrano agire per due mezzi nello stesso tempo, per via del dolore e del calore: effetti necessarj dell'*irritazione* che cagionano. Tal è il sentimento d'*IPROCRATE*, a cui s'era trasferito dall'analogia, osservando che nelle malattie, che da se stesse guarivano mediante le *parassidi*, le *ulcere*, ec. la Natura non metteva in opra verun altro agente. Il perchè vediamo, ch'egli si serviva di *vescicatorj* ogni volta ch'era giovevole il rendere universale la malattia, per indebolirne il fomite, estendendolo e distribuen-

Maniera con cui agiscono i vescicatorj.

Così biso-
gna fare al-
lorche il
malato è
stitico ;

Se nel corso della malattia l'infermo è stitico, sarà necessario di procurargli alcuni *scarichi*, applicandogli ogni due giorni un *clistere* composto di metà di *latte*, e metà d' *acqua* con un po' di *zucchero* : vi si aggiungerà un cucchiaino di *sal comune*, s'ei non produce l'effetto bramato.

Allorche è
troppo in-
brico ;

Se per lo contrario sopravvenga al malato una *scorrenza* notabile di *ventre*, conviene dargli per arrestarla delle piccole dosi di *teriacca* a molte riprese per giorno; se gli farà prendere per bevanda ordinaria il *decocto bianco*.

dolo sopra tutti gli *organi*. Credeva dunque che il dolore disponesse la parte a richiamare e a caricarsi della materia morbosa: per conseguenza che un dolore prodotto dall'arte, più vivo del naturale, diminuendo o annullando quest'ultimo, fosse bastante di fare per lo meno una diversione salutare, un trasporto del male; e che il calore per la sua virtù attrattiva fissare potesse la materia morbosa nella parte cui si applicavano i *vescicatorj*, donde essa scorreva al di fuori.

Pregiudizi
del popolo
circa i ve-
scicatorj.

Ma il volgo è ben lontano dall'adottare questo sentimento. Egli ha sul proposito de' *vescicatorj* altrettanti pregiudizj, quanti ne ha sulla *chinachina*. Non vede negli effetti dei primi che un dolore puramente gratuito, e una *piaga* per lo meno superflua. Quando noi proponiamo i *vescicatorj*, a qual pro, ci dice la maggior parte delle persone, tormentare questo malato? Egli è bastantemente da compiangersi, senza aumentare i suoi patimenti: se bisogna che muoja, lasciamolo tranquillamente morire; e qualora mai sia che riabbi, almeno non avrà motivo di rimproverarci di avergli fatto delle piaghe, che levandogli l'uso delle gambe o d'altre parti per un tempo notabile, non faranno che prolungare il suo male. Gli assistenti al malato per appoggiare sì fatti discorsi, non mancano di riferire degl' *esempi* immaginari di persone, o che sono restate inferme pel resto dei loro giorni, o che sono morte in conseguenza de' *vescicatorj*.

Vera idea
che si dee
formarsi de'
vescicatorj.

Tuttavolta non temeremo di dire, che questo è uno de' *rimedj* più possenti tra tutti quelli che possiede la Medicina; che quando sia applicato a tempo e condotto con prudenza, ei salva de' malati, la di cui morte è certa senza la loro applicazione; e che oltre gli vantaggi inestimabili nella malattia, su cui di presente si tratta, sono i *vescicatorj* i soli *rimedj* capaci di avvivar i sensi nei casi di *apoplessia*, di *asfopimanto*, di *letargo*, e di *paralisi*.

Rimedi contro la febbre lente-nervosa. 131

Si vède talvolta verso il nono o decimo giorno comparire una *eruzione migliare*. Siccome questa *eruzione* è soventemente *critica*, fa di mestiere di ben guardarsi dall'opporli al corso della Natura in questa operazione. Ella non deve essere arrestata nè per via del *salasso*, nè di altre *evacuazioni*; come nemmeno deesi eccitare mediante un *visto* riscaldante. Devesi al contrario sostenere le forze del malato mercè di *blandi cordiali*; tali sono il *siero di latte vinoso*, il *negus* leggiere, o il *cremore di sagou* mescolato con un po' di *vino*, ec. Non si terrà soverchiamente caldo il malato; si avrà però gran cura di non sopprimere un *sudore* blando e moderato, che ha luogo in questo caso.

Tutto che i *vescicatorj* e i *cordiali* sieno i *rimedj* principali in questo male, per coloro però che ne vorranno mettere in opra degli altri, noi indicheremo una o due *formule* di *rimedj*, che si prescrivono ordinariamente contro la *febbre lente-nervosa* (a).

Ne' casi disperati, allorchè il malato abbia il *singhiozzo*; de' *sussulti* nei *tendini*, ec. ho veduto degli effetti straordinari dal *muschio*, dato più volte per giorno in gran dose. Il *muschio* è senza dubbio un eccellente *antispa-smodico*: si può arrivare sino ai venti, ventiquattro grani, ripetuti tre o quattro volte

Allorchè sopraggiunga una eruzione migliare.

Rimedi indipendentemente dai vescicatorj e dai cordiali.

Cosa si dee somministrare allorchè il malato abbia il singhiozzo, ec. Il muschio solo.

(a) Allorchè il malato è debolissimo si può dargli un *bocconcino*, composto nella seguente maniera.

Prendete radice di *serpentaria virginiana*,) di ciascuna
di *contrajerva*,) dieci grani;
castoreo,) cinque grani.

Tritate tutto in un mortajo, e riducete in polvere finissima: fattene un *bocconcino* con un po' di *confezione cordiale*, o di *sciloppo di zafferano*.

Bocconcino per quando il malato è debolissimo.

Si darà questo *bocconcino* ogni quattro o cinque ore.

Si può ancora adoperare per lo stesso effetto la polvere seguente.

Prendete radice di *valeriana alvestre*,) venti grani;
zafferano) di ciascheduno quattro grani.
castoreo)

Polvere nello stesso caso.

Tritate tutto insieme in un mortajo, e riducete in polvere finissima. Si dà questa dose tre o quattro volte al giorno in un bicchiere di *siero di latte vinoso*.

dentro le ventiquattr'ore, ed anco più sovente, a norma delle circostanze.

Il muschio
combinato
con la can-
fora e il
sal volatile
di corno di
cervio.

E' necessario talvolta di aggiugnere al *muschio* alcuni granelli di *canfora* e di *sal volatile* di corno di *cervio*, siccome dotati della facoltà di eccitare la *traspirazione* e l'*orine*.

Si prepara questo *rimedio* nella seguente forma.

Prendete del *muschio*, quindici grani;
canfora, tre grani;
sal volatile di corno di *cervio*, sei grani.

Fatene un bocconcino con un poco di *sciloppo comune*.

Si esibisce questo *rimedio* come lo abbiamo qui sopra prescritto.

Allorchè
la febbre
diviene in-
termitten-
te, la chi-
nachina in
sostanza;

Se questa *febbre* diviene *intermittente*, il che accade spessissimo nella sua declinazione; o se le forze del malato sieno esaurite da' sudori *colliquativi*, ec. bisogna prescrivere la *chinachina*. Si darà una mezza dramma, anzi una dramma di questa corteccia in polvere, dentro un bicchieretto di *vino di Porto* o di *Bordeaux*. Si ripeterà questa dose tre o quattro volte per giorno, se lo *stomaco* del malato può tollerarla.

In infusio-
ne.

Se la *chinachina* in sostanza è difficile a passare, si farà infondere a freddo un'oncia di questa corteccia dentro una bottiglia di *vino di Reno* o di *Portogallo*, per due o tre giorni; e dopo averla ridotta a chiarezza, se ne porgerà un bicchierino al malato parecchie volte per giorno (b).

In quante
specie di
febbre si
può ammi-
nistare la
chinachi-
na.

Ci sono de' Medici, che prescrivono la *chinachina* in questa *febbre* e in varie altre (qualora non vi sieno indizj d'*infiammazione*), senza darfi pena se la *febbre* sia *intermittente* o *remittente*. Noi non pos-

(b) La *chinachina* conviene ancora infusa in altri *liquor* *cordiali*, nella seguente maniera.

Altra ma-
niera di
admini-
strare la
chinachi-
na.

Prendete *chinachina* della migliore, un'oncia;
scorza di *arancia*, mezz'oncia;
radice di *serpentaria virginiana*, due dramme;
zafferano, una dramma.

Riducete il tutto in polvere; lasciate infondere per tre o quattro giorni in una foglietta di ottima *acquavite*; feltrate.

Se ne danno due cucchiaj da caffè tre o quattro volte al giorno, in un bicchierino di *vino* leggero o di *negus*.

fiamo dire fino a qual punto le osservazioni future accrediteranno gli vantaggi di sì fatta pratica; ma dobbiamo credere che la *chinachina* sia un *febrifugo* universalissimo, e che può essere amministrata nella maggior parte delle *febbri*, nelle quali il *salasso* non è necessario, e dove non si discopre *infiammazione* alcuna *locale* (5).

(Per il governo della *convalescenza*, Ved. §. III, del Cap. II, di questo Vol.)

CAPITOLO NONO.

Della febbre maligna, putrida, porporina, o *petecchiale* (1).

Questa febbre può appellarsi la *febbre pestilenziale* di Europa, perchè la maggior parte de' suoi *sintomi* le danno la massima rassomiglianza con quel terribile morbo, conosciuto sotto il nome di *Peste* (2).

Questa febbre può essere chiamata la *febbre pestilenziale* di Europa. Perchè?

(5) Si passerà a vedere nel Capitolo seguente, che lo stesso Sig. BUCHAN non attende, per prescrivere la *chinachina*, che la febbre abbia il carattere d' *intermittente* o di *remittente*. Si può esporre come legge generale, che la *chinachina* è il migliore rimedio cognito contro tutte le febbri, di cui la cagione è una *degenerazione d'umori*: ora tutte le febbri, eccetto quelle che sono *inflammatorie*, riconoscono una tale cagione.

In tutte quelle dove la cagione è una *degenerazione d'umori*.

(1) (Ved. di sopra Cap. II, nota 2 e 3 pag. 14 e 15. di questo Vol. e nella Tavola la parola *Petecchie*.)

(2) Noi abbiamo fatto vedere nel Cap. IV, nota 1 di questo Vol., per qual ragione il Sig. BUCHAN dava ad una stessa febbre i nomi di *acuta*, di *ardente*, e di *inflammatoria*; e abbiamo riferito la testimonianza del Sig. LE ROY, che prova che queste denominazioni, di cui gli Autori anno fatto altrettante febbri particolari, non significavano che il grado della stessa febbre.

Lo stesso ragionamento si dee applicare alla *febbre maligna*. Si dà questo nome alla febbre la più micidiale e la più *contagiosa*. Ecco perchè l'Autore dice, ch'ella potrebbe appellarsi la *peste d'Europa*. Ora, la *porpora*, le *petecchie*, e la *purpura* degli umori rendono una *febbre contagiosissima*, nè questa invade giammai senza minacciare più o meno di

Perchè si dia cotesta denominazione alla febbre putrida, porporina, o petecchiale.

Chi sono
quelli che
vanno più
fortoposti
alla febbre
maligna.
Cosa deb-
basi inten-
dere per
febbre ma-
ligna.

Le persone d'una debole *costituzione* e d'un *temperamento melanconico*; quelle le di cui forze sono state esaurite da lunghi digiuni, da veglie, da lavori gravosi e faticosi, dall'eccesso de' piaceri d'amore, dalle *salivazioni* frequenti, ec. sono quelle che più ci vanno soggette.

§. I.

Cagioni della febbre maligna, putrida, porporina, o petecchiata.

L'aria mal-
sana; ciò
che la ren-
de comune
nelle pri-
gioni, ne-
gli spedali,
infermerie,
ec.

LA *febbre maligna*, ec. è cagionata dall'*aria* mal-sana, come quella che si respira da coloro che abitano in luoghi bassi, e dove non si presta avvertenza di ventilarli; tal'è ancora quella che rimane corrotta dalle emanazioni *putride* degli *animali* e de' *vegetabili putrescenti*, ec. Così questa *febbre* è comunissima nelle prigioni, negli spedali, nell'infermerie, massimamente quando vi si raduni troppa gente, qualora sì fatti luoghi non sieno bastevolmente ariati, o che la *mondazza* vi sia negletta (3).

pericolo. Tali sono dunque le *febbri maligne*, in tutta la estensione del termine; e non si avrà la menoma esitanza a persuadermene, se come l'abbiamo avanzato nel corso della nota or' ora citata, non si puòa meno di restare convinti che la Natura non ci presenta che due sole spezie di *febbre acuta continua*, la *benigna* e la *maligna*.

Ma s'è fatto di questa ultima, come della prima: se le diede il nome del *sintomo* il più apparente. Si appellò *febbre maligna porporina*, *febbre maligna petecchiata*, o semplicemente *febbre porporina*, *febbre petecchiata*, allorchè l'eruzione conosciuta sotto il nome di *porpora* e di *petecchie*, dominava al di sopra di tutti gli altri *sintomi*: *febbre putrida*, allorchè la *pusitidità* degli umori e degli escrementi si rendeva più di tutto manifesta; e *febbre maligna* solo, qualora tutti i *sintomi* pericolosi della malignità si trovavano ad un grado tale, che non v'era più ragione di chiamarla anzi *putrida* che *porporina*, o piuttosto *porporina* che *putrida*. Il Sig. BUCHAN ha dunque ragione di trattare di queste tre pretese spezie di *febbre*, sotto una sola ed unica denominazione. Della *febbre porporina* delle donne di parto si parlerà Tom. IV, Cap. I, §. VI, Art. VII.

(3) Quindi gl'infermi, che sono trasportati allo spedale,

L'aria esteriore che non circola liberamente; ch'è incessantemente inumidita dalle pioggie e dalle folte nebbie, cagiona parimente le *febbri maligne*, ec. Si vedono altresì succedere soventemente alle grandi inondazioni nei paesi bassi e di maremma, massimamente quando queste inondazioni sono precedute o seguite da eccessivi calori.

Una nutrizione di sostanze puramente animali, senza essere frammischiata, come conviene, di *vegetabili*; o di carne, e di pesci serbati troppo a lungo, possono egualmente originare questa specie di *febbre* (4). Quindi i marinaj nei viaggi di lunga corsa, e gli abitanti delle Città assediate, sono spesso infetti da *febbri maligne*.

Le biade guaste dalle pioggie, e per essere state troppo lungamente conservate, l'acque stagnanti, danno altresì motivo a queste stesse *febbri*.

I cadaveri che nel *putrefarsi* avvelenano l'aria, massime nelle stagioni calde, sono capacissimi di far nascere le *febbri maligne*. Per la qual cosa questa specie di *febbri* devasta soventemente gli accampamenti e i luoghi dove trovasi il teatro della guerra; il che ci dimostra la necessità di ritlegare ad una certa distanza dalle Città i cimiterj, i macelli, ec. (Ved. Parte Prima, Cap. IV, nota 1, e Cap. IX, nota 3.)

Le sostanze animali conservate troppo a lungo.

Le biade guaste, l'acqua stagnante:

I cadaveri in putrefazione:

anno non solamente a lottare contro la malattia da cui sono affaliti; anno ancora a combattere contro tutte quelle a cui li espone l'aria che respirano. L'attenzione che in alcuni spedali si presta, di assembrare in una stessa sala i malati infetti dallo stesso morbo, è saggiissima: ma ella diverrà inutile, finchè le sale avranno comunicazione tra loro: finchè l'aria delle sale che rinchiudono de'malati tocchi di malattie *contagiose*, si confonderà incessantemente con quella dell'altre sale.

Il solo mezzo di preservare i malati dagli effetti funesti di quest'aria venefica, è dunque di rendere isolata ciascheduna sala, e di costruirle ad una distanza notabile le une dall'altre. (Ved. Tom. I, Cap. X e XI, §. II.)

(4) Otto persone, dice il Sig. TISSOT, mangiarono del pesce fradico: tutte furono affalite da *febbre maligna*, e cinque ne perirono, malgrado le cure sollecite dei più esperti Medici. (Avis au peuple, T. I, pag. 255.)

osservazione.

L'immon-
dezza:

La immondezza è parimente una delle cagioni generali delle *febbri maligne*. Noi vediamo per conseguenza, ch'esse sono assai comuni dentro le grandi Città, tra i poveri, che respirano un'aria riserrata e malsana, che trascurano la *politezza*, e che sono sforzati a vivere di *alimenti* guasti e corrotti. Niente meno poi lo sono tra quegli artigiani che lavorano in mestieri sudicj, e che sono obbligati a starcene costantemente racchiusi.

Le affezio-
ni dell'a-
nima:

Le avversità, le disgrazie, la tristezza, il cordoglio, devono entrare nella classe delle cagioni, che possono dar motivo alla *febbre maligna*. (5)

La conta-
gione.

Aggiungeremo ancora, che la *febbre putrida*, *maligna* o *porporina*, è *contagiosa* al sommo grado; l'onde ella si comunica sovente dalla sola *contagione*: e per ciò stesso ogni persona di buona salute deve fuggire coloro che sono infetti da questa specie di *febbre*, quando delle ragioni assolutamente indispensabili non obblighino a trattenervisi da vicino (6).

La prin-
cipal sede
della feb-
bre mali-
gna è den-
tro i ner-
vi.

(5) Non si può dubitare che la *febbre maligna* non abbia la sua principal sede nei *nervi* e nel *cervello*. Io trovò in ciò solo, dice il Sig. LIEUTAUD, un carattere che vale benissimo a distinguerla dall'altre specie di *febbre*. E' vero che alcune di queste ultime sono soventemente accoppiate alle medesime affezioni *cerebrali* e *nervose*; ma esse non ci sono che passeggiere e *sintomatiche*, laddove poi formano l'essenziale corredo in tutti i tempi della *febbre maligna*. Un altro fatto, di cui posso rendermi testimonianza, che prova in qualche guisa ciò che avanzo; è che i due terzi almeno di coloro che ho veduto sopraffatti da *febbre maligna*, si trovavano in qualche avversità, o avevano avuto qualche rattristamento o de' travagli di spirito; sorgente occulta d'una infinità di mali. (*Précis de la Méd. Prat.* T. I; p. 41.)

Sintomi
precurfori.
Non v'è
che coloro
i quali so-
no utili al
malato che
debbono
accompanyar-
segli.

(6) Non v'ha che il desiderio di esser utile al malato, che possa spingere ad accostarsegli. Ora abbiamo fatto vedere Part. I, Cap. X, not. 1, e Cap. XI, §. II, not. 3, che non solamente gli ammalati anno dell'avversione per la compagnia, ma ancora che non anno bisogno che d'un custode, e d'un assistente per quando si devono cangiare. Forza è dunque in tal momento, senza timore di apparire rigidi o insensibili, negare l'ingresso nella camera del malato al padre, alla madre, ai fratelli, forelle, amici, ec. Un Medico, o qualsivoglia altra persona caritatevole e benefattrice, che strap-

§. II.

*Sintomi della febbre maligna, putrida, porporina,
o petecchiale.*

LA febbre maligna in generale si annunzia da una notevole *fiacchezza*; dà *lassezze spontanee* e senza veruna causa apparente. Alle volte questa debolezza è sì grande, che il malato può appena camminare, o anco reggersi in piedi, senza timore di sentirsi mancare: egli è nel sommo dell' *abbattimento*: sospira: perde di coraggio: è colpito dal timor della morte.

*Sintomi
precuratori*

Prova delle *nausee*; e vomita talvolta della *bile*: soffre un violento dolore di capo, accompagnato da *pulsazione* o battimento delle *arterie temporali*. Gli occhi compariscono di spesso *rossi* e infiammati, e risente l'infermo del dolore nel fondo dell' *orbite*. Se gli fa sentire un *ronzio* nell' *orecchio*: la *respirazione* è laboriosa, e sovente interrotta da *sospiri*.

Si lagna di dolori nella *regione dello stomaco*, nel dorso e nei *reni*: la lingua è dapprima bianca; ma diviene poscia *nera* e screpolata: i denti si coprono di *tartaro* in forma di *crosta* *nericcia*. Il malato caccia fuori talora de' *lombrici* per alto e pel basso; *abbrivida*; trema, e sovente *delira*.

*Sintomi
caratteristici*

Se si punge la vena, il *sangue* appare disciolto, o di pochissima consistenza, e si *putrefa* prontamente. Le *dejezioni* sono *fetidissime*, e talvolta *verdastr*e, nere, o di colore *rossigno*. La *pelle* si copre sovente di *macchie pallide*, *porporine*, *livide*, *brune*, o nere;

pa dalle mani di morte uno de' suoi simili, ha senza dubbio qualche diritto di esigere la riconoscenza della società. E ne sarà poi men degno, qualora abbia la fermezza di opporsi onde alcune persone fornite di buona salute non si precipitino, sotto l'apparenza d'un zelo quasi sempre infruttuoso e sovente nocivo, in una malattia, dalla quale è quasi impossibile di scapparne, e di cui le conseguenze sono sempre funeste, qualora pur non sieno mortali?

e talora sopravvengono delle impetuose *emorragie* dalla bocca, dal naso, dagli occhi, ec. (7).

(A questa enumerazione di *sintomi* aggiungeremo, che il *pulso* è *piccolo*, *veloce*, e *duro*, talvolta molle e languido, e sovente *intermittente*: che la *pelle* è secca, arida, e adusta, e tal'altra fiata fredda e viscosa. Ho veduto in una zitella di quattordici in quindici anni, la quale è perita da questo terribile morbo, la *pelle* raggrinzata e dissecata, massime nell'estremità delle dita, presso poco come quella di coloro che abbiano lungamente tenute le mani nell'acqua; e il duodecimo giorno della sua malattia si ritrovarono sopra le copertine del letto de' gran pezzi di *cuticola*, ch'ella s'era stracciata dalle mani e dalle braccia, le quali n'erano affatto scojate. Il dorso, le natiche, e una parte delle coscie, si sono scagliate nella stessa forma.)

Ciò che distingue le febbri maligne da quelle che sono puramente infiammatorie;

Dalle febbri lente o nervose.

Questa distinzione è talora difficilissima da farsi.

Come bisogna con-

Si possono distinguere le *febbri maligne* da quelle che sono puramente *infiammatorie*, dalla *piccolezza* del *pulso*, dal grande *abbattimento* del malato, dallo stato dissolto del *sangue*, dalle *petecchie*, o macchie *porporine*, e dalla *putridità* infetta de' suoi escrementi.

Si distinguono parimente dalle *febbri lente* o *nervose*, mediante il calore, o la sete, che sono più notabili, dal calore più carico dell'*urina*, in fine dalla *prostrazione* di *forze*, e da tutti gli altri *sintomi* che sono portati all'estremo.

Accade però talvolta, che i *sintomi* delle *febbri infiammatorie*, *nervose*, e *maligne*, sono talmente meschiati insieme nella *febbre* che si ha da curare, ch'è difficilissimo di determinare a qual classe ella appartenga. Allora devonfi adoperare le più grandi cautele, e usare tutto il sapere di cui taluno è capace.

Fa dunque mestieri di cominciare dal rivolgere la

(7) La *putrefazione* del *sangue* e le *macchie porporine*, poste qui nel rango dei *sintomi* comuni della *febbre maligna*, giustificano quanto abbiamo detto di sopra nella nota 2 di questo Cap.

propria attenzione verso i *sintomi* predominanti, e darli in tal caso. prescrivere il *visso* e i *rimedj* ch'essi esigono.

Importa moltissimo di riflettere che le *febbri infiammatorie* e *nervose* possono convertirsi in *maligne* e *putride*, per via d'un *visso* troppo *riscaldante*, o per via di *rimedj* contrarj. (Ved. Cap. IV, in fine della nota 1 di questo Vol.)

Le febbri infiammatorie e nervose possono convertirsi in maligne.

Non è facile di fissare la durata delle *febbri maligne*. Talora esse terminano tra il settimo e quarto decimo giorno, e tal'altra volta vanno al di là della quinta o sesta settimana. E' però necessario assai d'osservare che la loro durata dipende molto dalla *costituzione* dal malato, e dalla maniera con cui il suo male viene trattato (8).

Non è facile di fissare la durata delle febbri maligne.

I *sintomi* i più favorevoli sono un *flusso* di corpo Sintomi favorevoli.

(8) Il Sig. LE ROY antico Professore di Montpellier ha osservato che le *febbri maligne* anno de' caratteri differentissimi, relativamente all'età delle persone che ne sono attaccate. Per la qual cosa le ha egli divise in *febbre maligna* di *gioventù*, e in *febbre maligna* della *vecchiaia*. Noi vorremmo poter esporre le ragioni, sulle quali è fondata questa luminosa divisione; ma si fatta impresa ci condurrebbe al di là dei confini che ci siamo prescritti, e d'altra parte sarebbe straniera al nostro obbietto.

La loro durata è regolata all'età del malato.

Noi ci restringeremo a riferire ciò ch'egli dice della durata di questa specie di *febbre*.

„ Nella *febbre maligna de' vecchi*, i malati muojono talvolta l'ottavo o il nono giorno della malattia, più sovente l'undecimo o il decimo terzo. Io non l'ho mai veduta in alcuno, in cui terminando colla morte, si sia estesa al di là di questo termine. Allorchè questa malattia non toglie di vita il malato, essa può lasciare dietro di se alcune impressioni fastidiose e durevoli, che lo fanno lungamente languire, e per le quali alcuna volta soccombe „

Esse sono meno lunghe presso de' vecchi.

„ La *febbre maligna de' giovani*, ancorchè perigliosa, lo è però molto meno di quella de' *vecchi*. Allorchè il malato se ne libera, ella è d'ordinario assai lunga, qualora però non venga a terminarsi per via d'una *crisi*. Di rado finisce prima dei venticinque o trenta giorni: sovente si estende ai quaranta cinque, ai sessanta, talvolta anco al di là: e in questa specie di *febbre maligna* accade talora, che dopo averla passata assai male per quindici, venti, sino a trenta giorni, nulladimeno i malati la scappano bene „

Più lunghe, ma meno pericolose presso i giovani.

(*Mélanges de Phys. & de Méd.* pag. 171, 186, 187.)

leggero verso il quarto o quinto giorno, accompagnato da leggero calore e da sudore moderato. E quando questi durano un certo tempo, portano seco di sovente il male: devesi per tanto avere grande avvertenza di non arrestarli.

Le *pustolete migliari*, che spuntano tra le *petecchie* (Ved. Cap. II, nota 2, e 3 di questo Vol.) o le *macchie porporine*, sono ancora un *sintomo* favorevole, come pure quella specie di *scabbia*, di cui le labbra ed il naso si coprono verso il termine.

Buon segno si è quando il *polso* si solleva mediante l'uso del *vino*, o di qualsivoglia altro *cordiale*, e che si diminuiscono i *sintomi nervosi*, di cui abbiamo favellato.

La *sordità* sopraggiungendo verso il declinare della malattia è spessissimo un *sintomo* vantaggioso del pari (a); così pure i *tumori* e gli *ascessi* all' *anguinaglia* o alle *parotidi*, ec. (g)

Sintomi di pericolo.

Si può contare, tra i *sintomi* i più avversi, una *diarrea* eccessiva col ventre duro e tumido; delle *macchie* larghe, nere, livide sopra la *pelle*; delle *afte* nella bocca; de' *sudori* freddi e viscosi; la *gotta serena*, o la *cecità*.

(Accade però talvolta, che la *cecità*, o la *gotta serena*, abbia l'evento stesso della *sordità*; che col progresso del tempo si dissipi, e anche nel tempo stesso del male.)

Il cangiamento della voce; la vista smarrita; la difficoltà d'inghiottire; il tremito della lingua, e l'impossibilità di spingerla fuori della bocca; la propensione costante del malato a discoprirsì il *petto*, sono ancora de' *sintomi* infauti.

(a) La *sordità* non è sempre un *sintomo* favorevole in questa malattia: può anche darsi ch'ella non abbia sì fatto carattere, se non quando è cagionata da una *postema* formata dentro l'orecchio.

(g) Questi *tumori*, che sono di buon presagio alla gioventù, perchè sono *critici*, riescono, dice il Sig. LE ROY, ordinariamente *sintomatici* presso de' vecchi, e annunziano una morte vicina: le *macchie porporine* o *petecchiali*, sono alle volte, ma più di rado, della stessa natura.

Allorchè da ultimo il sudore e la scialiva sono tinfatti di sangue, e che l'orine sono nere, o depongono un sedimento di simil colore, il malato si trova in grande pericolo. Il sussulto de' tendini, le defezioni feride, icorose, (cioè assai chiare ed acquose) e involontarie, accompagnate da freddo all'estremità, sono in generale i forieri di morte.

Sintomi mortali.

§. III.

Visto che bisogna prescrivere ai malati attaccati da febbre maligna, putrida, porporina, o pericchiele.

NEL governo di questa malattia tutti i nostri sforzi devonfi dirigere a combattere, quanto è mai possibile, la disposizione degli umori alla putrescenza; a sostenere le forze dell'infermo; ad ispirargli del coraggio; a concorrere con la Natura operosa ad espellere la cagione del male, per via d'una dolce traspirazione e dell'altre evacuazioni.

Scopo che dee propriarsi in questo male.

Abbiamo osservato che l'aria malsana produce sovente le febbri putride: in conseguenza ella dee contribuire ad aggravarle, qualora il malato vi rimanga esposto; si deve dunque cominciare dall'impedire che l'aria non stagni nella camera del malato: a questo oggetto si apriranno le porte e le finestre della di lui stanza, o di quella da lato, a fine di rinfrescare l'aria, e di rinnovellarla perennemente. (Ved. Parte I, Cap. IV, e nota 5.) Avvegnachè la respirazione e la traspirazione delle persone anco in salute rendono ben tosto malsana l'aria d'un piccolo appartamento, questo effetto sarà ancora più pronto, se questa respirazione e traspirazione vengano da una persona, di cui tutta la massa degli umori è in istato di putrescenza.

Bisogna cominciare dal procurare al malato un'aria pura e fresca.

Non basta d'introdurre un'aria fresca dentro la camera del malato; fa di mestieri ancora mettere in opra l'aceto, l'agresta, il succo di cedro, di arancia, o di qualsivoglia altro vegetabile acido che si potrà procacciarsi il più prontamente; d'uopo è spruzzar-

A spruzzare la camera, il letto, ec. con de' succhi acidi;

ne sovente il letto, il pavimento, e tutte le pareti della camera.

Orvero ridurli in vapore. Si potrà ancora ridurre tutti costesti *acidi* in vapore, gettandoli sopra una palettina infocata, o facendoli bollire dentro la stanza, ec.

Farli finire dal malato. Devesi parimenti collocare in differenti siti della stanza delle scorze fresche di *cedro* e di *arancia*, e presentarne soventemente a fiutare al malato.

Vantaggi di si fatti vapori. Gli *acidi* adoperati in questa maniera tenderanno non solo a rinfrescare il malato, ma a preservare eziandio dalla *contagione* coloro che lo servono.

Utilità delle piante di odore acuto. Le piante il di cui odore è acuto, tali sono la *ru- ta*, il *sanaceto*, l'*assenzio*, ec. possono essere egualmente collocate in differenti posti della casa, e le persone che anno cura del malato, non possono fare di meglio che fiutarle soventemente.

Bisogna che l'infermo sia agiatamente, e che niente lo importuni. Non solamente fa d'uopo che il malato sia tenuto frescamente, ma bisogna altresì ch'egli si trovi agiatamente, e che niente lo importuni; il menomo strepito è capace di turbargli il capo, e il menomo movimento di farlo cadere nella *sincope*.

Le bevande, e gli alimenti devono essere acidulati. Ci sono pochi *rimedj* in questa malattia più importanti degli *acidi*. (Ved. Cap. II, nota 8 di questo Vol.) Devesi metterne in tutti gli *alimenti*, come pure dentro tutte le bevande del malato. Il *siero* di latte preparato coll'*arancia*, col *cedro*, o coll'*aceto*, è convenientissimo. Si dee apprestarlo in queste tre maniere a vicenda, o secondo il gusto del malato. Si può renderlo *cordiale* aggiungendovi del *vino*, per quanto la debolezza del malato sembrerà richiederlo.

Bevanda allorché il malato è assai sfinite, e che ha scorrenza di ventre; Se il malato è assai sfinite, se gli darà del *negus*, o del *vino* temperato per metà coll'acqua, o *acidulato* con il *succo* di *arancia* o di *cedro*. In alcuni casi se gli può accordare del *vino* puro: il migliore in allora è il *vino* di *Reno*; ma se v'abbia *smossa* di corpo, bisogna preferire il *vino* di *Porto* o quello di *Bordeaux*.

Allorché ha il dolo. Allorché il ventre è restio, si porgerà al malato in un bicchiere della sua bevanda ordinaria un cucchiaino di caffè di *fior di tartaro*, più o meno secondo le circostanze; oppure se gli darà per *tisana* una

decozione di *samarindo*, che ha il doppio vantaggio di lubrificare il ventre e di smorzare la sete.

L'*infusione* de' fiori di *camomilla* per quanto lo *stomaco* potrà tollerarla, è bevanda assai convenevole in questo morbo. Si può *acidularla*, aggiungendo a cadaun bicchiere dieci o dodici goccioline di *elissire* di *vitriolo*.

Infusione di fiori di camomilla acidulata.

Gli *alimenti* in questo male vogliono essere leggieri; essi consistiranno nel *cremore* di *avena*, nella *panatella*, ec. a' quali si aggiungerà un po' di *vino*, se il malato è debole e abbattuto. Si fatti *alimenti* saranno tutti *acidulati* con il *succo* di *arancia*, colla *gelatina* di *uva spina*, ec. Il malato può mangiare con tutta sicurezza delle frutta mature, cotte sia al forno, sia al fuoco, o anco crude; tali sono i *pomi*, l'*uva spina*, l'*amarasche* condite, le *prugna*, ec. (Ved. Cap. I, §. III, Artic. I, e Cap. IV, nota 3 di questo Vol.)

Quali debbano essere gli alimenti.

Non bisogna giammai in questa malattia lasciare lungamente il malato senza nutrimento. Un poco di *alimento* o di bevanda data con frequenza, non solamente sostiene le forze, ma ancora mette ostacolo alla tendenza degli umori alla *putrefazione*: per ciò stesso deesi dargli soventemente tra giorno delle piccole quantità di alcune delle bevande *acide* raccomandate dianzi, o di ciò che riuscirà gradevole al suo palato, o che potrà procacciarsi più agevolmente (10).

E' importante di dare frequentemente da bere e da mangiare al malato.

Nel caso che il malato avesse del *delirio*, bisognerebbe *fomentargli* soventemente i piedi e le mani con una forte *infusione* di fiori di *camomilla*. Questa *infusione*, o quella di *chinachina* per quelli che potranno farne la spesa, non mancherà di produrre il migliore effetto.

Così debbasi fare alorchè il malato abbia il delirio.

Li *fomenti* di questa specie non solamente alleggeriscono il capo dilatando i vasi dell'*estremità*; ma si be-

Fomenti de' fiori di camomilla.

(10) Questo precetto, ch'è di somma importanza, prova che il Sig. BUCHAN riguarda le *febbri maligne, putride*, come appartenenti alla classe di quelle, che si nominano *nerveuse*. (Ved. nota 3 di questo Cap.)

o di china-
china. Lo-
ro vantag-
gi in que-
sto caso.

ne, come le loro particole passano nell'interno e penetrano dentro nel sangue; possono mercè la loro virtù antiputrida contribuire a distruggere la putrescenza degli umori.

§. IV.

Rimedi che si devono amministrare nella febbre maligna putrida, porporina, o petecchiale.

Vomitivo
nel princi-
pio. Cli-
steri, e
lasciati.

SE trovisi il mezzo di porre in uso un vomitiva nel cominciamento di questa febbre, questo avrà quasi sempre un buon effetto. Ma se la febbre sussista da qualche giorno, e che i sintomi sieno violenti, in allora i vomitivi più non sono così affatto sicuri. Frattanto dee sempre tenere libero il ventre col mezzo de' clisteri o de' lasciati.

La cacciata di sangue è di rado necessaria nelle febbri putride, maligne. Se v'abbiano de' sintomi d'infiammazione, si può allora permetterla talvolta ne' primi istanti della malattia, ma in generale è cosa pericolosa il ripeterla. (Ved. Cap. II, nota 6 di questo Vol.)

I vescica-
tori non
devono ef-
fere appli-
cati che
negli ulti-
mi estremi
di questo
male.

Sintomi
che li in-
dicano.

Non si devono giammai mettere in opra i vescicatorj che negli ultimi estremi di questo male. Se le petecchie o le macchie porporine dispajono subitanamente: se il polso infiacchisce sensibilmente: se il malato ha del delirio: se questi sintomi sono accompagnati da quelli che abbiamo descritto, (pag. 139, e 140 di questo Volume,) bisogna venire all'uso de' vescicatorj, e in allora applicarli alla testa, a' polpacci delle gambe, o all'interno delle coscie.

Cosa v'è
da temersi
per parte

Ma siccome in questa malattia i vescicatorj potrebbero cagionare la cancrena (11), noi preferiamo in que-

Cosa sia la
cancrena, e
lo sfacelo.

(11) Allorchè una parte non ha più che un calore, una sensibilità, una elasticità estremamente languida; allorchè il suo colore è cangiato, ch'ei diviene bruno, livido, e nero, e che si formano sulla superficie alcune bolle o vescichette

questo caso degl' *impiastri* di *senape* e di *aceto* chiamati *senapismi*, o de' *cataplasmi* di *cipolle* con la farina di *segala*, ec. che si applicheranno caldi sotto le piante de' piedi; riserbando i *vescicanti* per i casi estremi (12).

de' *vescicatori*: sono da preferirsi i *senapismi*.

te piene d'acqua rossa, livida, nera, questo stato dinota una *mortificazione* cominciata, che i Medici chiamano *cancrena*.

Se col progresso del male la parte non mantiene più calore, nè senso, nè elasticità; se cede alla compressione, e si risolleva debolissimamente; qualora sia nera; se si stracci in brani, o se divenga dura e callosa, questo stato è una *mortificazione* confermata, cui si dà il nome di *sfacelo* dai Medici. (ASTRUC *Traité des Tumeurs*, T. I, pag. 56.)

(12) Questo precetto non distrugge per verun conto ciò che abbiamo detto, Cap. VI, §. II, nota 5 di questo Vol., che bisogna applicare di buon'ora i *vescicatori* nella maggior parte dei mali. La *pusrescenza* degli umori, vizio predominante nelle *febbri maligne*, e l'*eruzione critica* da cui sono accompagnate in appresso, anno senza dubbio indotto il Sig. BUCHAN a far quivi questa restrizione, ed ella sembra savissima; ma essa però riguarda particolarmente la *febbre maligna* dei giovani; poichè ecco qui come si spiega il Sig. LE ROY. (loc. cit. pag. 178.)

„ I rimedi soliti ad adoperarsi nel governo delle *febbri acute*, se mi sembrano mancare di efficacia nella presente, (nella *febbre maligna* de' vecchi.) Se ho talvolta avuto la buona sorte di riuscirvi, ho creduto doverlo attribuire principalmente alla *chinachina*, adoperata dopo i *rimedi generali*, in dose avanzata, e sopra tutto in sostanza, e al *vescicatorio* applicato di buon'ora „. (E soggiunge nella nota.)

Io dico al *vescicatorio* applicato di buon'ora, perchè reputo che per difetto d'un'applicazione bastantemente sollecitata, questo *rimedio* manchi sovente di produrre i grandi effetti che giustamente si attendono. Il *vescicatorio* può senza dubbio produrre un effetto utile per la rivoluzione ch'egli cagiona, mediante il dolore e l'irritazione *infiammatoria* ch' eccita nella parte, a cui si applica. Ma, non m'inganno, lo scorrimento notabile della *marcia* che vi si stabilisce in seguito, è ancora ben più vantaggioso in questa sorta di *febbri*. Questa spurgazione mi sembra corrispondere per l'utilità a quella dei *cauterj* e de' *fessoni* in certe malattie croniche: e per motivo appunto di procacciare un tale spurgo nel tempo della furia del male, consiglio di applicarli di buon'ora. Si fa, che abbisognano due o tre giorni anzi che l'escoriazione fatta dal *vescicatorio* si trovi in piena suppurazione.

Cautele
con le qua-
li bisegna
dare l' *em-
etico*.

Si ha per costume di dare nei principj di questa malattia il *tartaro stibato* o l'*emetico* in piccole dosi, che si ripetono ogni due o tre ore, fino a che egli abbia prodotto il vomito, mosso il ventre, o eccitato il sudore. Questo metodo conviene assai, purchè però il rimedio non si continui troppo a lungo, onde non infievolire l'infermo.

Opinione
falsa che si
ha della
virtù de'
cordiali e
degli *alef-
sifarmaci*
in questo
male.

S'è lungamente durato nell'opinione ridicola di poter espellere la materia infetta o *pestilenziale* della *febbre maligna*, mediante alcune dosi leggiere di *rimedj cordiali* o *alessifarmaci*: in conseguenza è stata esaltata la radice di *contrajerva*, la *confezione cordiale*, il *mitridato*, ec. come *rimedj* infallibili. Tuttavolta v'è ogni motivo di credere che di rado facciano molto di bene (13).

Non ve n'
ha alcuno
superiore
al buon vi-
no, ch'è
il miglior
de' cordia-
li.

In tutti i casi dove i *cordiali* sono necessarij, noi non ne conosciamo di superiori al buon vino; laonde lo consigliamo come il rimedio il più sicuro e il migliore. Il vino, gli *acidi*, e gli *antiputridi*, sono i soli *rimedj*, sui quali si può contare nella cura delle *febbri maligne*.

Di quale
importan-
za sia la
chinachina
in questa
malattia.

Tuttavolta nelle spezie le più perigliose di queste *febbri*, in quelle che sono accompagnate da *petecchie*, o da *macchie porporine*, livide, nere, fa d'uopo altresì aggiungere la *chinachina* agli *acidi*. Io l'ho vedu-

Nelle *febbri maligne de' giovani*, bisogna mettere in opra i *senapismi* e i *cataplasmi* di *cipolle*, di cui abbiamo poc' anzi fatto parola: se ne ricoprono le gambe, e la pianta de' piedi. Questi sono *rimedj* eccellenti, tutte le volte che temesi la *sancvena*. Per la qual cosa con massimo frutto si adoperano in altre malattie, quali sono il *vajuolo* di pravo carattere, ec.

Cosa deb-
basi pen-
sare di que-
sta classe
di *rimedj*.

(13) Non dee si, dice il Sig. LEBURAUD, far ricorso agli *alessifarmaci* e agli *alessiferi*, che con molta circospezione. Si agirebbe contro la ragione e l'esperienza, qualora si avessimo la temerità di farne prendere ad ogni sorta di soggetto indistintamente, per conformarsi alle brame delle femmine, e al sentimento del popolo ignorante: alla fine l'errore di coloro che li adoperano in alcune malattie, le di cui apparenze le anno fatte loro confondere con alcune altre, è per lo più funesto ai malati. (*Précis des Medicaments*, T. I, pag. 181.)

ta fare poco meno che de' miracoli, ne' casi pure dove le *persecchie* avevano l'aspetto il più disperato. Ma acciocchè produca questo effetto, forza è non solamente di prenderla in gran dose, ma ancora di continuarne l'uso per lungo corso di tempo. (Ved. di sopra la nota 12 di questo Cap.)

La miglior maniera di dare la *chinachina* è senza dubbio in sostanza, cioè in polvere come segue. Maniera di amministrarla.

Pigliate della miglior *chinachina*, un'oncia, Riducetela in polvere finissima; mettetela in un mezzo sestiere d'acqua, e aggiungetevi altrettanto di vino rosso: *acidulate* il tutto con trenta o quaranta goccioline di *elissire* di *vitriolo*, per rendere questo *rimedio* più facile a digerirsi, più gradito, e più attivo. Si può ancora aggiungervi due o tre oncie di *sciloppo* di *limoncelli*.

Si daranno due cucchiain ordinarij di questa *mistura* ogni due ore, o anche più spesso, se lo *stomaco* può sopportarla.

Coloro che non potranno prendere la *chinachina* in sostanza, la prenderanno infusa nel *vino*, nella maniera che abbiamo raccomandato nella malattia precedente. (Ved. pag. 132 di questo Vol., e la nota 6.)

Qualora il malato abbia uno scioglimento notabile di ventre, si farà bollire la *chinachina* dentro del *vino* con un poco di *cannella*, e si *acidulerà* il tutto con un po' di *elissire* di *vitriolo* nella forma seguente. Allorchè il malato abbia uno scioglimento notabile di ventre.

Pigliate della miglior *chinachina*, un'oncia;
cannella, una dramma;
elissire di *vitriolo*, quaranta goccioline.

Tritate la *chinachina*, e la *cannella*; fate bollire per alquanti minuti dentro una foglietta di *vino rosso*; *seiltrare*; aggiungetevi l'*elissire* di *vitriolo*.

Se ne daranno due cucchiain ogni due ore.

Niente di più efficace in questa specie di *scorrenza* di ventre, quanto gli *acidi* in gran dose, come pure tutti i *rimedj* che possono conciliare una dolce *traspirazione*. Utilità degli acidi in questo caso.

Se il malato è tormentato da *svogliatezze* e da vomito, se gli darà una *mistura* fatta con un'oncia e mezzo di *suco* di *cedro* spremuto di fresco, in cui Cosa bisogna fare allorchè il malato è tormentato.

si da svol-
gliatezze e
la vomito. si farà sciogliere una dramma di *sale d'assenzio*: si
aggiugnerà un'oncia d'*acqua di cinnamomo* e un po' di
quacchero.

Si farà prendere questa *mescolanza* nel momento
stesso ch'ella si è composta, cioè nel tempo dell'*ef-
fervescenza*, e si ripeterà tanto sovente quanto sarà
necessario.

Allorché
viene an-
nunziato
un ascesso
alle paro-
tidi.

Alle prime apparenze di enfiagione delle *parotidi*,
conviene applicare de' *cataplasmi maturanti* per accele-
rare la *suppurazione*. (Ved. nella Tavola la voce
Cataplasmi maturanti.)

(Fa di mestiere rinnovellare sì fatti *cataplasmi* o-
gni tre, o quattr'ore. Se il tumore non si ammolli-
sce, si chiamerà il Chirurgo, che ne sostituirà di più
attivi, e che d'altra parte sarà necessario per fare l'
apertura dell'*ascesso*, come prima la materia sarà for-
mata.) Dacchè si discopre che la materia è forma-
ta (14), forza è di aprire l'*ascesso*, e continuare
sempre l'applicazione de' medesimi *cataplasmi*.

Rimedi
che biso-
gna pre-
scrivere
per agevo-
lare la qua-
rignone del-
le ulcere
ragionate
da questo
male.

Ho veduto nella declinazione di questa *febbre delle
ulcere* considerabili, livide, *cancerose* in apparenza;
esalanti il puzzo infero de' cadaveri i più corrotti,
e disperse sopra parecchie parti del corpo, ramma-
ginarsi poco a poco, e il malato ricuperare la pro-
pria salute, mercè d'un uso copiosissimo di *chinachina*
dentro il *vino acidulato* con dello *spirito di vitriolo*.

Segni, ch'
indicano
che un a-
scesso è
maturo.

(14) Si è certi che la materia dell'*ascesso*, cioè la *marcia*,
è formata, quando il *tumore* forma una punta sensibile e ma-
nifesta; quando sotto questa punta si sente una mollezza e
come un vuoto; quando premendo i lati del *tumore*, si sen-
te una *fluttuazione*; quando i contorni del *tumore* sono me-
no tesi, meno rossi, e meno dolorosi.

Si offerverà però che nei *tumori* profondi, come quelli di
cui di presente si tratta, non si forma ordinariamente alcu-
na punta; ma gli altri *sintomi* bastano per assicurarsi della
maturità.

§. V.

Mezzi di prevenire e di ripararsi dalla febbre maligna, putrida, porporina, o peccetebiale.

PER ripararsi dalle febbri maligne; febbri cotanto perigliose, noi raccomandaremo la pulitezza la più scrupolosa; una abitazione in luogo asciutto e ben esposto; l'esercizio all'aria aperta; alimenti salubri, e un uso moderato de' liquori spiritosi.

Vitto preservativo della febbre maligna.

Si dee più di tutto fuggire la contagione. Non v'ha costituzione che ne sia al coperto: Ho veduto delle persone contrarre di sì fatte febbri; per aver fatto una sola visita ad un malato che n'era infetto; degli altri per essersi trasferiti in una Città dove elleno regnavano; ed alcuni per aver assistito ai funerali di coloro che n'erano da questo morbo periti: (Ved. Parte I, Cap. X; nbra 1; e nota 6, pag. 136 di questo Vol.)

Quanto sia importante di fuggire il contagio

Ogni volta che una persona sia compresa di questo male, deesi avere ogni attenzione che il contagio non si dissemini. A tal oggetto si collocherà il malato in una camera spaziosa, rimota; per quanto è possibile, dagli appartamenti abitati della casa. Egli sarà tenuto con estrema pulitezza; si avrà l'avvertenza di rinnovellare soventemente l'aria della sua camera: (Ved. Parte I, Cap. IV, nota 5, e 6.)

Come bisogna regolare l'aria onde impedire che il malato non la comunichi.

Tutto ciò che tocca il malato; quanto viene da lui, deve essere incontanente via trasportato. Fa di mestieri cangiarlo spesso di biancherie; e le persone che sono in salute, tranne quelle che sono destinate a servirlo, devono fuggire ogni commercio con lui: (Ved. Parte I, Cap. IX, che tratta della pulitezza, e Cap. X, che tratta della contagione.)

Se qualcheduno teme d'essere infetto di contagione, o di avere contratto il male, fa d'uopo che senza indugio prenda un vomitivo, e che s'adoperi per liberarsene; bevendo copiosamente d'una infusione di fiori di camomilla. Se il timore persista, o se alcuni

Cosa debbono fare coloro che temono d'essere infetti di contagione.

fenfomi infaufti fi appalefino, egli continuerà l' ufo di quefti *prefervativi* per uno o due giorni .

Può ancora prendere una *infufione* de' fiori di *camomilla*, e di *chinasbina* per bevanda ordinaria : berà in oltre, innanzi di coricarfì, una foglietta di *negus* gagliardo, o qualche bicchiere di *vino* generoso . Io fono ftato fovente coftretto a fequire sì fatta pratica, ne'tempi quando infuriavano le *febbri maligne*, e l' ho raccomandata ad altre perfone fempere con frutto .

I falaffi e i purganti fono pericolofi in quefto cafo .

In generale affrettafi di far ricorfo ai *falaffi* e ai *purganti*, come i più foverani *prefervativi* contro la *contagione* . Ma quefti mezzi fono sì poco capaci di preftarne difefa, che anzi foventemente efaurendo le forze, non fanno che aumentare il pericolo (15) .

Idea falfa che fi ha ordinariamente del prefervativi .

(15) Lo ftello ne avviene de' *prefervativi*, come degli *spacciifici* . La maggior parte non fono che *rimedj* di donnicciuole, che fi vantano come capaci di prevenire tutte le malattie . Tuttavolta è rariffimo che non fi foccomba a quella, cui fi è ftato efpofto . Bisogna rintracciare la cagione nell' ignoranza di coloro che li prefcrivono . Non v' ha quafi mai rapporto tra i *prefervativi* e i *rimedj* propri alla malattia, che fi vuole allontanare . Anzi fovente fono affolutamente oppofti tra loro .

Si è veduto una femmina configliare una tenera madre a bere forzatamente per alquanti giorni del vino puro, e a prendere ogni fera nel coricarfi una mezza dramma di *seriaca*, perchè non avendo effa per anco fofterto il *vajuolo*, s' era data alla cura d' un fuo figliuolo comprefo di quefto morbo . Quefta infelice seguì puntualmente sì fatto configlio . Nel quarto giorno fu foprefa da *febbre inflammatoria*, che il pofdomani fi appalefè per quella del *vajuolo* . Ma malgrado i prefidj i meglio amminiſtrati, le bolle non finirono di ben fpuntare, che l' inferma morì nel quinto giorno del male .

I veri *prefervativi* fono anzi i *rimedj* ſteſſi del male, da cui vuolſi mettere al riparo . Bisogna adattarſi al *viſto*, alle *bevande*, ai *rimedj* ch' eſige queſta tal malattia : in una parola ſervirſi, dalla quantità in fuori, degli ſteſſi foccorſi, come ſe taluno aveſſe effettivamente la malattia indoffo . Se ne vede un eſempio nel configlio che l'Autore ha poc' anzi dato a coloro che temono di aver contratta la *febbre maligna*; ſe ne vede un altro nella condotta che tenne il Sig. LE PECQ DE LA CLOTURE in riguardo degli abitanti, che provarono i primi *ſintomi* della malattia *epidemica* che deſtò il *Gros-Théil*. (Ved. *Obſ. ſur les Malad. épid. an. 1770*, pag. 173.)

Cofa debbaſi intendere per queſta ſorta di rimedj .

Quanto alle persone che assistono i malati attaccati da queste febbri, elleno avranno sempre seco una spugna, o un fazzoletto imbevuto di aceto, o di succo di cedro, che futeranno al momento di accostarsi al malato. Si laveranno le mani, e, s'è possibile, si cangieranno di abiti avanti di presentarsi in sociabile compagnia. (Ved. Parte I, Cap. IV, nota 6.)

CAPITOLO DECIMO.

Della febbre migliare.

Questa febbre trae il suo nome dalle pustole o vescichette che appajono sopra la pelle, e che rassomigliano per la forma e la grossezza a de' granelli di miglio (1).

Donde questa malattia tragga il suo nome.

Elleno sono ora rosse ed ora bianche; tuttavolta queste due spezie sono talora frammescolate l'una coll'altra.

Di qual colore sono le pustole.

Queste pustole sono in generale più numerose ne' siti, dove il sudore è più abbondante, come sul petto, sul collo, ec. Ma alle volte ancora tutto il corpo n'è coperto. Un sudore moderato o un dolce madore favorisce singolarmente questa eruzione: laonde ella diviene più dolorosa e più pericolosa, quando la pelle è secca.

Su qual parte del corpo siena più abbondanti.

Accade talora che la febbre migliare è la malattia primitiva, essenziale, o la unica: ma il più spesso non è che il sintomo d'un altro male; come del vajuolo, della rosolia, delle febbri infiammatorie, o

Questa malattia è talvolta essenziale, ma più spesso sintomatica.

(1) Questa malattia è rara in Francia, eccetto che nelle provincie settentrionali, come nella Normandia, dove insorge epidemica da parecchi anni. Il suo teatro è in Lamagna, e in alcune Città d'Italia. Le donne di parto sono le persone, appo le quali essa qui si rincontra il più sovente. D'altra parte ella non vi apparisce che con ordine epidemico, ovvero si congiunge a qualche altra malattia dominante.

Paesì dove si osserva più frequentemente.

maligne, nervose, ec. : in tutti questi casi ella è comunemente l'effetto del *visito*, o de' *rimedj* troppo *riscaldanti*.

Chi sono
quelli che
ci sono i
più esposti.

La *febbre migliare* assale principalmente le persone d'un carattere indolente e d'un *temperamento flemmatico* o *spoffato*. La gioventù ed i vecchi ci sono più soggetti di quelli che si trovano nel vigor dell'età.

Ella è più
ordinaria
alle femmi-
ne, massi-
mamente
nel tempo
del parto.

Ella è ancora più ordinaria alle femmine che agli uomini, massimamente alle femmine delicate e ne-ghittose, che trascurando l'*esercizio* si tengono costan-temente racchiuse, e vivono di *alimenti* atquosi e di poca sostanza. Tali femmine sono singolarmente soggette ad essere attaccate da questa spezie di *febbre* nel tempo del parto, ed esse vi perdono sovente la vita.

§. I.

Cagioni della febbre migliare.

LA *febbre migliare* è talvolta originata dalle *passio-
ni* veementi e dalle forti impressioni dell'animo, come l'*afflizione* eccessiva, il cordoglio, e la profon-da meditazione. Le veglie prolungate, le *evacuazioni* pertinaci, una *dietà* troppo leggiera, e soverchia-mente acquosa; le stagioni piovose; l'uso troppo abbondante di frutta acerbe, come di *prugna*, *ciliegie*, *cocomeri*, *poponi*, ec. vi danno sovente origine. Le acque corrotte; gli *alimenti* guasti dalle piogge, o per essere stati troppo a lungo conservati, possono ancora generare sì fatta *febbre*.

Ella può parimente esser il frutto della soppressio-ne d'una *evacuazione* consueta, come dello spurgo d'una *fontanella*, d'un *setone*, d'un *ulcere*, dell'*emor-roidi* scorrenti presso gli uomini, e de' *menstrui* nelle donne.

Cagioni
di questa
malattia
presso le
donne di
parto.

Questa malattia presso le donne di parto è soven-te l'effetto d'una *stirichezza* contumace, che prende luogo nel corso della gravidanza. Può ancora essere cagionata dall'uso eccessivo delle frutta immature, o degli altri *alimenti* malsani, per i quali le femmine incinte provano pur troppo del gusto.

Ma la cagione più generale presso queste femmine è l'inerzia. Una femmina che mena una vita sedentaria, massime nella gravidanza, e che al tempo stesso si pasce di *alimenti* grossolani, di rado scappa da questo male nel tempo del parto.

Per il che la *febbre migliare* è segnatamente funesta alle femmine del gran mondo, e alle mogli parimente de' fabbricatori e de' negozianti nelle Città commercianti, le quali per esser di ajuto ai loro mariti, non si scostano quasi mai di casa in tutto il corso di lor gravidanza; laddove questa malattia è appena cognita alle femmine attive e laboriose, che vivono alla campagna, e che fanno un *esercizio* convenevole all'aria aperta, ec.

S. II.

Sintomi della febbre migliare .

Quando la *febbre migliare* è *essenziale*, ovvero l'unica malattia, ella si annunzia presso poco come le altre *febbri eruttive*; vale a dire per via d'un *brivido* leggiero, ch'è suffeguito da calore, debolezza, *abbattimento*, e sospiri.

Questi *sintomi* sono accompagnati da un *pulso* piccolo e frequente; da difficoltà di *respiro*; da *ansietà*; ed oppressione di petto; (da *tosserella*. Il Sig. LE-PECQ DE LA CLOTURE osserva che questa spezie di *tosse* è un *sintomo patognomonico* dell' *eruzione* futura delle *pustole migliari*. Ved. questo libro intitolato: *Observations sur les Maladies épidémiques*, an. 1770.) Il malato è agitato; ha talvolta del *delirio*; la sua lingua appare bianca; gli tremolano le mani, e sente sovente al di dentro un calore cocente.

Presso le femmine di parto il *latte* sparisce, e le altre *evacuazioni* si sopprimono.

Il malato prova sotto la pelle un *pizzicore*, e un dolore simile a quello che cagionerebbero delle punture di spilli. Incontinentemente dopo cominciano a comparire delle *pustoliste* innumerevoli, rosse, o bianche: effetto ch'è generalmente suffeguito da una diminuzione nella *violenza* dei *sintomi*.

Sintomi
precuratori

Sintomo
patognomonico
dell' *eruzione* futura.

Presso le
femmine di
parto .
Sintomi
dell' *eruzione*

Il *polso* diviene più pieno e più regolare; la *pelle* più molliccia; e il *sudore*, a misura che la malattia avanza, esala un odore di *putrescenza*, particolare a questa *febbre*. La *debolezza*, l'*abbastimento*, l'*oppressione* del *petto* dispajono, e le *evacuazioni* ordinarie di mano in mano ritornano.

Verso il sesto o settimo giorno dell'*eruzione*, le *pustole* cominciano a disseccarsi e a cadere; il che cagiona un *prurito* assai spiacevole sulla *pelle*.

In qual tempo della malattia l'eruzione compare e disappear.

E' impossibile di assegnare il tempo preciso in cui queste *pustole* appariscono o dispajono. In generale si mostrano nel terzo o quarto giorno, quando sono *critiche*; ma quando l'*eruzione* è *sintomatica*, possono comparire in tutti i tempi della malattia.

Sintomi pericolosi.

Talvolta le *pustole* appariscono e spariscono a vicenda: in questo caso v'ha sempre del pericolo; ma quando spariscono subitaneamente, senza ricomparire di nuovo, il pericolo è in allora grandissimo.

Caratteri delle pustole milgari presso le femmine dopo il parto.

Presso le femmine dopo il parto, queste *pustole* sono d'ordinario ripiene nel principio d'un acqua limpida: ma divengono poscia gialliccie: talora sono irammeschiare di *pustole* rossigne. Quando sono tutte di questo colore, la malattia prende il nome di *Rash*, che il Sig. TISSOT traduce per *ébullition*, (ebollimento, o pruzza.) (Ved. la Lettera al Sig. HIRZEL.)

§. III.

Visto che bisogna prescrivere ai malati afflitti da febbre milgare.

Scopo che si dee proporre in tutte le febbri eruttive.

IN tutte le *febbri eruttive* di qualunque si sia specie, lo scopo essenziale è di prevenire lo sparimento repentino delle *pustole*, e di favorire tutto ciò ch'è valevole ad accelerare la loro *maturazione*. Per conseguenza devesi tenere il malato in una temperatura tale, che l'*eruzione* non avanzi troppo sollecita, nè che le *pustole* retrocedano prima di essere pervenute alla loro maturità. Non si somministreranno dunque al malato se non degli *alimenti* e delle bevande d'una qualità moderatamente nutritiva e cordiale.

Si manterrà la sua camera nè troppo calda nè di soverchio fredda, e non si aggraverà di copertine l'infermo: al fine si studierà più di tutto di tenerlo tranquillo, di allegrarlo, niente essendovi certamente di più adattato a far retrocedere un'eruzione, quanto la paura o il timore del pericolo.

Non conviene tenere troppo caldo il malato.

Gli alimenti convenevoli in questa malattia sono li brodi leggieri di pollo con un po' di pane; la *panasetta*, il *sagou*, o il *cremore di avena*, in un mezzo sestiere di ciascheduno de' quali si può aggiugnere, se la debolezza del malato lo esiga, una o due cucchiate di *vino generoso* con alquanti granelli di *sale* e un po' di *zucchero*. Il malato può ancora mangiare de' *pomi* di buona qualità, cotti dinanzi il fuoco, o bolliti con altre frutta mature, di natura *lubrificativa* e *rinfriscante*.

Alimenti.

Quanto alle bevande, esse devono essere adattate allo stato di forza, o di *abbattimento* del malato. Se egli abbia forze, la bevanda deve essere leggiera; tal'è la *tisana di avena*, l'*infusione di menta*, o la *decozione* seguente.

Bevanda allorchè il malato non è punto indebolito;

Prendete della *rasura di corno di cervio*, di ciascheduna radice di *salsapariglia*, due oncie. Fate bollire in due pinte d'acqua; feltrate; aggiungetevi un po' di *zucchero*.

Il malato ne farà la sua bevanda ordinaria.

Se l'infermo è debolissimo e assai abbattuto, se l'eruzione non succede convenevolmente, la bevanda dee essere alquanto più *corroborante*. Se gli somministrerà in allora del *siero di latte* apprestato col *vino*, *acidulato* col *fuco di arancia* o di *cedro*, e si renderà questa bevanda o più forte o più debole, secondo che le circostanze lo richiederanno.

Allorchè egli si trova estremamente abbattuto;

Alle volte la *febbre migliare* si accosta alla *febbre maligna*. In tal caso bisogna sostenere le forze del malato con de' validi *cordiali*, accoppiati agli *acidi*; e se il grado di *putrescenza* è considerabile, fa di mestiere somministrare la *chinachina*.

Allorchè la malattia s' accosta alla febbre maligna.

Allorchè la testa è di molto aggravata, forza è di lubrificare il *ventre* per via de' *clisteri ammollienti* (a).

Cosa indichi i clisteri ammollienti.

(a) Nel Giornale intitolato: *Commercium litterarium*, an. Importanza della re-

§. IV.

Rimedj che si devono somministrare nella febbre migliare.

Effi sono poco necessari i rimedj in questa malattia. Nulladimeno se l'eruzione non si fa a dovere, o se il malato è infiacchito, non solamente sarà necessario di sostenere le di lui forze con de' cordiali, ma sarà d'uopo altresì applicargli i vescicanti. Il miglior cordiale in questo caso è il vino generoso, che il malato può prendere egualmente nei suoi alimenti e nella sua bevanda; e qualora vi abbiano de' segni di putrescenza, il che accade di sovente, si

SE gli alimenti e le bevande sieno ben diretti, i rimedj saranno poco necessari in questa malattia. Nulladimeno se l'eruzione non si fa a dovere, o se il malato è infiacchito, non solamente sarà necessario di sostenere le di lui forze con de' cordiali, ma sarà d'uopo altresì applicargli i vescicanti.

Il miglior cordiale in questo caso è il vino generoso, che il malato può prendere egualmente nei suoi alimenti e nella sua bevanda; e qualora vi abbiano de' segni di putrescenza, il che accade di sovente, si

gola di vitto temperato in questa malattia, comprovata da una osservazione.

1735, si legge l'istoria d'una *febbre migliare epidemica*, che fece delle grandi stragi a *Strasbourg*, durante i mesi di Novembre, Dicembre, e Gennaio. Ella ci mostra la necessità del *vitto temperato* in questa malattia; ci ammaestra ancora che i Medici non sono sempre quelli che scoprono i primi il vero governo dei mali.

„ Questa *febbre*, dice l'Autore, faceva terribile scempio anco tra gli uomini della più forte *costituzione*; e nessun *rimedio* riusciva. I malati erano colti improvvisamente da *brividi*, da *sbravigli*, da *stiramenti*, da dolori nel dorso, seguiti da gran calore. Perdevano allo stesso tempo l'appetito, e pativano di grandi *fiacchezze*. Verso il settimo o nono giorno, l'*eruzione migliare* si faceva vedere, simile alle *morficature delle pulci*, con grandi *ansietà*, *delirio*, *vigilia* e forte *agitazione* quando il malato giaceva in letto. La *cacciata di sangue* riusciva mortale. Le cose essendo in questo stato disperato una *mammana* applicò da sua propria fantasia ad uno di tai malati, ch'era nel *fiume del male*, un *cistiera* di *acqua piovana*, con del *burro*, senza sale, e per bevanda ordinaria diedegli una *pinata* d'acqua di fonte, un mezzo *sestiero* di ottimo *vino*, il *succo* d'un *cedro*, e sei *oncie* di *zucchero*, il tutto bollito insieme fino a tanto che *spumino*. Questi *rimedj* annoverati l'esito il più felice: il ventre divenne *lubrico*, i *sinismi* perigliosi *svanirono*, il malato ricuperò le proprie *forze*, e sfuggì dalle *braccia di morte*.

Questo metodo di cura è stato imitato da molte altre persone, e sempre con l'esito il più fortunato.

darà in tal caso la *chinachina* col vino e gli *acidi*, I vescicatorj, come lo abbiamo consigliato nella febbre putrida, (Ved. di sopra pag. 147. di questo Vol.)

Ci sono de' Medici che applicano i *vescicatorj* per tutto il corso di questa malattia. Quando la Natura è languente; quando l'*eruzione* appare e compare, è necessario di stimolarla mediante una serie continuata di piccoli *vescicanti*. Ma fuori di queste circostanze, uno solo ci sembra bastare.

Ciò non ostante allorchè il *polso* s'indebolisce sensibilmente; che le *pustole* si dileguano; che la testa s'ingombra, in allora è necessario d'applicare parecchi *vescicanti* sopra le parti le più sensibili, come nell'interno delle coscie, delle gambe, ec.

La *cacciata di sangue* è di rado necessaria nella *febbre migliare*, e talvolta vi arreca molto male, perchè indebolisce e abbatte l'infermo. Ella per tanto non dee giammai eseguirsi senza il consiglio d'un Medico. Faccio questo riflesso perchè è usanza di curare questo male presso le femmine dopo il parto con delle copiose *cacciate di sangue* e dell'altre *evacuazioni*, come se egli fosse sommamente *infiammatorio*. Ma tale pratica riesce per l'ordinario mortale. (Ved. la nota (a) di questo Cap. pag. 155. di questo Vol.)

Gl'infermi di questo male tollerano sempre meno che volentieri le *evacuazioni*; ed egli sembra sovente partecipare piuttosto della *febbre maligna*, di quello che della *febbre infiammatoria*.

Sebbene la *febbre migliare* sia soventemente generata presso le femmine dopo il parto da un *vizio soverchiamente riscaldante*, niente di meno sarebbe periglioso l'abbandonarlo di sbalzo, e ricorrere subitamente ad un *vizio affatto rinfrescante* ed a copiose *evacuazioni*. Noi abbiamo motivo di credere che sia più sicuro il sostenere le forze del malato, e sollecitare le *evacuazioni* naturali, di quello che l'aver ricorso a de' mezzi artificiali; ch'estenuando le forze, sogliono aumentare il pericolo.

Se questa malattia diviene ostinata, o che il ristabilimento del malato si porti in lungo, se gli darà la *chinachina* in sostanza, o infusa nel vino, o nell'*acqua*, a suo piacere.

La cacciata di sangue per l'ordinario contraria in questa malattia, anche alle femmine di parto.

I malati difficilmente tollerano le evacuazioni. Perché?

Cautela ch' esige il governo di questa malattia presso le femmine dopo il parto.

Cosa bisogna fare allorchè la malattia porta in lungo.

Quando
abbisoguai
purgare.

La *febbre migliare*, come pure tutte le altre *febbri eruttive*, richiedono dei blandi *purgativi*, che non bisogna negligere di amministrare subito che la *febbre* è cessata, e che le forze del malato un poco rimesse lo permettono.

§. V.

Mezzi di preservarsi dalla febbre migliare.

Maniera,
onde le fem-
mine in-
cinate devo-
no condursi
per preve-
nire questo
male.

Osserva-
zione so-
pra i mez-
zi di pre-
venirlo
presso le
femmine
dopo il
parto.

I Mezzi di preservarsi e di prevenire la *febbre migliare* sono il respirare un'aria pura ed asciutta; il fare un *esercizio* sufficiente; ed il prendere solo degli *alimenti* salubri.

Le *femmine* incinte devono evitare la *stitichezza* del ventre, e fare in ciaschedun giorno quanto mai potranno di *esercizio*. Devono astenersi dal mangiare delle frutta guaste e di cattiva qualità, e quando sono nel parto, devono osservare rigorosamente una regola di *vitto rinfrescante*.

(Una *femmina*, che ho assistito nel parto, fu dodici o quindici ore dopo assalita da una *febbre* assai violenta. Io l'attribuiva a due o tre bicchieri di *vino*, che si accordarono alle sue istanze nel tempo del travaglio. Riducei l'intero suo nodrimento ai semplici brodi; e la sua bevanda ordinaria era dello *sciloppo* di *capelvenere* stemperato nell'acqua tiepida. Sebbene fosse d'autunno, e che il freddo cominciasse a farsi sentire, non feci accrescere le sue copertine. A capo di ventiquattr' ore la *febbre* non era così gagliarda; ma vi aveva doglia di capo, nei *reni*, nel dorso, ed i *flussi* erano un poco ritardati. Riducei i brodi a tre per giorno, ed ordinai due *clisteri* di acqua semplice. Il posdomani del parto apparvero alquante *pustole migliari* bianche d'intorno al collo, sul petto, e sulle mani; ma tutti gli altri *sintomi* erano notabilmente diminuiti. Feci continuare lo stesso governo, e il sesto giorno dopo il parto la malata fu in istato di levarsi.

Io non pretendo d'insinuare che il governo da me tenuto in questo caso, sia quello che si debba seguire in tutti. E' certo che ci sono delle circostanze as-

fai gelose, che richiedono la più grande sagacità e il più profondo sapere. Ma in allora non v'ha che un Medico che possa decidere; e il miglior partito si è di chiamarlo il più presto possibile, perchè spessissimo non v'è momento da perdere.

Vorrei solamente che i Cerusici, le levatrici, e le comari, delle quali la camera d'una donna di parto diviene sconsigliatamente il ricetto dalla mattina sino alla sera, fossero più istruite, e che riflettessero meglio sopra lo stato d'una femmina che abbia poc' anzi partorito. Queste persone sarebbero ben presto persuase che questa femmina è nello stesso caso d'una persona che abbia poco prima provato una fatica eccessiva, e presso cui il sangue e gli umori sono in un grado di agitazione più o meno violenta. Che se in questo stato s'ingozzi soverchiamente la inferma di *alimenti*, non si tosto, o anche qualche tempo dopo ch'ella ha partorito, come avviene pur troppo spesso, per non dir sempre, lo stomaco, ch'è stato partecipe della fatica con tutto il resto del corpo, non è più in istato di digerirli: il chilo, che formeranno questi *alimenti*, sarà composto di particelle crude, che introdotte negli umori, svilupperanno il *germe di putrefazione*, a cui essi sono pur troppo disposti: che se in oltre loro si facciano prendere delle *droghe riscaldanti*, come del vino e del zucchero, del vino e della cannella, cose caldissime, degli *elissiri*, delle *confezioni*, ec. come è ancora in uso per far svanire, come si dice, il latte per via di sudore, queste sostanze *acri ed irritanti* porteranno il fuoco per tutto dove ciroleranno, e fisseranno l'*infiammazione* nelle parti che vi sono più disposte.

Se riflettendo sopra queste verità, riconoscessero che i malori che accadono alle femmine dopo il parto, non riconoscono il più sovente alcuna altra *causa*, s'accorgerebbero di quale importanza sia il *visto temperato e rinfrescativo* ne' parti ordinarj, per prevenire ogni sinistro accidente; e di quale importanza sia la *dietta austera e diluente* nei casi dove questi accidenti daranno i primi indizj della loro esistenza, come lo prova l'osservazione che abbiamo or ora riferito. Si vedrà più particolarmente Tom.

Gli errori che si commettono nel vitto delle femmine che sono di parto, procedono dall'idea falsa che s'è formata del parto.

Importanza del vitto temperato, e rinfrescante presso le femmine dopo il parto.

IV, Cap. L, §. VI, Art. VI, la condotta che bisogna tenere riguardo le femmine dopo il parto attaccate da questa febbre.)

CAPITOLO UNDECIMO.

Della febbre remittente.

Donde deriva il nome che porta questa specie di febbre.

Questa febbre viene così chiamata dalla *remissione* o diminuzione dei *sintomi*, che si manifesta talvolta più presto, tal'altra più tardi, ma in generale avanti l'ottavo giorno della malattia. Questa *remissione* è ordinariamente preceduta da un sudore leggiero, dopo il quale l'ammalato si trova notabilmente sollevato; ma poche ore dopo i *sintomi* che non sono interamente cessati, ricompariscono di bel nuovo.

Le *remissioni* della *febbre remittente* anno alle volte de' periodi regolari, ma più spesso essi sono irregolari; in guisa che la loro durata è ora più lunga, ora più corta. Che che ne sia, più che la *febbre remittente* s'accosta alla *febbre intermittente regolare*, meno ella è pericolosa.

Caratteri della febbre remittente.

(Le *febbri remittenti* sono adunque quelle che, dopo la loro invazione fino alla fine, non abbandonano il malato, ma di cui i *sintomi*, quali sono i *brividi*, lo sbavigliamento, il freddo, il calore, ec. s'abbassano, e s'innalzano a vicenda: di maniera che vi sono de' momenti nella giornata, ne quali l'infermo si trova assai sollevato, senza per ciò essere senza *febbre*; avvegnachè egli ha il *pulso* sempre più febrile che nello stato naturale, e l'abbattimento delle forze è sempre considerabile: cosa che non si rincontra nell'intervallo delle *febbri intermittenti*.)

§. I.

Cagioni della febbre remittente.

LA febbre remittente è comune nei luoghi bassi; paludosi, coperti d'acque stagnanti, e di boschi. Ma i luoghi, dove ella è più funesta, sono quelli ne quali un gran calore si ritrova unito con una grande umidità, come in alcune parti dell'*Africa*, in *Bengala*, nell'*Indie Orientali*, ec. dove la febbre remittente è in generale di genere *putrido* e pericolosissima. Ella si fa con più di frequenza vedere durante un tempo nubiloso; segnatamente dopo le pioggie o le strabocchevoli inondazioni, ec.

Ognuno vi è esposto: nè il sesso, nè l'età, nè la costituzione ne esentano alcuno. Ma coloro che sono d'un temperamento spoffato, che stanziavano in abitazioni basse e immonde, che respirano un'aria impura e che non circola, che non fanno abbastanza d'esercizio, che vivono di alimenti malsani, ci sono i più sottoposti.

Chi sono i più esposti alla febbre remittente.

§. II.

Sintomi della febbre remittente.

I Primi sintomi di questa febbre sono de' sbavigli, de' stivamenti, de' dolori di testa, delle vertigini, e delle alternazioni di freddo e di caldo. Talvolta il malato cade in delirio dal momento del primo attacco. Risente un dolore nella regione dello stomaco, e talora vi si discopre una enfiagione. La lingua è bianca, gli occhi e la pelle appaiono soventemente gialli, e spesso l'infermo vomita della bile.

Il polso è talvolta un po' duro; ma radamente pieno, e il sangue estratto dalla vena non dà segno d'infiammazione, vale a dire, che di rado è denso. Ci sono de' malati che soffrono una stitichezza eccessiva; degli altri al contrario anno delle smosse di ventre incomodissime.

È impossibile di descrivere tutti i sintomi che ac-

È impossibile di descrivere tutti i sintomi che ac-

ferire
tutti i si-
tomi, a ca-
gione della
loro esse-
ma varietà.

compagnano questa malattia, perchè variano a norma del luogo che si abita, della *costituzione* del malato, e della stagione dell'anno. Possono ancora molto variare a tenore della cura, e di parecchie altre circostanze, che sarebbe troppo lungo l'esporre.

Questa
febbre si
mostra so-
vente sotto
l'aspetto
delle febbri
biliose, ner-
vose, e ma-
ligne.

Talora questa malattia appare corredata dai *sintomi* della *febbre biliosa*, talora da quei della *febbre nervosa*, e tal'altra volta da quei della *febbre maligna*. Non è affatto raro di vedere sì fatti *sintomi* succederli gli uni agli altri, o anche complicarsi al tempo stesso nella persona medesima.

(Cotesi *sintomi* non si rincontrano insieme, se non nella *febbre remittente irregolare*, che d'altra parte è assai frequente; e in tal caso non è raro che il malato abbia delle *convulsioni*; de' dolori rassomiglianti alla *colica*, alla *pleurisia*, al *reumatismo*, ec.

Massima-
mente
quando el-
la è irre-
golare.

Ma quando la *febbre remittente* è *regolare*, il suo andamento si avvicina di molto a quello delle *intermittenti*; in guisa che dall'ordine di queste *remissioni*, si riconosce la *quotidiana*, la *terzana*, la *quartana*, ec. (Ved. di sopra la divisione delle *febbri intermittenti* pag. 30 e seg. di questo Vol.) Spesse volte ancora le *intermittenti* degenerano in *remittenti*, e queste in *intermittenti*: tanto avvi d'affinità tra loro.

La febbre
remittente
regolare
rassomiglia
alle inter-
mittenti.
Ella non
è più da
temersi; ma
l'irregola-
re è peri-
colosa.

La *febbre remittente regolare* non è più da temersi della *febbre intermittente*. Noi vedremo che lo stesso non è della *irregolare*, che si trasmuta soventemente in *infiammatoria*, in *febbre maligna*, e che in allora mette sempre la vita in pericolo. La *remittente*, che corrisponde alla *febbre quartana*, è la più indomabile e la più da temersi. Le sue conseguenze ordinarie sono il *marasmo*, la *febbre lenta*, l'*idropsia*, ec.

Aggiungeremo che in questa *febbre* i malati anno alle volte la *salvazione* che spesso è *critica*. Altre volte essi cacciano fuori durante l'*accesso* dell'*urina focose*, che formano una posatura nel tempo della *remissione*, e soventemente con vantaggio.)

§. III.

Regola di vitto che bisogna seguire in una febbre remittente.

IL vitto deve essere adattato ai *sintomi* predominanti. Quando abbiavi qualche apparenza d'*infiammazione*, la dieta vuol essere leggerissima, e la bevanda tenue, e *diluyente*. Ma quando questi *sintomi* sieno quelli della *febbre nervosa* o *maligna*, fa di mestieri sostenere le forze del malato con degli *alimenti* e delle bevande di natura un po' più nutritiva, come lo abbiamo raccomandato nell'ultima *febbre*, di cui s'è poc'anzi parlato. (Pag. 155. di questo Vol.) Bisogna per altro essere scrupolosissimi circa l'uso delle sostanze *riscaldanti*, perchè questa *febbre* si cangia spesso volte in *continua*, a motivo d'un vitto caldo e di *rimedj* contrarj.

Di qualunque genere sieno i *sintomi*, bisogna tenere il malato fresco, pulitamente, e tranquillo. La sua camera deve essere grande, per quanto è mai possibile, e vi si dee soventemente rinnovellare l'*aeria*, per via della porta e delle finestre. Devesi irrigarla di *aceto*, di *suco di cedro*, ec. Si dee cangiare spesso il malato di biancherie, di copertine, ec. e trasportare senza indugio i suoi escrementi. (Ved. Parte I, Cap. IV, nota 5, e Cap. VIII, nota 6.)

Sebbene abbiamo di già raccomandato tutte queste cose, crediamo di doverle raccomandare di nuovo, poichè esse sono di una importanza molto maggiore pel malato, di quello che lo sieno i più vantati *rimedj* (a).

Eti dee essere relativo al *sintomi*. Diluyente nel casi d'*infiammazione*, e corroborante nei casi di *malignità*, ec.

In tutti i casi bisogna che il malato sia tenuto frescamente, con pulitezza, e in istato tranquillo.

Ragioni per le quali si ripeterà spesso volte i medesimi avvisi.

(a) L'illustre Dott. LIND di Edimburgo nella sua Dissertazione inaugurale sopra le *febbri remittenti putride* di Bengala fa le osservazioni seguenti.

„ Bisogna cangiare il più sovente possibile le biancherie, le copertine, ed i panni del malato; devonli esporre all'*aria*. Quanto alle *deiezioni* e agli altri escrementi, biso-

§. IV.

Rimedj che devono prendere coloro che sono attaccati da una febbre remittente.

Mezzi di rendere il progresso di questa febbre regolare. La emissione di sangue purché ella sia indicata.

Un vomitivo v'è molto più necessario.

Ipecacuana.

Pozione emetica.

PER giungere a guarire questa febbre, è d'uopo dar principio dal trovar la maniera di rendere il suo progresso altrettanto semplice, quanto quello d'una febbre intermittente regolare. Si può riuscirvi mediante il salasso, laddove v'abbiano de' sintomi d'infiammazione. In tutti gli altri casi, è necessario di astenersene, perchè indebolirebbe l'ammalato e prolungarebbe la malattia.

Ma non è così del vomitivo, il quale sarà di rado mal impiegato, e che in generale può essere d'una grande utilità.

Quindici o venti grani d'*ipecacuana* in polvere, corrisponderanno perfettamente a questa indicazione.

Tuttavolta io consiglio di preferire in questo caso una *pozione emetica*, composta d'uno o due granelli di *tartaro stibiato*, e di cinque o sei granelli d'*ipecacuana* in polvere, il tutto in un bicchiere d'acqua: si ripete questa *pozione* due o tre volte, coll'intervallo d'un giorno tra l'una e l'altra, se l'affanno di stomaco e le voglie di vomitare persistano (1).

„ gna trasportarli altrove sul momento. La camera, dove ri-
„ posa, dee' essere ben ariosa e irrigata con' aere. Bisogna
„ da ultimo prestare l'attenzione la più scrupolosa a tutto
„ ciò che concerne il malato. Ho provato che il Medico che
„ ha riguardo a sì fatti precetti, e che li mette in pratica,
„ riesce infinitamente meglio che il Medico più istruito che
„ li trascura „

Riflessioni
sopra l' e-
metico.

(1) Noi dobbiamo far osservare col Sig. LIZOTAUD, che si seguono differenti metodi per la preparazione del *tartaro stibiato*, e che la scelta dipende dall'idea e dalla volontà di cadauno Speciale; donde ne segue che fuor di Parigi, e anche in Parigi stesso, la dose conveniente di questo medicamento sovente non è più la medesima; ch'ella varia, e che non si può senza un inconveniente più o meno grande mancare di aver riguardo a questa differenza, la quale può fare che ora questo medicamento abbia troppo di effetto, ora che non ne

Bisogna tenere il ventre lubrico per mezzo de' clisteri e de' blandi lassativi: tali sono le infusioni leg- Clisteri e
lassativi
blandi.
giere di senna e di manna; delle piccole dosi di eler-
uario lenitivo, di cremore di tartaro; di samarindi, di
prugna bollite, ec. Ma fa d'uopo di ben guardarsi
dal mettere in opra i purganti forti e drastici.

Mediante sì fatto metodo la febbre può essere ri- Chinachi-
na allora
chè la feb-
bre s'è re-
sa inter-
mittente.
regolare.
dotta in pochi giorni a delle intermissioni distinte e
regolari. Qualora vi si sia pervenuto, si può som-
ministrare la chinachina, che compie d'ordinario la
guarigione.

E' inutile di qui ripetere la maniera, con cui si
dee farla prendere; abbiamo avuto molte occasioni di
favellarne nei Capitoli precedenti. (Ved. sopra tut-
to il §. IV; dei Cap. III; e VIII di questo
Vol.)

produca abbastanza. (*Précis de la Mat. Méd.* Tom. I, pag.
337.)

Da queste sagge osservazioni si vede, che qualora almeno Ragioni
per cui non
si dee ado-
perarlo che
con caute-
la.
non si conosce perfettamente il metodo con cui lo Speciale,
a cui indirizzasi, prepara l'emetico, è imprudente cosa l'
adoperarlo. Ci sono degli Speciali, l'emetico de' quali dato
a due grani produce degli effetti grandissimi; altri poi ce ne
sono, la preparazione de' quali nessun effetto produce, ancor-
chè esibita alla dose di quattro grani; tutte queste considera-
zioni devono indurci a non far uso dell'emetico che non del-
le grandi cautele, e quando le circostanze lo esigono assoluta-
mente.

Abbiamo nell' *ipecacuana* un emetico naturale, blando, e L' ipeca-
cuana è più
sicura.
sicuro, che conviene nel maggior numero dei casi. (Ved.
nella Tavola la parola *ipecacuana*, e *tartaro stibiato*.)

Del resto la miglior maniera di adoperare il *tartaro emeti-* Maniera di
adoperare
l'emetico,
allorchè le
circostanze
lo doman-
dano assai
luttamente.
co, si è quella di farne sciogliere quattro o cinque grani den-
tro una foglietta di acqua tiepida: si prende un cucchiaino di
questa soluzione; si mette dentro un bicchiere d'acqua, e si
porge al malato: si replica questa dose ogni quarto d'ora,
finchè l'infermo abbia vomitato; dopo di che si getta via il
residuo.

§. V.

Mezzi di preservarsi dalla febbre remittente.

Preservativi.

I Migliori mezzi di preservarsi da questa febbre sono di prendere degli *alimenti* sani e nutritivi; di osservare la *pulitezza* la più scrupolosa; di custodire il *corpo* in un calore moderato; di fare un conveniente *esercizio*; di evitare da ultimo nei paesi caldi i luoghi umidi, la rugiada, l'*aria notturna*, e l'altre cose di questo genere.

Chinachina nelle contrade dove questa febbre è epidemica.

Tabacco nello stesso caso.

Del resto nelle contrade dove ella è *epidemica*, il *preservativo* il più *eccellente* che si possa raccomandare è la *chinachina*, che si può masticare, o prendere *infusa* nell'*acquavite*, nel *vino*, ec.

Ci sono de' Medici che suggeriscono di masticare del *tabacco*. Lo riguardano come utilissimo nei luoghi di *maremma*, per prevenire le *febbri*, sì *remittenti*, che *intermittenti*.

CAPITOLO DUODECIMO.

Del vajuolo, e della inoculazione.

§. I.

Del vajuolo.

Poche persone si trovano che non soccombano a questa malattia.

Questa malattia è sì comune, che ci sono poche persone, le quali in uno o in altro tempo non vi soccombano: ella è la malattia la più contagiosa delle nostre contrade, e da lungo tempo in poi il flagello dell'Europa.

In quale stagione ella sia più frequente; e chi ci sono i più soggetti.

Il *vajuolo* in generale apparisce verso la primavera, diviene frequentissimo nell'estate, lo è meno nell'autunno, ed è rarissimo nell'inverno. I fanciulli ci vanno più soggetti: coloro che si cibano di *alimenti grossolani e indigestibili*, che non fanno suffi-

ciente esercizio, che abbondano d'umori densi, corrono de' gran rischj in questo male.

Si divide il *vajuolo* in *discreto* e in *confluente*: questa ultima specie è sempre accompagnata da pericolo.

Si divide in discreto e in confluente.

(Si dà il nome di *discreto* al *vajuolo*, di cui le *pustole* sono distinte e separate l'une dall'altre: si nomina *confluente* quello di cui le *pustole* numerosissime si congiungono tra di loro, in guisa che parecchie sembrano formarne una sola.

Cosa debbasi intendere per questi termini.

Questa distinzione fondata nella Natura non dee far riguardare questi due *vajuoli* come di specie differenti: questi non sono che gradi dello stesso male. I Pratici giudiciosi, dice il Sig. LIEUTAUD, non la ignorano: si vede anzi assai di sovente, contro tutto ciò che ne viene asserito, il *vajuolo discreto* più pericoloso del *confluente*, tanto per il numero delle *pustole*, come per la violenza de' *simptomi*. D'altra parte il governo dell'uno è assolutamente lo stesso che quello dell'altro; non si tratta che di proporzionare la dose de' *rimedj* al pericolo.)

Queste differenze non sono che de' gradi della medesima malattia.

È stato ancora diviso il *vajuolo* in *cristallino*, nel quale la *marcia* è chiara e senza consistenza; in *sanguigno*, ec.

Altra divisione del vajuolo.

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni del vajuolo.

IL contagio è la via la più ordinaria per cui si comunica il *vajuolo*; e dal momento in poi che questa malattia è stata portata in Europa, non siamo per anco venuti interamente a capo d'impedire ch'ella non sia *contagiosa*: ed è perchè non si sono usati, almeno ch'io lo sappia, i mezzi convenevoli onde pervenirvi; in guisa che attualmente il *vajuolo* è divenuto in certo modo una malattia *consuetudinaria*.

Il contagio è la cagione la più frequente del vajuolo.

I fanciulli che si sono soverchiamente riscaldati nella corsa, alla lotta, ec.; gli adulti che si sono poc' anzi dati ad una qualche fregolatezza, sono moltissimo disposti ad essere attaccati dal *vajuolo*.

168 *Parte Seconda, Cap. XII. §. 1. Art. II.*
Io, qualunque volta non l'abbiano per lo innanzi
sofferto .

ARTICOLO SECONDO.

Sintomi del vajuolo.

*Sintomi
fortiori .* Questa malattia è così universalmente conosciuta,
che rendesi inutile l'entrare nella stessa minuta
de' suoi *sintomi* .

I fanciulli per l'ordinario sono tristi, indifferenti,
o assopiti durante i due o tre giorni, che precedono
i *sintomi* i più considerabili del *vajuolo* (1). Bevono
più dell'ordinario; anno poco gusto pegli *alimenti*
solidi, si lagnano di lassatezza; e sono molto disposti
a sudare per poco che facciano di *esercizio* .

*Sintomi
dell' eru-
zione vici-
na .* Questi *sintomi* sono susseguiti da vicende leggiera
di freddo e di caldo . A misura che il tempo dell'
eruzione si avvicina, questi *sintomi* acquistano più di
forza, e sono accompagnati da doglie nei *reni*, alla
testa; da vomiti, (o almeno da voglie di vomita-
re,) ec. : il polso è *veloce*; la *pelle* è infocata;
l'infermo agitato. Qualora siasi assopito, si sveglia
come scrollando, e con una specie di orrore: *sintomo*
ordinario dell'*eruzione* vicina, come lo sono altresì
le *convulsioni* ne' fanciulli di tenera età.

(1) Tuttavolta, dice il Sig. TISSOT, presso i fanciulli d'
un *temperamento sardo è stemmatico*, ho veduto che una lega-
giera agitazione nel *sangue*, avanti che i *brividi* comparis-
sero, loro impartiva una vivacità, un brio, e un colorito che
non avevano per solito.

Alla fine dell'estate passato feci la stessa osservazione sopra
un fanciullo di cinque anni, e nel mese di febbrajo di quest'
anno in una giovanetta di quattordici anni, soggetti tutti e
due fino allora malinconici e tristi. Il loro *vajuolo* si annun-
ziò per via di un'allegria e giocondità, che fecero presagire
alla stessa madre della fanciulla, ch'essa già covasse un qual-
che gran male.

Tanto è vero che la Natura, per avvertirci del nimico che
viene ad attaccarci, ha sempre l'attenzione di vestirci d'un
carattere che contrasta col nostro proprio, e ch'essa prende
eziandio quello delle persone in salute, quando egli sia a noi
straniero ed insolito!

Verſo il terzo o quarto giorno, dal momento in cui il diſagio di ſalute s'è manifeſtato, le *pustole* in generale cominciano ad apparire: talvolta ſpuntano più di buon'ora; ma queſto non è poi un ſegno favorevole. (Cio indica ordinariamente che il *vaiuolo* ſarà *conſuente*.)

Tempo in cui le pustole cominciano a comparire.

Le prime apparenze delle *pustole* raffomigliano a delle *morficature di pulci*; e ſi fanno dapprima vedere ſul viſo, in ſeguito ſulle braccia, indi ſul petto, ec.

Caratteri ch'effe anno dapprima.

Acciocchè i ſintomi ſieno i più favorevoli, fa di meſtieri che l'*eruzione* ſi faccia lentamente, e che la *febbre* ſi dilegui ſubito che appariſcono le *pustole*.

Cio che rende i ſintomi favorevoli.

Nel *vaiuolo diſcreto benigno*, le *pustole* di rado ſi manifeſtano avanti il quarto giorno, dappoi che il diſagio di ſalute ha cominciato; e in generale continuano gradatamente a ſortire nel corſo de' di ſeguenti.

Regola dell'eruzione nel vaiuolo benigno.

Le *pustole* che ſono *diſcrete*, di cui la baſe è d'un bel vermiglio (*), che ſono ripiene d'una materia *putrida*, denſa, biancaſtra a prima viſta, e poſcia d'un color gialliccio, ſono le migliori.

Caratteri favorevoli delle pustole.

Le *pustole* al contrario che ſono d'un colore bruno e livido, formano un ſintomo infauſto; ed egli è parimente della ſteſſa natura, quando ſono, piccole appianate, e che anno delle nere taccherelle nel loro mezzo. Quelle che contengono un'acqua limpida, *icoroſa*, ſono peſſime.

Infausti e pericolosi.

Un gran numero di *pustole* ſopra la faccia è ſempre accompagnato da pericolo: è ancora un triſto ſegno quando ſono *conſuente*, ch'è quanto a dire, quando ſi toccano, o che l'una coll'altra conſondonſi.

Egli è un ſegno cattivo allorchè ſono in gran numero ſopra la faccia.

(Nel *vaiuolo conſuente* la *febbre* non cedé interamente dopo l'*eruzione*; ne rimane un poca tuttora, ed ogni ſera raddoppiaſi. Nel *vaiuolo di malvagio ca-*

La febbre non cede dopo la eruzione del vaiuolo.

(*) Queſto carattere è ugualmente favorevole nel *vaiuolo inoculato*: quindi gl'Inoculatori ſono attentiffimi nel rimarcarlo, e quando egli ſi preſenta, ne traggono il più felice *pronofico*, che non delude giammai le loro ſperanze.

confusione
e di pra-
vo caratte-
re.
Sintomi
i più peri-
coli.

rattere, questa febbre è sensibilissima per tutto il corso del male, ed i raddoppiamenti sono più o meno violenti.)

Ma i *sintomi* i più infauti sono le *petecchie*, o delle macchie *porporine*, brune, nere, che stanno fraposte alle *pustole*. Esse annunziano una dissoluzione *purrida* del sangue, e per conseguenza il sommo de' pericoli. (Ved. Cap. II, nota 2, e 3 di questo Vol.)

Le *feccie* e l'*orine* sanguigne, la tumidezza del ventre, la *stranguria* o la *soppressione* dell'*orine*, sono pessimi *sintomi*. Le *orine* pallide, le *pulsazioni* sensibili nell'*arterie* del collo, annunziano il *delirio* e gli *accessi* di *convulsione*. Se il viso non si gonfia; se al contrario si deprime avanti che le *pustole* sieno giunte a maturità, questo è uno svantaggiosissimo segnale.

Tempo
dell'infag-
gione del
viso e dell'
altre parti.
Ordine con
cui ciò dee
seguire.

Ma se il viso si gonfi verso l'undecimo o duodecimo giorno, mentre che le mani e i piedi cominciano ad intumidirsi, il malato s'incammina alla guarigione. V'ha per lo contrario ogni motivo di temere, qualora i *sintomi* non seguano con quest'ordine.

Allorchè la lingua è coperta da una crosta nereggiante, questo è indizio funesto. Tale è ancora quando il malato sente de' *brividi* nello stato più avanzato del male. Il ringhio de' denti, quando abbia per cagione l'irritamento del *sistema nervoso*, è un segnale perverso; ma talora ciò procede da' *lombrici* o da una affezione dello *stomaco*.

(Gli eccessivi *sudori* sul principio del *vajuolo* sono d'infautto presagio: la *scorrenza* di *urine*, come pure la ostinata *stisichezza*, sono da temersi: la *diffusim* o la *difficoltà* d'*orinare*; le *feccie* verdastre, estremamente fetide; le *convulsioni* dopo l'*eruzione*, o nel corso della *suppurazione*; la *salivazione* intercetta presso gli adulti; la cessazione della *diarrea* ne' fanciulli, sono accidenti più o meno gravi, che possono avere le conseguenze le più dolorose.)

ARTICOLO TERZO.

*Regola di vitto che si dee prescrivere ai malati
attaccati dal vajuolo.*

SIN dalle prime apparenze de' *sintomi* del *vajuolo*, si mettesi in iscompiglio, si ricorre ai *rimedj*, sempre col rischio della vita dell'infermo. Ho veduto de' fanciulli che per cedere all'importunità de' loro genitori costernati, sono stati *salassati*, *purgati*, e a' quali s'erano applicati i *vescicatorj*, a segno che nel tempo della *febbre* che precede l'*eruzione*, la Natura era stata non solamente turbata nella sua operazione, ma ancora s'era resa incapace di sostenere o di mantenere le *pustole*, dopo ch'erano sortite. Così questi malati, sfiniti da tali *evacuazioni*, soccombevano sotto il peso del male.

Condotta pericolosa che si tiene ordinariamente nel primi giorni del vajuolo.

Allorchè si manifestano delle *convulsioni*, sgomentasi al maggior segno, dassi fretta di volerle calmare mediante qualche *rimedio* arcano, come se fossero la malattia *essenziale*: esse non sono che il *sintomo* dell'*eruzione* che deve succedere: *sintomo* che non è nemmeno infausto. Siccome queste *convulsioni* d'ordinario svaniscono anzi che le *pustole* compariscano, non si manca di attribuirne il dileguamento al *rimedio*, che per tal mezzo acquista della rinomanza senza meritarsela (a).

Le convulsioni presso i fanciulli non sono sintomi pericolosi.

Tutto ciò ch'è necessario di fare, generalmente parlando, nel corso della *febbre* che precede l'*eruzione*, appellata *febbre eruttiva*, è di tenere il malato

Cosa bisogna fare durante la febbre che

(a) Le *convulsioni* nel *vajuolo* mettono senza dubbio della costernazione; ciò non ostante producono soventemente degli effetti salutari. Appariscono essere uno de' mezzi che la Natura adopera per abbattere la violenza della *febbre*. Ho sempre veduta diminuita la *febbre*; e interamente dileguata talvolta, dopo uno o più *accessi* di *convulsioni*. Si debbono per tanto riguardare le *convulsioni* (massime nei fanciulli) come un *sintomo* favorevole nella *febbre* che precede l'*eruzione* del *vajuolo*, poichè tutto ciò che impiccolisce la *febbre*, scema l'*eruzione* del pari. Perché?

precede l'
eruzione .

fresco e bene agiato ; di fargli bere copiosamente delle *tisane* leggiere e *diluenti* , come una *infusione* di *menta* , dell' *orzata* , del *siero chiarificato* , dell' acqua di *cremore d'avena* , ec.

Non bisogna obbligarlo al letto ; fa d' uopo ch' ei stia levato , per quanto lo potrà . Non si mancherà di bagnargli sovente le gambe e i piedi nell' acqua tiepida . Se gli daranno de' soli *alimenti* leggeri , e si avrà cura , per quanto sarà possibile , che non sia incomodato da romore o dalla compagnia delle visite .

Per quin-
to benigno
sia il vajuolo,
non bi-
sogna ab-
bandonare
il malato
a' propri
capricci .

(Questa malattia è talvolta sì leggiera , che l' *eruzione* succede quasi senza aver sospetto che il fanciullo sia malato , e il progresso corrisponde al principio . Le *pustole* sortono , ingrossano , marciscono , e maturano , senza che il malato guardi il letto ; senza ch' ei dorma meno , nè che abbia minor appetito dell' ordinario . E' assai comune nelle campagne il vedere de' fanciulli (imperciocchè non sono che i fanciulli quelli che lo abbiano sì leggiero ,) passare all' aria aperta tutto il tempo della loro malattia ; correndo e mangiando come in istato di salute : coloro eziandio che lo anno un po' più grave , sortono ordinariamente subito che l' *eruzione* è interamente compiuta , e si abbandonano senza riguardo alla voracità del loro appetito . Malgrado questa poca cura , parecchi guariscono perfettamente .

Malori che
ne sono le
conseguen-
ze .

Ma , come in seguito lo vedremo , questo non è un esempio da seguirsi ; perchè parecchi ne provano delle conseguenze fastidiosissime . Il Sig. TISTOT dice di aver veduto copioso numero di questi fanciulli , che dopo avere avuto sì fatto *vajuolo* felice , ma curato malamente , erano caduti in malattie di differenti specie difficilissime da distruggersi . Non è raro il vedere di questi fanciulli così trascurati , i quali anno perduto la vista , l' udito , l' uso delle gambe , ec.)

Pericoli
del lasciare
il malato
in letto , di
dargli de'
cordiali ,
ec.

Niente v' è di più periglioso pel malato , quanto sforzarlo a restare nel letto durante questo primo periodo della malattia ; e l' ingozzarlo di *cordiali* , o di *rimedj sudoriferi* , ec. (2) .

Malattie
nelle quali

(2) I *sudoriferi* sono utilissimi nelle malattie , che ricondol-

Tutte queste droghe riscaldanti infiammano il sangue, aumentano la febbre, e precipitano il progresso dell'eruzione. Ne risultano degl'innumerevoli inconvenienti. Questi rimedj non solamente accrescono il numero delle pustole, ma ancora le rendono confluenti: e allorchè queste sono sortite con troppa fretta, elleno si deprimono ordinariamente avanti d'essere pervenute al grado di maturazione necessaria.

Effetti de' cordiali, e de' sudoriferi.

Sino dai primi indizj del vajuolo si vedono le donnicciuole opprimere i fanciulletti con cordiali, zaffirano, seriaca, vino, punch, e acquavite eziandio. Tutto ciò, dicono esse, per rimuovere l'eruzione dal cuore. Questo errore, come pure mille altri, ha la sua sorgente nell'abuso di questa osservazione giustissima: Che il vajuolo sorte meglio qualora la pelle sia morbida, umidiccia, e che il malato allora si trova in miglior stato, che quando ella sia arida e secca.

Errore sul quale è fondata l'opinione del popolo relativamente al rimedio riscaldanti nel vajuolo.

cono per loro cagione o la soppressione della traspirazione insensibile, o quella del sudore. Tali altresì riescono in certe malattie contagiose, la materia delle quali ha qualche disposizione a portarsi verso la pelle: a cagione di esempio nei casi di veleni, nelle malattie veneree, nei reumatismi, ec.

i sudoriferi sono utili.

Ma nelle malattie acute qualora si somministrino senza che la Natura sia disposta al sudore, il malato se ne troverà peggio, perchè essendo tutti riscaldanti, il calore troppo eccessivo del sangue, o la circolazione soverchiamente rapida di questo fluido, sono altrettanti ostacoli alla traspirazione.

Nell'altre riescono dannosi.

Tra tutte le malattie acute, il vajuolo è quella in cui il popolo è più propenso ad impiegare i sudoriferi. Si vede che l'eruzione si fa nel mentre che il malato è in sudore, e ch'egli si trova meglio come tosto questa eruzione s'è fatta: da ciò si conchiuse ch'eccitando il sudore, si affretterebbe l'eruzione, e che si recherebbe sollievo al malato: ma per la ragione che abbiamo testè arrecato, i riscaldanti in questo caso ben lungi dall'eccitare il sudore, non solo non promuovono la traspirazione, ma per lo contrario l'impediscono. (Ved. Parte I, Cap. II, nota 2.)

Perchè si usano familiarmente nel vajuolo.

Per ciò una tale condotta ogni giorno ci fornisce di tristi esempj dei suoi effetti funesti. Le deposizioni purride sulle parti esterne, anzi dentro i polmoni e negli altri visceri; la cancrena, il cario de' denti, conseguenze tanto comuni di questo morbo, e per cui il malato quasi sempre perisce, di spesso non riconoscono altre cagioni.

Mali che cagionano.

Soll' essi, in cui il sudore è utile nelle malattie acute.

Ma questa non è una ragione per intraprendere di far sudare il malato. Il sudore non è giammai utile, se non esca spontaneamente da se, o che non sia l'effetto di bevande leggiere e diluenti.

Le nutrici non devono tenere seco loro coricati i fanciulli com'essi da vajuolo.

I fanciulli sono sovente sì capricciosi, che non vogliono restare in letto senza avere al loro canto le proprie nutrici. Questa condiscendenza non può avere che degli effetti dannosi per la nutrice, e pel fanciullo. Primieramente il calore naturale della nutrice non può a meno di non accrescere la febbre del fanciullo; in seguito se la nutrice giunge a contrarre la febbre, come pur spesso accade, il pericolo si farà vie maggiore per tutti e due (b).

Non si dee permettere che parecchi fanciulli tocchi di vajuolo dormano insieme.

Far dormire nello stesso letto parecchi fanciulli che anno il vajuolo, questo è un esporli a conseguenze le più fastidiose: non si deve, se sia possibile, giammai collocarne nemmeno due nella stessa camera; poichè la respirazione, il calore, il puzzo, ec. tutto tende ad aumentare la febbre, e per conseguenza la malattia.

Malori che ne sono la conseguenza.

E' solito di vedere presso la povertà due o tre fanciulli coricati sullo stesso letto, sì coperti di bolle, che la pelle dell'uno si trova agglutinata con quella dell'altro. Non si può essere testimonj di simile spettacolo, senza che il cuore non si commuova. E' di qual modo mai non dovrebbe la contagione infettare costesti miseri sciagurati? Per la qual cosa la maggior parte perisce pegli effetti funesti di questa pratica assurda del pari che inumana (c).

Osservazioni sopra i pericoli che ne risultano.

(b) M'è toccato vedere una nutrice, la quale ancorchè avesse di già avuto il vajuolo, ne restò sì infettata per aver dormito con un fanciullo che aveva un vajuolo di pravo carattere, ch'essa ebbe non solamente un numero copioso di pustole sopra tutte le parti del corpo, ma ancora una febbre maligna, che fu suffeguita da gran numero di ascessi, da cui a gran pena rifand. Noi riferiamo questa osservazione, per rendere gli altri guardinghi contro il pericolo di questa malattia sì contagiosa.

(c) Questa osservazione è ancora applicabile agli spedali, ec. dove accade che parecchi fanciulli abbiano il vajuolo nel-

Niente v'è di più sconcio dell'usanza tra il più abbierto popolo, di tenere sordidamente i fanciulli negli stessi panni per tutto il corso di questo morbo nauseoso. Ciò fanno per la tema che il malato non pigli freddo, qualora si volesse mutarnelo; ma da ciò ne risultano le conseguenze le più dolorose.

I malati infetti di vajuolo devono essere sovente mutati di biancherie.

Queste ruvide biancherie divengono dure, perchè l'umore che incessantemente trapela, forma prestamente de' strati densi che acquistano della consistenza, e che stracciano la pelle tenera di tai fanciulli. Elleno mandano poscia un puzzo sempre pernicioso e pel malato, e per coloro che ne tengon cura. Di più il sudiciume, le sporcherie che vi stanno aderenti, sono di nuovo assorbite da' pori della pelle, rientrano nella massa del sangue, ed aggravano il male. (Ved. Parte I, Cap. IX, nota 2.)

Perchè?

Se mai non deesi soffrire che un malato resti nella sporczia, allorchè egli è attaccato dal male interno, con più di ragione devesi usare attenzione su ciò nel tempo del vajuolo. Le malattie della pelle anno di sovente origine dalla sola immondezza; essa per tanto è sempre capace di aumentarle.

Quanto la sporczia sia nociva nel vajuolo.

Si rinfrescherà e si ricreerà singolarmente il malato, qualora si possa cangiarlo ogni giorno di biancherie. Vero è che bisogna avere attenzione di non adoperare che de' panni asciuttissimi. Uopo è altre-

Utilità del cangiar ogni giorno il malato di biancherie. Con quale cau-

lo stesso tempo. Ho veduto più di quaranta fanciulli infermi nella stessa sala, durante tutto il tempo di questa malattia, senza che alcun di loro avesse la libertà di respirare un'aria fresca. Chi non vede quanto sia dannosa sì fatta condotta? Una regola per tanto che si dovrebbe seguire in tutti gli spedali, non solamente riguardo al vajuolo, ma ancora riguardo a tutte le altre malattie, sarebbe che ciaschedun malato fosse collocato in maniera di non essere veduto, nè inteso da un altro. (Il Sig. LE ROY, nel piano del suo spedale adempie perfettamente a questa intenzione. Ved. Parte I, Cap. XI, §. II, nota 4.)

Questa è un'attenzione, cui non si presta abbastanza di riguardo. Nella maggior parte degli spedali e dell'infermerie, il malato, il moribondo, il morto si trovano spesso volte nella stessa sala.

sta bi-
gna farlo.

sì, ch'essi sieno riscaldati, e di non metterglieli che quando egli sente meno di caldo. (Ved. Parte I , Cap. IX, nota 2.)

Pregiudizio
del popolo
intorno il
vitto ri-
scaldante.

Malgrado tutto ciò che s'è potuto dire contro il vitto *riscaldante* nel *vajuolo*, il pregiudizio del volgo è ancora su questo proposito sì forte in questa paese, che si vede tutto giorno buon numero di persone cadere in questo errore.

Esempj che
provano che
si può con
sicurezza
esporre all'
aria aperta
i malati di
vajuolo.

Ho veduto delle povere femmine a viaggiare nel più fitto verno, portando seco i loro fanciulli malati di *vajuolo*: ne ho di spesso osservato dell'altre mendicare per le vie con i loro fanciulli tra le braccia, coperti di *pustole*, e non ho giammai udito dire che veruno di questi sia morto per sì fatta condotta. Non è poi possibile di offrire degli esempj che provino d'una maniera più evidente, che si può, almeno con sicurezza, esporre all'*aria* aperta i malati di *vajuolo*.

Non biso-
gna espor-
li ne' pas-
segi pub-
blici.

Perchè?

Questa però non è una ragione per esporli in pubblico: egli è comunissimo di vedere oggidì questa spezie di malati a prender l'*aria* nei pubblici passeggi all'intorno delle grandi Città. Questa condotta, che appaga la vanità degl'*Inoculatori*, è pericolosa per i cittadini, e contraria ai riguardi che si debbono all'umanità e ad ogni buona politica, avvegnachè costesti ammalati possono disseminare il *contagio*.

Quali deb-
bano essere
gli alimen-
ti nel va-
juolo.

Gli *alimenti* in questa malattia devono essere leggerissimi e di qualità *vinfriscante*. Delle *panatelle*, o del *pane* bollito con una eguale quantità d'*acqua* e di *latte*; de' *pomi* di buona qualità, corti dinanzi al fuoco, o bolliti con del *latte*, e *addolciti* con un po' di *zucchero*, ec. sono quelli che convengono.

Qual deb-
ba essere la
bevanda.

La bevanda sarà composta di parti eguali d'*acqua* e di *latte*; di *siero chiarificato*; di *tisana d'orzo*, di *cremore d'avena*, ec. Quando le *pustole* saranno turgide, il *latte di butirro* è una bevanda convenientissima.

ARTICOLO QUARTO.

Rimedj che si possono somministrare ai malati di vajuolo.

SI distinguono quattro periodi in questo male: la *febbre che precede l'eruzione*: l'eruzione medesima: la *suppurazione*, o il tempo che la Natura impiega nel maturare le *pustole*, e la *febbre secondaria* (3).

Bisogna distinguere quattro tempi nel vajuolo.

Cura del primo periodo, o tempo della febbre che precede l'eruzione.

Abbiamo già detto che nel corso della prima *febbre* bastava tenere il malato frescamente e tranquillamente; dargli delle bevande *diluenti*; bagnargli soventemente i piedi e le mani nell'*acqua tiepida*, ec. (Ved. di sopra pag. 172. e seg. di questo Vol.)

Cosa basta prescrivere ai fanciulli in questo primo tempo.

Tuttochè in generale questo sia il metodo: il più sicuro per fanciulli, gli adulti però d'una *costituzione forte e pleuritica* anno talvolta bisogno della *cacciata di sangue*. Il *polso pieno*, la *pelle secca*, e gli altri *sinomi d'infiammazione*, rendono necessaria codesta o-

Simomi che presso gli adulti indicano il salesto.

(3) La *febbre secondaria* è propriamente la *febbre di suppurazione*: perciò ella si manifesta dacchè la *suppurazione* comincia, e si mantiene per tutto il tempo che questa dura. Ma questa *febbre secondaria*, e quella che precede l'*eruzione*, non sono ben distinte, fuorchè nel *vajuolo benigno*, dove la *febbre* che precede l'*eruzione*, come lo abbiamo fatto osservare, cessa ordinariamente dopo l'*eruzione*. (Ved. di sopra pag. 169 di questo Vol.) Imperciocchè nel *vajuolo di pravo carattere e maligno*, la *febbre* non cessa dopo l'*eruzione*, nè fa che rinforzarsi durante la *suppurazione*, la quale dà principio al terzo tempo, o periodo del male.

Cosa intendasi per febbre secondaria del vajuolo.

In tal caso dunque la presenza di questa *febbre secondaria* si riconosce solo dall'intensità dei *sinomi*, e dall'esistenza della *suppurazione*.

Noi daremo per quarto periodo della malattia il disseccamento delle *pustole*, dopo di che le croste cadono; cosa che accade tra il duodecimo e decimo sesto giorno di male. (Ved. in seguito la nota 8 di questo Cap.)

perazione ; ma qualora almeno questi *sintomi* non sieno urgenti , è più sicuro di farne a meno . Se il ventre è *duro e pieno* , bisogna usare de' *clisteri molli* .

Vantaggi
de' clisteri
in questo
primo pe-
riodo del
vajuolo .

(I *clisteri* contribuiscono a scemare la doglia di capo ; a diminuire le propensioni al vomito e i vomiti , che assai molestano certi malati , ma che si cerca mal a proposito di sedare mediante la *confezione giacintina* , la *teriac* , l' *acqua di melissa* , e gli altri *liquori spiritosi* , e *riscaldanti* , e di cui è ancora più pericoloso di voler togliere la cagione mercè dell' *emetico* , o d' un *purgante* , che sono *rimedj* perniciosi nei principj di questo male , se se ne eccettui un picciol numero di casi , di cui il Medico solo può giudicare con sicurezza . (Ved. Cap. V , nota 3 , di questo Vol.)

Utile del
salasso
quando sa-
rà indicato:
circo stanze
dove fa d'
uopo ripe-
tezzio .

Quanto al *salasso* , di cui abbiamo poc' anzi favellato , fa di mestieri eseguirlo dacchè i *sintomi* che lo indicano si manifestano ; e se dopo questa operazione lo stato del malato dura lo stesso ; se in oltre il *polso* diviene più *pieno* , più *duro* ; se v'abbia *sonore* o *vaneggiamento* , forza è ripeterlo dentro le ventiquattr' ore . Il Sig. TISSOT ha fatto fare sino a quattro *salassi* ne' due primi giorni , a de' giovani ch' erano in questo caso .)

Cosa sia da
farsi quan-
do v'ab-
biano delle
voglie di
vomitare .

Se il malato abbia delle *nausee* moleste o delle voglie di vomitare , se gli darà una *infusione* de' fiori di *camomilla* , o di *acqua tiepida* , per ripulirgli lo *stomaco* .

Siccome nel cominciamento della *febbre* che precede l' *eruzione* delle *pustole* del *vajuolo* , la Natura tenta ordinariamente una *evacuazione* pel l'alto o pel basso , qualora si secondi , si contribuirà singolarmente a rintuzzare la violenza del morbo .

Come si
debba aju-
tare la sup-
purazione ,
quando le
pustole co-
minciano a
compare .

Sebbene tutto il governo di questa prima *febbre* unicamente consiste nel *virtù rinfrescante* , ec. ad oggetto di prevenire la troppo grande affluenza delle *pustole* ; ciò nulla ostante quando queste cominciano a manifestarsi , nostro dovere si è di favorire la *suppurazione* mercè le bevande *diluenti* , gli *alimenti leggeri* , e per via de' *cordiali* , allorchè la Natura appaja inoperosa .

Quando il polso profondo, e che risveglia la sensazione d'un verme che striscia; quando la perdita delle forze, i sfinimenti, e un grande abbassimento rendono i cordiali necessari, in allora consigliamo il vino generoso, che si può esibire dentro una quantità eguale d'acqua, acidulato con del succo di cedro, d'arancia, o della gelatina d'uva spina, ec. il siero di latte vinoso egualmente acidulato conviene altresì in questo caso.

Bisogna per altro guardarsi bene di non riscaldare soverchiamente il malato; imperciocchè in luogo di agevolare la eruzione, essa ne sarebbe ritardata. (Ved. nota 2 di questo Cap. pag. 172. di questo Vol.)

Circo-
sta-
za che
dica-
no i
cordiali.

E' da
gu-
dar-
si dal
ri-
scaldare
soverchia-
mente il
malato.
Perchè i

Cura del secondo periodo, o tempo dell'eruzione.

Talvolta la violenza della febbre s'opponne alla eruzione. In questo caso il vitto rinfrescante deve essere seguito con tutto il rigore: non solamente fa di mestieri che la camera del malato sia rinfrescata col rinnovellamento dell'aria, ma bisogna ancora farlo frequentemente sortire dal letto, o tenervelo leggiermente coperto.

Allorchè una grande agitazione mette ostacolo all'eruzione ed al gonfiamento delle pustole, forza è di amministrare alcuni calmanti leggieri; ma bisogna sempre usarli con prudenza.

Per un fanciullo un cucchiaino da caffè di sciloppo di papavero o di diacodion, ogni cinque o sei ore, sarà bastevole, e si replicherà fino a che se ne abbia ottenuto l'effetto bramato. Per un adulto un cucchiaino da tavola soddisferà alla stessa intenzione (4).

Caso in cui
il vitto rin-
frescante è
d'una ne-
cessità assolu-
ta.

Caso che
indica cala-
re i manti.

Dose di
questi ri-
medi per
i fanciulli.
Per gli ad-
ulti.

(4) Lo sciloppo di diacodion è uno de' più blandi narcotici: richiama il sonno, modera i dolori, ec. tuttavia non bisogna adoperarlo che con riserva, massime nel vajuolo. Abbiamo di già narrato i malori che dà motivo, allorchè viene amministrato da alcune nutrici o da alcuni imprudenti,

Con quale
prudenza si
debbano am-
ministrare
nel vajuolo.

Cosa biso-
gna fare nel
caso di sop-
pressione
d' orina .

Nel caso di *stranguria* o di *soppressione d' orina*, ac-
cidente assai ordinario nel *vajuolo*, bisogna far forti-
re l'infermo dal letto; e qualora sia in istato, fa d'
uopo ch'egli passeggi a piè nudi per la camera. Se
le forze non glielo permettono, si metta ginocchio-
ni sul letto, e di tanto in tanto si sforzi di cacciar
fuori l'orine.

Importan-
za d' un
fiusto co-
pioso d' o-
rine nel va-
juolo .

Allorchè questi ajuti non riusciranno, se gli darà
più o meno soventemente, secondo che sarà necessa-
rio, un cucchiaino da caffè di *spirito di nitro dolcifi-
cato* dentro un bicchiere della sua bevanda: niente
di più utile, di più vantaggioso nel *vajuolo*, quanto
una *evacuazione* abbondante d'orine.

Gargarif-
mo per
nettare la
bocca e le
fauci .

Allorchè la bocca è impastricciata; che la lingua
è secca e screpolata, bisogna che il malato si riscia-
cqui di frequente, e si gargarizzi la bocca e le fauci
con dell'acqua e del *mele*, ai quali si aggiungerà
un po' di *aceto* o di *gelatina d' uva spina*.

Se il ven-
tre è chin-
so, devonfi
fare de' cli-
steri am-
mollienti .

Accade sovente che il malato non scarichi il ven-
tre per tutti gli otto o dieci primi giorni del *vajuolo*:
sì fatto accidente non solo riscalda ed infiamma
il *sangue*, ma gli escrementi eziandio soggiornando
troppo lungo tempo nel corpo divengono *acri*, anzi
puridi, ed anno delle fastidiose conseguenze. E' dun-
que necessario, allorchè il ventre è restio, di usare
de' *clisteri ammollienti* ogni due o tre giorni in tutto
il corso del male; essi rinfrescheranno, e solleveran-
no singolarmente il malato. (Ved. Cap. V, nota 3,
pag. 79 e 177 di questo Vol.)

e ne abbiamo esposto le ragioni nella Parte I, Cap. I, §.
VII, nota 38.

Disordini
che ne so-
no le con-
seguenze
allorchè
vengono
esibiti mal-
a proposi-
to .

Per passare all'uso di questo *rimedio*, richiedesi che l'agi-
tazione sia la vera cagione che si opponga all'*eruzione* e all'
innalzamento delle *pustole*. Ma fuori di questo caso, bisogna
astenersene, perchè sarebbe capace di produrre dell'*ingerga-
mento* nei vasi, l'*infiammazione della pelle*; e per consequen-
za di rendere lo stato della malattia peggiore di prima. Cre-
diamo adunque che sarà cosa più saggia di non assumersi giam-
mai l'impegno di amministrare questa specie di *rimedio*, ma
di chiamare un Medico, in questi casi che appajono cotanto
gelosi.

Quando le *petecchie*, o le macchie *porporine*, livide, o nere, sopravvengono e appajono tra le *pustole*, forza è di somministrare la *chinachina* ad una dose tanto grande, quanto lo stomaco del malato potrà sopportarla. Per un fanciullo:

Cosa bisogna fare allorchè si presentano delle *petecchie*, ec.

Prendete *chinachina* della migliore, due dramme; acqua di *cinnamomo semplice*, un'oncia; *sciloppo d'arancia* o di *limone*, due oncie.

Chinachina acidulata.

Riducete la *chinachina* in polvere finissima; scioglietela in tre oncie di acqua comune; aggiungetevi l'acqua di *cinnamomo* e lo *sciloppo*; acidulate questa *mistura* con alquante goccioline di *spirito di vitriolo*; se ne dà ogni ora un cucchiaino ordinario.

Dose per li fanciulli;

Si può prescrivere lo stesso rimedio ad un adulto; ma bisognerà che ne prenda tre o quattro cucchiaini ogni ora.

Per un adulto.

Non occorre usare scarsamente di questo rimedio, ma sì bene adoperarlo tanto spesso quanto lo stomaco potrà permetterlo: poichè allora produce quasi sempre i più felici effetti. Ho veduto altresì frequentemente, mediante la *chinachina* e gli *acidi*, sparire delle *petecchie*, e un *vajuolo*, che aveva l'aspetto il più minaccioso, pullulare assai bene, e riempierli d'una materia di buona qualità.

Felici effetti di questo rimedio esibito nel caso che sia indicato, e in dose convenevole.

In questo caso la bevanda del malato deve essere corroborante: tal è il buon vino, acidulato collo *spirito di vitriolo* coll'aceto, col succo di *limoni*, o la *gelatina d'uva spina*, ec. Gli alimenti devono consistere in *pomi cotti* o *bolliti*; in *ciliegie candite*, in *prugna*, e in altre frutta di qualità acida.

Bevanda e alimenti che devono accoppiarsi all'uso della *chinachina*.

La *chinachina* e gli *acidi* sono necessari non solamente nel *vajuolo* accompagnato da *petecchie*, o da *sintomi maligni*; eglino lo sono parimente nel *vajuolo cristallino*, in cui la *marcia*, o la materia delle *pustole* manca di consistenza, e non è lavorata convenevolmente. Imperciocchè la *chinachina* sembra possedere la virtù singolare di aiutare la Natura nella preparazione della *marcia*, o di ciò che appellasi la materia lodevole del *vajuolo*; conseguentemente ella non può essere che utile in questo morbo, e in quelli la di cui *crisi* dipende da una *suppurazione*.

La *chinachina* è egualmente necessaria nel *vajuolo cristallino*. Perché?

Ho di frequente osservato nel *vajuolo* in cui le *pu-*

Vantaggi della *china*.

ghisa al-
lorchè le
pustole so-
no depre-
sse, ec.

role erano depresse, e piene d'una materia tenue, trasparente, e che mostrano di voler divenire *con-*
fluenti, che l'uso della *chinachina acidulata* nel modo
soprammentovato, cangiava proficuamente il colore e
la consistenza della *marcia*, e produceva gli effetti i
più felici.

La depre-
ssione istan-
tanea delle
pustole met-
te il mala-
to in gra-
ve perico-
lo. Da che
dipenda il
più delle
volte si fat-
to acci-
dente.

Allorchè le *pustole* si deprimono istantemente, o,
come dicono le donniceiuole, che il *vajuolo* ritorna
al di dentro, anzi che la materia sia pervenuta alla
sua maturità, il pericolo è grandissimo. Questo acci-
dente è spesso fiate (al che importa moltissimo di
badare) l'effetto d'un *vizzo* riscaldante, o di rime-
dj che anno fatto sortire la materia prima che sia
stata preparata convenevolmente (5).

Non bise-
gua con-
fondere
questo sta-
to con il
disparire
delle pu-
stole per
via di ri-
soluzione.
Cosa serve
a distingue-
re questi
due stati
differenti.

(5) Prima di passare ai *rimedj* che il Sig. BUCKAN si di-
spone a proporre, crediamo di dover fare osservare che acca-
de talvolta che un *vajuolo discreto* e assai *benigno* non ter-
mini per via della *suppurazione*. Le *pustole* in allora spariscon
no poco a poco, e finiscono per *risoluzione*.

Ma in tal caso il malato, ben lungi dall'essere in perico-
lo non prova neppure il menomo *sincompo di febbre*; si trova al
contrario di bene in meglio, a misura che le *pustole* svani-
scono. Non v'è dunque cosa da farsi. Ho veduto tre o quat-
tro *vajuoli* di questa specie; i malati si sono prontamente ri-
stabiliti; la sola cautela che ho creduto di dover prendere,
è stata di purgarli in sulla fine, due volte di più che non
si suole in quelli, le *pustole* de' quali vengono come il consueto
a *suppurazione*.

Il *vajuolo*
che termi-
na per via
di risoluzi-
one, non
è per ve-
run conto
il *vajuolo*
volante.

Caratteri
di quest'ul-
tima ma-
lattia.

Guardisi bene di non ingannarsi: il *vajuolo* di cui parla-
mo, non è quello cui si dà il nome di *vajuolo volante*, o di
piccolo vajuolo: essi anno de' *sincomi* differentissimi. Siccome
si confondono tutto giorno, sicchè sovente si prende quest'
ultimo per il *vajuolo discreto benigno*, e questo abbaglio
autorizza a sostenere sia che si può avere il *vajuolo* più vol-
te, sia che l'*inoculazione* da questo non preserva, noi espor-
remo i caratteri del *piccolo vajuolo volante*, più estesamente
che non abbiamo fatto nelle precedenti Edizioni. Questa de-
scrizione, facilitando il paragone del *vajuolo* col *vajuolo vo-*
lante, impedirà che quelli che vanno in traccia del vero,
sieno d'ora innanzi ingannati da fallaci apparenze.

Sintomi del
vajuolo vo-
lante.

Una *febbre* più o meno sensibile, ma d'ordinario leggera,
e che non dura che ventiquattr'ore, o al più trentasei o qua-
ranta, accompagnata da disagio, da *stanchezza*, da leggier
to *mal di testa*, e qualche volta da *nausea*, precede per lo

Si devono in allora applicare prontamente i vesici- Cosa deve
si prescri-

più l'eruzione; ma sovente la febbre è appena sensibile, e i malati non provano che stanchezza e disagio.

Verso la fine del primo giorno, alle volte del secondo, e raramente nel terzo si fa l'eruzione. Compiuta questa, cessano tutti gli accidenti, nè più comparisce la febbre. I malati riacquistano il loro appetito, e non provano alcuno degli accidenti che sopraggiungono al vero vajuolo.

Le pustole che caratterizzano il piccolo vajuolo sono d'ordinario in poco numero; alle volte però sono abbondanti, e sparse per tutto il corpo. Elleno sono sempre distinte, e giammai confluenti. Dapprima anno il roffore delle pustole del vajuolo, ma i loro progressi sono infinitamente più rapidi: si sviluppano sovente e si disseccano nello spazio di due o tre giorni. Alcune volte nondimeno vi sono anche tra queste, che hanno un termine più lento, e che conservano più a lungo le apparenze del vajuolo; ma il loro numero in confronto dell'altre è al più come 1 a 60.

Caratteri
delle pu-
stole;

Queste pustole sono, per la maggior parte, piene di una serosità limpida, che alle volte diviene bianca, e rassomiglia un poco alla marcia. Non si vede che rarissime volte alla loro base un circolo infiammato delle pustole del vajuolo, nè giammai come queste si appianano nel loro centro: non conservano la forma conica, come le pustole del vajuolo discreto: ma sono elleno sferiche, ed hanno maggior diametro che quello della loro base. Dal loro disseccarsi si coprono di una pellicina sottile e secca, e al cader di questa si scorge una macchia differentissima da quella che si osserva nel luogo delle pustole del vajuolo.

Se si esaminano queste macchie o vestigie quindici giorni dopo il disseccamento, si vede che sono livide, senza profondità nè elevatezza; mentre quelle che succedono al vajuolo, sono purpuree o violate, insavate nel centro, e più o meno rilevate sull'estremità. Le macchie del vajuolo sono almeno tanto larghe quanto lo erano le pustole, quelle del vajuolo volante sono molto meno larghe, eccetto quelle che gl'infermi grattando anno reso infiammate.

Delle vestigie che restano al cader delle pustole.

Li caratteri essenziali del vajuolo volante sono adunque, 1. che l'eruzione apparisce alle volte nel primo giorno, più sovente nel secondo, di rado al cominciare del terzo; ciò che mai non accade nel vajuolo propriamente detto, in cui l'eruzione non si fa per lo più che al cominciare del quarto giorno, come abbiain detto di sopra pag. 169 di questo Vol., quando almeno non debba essere confluyente; ma allora egli è accompagnato da sintomi spaventevoli, e che l'annunziano di attivo carattere: 2. che le pustole non contengono che una

vere nella catorj ai polsi e alle *caviglie* de' piedi, e sostenere le
 depressione forze del malato con de' *cordiali* (6).

Si sono veduti talora degli effetti sorprendenti dal
 nelle pustole *salasso* per fare risollevar le *pustole* depresse. Ma que-
 la vescica- sta operazione ricerca una somma perizia, per sape-
 re esattamente distinguere quando convenga, o fino
 cordiali. a qual punto il malato può sopportarla.

La caccia- Frattanto è sempre bene di applicare de' *cataplasmi*
 ta di sangue ai piedi e alle mani, siccome dotati della facoltà di
 e *cataplas-*

serosità d'ordinario limpida: 3. finalmente che le *pustole* spa-
 riscono al più tardi il quarto giorno, condotta in tutto dis-
 ferentissima, come s'è veduto, dal *vajuolo*. D'altra parte il
vajuolo volante non è mai *confluente*, non mai pericoloso: il
 più sovente si fa l'*eruzione* senza che il malato provi nuo-
 va *febbre*, che sempre quando v'ha è leggera.

Cura. Per tanto questo *vajuolo* non esige altri *rimedj* che uno
 o due *purgativi* quando le *pustole* sono disseccate. Si tratta
 soltanto di tenere il malato in *regola* di *vitto* durante l'*eru-*
zione, e d'impedire che non rientri; ciò che si otterrà, re-
 golandosi, se fa d'uopo di *rimedj*, come lo consigliamo nel-
 la cura del *vajuolo*.

Cautela (6) I *vescicatorj* sono perfettamente indicati in questa cir-
 ch' esige l' stanza. Tuttavia se questo accidente fosse accompagnato da
 applicazio- affopimento, cagionato dalla forza della *febbre* e dal gon-
 ne del ve- fiammento e distensione dei *vassi*, eglino diverrebbero pericolosi:
 ficatorj in avvegnachè, come l'abbiamo fatto osservare, (Cap. VIII,
 questo ca- nota 4, pag. 129 di questo Vol.) l'effetto dei *vescicatorj* è d'ir-
 fo. ritare e di produrre calore; senza di che non potrebbero in-
 durre a *suppurazione* la parte, alla quale sono applicati. Ora
 non possono irritare senza aumentare la *febbre* e l'*infiamma-*
zione; *simptomi* cui vanno congiunti gli accidenti che si cerca-
 no di rimuovere in sul momento. I *vescicatorj* scemano al-
 tresì la quantità dell' *orine*, e talvolta ne cagionano la *sop-*
pressione, di cui uopo è al contrario di aumentarne lo scor-
 rimento, come or'ora il disse l'Autore: da ultimo i *vescico-*
vj rendono i dolori più acuti, laddove abbisogna calmarli,
 ec.

I *vescicatorj* non sono dunque indicati nei casi di depres-
 sione delle *pustole*, se non quando questo accidente è accom-
 pagnato da un *polsi frequente e debole*; quando la pelle è
 arida; qualora vi soppravvenga *oppressione* con inquietudine o
delirio; accidenti che d'ordinario annunziano il trasporto della
 materia al petto.

Cosa biso- Nei casi contrari bisogna applicare i *senapismi* o i *cat-*
 gna prefe- *plasma* di *cipolle*, prescritti nel Cap. IX. nota 12, pag. 145
 rire allor- di questo Vol.
 che essi
 mancano.

eccitare una enfiagione in queste parti , e per tal mezzo richiamare gli umori verso l'estremità (7).

mi sono utilissimi in questo caso.

47920

Cura del terzo periodo, o tempo della febbre secondaria .

Il periodo più pericoloso del vajuolo è quello della febbre secondaria: ella comincia d'ordinario quando le pustole del viso cominciano ad oscurarsi, o cangiano di colore , e la maggior parte di coloro che sono messi a morte dal vajuolo , periscono nel corso di questa febbre (8).

Questo periodo è il più pericoloso.

(7) In generale la depressione delle pustole , o anco il rallentamento dell'eruzione, sono casi gravissimi, che possono dipendere da cagioni differentissime, e che non è dato che all'esperienza il potere di scoprirle.

La depressione delle pustole è sempre un caso gravissimo ch' esige i consigli d' un Medico .

Noi consigliamo adunque in tali circostanze, di non perdere il tempo a volere da se stessi richiamare la Natura alla sua operazione , ma di far senza indugio venire un Medico, ai consigli del quale si dovrà riportarsi interamente .

(8) Si farà riflesso che le pustole del viso devono trovarsi in suppurazione, e anche cangiate di colore, mentre quelle dell'altre parti del corpo non sono ancora che nel secondo periodo della malattia, ch'è quanto a dire in quello dell'eruzione. Imperciocchè s'è detto, (pag. 169. di questo Vol.) che le prime apparenze delle pustole si manifestano da prima sul viso, poscia sulle braccia, quindi sul petto, ec. e più basso, (pag. 170.) che il viso si sgonfia, allorchè le mani, i piedi, ec. cominciano ad intumidirsi .

Ordine con cui si stabilisce la suppurazione nelle pustole del vajuolo .

In fatti tal è l'andamento della Natura nel vajuolo . L'eruzione comincia nel viso, e finisce nell'estremità, avanzandosi successivamente alle parti intermedie . Ora siccome questa malattia vi mette dai tre ai quattro giorni a percorrere cadauno de' periodi che abbiamo additato di sopra nota 3, di questo Cap., deve succedere che le pustole che sono comparse le prime faranno in piena suppurazione, mentre quelle che apparvero le ultime, non sono per anco giunte alla loro grossezza .

La febbre secondaria, che abbiamo detto essere la febbre di suppurazione, non può dunque terminarsi prima che l'enfiagione de' piedi sia svanita ; e ciò non accade che nei due o tre giorni che fuffeguono allo sgonfiamento del viso. In fatti in questo spazio di tempo la febbre secondaria esercita le

Tempo che dura la febbre secondaria tanto più funesto al malato, quanto più

Uopo è di
secondare
gli sforzi
della Natura
nell' e-
vacuazioni
ch'ella sol-
lecita.

In questo periodo la Natura cerca di alleggiare il malato per via della *scorrenza di ventre*; e non si dee per alcuna ragione contrariare questi suoi sforzi: uopo è per lo contrario di favorirli. Si userà dunque attenzione di procurargli de' *scarichi*, e di sostenere le di lui forze mediante degli *alimenti* e delle bevande di qualità *refrescanti*, *diluenti*, e *corroboranti*.

(La *salvazione* è parimenti una *evacuazione* assai ordinaria nel *vajuolo*, segnatamente negli adulti, per non passarla sotto silenzio, e non si dee punto impegnarsi ad arrestarla più che la *scorrenza di ventre*; ma è bene il cercare d'intertenerla cogli stessi mezzi) (9).

è e custodi-
to caldo.
Prova.

sue furie, che sono altrettanto più funeste al malato, quanto più s'è per lo innanzi custodito al caldo.

Il viso, ch'è la sola parte del corpo che non si carica di copertine, ne somministra una prova convincente. La *suppurazione* comincia senza che la *febbre secondaria* esibisca segni sensibili di sua esistenza. Questa *febbre* non si appalesa, se non quando le *pustole* del viso cominciano a mutar colore, vale a dire allorchè la *suppurazione*, compiuta su questa, comincia nell'altre parti; e gli esempi che il Signor BUCHAN riferisce di sopra pag. 181. di questo Vol. dimostrano con evidenza, che se le altre parti del corpo non fossero coperte nel *vajuolo*, se non come lo sono nello stato di sanità, s'ignorerebbe per fino il nome di *febbre secondaria*, la quale uccide il maggior numero dei malati che muojono di *vajuolo*; o almeno questa *febbre* non sarebbe che leggerissima.

Avvantag-
gi degli a-
cidi in que-
sto periodo
del vajuo-
lo; anzi in
tutto il cor-
so del male.

(9) Sopra tutto in questo periodo bisogna adoperare gli *acidi*, anzi gli *acidi minerali*. Tal'è la pratica degli HALLER, dei LIEUTAUD, e dei TISSOT. Gli *spiriti acidi*, dice questo ultimo, anno la virtù di spinger fuori l'*orina* e la *scialiva*; di arrestare la *putrescenza*, e di calmare la violenza del calore, secondo l'espressione di SYDENHAM. Il Sig. DE HALLER parlando d'una *epidemia* che regnò a Berna, e di cui il carattere di *putrefazione* esigeva l'uso degli *acidi*, dice: „La sera del nono giorno feci mettere dello *spirito di vitriolo* dentro la bevanda, per prevenire la *putrefazione* „ e la *febbre secondaria*: il decimo giorno le *pustole* ch'erano della stessa natura, cioè nere, cominciarono ad ingiallire: dopo una dose assai gagliarda d'*acido*, l'appetito si svegliò alcun poco „.

Osserva-
zione.

Una fanciullina di sei anni soffriva da due giorni alcuni dolori orribili nei *reni*, nel dorso, nel ventre, e nella testa; questi erano accoppiati ad una *febbre* violenta. I genitori in-

Se allo svegliarsi della *febbre secondaria* il *polso* è *veloce* assai, molto *duro*, e *fortissimo*; se il *calore* è *notabile*; se la *respirazione* è *laboriosa*; se talora si osservino degli altri *sintomi* dell'*infiammazione di petto*, forza è sul momento di cacciar *sangue* al malato, regolando la quantità del *sangue* che se gli leverà, sull'età, sulle forze dell'infermo, e sull'urgenza dei *sintomi*.

Circo-
stan-
ze che in
questo ter-
zo periodo
esigono la
cacciata del
sangue.

Ma se nella *febbre secondaria* il malato soggiace a de'sfinimenti; se le *pustole* divengono subitamente pallide; se l'*estremità* si fanno fredde, bisogna applicare i *vescicatorj*, e sostenere le forze del malato con de' *cordiali*. Il *vino*, così pure i *liquori spiritosi*, sono stati alle volte esibiti in questi casi con de' successi meravigliosi.

Quali esi-
gono al
contrario
i vescicato-
ri e i cor-
diali.

Siccome la *febbre secondaria* dipende in gran parte, per non dire interamente, dall'assorbimento della *materia del vajuolo*; sembrerebbe ragionevole di aprire le *pustole* non sì tosto che sono mature. Si tiene tutto giorno questa condotta in riguardo de' *flemmoni*

Necessità
di aprire
le pustole
del vajuolo.

gorgavano cotesta creaturina di vino, di *zucchero*, e di bro-
di, perchè ricusava di mangiare. Loro intenzione si era di
prevenire il *vajuolo*, di cui un fanciullo si trovava compres-
so nella stessa casa. Ma questo governo ben lungi dal dimi-
nuire i *sintomi*, ne aumentò la violenza. Fui chiamato: la
trovai nello stato ora descritto. Avendo poc' anzi sperimen-
tato i buoni effetti degli *acidi* nella *febbre secondaria* d' un
altro *vajuolo*; credetti di dover impiegarli nella *febbre eru-
siva* della presente malata. Prescrissi de' *clisteri*, de' *bagni ai
piedi*, e una *tisana* fatta con due oncie di *sciloppo di viola*
e uno scrupolo di *spirito di visriolo* dilute in una pinta d'
acqua.

Si ristabilì poco a poco la calma, e le *pustole* spuntarono
nel dì seguente. Il *vajuolo* fu *confluente*. Non interruppi l'
uso degli *acidi*: esibiva talora l'*aceto*, e talora lo *spirito di
visriolo*, aumentando e diminuendo le dosi secondo le circo-
stanze. In fine ella ne prese fino alla perfetta maturità delle
pustole, che accadette come il solito nel quattordicesimo gior-
no. Questo *vajuolo*, che si annunziò sotto l'aspetto il più
terribile, e che fu talmente *confluente* che le *pustole* del
viso non formavano più che una sola crosta, non esigette al-
tri *rimedi*, ed il suo corso fu quello d' un *vajuolo dise-
cretto*.

o degli *ascessi* che tendono alla *suppurazione* : non si vede perchè essa non converrebbe in riguardo delle *pustole* del *vajuolo* . Noi pensiamo al contrario che questo sia sempre un mezzo di estinguere la *febbre secondaria* , e sovente di prevenirla assolutamente .

Quando e come bisogna aprire le *pustole* . Bisogna aprire le *pustole* quando cominciano ad ingiallire . Niente di più semplice di questa operazione . Si recide l'apice della *pustola* con le forbici ; o si foracchia con uno spillo , e si asciuga il *marciume* con un po' di filaccie asciutte . Si comincia dalle *pustole* del viso , perchè queste maturano le prime : si passa in seguito all'altre , a misura che giungono allo stato di maturità .

Bisogna riaprire , ma a misura che si riempiono .

Ragioni mal fondate , sulle quali appoggiasi per non prestarsi a questa operazione .

Esse si riempiono in generale una seconda , ed anche una terza volta . Si ripeterà dunque l'operazione , o piuttosto si continuerà ad aprire le *pustole* , finchè mostreranno contenere del *marciume* .

Se una operazione sì naturale è stata fin qui negletta ; crediamo che non se ne debba incolpare che la tenerezza mal intesa de' genitori : credono essi che ciò debba cagionare molto dolore ai fanciulli ; e in seguito di sì fatto errore , vogliono piuttosto vederli morire , che farli parire . Questa opinione è assolutamente senza fondamento . Ho sovente aperto delle *pustole* , non essendo veduto dal malato , senza ch'ei abbia dato il menomo segno di dolore . Ma supposto ch'ella sia leggermente dolorosa , questo piccolo inconveniente dovrebbe appena calcolarsi , in confronto de' vantaggi che si ritraggono da tale operazione (10) .

La quale è generale nell'Indo-
stan .

(10) Il metodo proposto dal Sig. BUCHAN è tanto meglio fondato , quanto che questa è una pratica generale nell'*Indo-
stan* . Colà i Bracmani , che assistono comunemente i nativi del paese malati di *vajuolo* , e che regolarmente *inoculano* nella primavera , anno uno *spillo* d'un legno particolare , e unicamente destinato a pungere le *pustole* del *vajuolo* , e a farne fortire la *marcia* . Essi praticano questo metodo col più prospero successo , avendo una destrezza particolare per fare cotesta operazione in breve tempo , ancorchè il malato abbia un gran numero di *pustole* . (Ved. il Trattato Inglese del Sig. or HOLWELL sopra la maniera d'*inoculare* a Bengala .)

L'apertura delle *pustole* non solamente previene l'assorbimento della materia del *vajuolo* dentro del *sangue*, ma diminuisce eziandio la tensione della *pelle*, e per tal mezzo solleva singolarmente il ma-
lato.

Vantaggi di questa operazione. Scemamento de' dolori;

Ella impedisce in oltre ch'egli non resti butterato, e questo vantaggio non è il meno importante. La materia soggiornando lungamente dentro le *pustole*, corrode colla sua *acrimonia* la *pelle* delicata del viso; così se ne veggono di quelli che sono talmente svisati, che anno appena sembianza umana (d).

Conservamento della bellezza.

Cura del quarto periodo, o della disseccazione delle pustole.

Dopo che le *pustole* sono disseccate, e le croste cadute, è in generale necessario di purgare l'infermo (11). Quando però siasi mantenuto il ventre li-

Momento di purgare.

(d) Sebbene questa operazione non possa mai nuocere, tuttavia non è necessaria se non quando il malato abbia un gran numero di *pustole*, o allorchè la materia ch'esse contengono sia sì acre, che dia motivo di temere delle conseguenze pericolose, qualora venga ad essere *assorbita*, o a retrocedere nella *massa* del *sangue*.

Ella non è tuttavia necessaria, se non quando il malato abbia molte *pustole*.

(11) Allorchè non si può eseguire l'operazione consigliata poc' anzi dall'Autore, a cagione dell'opposizione che s'incontra, sia per parte de' parenti, quando i malati sono de' fanciulli, sia per parte degli stessi malati, allorchè sono più avanzati in età, la *purgazione* può in allora supplire in qualche parte. Bisogna in tal caso metterla in pratica molto più di buon'ora, di quello che la prescrive il Sig. BUCHAN. Io la ho adoperata con frutto, sul esempio del Signor TISSOT, tosto che la *febbre* di *suppurazione* comincia a manifestarsi. Un'oncia di *manna* per i fanciulli, due oncie per gli adulti, bastano d'ordinario a procurare in questo tempo, cioè nel nono giorno di male, tre, quattro, o cinque *scarichi*. Si continua la stessa dose nei due giorni susseguenti.

Non sempre conviene attendere questo tempo per purgare.

Quando anco si arrivasse a fare l'operazione utile di cui si tratta, non bisognerebbe per ciò interdire la *purgazione*, nel tempo che ho di presente indicato. Ho curato due *vajuoli* di seguito, da cui furono assalite due sorelle ancora fanciulle. Aperse le *pustole* a tutte e due, e le aperse in tre tempi differenti, in quasi tutta l'estensione del corpo. Cominciai a

Osservazione.

bero per tutto il corso del male; se il latte di *bua* *irro*, e le altre bevande diluenti gli sieno state amministrate in abbondanza, dopo l'ottavo giorno del *vajuolo*, la *purgazione* diviene meno necessaria: ma non si dee giammai ometterla affatto.

Maniera di purgare i bambini; Si purgano i bambini con delle *prugna*, in cui si fa infondere un po' di *sena* e di *rabarbaro*, che si addolcisce con del zucchero. Se ne danno in piccole dosi, finchè promovano l'evacuazione.

I fanciulli di cinque fino a' sei anni; Coloro che sono di maggiore età, devono prendere de' *purgativi* un po' più forti. Si porgono, per esempio, ai fanciulli, di cinque in sei anni, otto o dieci grani di scelto *rabarbaro* in polvere la sera; e la dimane mattina se gli danno parimenti quattro o cinque grani di *sciavappa* in polvere. E per facilitarne l'effetto, e portar fuori la medicina, se gli darà del brodo; o del *cremore diluto d'avena*. Si ripeterà questa specie di *purga* tre o quattro volte, con cinque o sei giorni d'intervallo l'una dall'altra.

I fanciulli più provetti e peggli adulti; Per i fanciulli ancora più provetti e peggli adulti, si aumenterà la dose di questi *purganti* in proporzione della loro età e della loro *costituzione*: si exhiberanno loro sotto le stesse forme, e nei tempi medesimi.

Cosa bisogna fare allorchè sopraggiungono degli ascessi; Quando sopraggiungono degli *ascessi* in seguito del *vajuolo*, cosa pur troppo solita, forza è di riderli a *suppurazione*, con la maggiore prontezza possibile, col mezzo de' *cataplasmi maturanti*; e dopo che sono aperti, sia naturalmente, sia mediante l'operazione,

purgare la prima tosto che le *pustole* principiarono ad ingiallire, ed essa guarì prontamente: quanto alla seconda, che aveva preso il male dall'altra, alcune circostanze da essa malata indipendenti, ma bensì derivanti dalle persone che l'asfistevano, m'impedirono di seguire sì fatto metodo. Non la purgai che quando le *pustole* furono diseccate; cui sopravvennero più di trenta *ascessi*, tra' quali uno sul braccio restò più di tre mesi a guarire. La quantità delle *marcia* che mandarono questi *ascessi*, fece effettivamente credere, come dice il Sig. Tissot, che in questa malattia tutto il *sangue* sembra sangersi in materia *purrida*.

conviene purgare. La *chinachina* e il *latte* sono utilissimi in questo caso.

Se sopravvenga della *tosse*, della difficoltà di respiro, e degli altri *fenomeni di tiffchezza*, fa di mestiere trasportare il malato in *aria salubre*, fargli far uso del *latte d'asina*, e ordinargli un *esercizio* proporzionato alle di lui forze. (Ved. su questo punto il Cap. VII, di questo Vol., che tratta della *tiffchezza*.)

La tosse e degli altri fenomeni di tiffchezza.

(Il *vajuolo* dà luogo assai di sovente a due accidenti; voglio dire all'*infiammazione della gola*, che leva spesso volte la facilità d'inghiottire, e all'*enfiammazione delle palpebre*, talvolta accompagnata da *infiammazione*: questi accidenti quasi sempre sopravvengono a que' malati che si curano con i *rimedj riscaldanti*. Io li ho sempre rincontrati in coloro, per i quali sono stato solamente chiamato il giorno stesso o il dì susseguente all'*eruzione*, e che i parenti avevano fin a quel punto governato alla loro foggia, cioè con del *vino*, del *zucchero*, de' brodi di manzo, dell'acqua di *lenicchie*, e di *cinnamomo*; ec. I *gargarismi acidulati* anno ben tosto calmato l'*infiammazione della gola*: e qualora si segua il metodo *rinfriscante* di *viro* qui sopra descritto, si è sicuro di non più vederla ricomparire.

L'infiammazione della gola.

Quanto agli occhi, che non è raro di vedere talmente gonfi, infiammati, *sumidi*, che le palpebre restano di frequente conglutinate insieme per tutto il tempo dell'*eruzione* e della *suppurazione*, accidente che giunge talora a segno di sfigurare cotesto *organo*, di pregiudicare la vista, e per fino anco a far cadere gli occhi stessi in *cancro*: quando i *fenomeni* sono di già gravissimi, forza è di applicare immanamente su cadauno di essi un *cataplasma* di mollica di pane e di *latte*, che si rinnova ogni quattr'ore, e si continua fino a che le palpebre sieno bastevolmente ammolite per potersi riaprire. Fa d'uopo nello stesso tempo di ordinare al malato una *dietta* leggerissima. Se le palpebre restando aperte, si discoprono alcune *pustole* sopra la *cornea*, o un qualche *tubercolo* bianco, bisogna rinnovare i *cataplasmi* fino a che tutte queste parti abbiano *suppurato*. Allora si

Il gonfiamento e infiammazione degli occhi.

mettono sopra gli occhi de' *piumaccioli*, dopo averli prima inzuppati dentro una *infusione* di fiori di *camomilla* e di *sambuco*.

Mezzi di
prevenire
questi acci-
denti.

Un mezzo assai semplice di prevenire sì fatti accidenti, e che m'è sempre riuscito contro l'*infiammazione* della gola, si è di usare fin dai principj della malattia la *dieta rinfrescante*; e contro il *gonfiamento* delle palpebre di farle incessantemente tra giorno fomentare con un pannolino inzuppato in un *mescolglio tiepido* d'acqua e di *latte*, o di applicarvi delle piccole fettucce di lardo assai fresco: mezzi che si useranno dal primo istante che si scorderà del *gonfiamento* nelle palpebre.)

§. II.

Dell' inoculazione.

Scopo dell'
inoculazio-
ne.

Benchè non siavi alcuna malattia, la quale, dopo che s'è dichiarata tra gli uomini, più si faccia scherno de' ripari della Medicina, quanto il *vajuolo*; tuttavia non ve n'ha alcuna in cui si possa anticipatamente, come in questa, prevenire quasi affatto il pericolo, mediante una pratica assai semplice, cioè l'*inoculazione*.

Da qual
tempo ella
sia cono-
sciuta in
Europa.

Questa scoperta salutare non è conosciuta in Europa che da un mezzo secolo addietro; ma simile alla maggior parte delle scoperte utili, ella non ha fatto fino al presente che de' progressi assai lenti. Dobbiamo però confessare per gloria della Nazione, che l'*innesto* ha qui ricevuto un accoglimento più favorevole che presso alcuni de' nostri vicini: ma egli è ancora ben lungi dall'essere universalmente praticato; e dobbiamo temere che non lo sia giammai, finchè non sarà eseguito dai padri e dalle madri sopra i loro propri figliuoli.

Perchè l'
inoculazio-
ne non è ri-
cevuta uni-
versalmen-
te?

Una scoperta qualunque non può divenire generalmente utile, fino a tanto che non è conosciuta e praticata che da un picciol numero di persone. Se l'*innesto* del *vajuolo* fosse stato introdotto nelle nostre contrade, piuttosto come una cosa di moda che come una scoperta di Medicina, e se fosse stato prati-
cato

cato dallo stesso genere di persone, che lo esercitano nei paesi donde ci è pervenuto, da lungo tempo fatto si sarebbe universale .

La pratica dell' *inoculazione* non è in certo modo divenuta generale neppure in Inghilterra, se non allora che è stata esercitata da persone che non erano Medici (12) .

Costoro non solamente ne anno resa la pratica molto più generale, ma ancora più sicura; ed agindo con più di libertà che i Pratici di professione, ci anno fatto apprendere che il maggior pericolo del malato non deriva dal difetto di cura e di attenzione, ma sì bene al contrario dall' eccesso dell' una e dell' altra .

Bisognerebbe essere ben poco istruito di questa materia, per imputare il successo dell' *inoculazioni* moderne ad una abilità superiore nel metodo di preparare il soggetto e di comunicare la malattia. E' vero che alcuni tra gli altri, col disegno di rapire ed appropriarsi tutta la pratica di questo utile *preservativo*, pretendono di avere de' secreti straordinarij e infallibili, onde preparare le persone che si devono *inoculare*; ma queste pretese non sono spacciate che per imporre alla credula e cieca ignoranza.

Il successo degli' *Inoculatori* non dipende dalla loro capacità .

Non abbisogna se non del senso comune e della prudenza, per saper scegliere il soggetto e condurre l' operazione; e le persone sagge e sensate possono *inoculare* i loro fanciulli, ogni volta che troveranno

Cosa basta per riuscire .

(12) In fatti dall' istoria di questa operazione salutare sappiamo, ch' ella non è stata introdotta o rinnovellata nei paesi, dove attualmente è conosciuta, che da persone ch' erano tutt' altro fuorchè Medici. A Costantinopoli due donne Greche *inoculano* felicissimamente parecchie migliaia di persone: a Bengala questo è l' ufficio de' Bracmani o dei Sacerdoti di quelle contrade: in America, sulle sponde del fiume dell' Amazzoni, vi si occupa un Carmelitano Missionario: a Rionegro, un altro Missionario: nelle Colonnie Portoghesi, un Chirurgo: in Pensilvania, un Gentiluomo è quegli ch' innesca col più prospero evento i suoi schiavi: in Inghilterra, SURTON, famoso per più di venti mila *inoculazioni* tutte felici, era appena Cerusico.

ARTICOLO PRIMO.

Esposizione di differenti metodi d'inoculare.

Il successo
dell'inocu-
lazione non
dipende da
tale, o tal
altro meto-
do.

Egli è essenziale di riflettere che il sentimento qui
esposto, non è il risultato della teoria, ma uni-
camente dell'osservazione. Imperciocchè quantunque
abbia io stesso avuto di quelle occasioni, che a po-
chi Medici si sono offerte, di sperimentare nell'*ino-
culazione* tutti i metodi conosciuti; pure il successo
di questa operazione m'è sempre sembrato sì poco
dipendere da quelle tali circostanze, le quali si repu-
tano di tanta importanza, voglio dire la preparazio-
ne e l'*innesto* col tale o tal altro metodo, che da
parecchi anni in poi ho fatto fare questa operazione
dai padri e dalle madri, dalle nutrici, ec.; ed ho
trovato che il metodo esposto nella nota seguente
riusciva sì bene che gli altri, senza altresì avere la
maggior parte degli inconvenienti di quelli (e).

Metodo
semplici-
mo e fel-
cissimo d'
inoculare,
proceduto
da una cir-
costanza
particolare.

(e) Una circostanza critica, come pur troppo spesso avvie-
ne, mi ha condotto a scegliere cotesto metodo. Un uomo il
quale aveva poch'anzi perdute dal *vajuolo* tutti i suoi figli,
eccetto un solo, si determinò a farlo *inoculare*. Mi partecipò
la sua intenzione; e mi pregò di persuaderne la madre e l'
avola di questo fanciullo. Ma ciò fu impossibile.

Per la qual cosa consigliai il padre di dare al suo figliuol
lo una o due dose di *rabarbaro*, poscia di andare da un qual-
che malato compreso di *vajuolo benigno*, di aprirgli una o
due *pustole*, di coglierne la materia sopra un poco di bam-
bagia; e come prima fosse ritornato a casa, di fare sulle braccia
del fanciullo una leggiera graffiatura con uno spillo, di
stropicciare la pelle graffiata colla bambagia inzuppata della
materia del *vajuolo*, e di non prendersi maggior fastidio.
Tutto fu puntualmente eseguito. Il *vajuolo* comparve a capo
tempo ordinario, percorse i suoi periodi con regolarità; e la
malattia fu sì *benigna*, sì dolce, che il piccol malato non
fu obbligato a restare in letto neppure una sol' ora. Noi non
abbiamo verun altro esempio, che il *vajuolo inoculato* abbia
seguito un cammino tanto naturale, fino al perfetto ristabi-
limento del malato, quanto presso questo fanciullo.

Si può inoculare il *vajuolo* in molte maniere differenti con un effetto eguale .

In Turchia , donde ci è pervenuta l' *inoculazione* , le femmine comunicano il *vajuolo* ai fanciulli facendo una piccola apertura sulla *pelle* con uno spillo , e introducendo nella *ferita* un poco di materia presa da una *pustola* matura .

Metodo d' inoculare in Turchia ;

Sulle coste della Barbaria , s' introduce nella *pelle* tra il pollice e l' indice , col mezzo d' un ago , un filo imbevuto di materia : e in alcune altre regioni della stessa Barbaria per *inoculare* limitasi a stropicciare la parte , ch' è tra il pollice e l' indice , o qualsivoglia altra parte del corpo , con della materia del *vajuolo* . Questo metodo di stropicciare una qualche parte della *pelle* con la materia del *vajuolo* , è conosciuta in molti luoghi dell' Asia e d' Europa , al pari che in Barbaria : questo è ciò che chiamasi *accare il vajuolo* .

Sulle coste della Barbaria in parecchi luoghi dell' Asia , e dell' Europa ;

Il presente metodo d' *inoculare* in Inghilterra , è di fare due o tre incisioni al braccio presso che orizzontali , e talmente superficiali , che non vadano al di là della *pelle* . Si fanno queste incisioni con la lancetta , intinta d' una piccola quantità di materia presa da una *pustola* matura : si riuniscono poscia queste piccole *ferite* , e si lasciano senza altro apparecchio .

In Inghilterra .

Alcuni adoperano una lancetta coperta dalla materia secca del *vajuolo* : ma sì fatto metodo è meno sicuro : egli è spesso fallace , e non si dee mai metterlo in opra , fuorchè quando non possa procacciarsi della materia fresca . Qualora vi si sia costretto , fa di mestieri umettare la materia , esponendo per qualche tempo la lancetta al vapor dell' acqua calda .

Ma per *inoculare* , o comunicare il *vajuolo* , basta applicare della materia fresca sulla *pelle* per uno spazio sufficiente di tempo , senza aver bisogno di fare veruna *ferita* . Sicchè si prenda un breve filo , d' un mezzo pollice di lunghezza , imbevuto di questa materia ; si posi immediatamente sul braccio nella parte media tra il gomito e la spalla ; si copra d' un pezzo d' *impiaastro costringitivo* comune , e si lascj. il tutto per otto in dieci giorni . Questo mezzo non mancherà di comunicare la malattia .

Metodo d' inoculare senza far l' incisione .

Perchè si
propone
cotesto me-
todo.

Noi non facciamo menzione di questo metodo, se non perchè in generale la maggior parte delle persone temono le *ferite*; e v'è luogo di credere che quanto più l'operazione diverrà agevole a praticarsi, più vi sarà di speranza ch'ella si renda generale.

* Suoi av-
vantaggi
superiori a
quello per
incisione,
che può a-
vere delle
conseguen-
ze moleste.

V'ha chi s'immagina che il *gemitio* della materia, a cui dà luogo la *piaga* risultante dall'incisione, diminuisca la quantità delle *pustole*, e quindi si renda vantaggiosa. Ma non v'è gran fermezza su questa congettura: v'è anzi qualche cosa di più, ed è che le *ferite* profonde si fanno spesso *ulcerose*, e divengono incomode e fastidiose.

L' inocu-
lazione non
sarà univer-
sale, se non
quando ver-
rà praticata
dai padri e
dalle ma-
dri.

Non vediamo che l'*inoculazione* sia considerata come una pratica di Medicina nei paesi, donde l'abbiamo ricevuta. In Turchia sono le stesse femmine che la esercitano; e nell'Indie Orientali sono essi i *Bracmani* o i *Sacerdoti*. (Ved. qui sopra nota 12 di questo Cap.) Nelle nostre contrade questa operazione è ancora nell'infanzia: speriamo però ch'ella diverrà quanto prima assai familiare, purchè i padri e le madri non si facciano più di difficoltà d'*inoculare* eglino stessi i loro figliuoli, di quella che non anno attualmente di loro porgere de' *purganti*.

Tocca agli
Ecclesiasti-
ci ad inci-
tare il po-
polo all'
inoculazio-
ne.

Tra tutte le classi, nessuna può avere un vantaggio eguale al Clero di rendere la pratica dell'*inoculazione* universale. La maggiore opposizione cui va soggetta, viene sempre da scrupoli di coscienza. Gli Ecclesiastici soli anno il potere di distruggerli. Il perchè noi raccomandiamo ad essi non solamente di adoperarsi a combattere le obbiezioni o gli scrupoli di Religione, che impongono agli spiriti deboli, relativamente a cotesta operazione; ma ancora di farla riguardare come un dovere, e di far concepire il pericolo che v'ha del non far uso d'un mezzo, che la Provvidenza ci dona, per conservare la vita de' nostri discendenti (13).

(13) L'esempio di molti Ecclesiastici che furono inoculati e praticarono e fecero praticare l'*inoculazione*; le Consulte delle più funeste Università, le risposte di molti dotti Teologi in favore di questa operazione; i trattati in materia d'

Certamente che coloro i quali trascurano d'impiegare i soccorsi che possono conservare la vita de' loro figliuoli , sono al pari colpevoli di quelli che li assassinano ; e bramarei daddovero che questa materia fosse maturamente considerata . Coresto esame condurrebbe a provare , quanto sia importante pei padri e per le madri di non negligere di comunicare , mediante l' *inoculazione* , il *vajuolo* ai proprj figliuoli nei primi anni del loro vivere .

Quanto sia importante che i padri e le madri insegnino i loro figliuoli in età tenera .

ARTICOLO SECONDO.

Vantaggi importanti che risultano necessariamente dall' inoculazione .

IL Dott. KENZIO, nella sua *Storia della sanità* , ha dipinto d'una maniera da non lasciar punto da desiderare , i vantaggi molteplici dell' *inoculazione* del *vajuolo* (f) .

inoculazione pubblicati con le dovute approvazioni ; queste autorità , io dico , tutte di gran peso , dovrebbero animare lo zelo de' Pastori , patrioti ed amici dell' umanità , e dovrebbero portarli a far capire a que' popoli che sono affidati alla sua cura , che la loro propria utilità , che la carità cristiana , il bene dello Stato , la conservazione degli uomini sono del pari interessati a fondare e promuoverti l' *inoculazione* , e a persuaderli soprattutto di queste verità : Che la confidenza nella Provvidenza non ci dispensa dal garantirsi dai mali che ci minacciano , quando si fa per esperienza che si possono prevenire ; che se l' *inoculazione* , come l' esperienza stessa lo dimostra , è un mezzo di preservarsi dagli accidenti funesti del *vajuolo* , la Provvidenza non ce l' offre , come rimedio , se non perchè ne usiamo ; che s' ella così non fosse , tutti li *preservativi* , tutti li *rimedj* di *precauzione* sarebbero in avvenire illeciti ; che se così non fosse , non ci sarebbe permesso di fuggire il pericolo che ci sovrasta ; bisognerebbe che ci lasciassimo ingojare dalle inondazioni , divorar dalle fiamme , straziar dalla peste ; a somiglianza de' Turchi , che per timore di opporsi agli ordini della Provvidenza , periscono a migliaia in tempo di peste , sì comune in Costantinopoli ; mentre si vedono li Franchi stabiliti in mezzo di loro , preservarsene , rinchiudendosi in casa essi e le loro famiglie .

(f) , I pericoli che accompagnano il *vajuolo* preso per via

Pericoli che accompagnano.

A che fie-
ro esposti
quelli, che
non anno
avuto il va-
juolo.

Noi ci contenteremo di aggiungere a quanto egli ha detto su questo proposito, che coloro i quali non anno avuto il *vajuolo* nei primi anni della loro vita, sono infelici pel timore perpetuo che anno di averlo un giorno alla fine; locchè li mette talvolta nell'impossibilità di soddisfare ad alcuni doveri utili ed indispensabili.

Tali sono
i domestici
e gli schia-
vi;

Poche persone si sentono in voglia di prendere de' dimessici che non abbiano avuto il *vajuolo*: con molto più di ragione di comperare degli schiavi, che possono un giorno morire di questo male.

I Medici,
i Cerusici,
le femmine
provette;

Quanto mai un Medico, un Cerusico, che non abbiano avuto il *vajuolo*, non si arrischiano nel curare questa malattia! Quanto sono da compiangere le

guano il
vajuolo pre-
so per via
di conta-
gio, e che si
prevengo-
no coll'ino-
culazione.

„ di contagio, dice questo Autore amico dell'umanità, sono
senza numero, e l'*inoculazione* li previene tutti. Il *vajuolo*
„ *naturale* può sorprendere nel momento che il corpo non
è disposto a riceverlo; può assalire in una stagione o trop-
po calda, o troppo fredda; può contrarsi da un *vajuolo*
del più perverso carattere. Si può venirne attaccati ino-
pinatamente, a cagione d'esempio, allorchè una spezie pe-
ricolosa ne viene introdotta imprudentemente in una piaz-
za marittima: può coglierli subito dopo un eccesso di stra-
vizzo, d'intemperanza, o di piaceri venerei; dopo alcu-
ne veglie indispensabili, alcune fatiche sforzate, alcuni
viaggi necessarj „.

„ E egli dunque sì piccolo vantaggio, che tutte queste cir-
costanze infauite possano prevenirli coll'*inoculazione*? Mer-
cè di questa gran numero di persone sono preservate dalla
disformità, non altrimenti che dalla morte. Nel *va-
juolo naturale* quante avvenenti persone non restano svi-
state! Quanti temperamenti forti e robusti non sono rovina-
ti, laddove l'*inoculazione* non ha quasi mai lasciato nè
segni, nè tracce verune, per quanto numerose sieno state
le pustole del viso, e spaventevoli i *sinismi*! La maggior
parte dei dolori sì acuti nel *vajuolo naturale*, sono rarifi-
simi nell'*inoculazione* „.

„ L'*inoculazione* non previene forse i terrori inesprimibi-
li, che incessantemente tormentano le persone che non an-
no avuto il *vajuolo*, e che le mette al sicuro dalle stragi
di questo flagello, che in alcune epidemie spopola gl'interi
villaggi, saccheggia, rovina Città commercianti, e porta
la desolazione in tutta la Provincia? ec. „

femmine che pervengono ad una età matura senza aver avuto il *vajuolo*!

Una femmina incinta scappa di rado da questo male; e se un fanciullo giunge ad averlo, essendo nutricato da una madre che non l'abbia avuto, quale scena più dolorosa e più crudele! Se ella continua a nutrire il suo bambino, lo fa col rischio della sua vita: se al contrario lo poppi, egli corre sommo pericolo di morire.

Una femmina incinta, quella che allatta, e lo stesso bambino;

Quante volte non avviene che una tenera madre è costretta di allontanarsi dalla propria casa, di lasciare in abbandono i suoi figliuoli infetti di *vajuolo*, e ciò pure nel tempo stesso in cui le sue sollecitudini sono loro più necessarie! Che se l'amore materno vince i suoi timori, le conseguenze ne divengono soventemente funeste.

Una madre il di cui figliuolo è infetto dal *vajuolo*.

Ho conosciuto una tenera madre che aveva un bambino lattante, e che vittima l'uno e l'altra di questo morbo crudele, sono stati tutti e due racchiusi dentro lo stesso avello.

Osservazione.

Ma coteste scene sono troppo spaventevoli, onde poterli esporre liberamente. Che i padri e le madri, che sono obbligati di fuggire con i loro figliuoli, per evitare il *vajuolo*, o che rifiutano d'inocularli nell'infanzia, considerino la situazione deplorabile, cui li riduce la loro mal intesa tenerezza.

Siccome il *vajuolo* è attualmente divenuto una malattia epidemica in presso che tutte le regioni del mondo, noi non dobbiamo a niente più applicarsi, che a renderlo il più benigno possibile. In fatti questa è la sola maniera, che sia sin ora in nostro potere per annullarlo; e se dovessi avanzare un paradosso, non temerei di dire, che se l'inoculazione divenisse universale, ella equivalerebbe presso poco alla estirpazione totale del *vajuolo*.

Il *vajuolo* essendo una malattia epidemica, non si tratta se non di renderla la più benigna possibile;

Imperciocchè poco importa che un male sia fradiciato interamente, o che reso siasi talmente benigno, che non si renda più capace di minacciare la vita o di alterare la costituzione; l'uno compensa l'altro: e v'è motivo di lusingarsi che l'inoculazione procurerebbe questo vantaggio.

E si fatto vantaggio non si può attendere che dall'inoculazione.

Il numero di quei che muojono per l'inoculazione, Confronto della mor-

Malità ca-
onata dal
vajuolo e
dall'inocu-
lazione.

merita appena d'essere rammemorato. Nel *vajuolo naturale*, ne muore ordinariamente uno in quattro o in cinque: nell'*inoculazione* non ne muore neppur uno tra mille. V'è di più; alcuni Pratici possono vantarsi di avere *inoculato* più di dieci mila soggetti senza averne perduto un solo (14).

Obbiezio-
ne contro
l'inocula-
zione.

(14) Ecco una obbiezione fatta e ripetuta presso poco negli stessi termini da tutto il mondo.

Si potrà mai persuadere un padre o una tenera madre d'fare una ferita ad un suo caro figlio di deliberato proposito, per comunicargli una malattia che non avrà forse giammai, e che può recargli la morte? Per quanto piccolo che sia il rischio dell'inoculazione, non fosse egli che d'uno in mille, o meno ancora; devono i genitori esporvi volontariamente i propri figli?

Risposta.

„ Sì, senza dubbio, risponde il Sig. DE LA CONDAMINE;
„ se questo padre o questa madre vuole preservarlo da un
„ altro rischio incomparabilmente maggiore, e se il pregiu-
„ dizio non offusca in questi il lume della ragione; se ama-
„ no il figlio con vero amore, non devono bilanciare a far-
„ lo *inoculare*.

Uno tra
sette di
quelli che
anno il va-
juolo ne
muore.

Per rispondere a questa obbiezione con tutta esattezza, il Sig. DE LA CONDAMINE comincia dallo stabilire, che la metà del genere umano muore prima dall'aver avuto il *vajuolo*, cioè nell'infanzia: (Ved. la Parte I, Cap. I, nota 1.) che dell'altra metà, il numero di quelli che ne vanno esenti, merita appena esser contato; che di tutti coloro che ne sono attaccati, ne muore in generale un settimo, talvolta un quinto; cioè talora uno in sette, talora uno tra cinque, e che il maggior rischio di morire dall'*inoculazione* non è valutato, da più di sei mille esperienze, che d'uno in trecento e settantasei.

Non ne
muore
nemmeno
uno tra
mille di
quelli che
sono ino-
culati.

Si osserverà che dopo il 1765, in cui è comparsa l'ultima Memoria per servire di seguito all'istoria dell'*inoculazione*, il metodo d'*inoculare* s'è perfezionato a segno, che le relazioni de' più famosi Medici di tutte le nazioni, segnatamente del Nord, provano quanto il Sig. BUCHAN avanza, che non ne muore nemmeno uno tra mille *inoculati*.

Leggiamo altresì nel *Compendio Istoric del nuovo metodo d' inoculare* del Sig. PÖRNER, che questa operazione è talmente sicura, che quando si volessero attribuirle due accidenti accaduti nel corso di venti mila *inoculazioni*, si troverebbe ancora più di dieci mila contro uno a scommettere in favore di ogni persona *inoculata*.

Il Sig. DE LA CONDAMINE si rivolge poscia al padre, che sta dubbioso d'*inoculare* il proprio figlio, cui si favella:

ARTICOLO TERZO.

Quali sarebbero i mezzi da impiegarsi per rendere l'inoculazione universale.

HO di frequente desiderato che si formasse un piano atto a rendere questa salutar pratica univer-

„ Si tratta, dite voi, della vita di vostro figlio, e voi
 „ non volete punto rischiare, avreste senza dubbio ragione;
 „ se la cosa dipendesse da voi; ma forza è qui di arrischiare
 „ re a vostro malgrado. In vano vi sottraete: due soli partiti
 „ vi restano a prendere, o d'*inoculare*, o di non *inoculare*
 „ il vostro figlio. Ecco due rischi a passare, l'uno
 „ de' quali è inevitabile. *Inoculando* il vostro figlio, in trecento
 „ e settantacinque, o più tosto dieci mila avvenimenti
 „ felici; ve n'ha uno da temere: non *inoculando* v'è più
 „ d'uno a scommettere contro sette che voi lo perderete:
 „ questo ultimo rischio è di cinquanta volte, anzi di ottocento
 „ volte maggiore dell'altro. Scegliete frattanto, e bilanciate
 „ ancora, se vi dà l'animo „.

Ma si dirà, qual sarebbe la disperazione di questo padre, se malgrado di speranze sì lusinghevoli, il suo figliuolo venisse a soccombere sotto la prova dell'*inoculazione*? Timore chimérico? ripiglia il Sig. DE LA CONDAMINE; poichè il *vajuolo inoculato* è infinitamente meno pericoloso che il *naturale*, e sopra tutto dappoichè colui che non lo avrebbe giammai avuto naturalmente, non lo soffrirà per via dell'*inoculazione*.

Quegli che non avrebbe mai veduto il vajuolo, non lo soffrirà dall'*inoculazione*.

Ma quand'anco questo figlio diletto venisse a morire contro ogni verisimiglianza, di che avrebbe il padre a rimproverarsi? Nato tutore del proprio figlio, era obbligato di scegliere in favore del suo pupillo, e la prudenza gli ha dettato la scelta. In che consiste questa prudenza, se non che nel bilanciare gl'inconvenienti e gli vantaggi, e a giudicare giustamente del grado maggiore di probabilità? Al tempo stesso che un cieco istinto riteneva il padre, l'evidenza gli gridava: *Dei due pericoli, che bisogna affrontare, scegli il minore*. Doveva, poteva egli resistere a questa voce? La sorte ha tradito il suo attentato; n'è egli mallevadore? Un altro padre grida al suo figlio: *La terra trema, scrolla la casa; esci; fuggi*. . . . Il figlio forte, la terra s'apre, e lo ingoja; questo padre è egli colpevole? Il nostro è nello stesso caso. Se sua figlia fosse morta di parto, si rimproverebbe egli la di lei morte? Ne avrebbe più di motivo. Poteva far a me-

fale: ma temo davvero di non giungere mai a tanta contentezza di vedere l'esecuzione d'un affare, che sarebbe cotanto utile al genere umano. Si offrono senza dubbio delle grandi difficoltà; la cosa non è però impraticabile. Il progetto è grande, poichè non si decide di meno che di conservare la quarta parte della spezie umana. Che non si dee tentare onde adempiere e pervenire ad uno scopo tanto considerabile?

Bisognerebbe cominciare dal prescrivere agli Ecclesiastici di raccomandare l'inoculazione. Il primo passo da farsi per rendere l'*inoculazione* universale, è di distruggere i pregiudizj che provengono dalla Religione, e che vogliono opporvisi. Come l'abbiamo già fatto osservare, non v'è che il Clero, il quale possa giungere a tanto. Fa di mestieri non solamente che raccomandino al popolo l'*inoculazione* come un dovere: l'esempio sarà sempre più efficace del precetto (15).

Bisognerebbe in seguito, che i Medici inoculassero gratis i fanciulli de' poveri. Ciò che in seguito bisogna fare, si è di mettere qualsivisa persona al caso di poter avere il soccorso dell'*inoculazione*. In conseguenza raccomandiamo alla Facoltà Medica d'*inoculare gratis* i fanciulli dei poveri. Sarebbe una barbarie il privarne a motivo di povertà una parte tanto considerabile del genere umano.

Cosa dovrebbe fare il Governo per indurre il popolo all'inoculazione. Se alcuno di questi compensi non può aver luogo, tocca al Dominio di prendersene la briga. Ogni Governo ha certamente il poter necessario per rendere questa pratica generale, ed estenderla almeno tanto lungi, quanto il proprio dominio. Noi non vogliamo dire che si debba usar la forza per mezzo d'una legge. La via la più sicura sarebbe d'impiegare a spese pubbliche un certo numero d'*Inoculatori*, per *inoculare* i fanciulli dei poveri. Si vedrebbe poscia a gran fretta la consuetudine, la più valida di tutte le leggi, obbligare ciaschedun individuo ad

no di maritarla. Non fu per salvare la vita di sua figlia, che la esposse al pericolo del parto; e tuttavia nel maritarla egli ha messo più a rischio i di lei giorni, che quelli del suo figliuolo sottomettendolo all'*inoculazione*.

(15) Non bisogna scordarsi ch'è un Protestante quello che quivi parla, e che nella Religione Protestante i Preti sono ammogliati.

inoculare il proprio figliuolo, onde prevenirne i rimproveri.

Si potrebbe obbiettare contro questo progetto, che i poveri rifiuteranno d'impiegare gl' *Inoculatori*; ma è facile di togliere tale difficoltà: non si tratterebbe, se non di dare una piccola ricompensa a cadauna madre che accompagnasse il suo figliuolo, e che restasse presso di lui per tutto il corso della malattia; questo mezzo sarebbe bastevole.

Obbiezioni contro questo piano. Rif. poste.

Di più, il successo da cui è sempre seguita questa operazione, sbandirebbe a pieno ogni obbiezione che si potrebbe fare su tale proposito. Lo stesso riflesso di questo piccolo guadagno sarebbe capace d'indurre i poveri ad abbracciare questo piano. Essi allevano i loro fanciulli fino all'età di dieci o dodici anni; e nel momento in cui questi fanciulli potrebbero loro divenire utili, vengono spesso tolti di vita da questo morbo, con gran pregiudizio de' loro genitori, e detrimento della società.

Il Governo d'Inghilterra da alquanti anni è inteso singolarmente alla conservazione de' fanciulli: si vedono fondare e mantenere per ogni dove degli Spedali de' fanciulli derelitti, ec. Noi non temeremo però di dire, che se la decima parte delle somme impiegate in sì fatti stabilimenti fosse stata impiegata a promuovere la pratica dell' *inoculazione* tra i poveri, non solo si sarebbe conservata la vita d'un gran numero di fanciulli, ma ancora questa pratica sarebbe oggi giorno in questa Isola presso che universale.

Non si può immaginare quanto l'esempio, e un po' di danaro, abbiano d'impero sul povero. Frattanto lasciatelo in balia di se stesso; egli segue la sua antica consuetudine, senza pensare giammai a riformare le sue usanze. Del resto quanto noi proponiamo, non è che una idea, che noi porghiamo a coloro che sono animati dal pubblico bene. Se un simil progetto fosse approvato, si esporrebbe ben tosto il piano di mezzi di metterlo in esecuzione (16).

(16) E' provato, che una decima quarta parte del genere Quante persone si

Altri mezzi proposti.

Siccome gli Stabilimenti pubblici incontrano sempre delle difficoltà innumerevoli, quando si tratta di farli riuscire, e che sovente per delle viste d'interesse, o per difetto nella condotta di coloro che sono incaricati dell'esecuzione, non corrispondono alle intenzioni d'umanità, con le quali sono stati concepiti, noi ci accingiamo a proporre alcuni altri metodi che potranno mettere i poveri in istato di godere de' vantaggi dell'*inoculazione*.

Non si può dubitare che gl'*Inoculatori* non diventino di giorno in giorno più numerosi. Brameremmo per conseguenza, che loro si accordasse in ciascuna Parrocchia un certo onorario, acciòchè *inocu-*

salvarebbero ciascun anno in Francia mediante l'*inoculazione*.

umano muore attualmente di *vajuolo*. Di venti mila persone che muojono ciascun anno in Parigi, questa terribile malattia ne toglie dunque di vita mille quattrocento e venti otto; sette volte questo numero, o più di venti mille, è dunque il numero de' malati di *vajuolo* a Parigi negli anni d'infestazione ordinaria. Se tutti gli anni s'*inoculassero* in questa Città dieci mila persone, ne morrebbero forse trenta, a ragione di tre per mille; ma supponendo, contro ogni probabilità, che morissero due *inoculati* in cento, in luogo d'uno in tre, o quattro cento in dieci mille, (Ved. la nota 14 di questo Cap.) non ci farebbero mai più di dugento persone che morissero ogni anno di *vajuolo*, in luogo di mille quattrocento e venti otto. E' dunque dimostrato che lo stabilimento dell'*inoculazione* salverebbe la vita a mille dugento, o mille trecento Cittadini per ciascun anno nella sola Città di Parigi; e a più di venticinque mille persone in tutto il Regno, supposto, come si presume, che la Capitale contenga il ventesimo degli abitanti della Francia.

Questo riparo adunque animato dall'esempio, e più dalle ricompense, principale sprone onde eccitare l'indolenza e l'insensibilità del popolo sui vantaggi loro personali, e sui comuni beni dell'umanità, conserverebbe allo Stato ogni anno venti cinque mila soggetti, che divengono annualmente la preda del *vajuolo*. Se, dice il Sig. DE LA CONDAMINE, l'uso dell'*inoculazione* fosse divenuto generale in Francia, dappoichè la famiglia Reale dell'Inghilterra fu *inoculata* nell'1732, si avrebbe omai salvata la vita a quasi un milione di uomini, senza comprendervi la loro posterità. Dal 1754, che questo Accademico scrisse, fino al dì d'oggi, bisogna aggiungere a questo milione più di ottocento cinquanta mille uomini.

l'assero tutti i fanciulli di quella data Parrocchia, pervenuti all'età convenevole. Questo progetto non cagionerebbe che una piccolissima spesa, e metterebbe ognuno in istato di profittare di questa invenzione salutare. Ma due grandi ostacoli si oppongono ai progressi dell'inoculazione.

Il primo è il desiderio naturale ed innato presso tutti gli uomini di allontanare il male per quanto è possibile; quindi l'inoculazione non sembrando che prevenire una malattia futura, ed essendo una malattia ella stessa, non è maraviglia se gli uomini in generale ne abbiamo una sì grande avversione. I suoi successi per altro distruggono bastantemente tutti questi vani timori. Chi di buon proposito non preferirebbe oggidì un mal leggiero, per evitarne uno molto più grande domani, quando ei lo riguardasse come egualmente certo (17)?

Primo ostacolo che si oppone al progresso dell'inoculazione.

(17) Abbiamo già detto nota 14 di questo Cap., che il piccolo numero degli adulti che muore senza aver avuto il vajuolo, merita appena di esser contato. Questa non è una semplice asserzione; egli è un fatto dedotto dalle osservazioni dei Medici, che anno scritto dappoichè questo morbo crudele si è manifestato.

ABUBEKER, cognito più sotto il nome di RHASES, Medico Arabo, colui, che tra tutti quelli che, fino a SYDENHAM, forse fino a BOERHAAVE, ha meglio conosciuto e meglio curato questa malattia, stabilisce positivamente che tutti gli uomini l'incontrano. AVICENNA, AVENZOAR, AVERROES dicono, che *chicchessia non ne va esente*. Sembra, secondo il FRACASTORO, che ogni persona l'abbia una volta in sua vita, qualora almeno non venga rapita da una morte immatura. Tutti gli uomini ne fanno una volta assaliti, dice il MERCURIALE. Con ragione, dice il FORESTO, gli Arabi ed alcuni altri Medici insigni anno stabilito, che tutto il mondo abbia a soffrire il vajuolo.

Autorità che prova che tutti gli uomini anno il vajuolo, e non lo anno più d'una sol volta in tutta la vita.

Tutti gli uomini sono costretti ad averlo una volta: questi sono i termini di SENNERTO. BORELLI dice. E' vero che ho vedute alcune persone che non avevano mai patita questa malattia, e alcune altre che l'avevano avuta due volte; ma questi sono casi di eccezioni rarissime alla regola generale, che stabilisce, che tutto il mondo lo abbia, e non l'abbia a parere che una sol volta. Tra parecchie migliaia di persone, soggiunse SEBISIO, non ve n'è che un picciol numero che ne

Secondo
il Racolo
che si op-
pone all'
inoculazio-
ne.

Il secondo ostacolo è il timore de' rimproveri : e gli ha il massimo impero sulla maggior parte degli uomini . Se un fanciullo muoja , s'immaginano di

vada esente . Di mille se ne troverà appena uno che non lo abbia nel corso di sua vita, dicono RIVIERO e TULPIO .

LOW stabilisce , ch' *ei sia universale* . JUNCHER credeva che *alcuno non ne andasse esente* . MEAD dopo cinquanta anni di pratica scrisse , che *appena uno in mille evitava questa malattia* . Il Sig. HAHN ripete in parecchi luoghi delle sue Opere , che *di mille ne scappa appena uno o dua di questa peste* . Il Sig. SCARDONA riguarda come dimostrato , ch' *ella non la perdoni ad uno tra mille* . Il Sig. ROSEN dice , che *ci sono pochissimi esempj di uomini che si sottraggano da questo morbo* .

Il Sig. LUDWIG mette tra il numero delle cose dubbiose , se ve n'abbia alcuno di eccezzuato : *Un picciolissimo numero di persone*, dic'egli , *è forse esente da questo male* .

Ritratto
terribile
che fre-
quente-
mente pre-
senta que-
sto male .

Dopo queste autorità rispettabili , qual'è la persona che non avendo avuto il *vajuolo*, possa dire che non lo avrà giammai ? Ch'ella non farà tra il numero di quegli infelici , che fin dal secondo o terzo giorno del male perdono tutto il lor *sangue* per i pori della *pelle*, inondando i loro letti , i loro appartamenti , e ammorbando l'aria d'un puzzo tale , che nè l'amor paterno , nè l'allettamento delle ricompense possono indurre chicchessia a prestare a questi miserabili le assistenze ch' esige lo stato loro ?

Qual'è la femmina , che non debba temere d'essere nel caso di quella di cui parla il Sig. TISSOT ? Ho veduto , dic'egli , e a questa trista rimembranza mi sento stracciar il cuore , ho veduto la donna la più amabile soccombere a questo orribile morbo : l'ho veduta ridotta all'abbandono di tutti , ed io medesimo al caso di visitarla era costretto a coprirmi le narici e la bocca con una spugna inzuppata nell'aceto , e nel *liquore anodino minerale* dell'HOFFMANNO . Questo stato deplorabile non è giammai lungo per buona ventura . Questi sventurati periscono a capo di alcune ore , senza che l'arte possa procurar loro il menomo soccorso .

Conseguen-
ze comuni
del vajuolo .

Ogni specie di *vajuolo*, si dirà , non è sì spaventevole : siamo d'accordo : ma tutte però sono perigliose , poichè di sette malati tocchi di questo male ne muore comunemente uno , e talvolta due in undici : poichè tra coloro che sopravvivono ai colpi de' suoi strali venefici , gli uni restano infermicci pel resto dei loro giorni ; gli altri sono mutilati d'una o di parecchie parti necessarie alla propria conservazione ; questi sono privi per sempre degli avvantaggi della vista , quelli dell'udito : tutti perdono il più prezioso dono della Natura , la bel-

meritarfi il biasimo di tutto il mondo, e questo è ciò che non possono tollerare. (Ved. nota 14 di questo Cap.) Ecco veramente il gran punto della difficoltà; e finchè non sia essa distrutta, l'inoculazio-

tà, e restano sovente svitati a segno ch' in vano cercansi nella loro fisionomia le sembianze che si facevano distinguere.

Ma togliamo dagli occhi il fatto spettacolo spaventoso. Proviamo che l'*inoculazione* non è nè crudele, nè perigliosa, nè mortale; ch' ella merita appena il nome di malattia; massime dopo che il metodo di eseguirla s' è perfezionato. Prendasi per esempio quello, che l' Autore ha poc' anzi riferito (nota 8 di questo Cap.) Si vede che questo è un soggetto preso a caso; ch' è un padre, che Medico per nessun conto eseguisce egli stesso l'operazione, e che si tiene celato ai due Arghi, che le ragioni validissime del Sig. BUCHAN. non avevano potuto convincere.

Osservazioni che provano che gli effetti dell' inoculazione sono assai leggieri, - ch' ella appena merita il nome di malattia.

Un altro esempio ancora più strepitoso è quello riferito dal Dott. POWER. Il Sig. SUTTON *innestò* nello stesso giorno quattrocento e settanta persone, che s' erano radunate negli stessi contorni per far la messe. V' erano tra questo numero prodigioso de' fanciulli al di sotto de' due mesi; de' vecchi d' oltre settant'anni; delle nutrici coi loro bambini; delle madri coi loro figliuoli: buon numero di questi *inoculati* componevano delle famiglie intere. Coloro ch' erano venuti per far la ricolta, non perdettero nemmeno un giorno di lavoro; e tutti, niuno eccettuato, furono perfettamente guariti. E desso poi un male crudele?

TIMONI, PYLARINI, LE DUC, Medici Greci contemporanei, ma di età e d' interesse differenti, e che non si sono citati nelle loro Opere, hanno assicurato che dopo parecchi anni di ricerche e di esperienze, di cui furono testimoni oculari, non avevano cognizione che questa operazione avesse mai avuto conseguenze fastidiose. Dopo il 1751 fino al 1754 non è morto alcun *inoculato* nello spedale di Londra. Il cel. TRONCHIN disse apertamente, che se perdesse un solo malato d' *inoculazione*, cesserebbe di mai più *inoculare*. E sarà poi questa una malattia pericolosa e mortale?

Ma bisogna rispondere ad un'altra obbiezione. L' *inoculazione* mette ella al coperto dal *vajuolo naturale*? E' dessa veramente il *preservativo* di questa malattia.

L' *innoculazione* mette al coperto dal *vajuolo*.

L' istoria de' fatti, dice il Sig. DE LA CONDAMINE, è la migliore risposta a questa obbiezione. Dappoichè si tengono gli occhi aperti sui progressi dell' *inoculazione*, e che tutti i fatti furono discussi contraddittoriamente, non è stato giammai provato che una persona *inoculata* abbia contratto per la se-

no non farà che de' lenti progressi. Tuttavolta niente può cagionare meglio questa felice rivoluzione, quanto l'ulanza.

Che

ponda volta il *vajuolo*. Questa è una verità attestata dal TIMONI, PYLARINI, JURIN, PERROT, WILLIAMS, SCHENK, KIRKPATRICK, e che gl' inimici di questo metodo si sono studiati di eludere per ogni sorta di via, anche per quella dell'impostura dice il KIRKPATRICK.

Il Dott. NEETTLETON fu costretto di smentire pubblicamente un rumore che s'era sparso, che uno de' suoi *inoculati* avesse in seguito ripreso il *vajuolo*, e che se la fosse passata assai male. Ne fu spacciato un altro con una Lettera d' un certo JONES, che sosteneva la cosa stessa al suo figlio. Il Sig. JURIN s'informò diligentemente del fatto: il padre ricusò di far vedere le cicatrici del fanciullo. Offrì poscia di dire la verità, purchè ne fosse bene rinumerato: costui uomo finì collo scrivere e confessare al Sig. JURIN, ch'ei non sapeva nemmeno cosa fosse l'*inoculazione*. Il Dott. KIRKPATRICK riferisce la lettera nella sua Opera pag. 123. egli altresì dice pag. 120: Si sono fatti giacere de' fanciulli *inoculati* con degli altri che avevano il *vajuolo naturale*, senza che alcuno l'abbia contratto una seconda volta. ELISABETTA HARRIS, che fu tra il numero dei sei malfattori *inoculati* nei primi esperimenti in Inghilterra, dopo la sua guarigione assistette a più di venti malati di *vajuolo*, e la *contagione* non ebbe su d'essa potere alcuno.

L' *inoculazione* non s'attacca su quelli che sono avvolti nel *vajuolo*.

Nella stessa occasione si è voluto provare, se fosse possibile che una persona già tocca altra volta di *vajuolo*, lo ripigliasse per via d'*inoculazione*, nè vi si potè riuscire, ancorchè s'abbia introdotto nella ferita maggior quantità del solito *veleno* (pag. 119.). Uno de' figli di Lord HARDEWICKE, allora gran Cancelliere d'Inghilterra, avendosi fatto *inoculare*, ebbe tutti i *sintomi* del *vajuolo*: la *ferita* s'infiammò, la *suppurazione* si stabilì, ma senza la menoma *eruzione*. Il malato poco pago delle sicurezze che se gli davano, di non aver nulla più a temere, si sommise di nuovo alla stessa prova, che non produsse verun effetto. A Montpellier un giovane studente si fece *inoculare* dal Sig. LE ROY. Ebbe egualmente tutti i *sintomi* del *vajuolo*, senza alcuna *eruzione*: si fece di bel nuovo *inoculare*, nè più apparve veruno di tali *sintomi*.

Se dopo cinquant'anni che l'*inoculazione* è divenuta frequente in Inghilterra, non si può citare verun *inoculato* che questo male abbia colto di nuovo, sia naturalmente, sia artificialmente: se in Francia tutti i Medici onesti e di buona fede attestano la medesima verità, per quale fatalità alcune

per-

Che l'inoculazione divenga alla moda, e prestamente dispariranno tutte le difficoltà. Ella è la moda sola, che guida la moltitudine fin dal principio del mondo, ed ella la governerà senza dubbio sino alla fine de' secoli.

(Coutume, opinion, reines de notre sort,
Vous réglez des mortels & la vie, & la mort.

VOLTAIRE.)

Che le genti illuminate diano dunque l'esempio all'altre: questo esempio trionferà alla fine, per quante difficoltà ch'egli incontri ne' suoi principj.

Ma prevedo un obbietto, tratto dal dispendio che richiederà l'inoculazione. Noi non proponiamo che cialcheduna Parròchia abbia per *Inoculatore* un SURTON o un DISMDALE, di già conosciuti dalle Teste coronate, mercè de' successi che li anno resi di un pregio superiore alle facoltà del volgo. Ma gli altri *Inoculatori* non anno forse un eguale speranza di riuscirvi? Lasciate che abbiano le stesse occasioni; sieno essi pure impiegati, e svaniranno tutte le difficoltà. Non v'è forse Parròchia, e neppure Villaggio in Inghilterra, dove non v'abbia qualcuno che sappia cavar sangue; eppure il *salasso* è operazione infinitamente più difficile da eseguirsi; ella ricerca più di sapere e più di destrezza che l'inoculazione.

Il Clero è quello appunto, cui raccomandiamo principalmente la pratica dell'inoculazione. La maggior parte degl'individui che lo compongono, anno

Obbiezione tratta dal dispendio che recherà l'inoculazione. Risposta.

persone prevenute o mal intenzionate vorranno e perveniranno a farci credere il contrario!

Una delle cagioni che più inducono a consentire a questi falsi romori; si è, che impropriamente mettonsi nel novero degl' *inoculati* que' tali, su cui l'inoculazione è stata tentata senza effetto. L'operazione bene o mal fatta, quando non produce nè *pustole*, nè *suppurazione*, lascia il soggetto nello stesso stato di prima; se dunque venga in seguito assalito dal *vajuolo naturale*, non si può dire ch'ei l'abbia di nuovo contratto, poichè così lo viene ad avere per la prima volta. Tali sono gli esempi che si citano de' pretesi *inoculati*, i quali dopo sì fatta operazione anno avuto il *vajuolo*; tutti gli altri fatti allegati non anno potuto reggere alle prove.

Tomo II.

O

Cagioni per cui pretende che coloro i quali sono stati inoculati, non possano avere il vajuolo.

qualche notizia di Medicina; presso che tutti fanno punger la vena e prescrivere de' *purganti*: questi due punti racchiudono tutto ciò ch' esige la pratica dell' *inoculazione*. I Sacerdoti, appo gl' Indiani i meno illuminati, *inoculano*; perchè mai un Maestro della Religione Cristiana riguarderebbe questa operazione come inferiore al suo grado? Il corpo, al pari dell' anima, merita sicuramente una parte delle cure d' un Pastore; almeno la *Fonte di tutte le scienze*, il più *gran Maestro che sia mai comparso tra gli uomini*, sembra essere di questa opinione.

Se veruno de' mezzi proposti non può aver luogo, forza è che i padri e le madri inoculino da se stessi i loro figliuoli.

Se alcuno di questi mezzi non può essere messo in esecuzione, è dovere de' padri e delle madri d' *inoculare* da se stessi i loro figliuoli. Abbraccino pure quel tal metodo che loro piacerà, purchè il soggetto sia in salute e d' un' età conveniente, l' operazione non mancherà quasi mai di riuscire a tenore delle loro brame. Ho buon numero di esempj di padri e di madri che anno *inoculato* i loro figliuoli, senza che abbia giammai appreso che ne sia risultato inconveniente alcuno.

Esempj della facilità con la quale si fa questa operazione.

Viene riferito che un abitante dell' Isole dell' America abbia *inoculato* di sua propria mano più di trecento de' suoi schiavi in un solo anno con molto buon esito, malgrado il calore del clima, e molte altre sfavorevoli circostanze. Ho veduto de' semplici artigiani fare questa operazione altrettanto felicemente quanto de' Medici.

Tuttavolta noi siamo ben lungi dall' impedire le persone che ne anno i mezzi, di servirsi di soggetti abili per *inoculare* i loro fanciulli, e reggerli nel corso di questo male (se così fa d' uopo chiamarlo). Tutto ciò che ci siamo proposti, è di provare solamente, che qualora non si possano avere di questi *Inoculatori*, non bisogna perciò negleggiare la *inoculazione*.

Metodo che l' Autore ha impiegato sopra il suo proprio figlio.

In vece di qui occuparmi a moltiplicare le ragioni in suo favore, domanderò solo la permissione di riferire il metodo che ho pensato nell' *inoculazione* del mio proprio figlio, ch' era allora il solo fanciullo ch' io mi avessi. Dappoichè gli ebbi fatto prendere due piccoli *purganti*, ordinaì alla nutrice d' intingere

un capo di filo nella materia fresca d'una pustola di *vajuolo*, di posarlo sopra il braccio del fanciullo, e di mantenervelo fermo, mediante un poco di *empiaastro costringitivo*. Questo *empiaastro* vi restò appliccato sei o sette giorni, finchè ne fu staccato per accidente.

Frattanto il *vajuolo* si manifestò verso il tempo solito, e fu dei più *benigni*. Questo metodo sicurissimo, e che basta presso che in tutti i casi, può mettersi in opra senza la menoma cognizione di Medicina (18).

Noi ci siamo intanto più estesi su questo soggetto, in quanto che i veri vantaggi dell'*inoculazione*

Bisogna che la pratica dell'

(18) Il Sig. TRONCHIN essendosi accorto, che gli accidenti funesti succeduti ai fanciulli ne' primi tempi dell'*inoculazione*, nati dal terrore e dal dolore degl'istromenti taglienti contribuivano a rallentare i progressi di questa operazione, s'immaginò di sostituire al metodo d'*inoculare* per *incisione* alcuni piccoli *vescicanti*, che coprissero il filo inzuppato di materia del *vajuolo*, e applicato senza puntura o graffiatura alcuna. Usò di questo metodo, e vi riuscì.

Quanta rassomiglianza abbia il fatto medesimo con quello del Sig. Tronchin.

Egli s'era altresì accorto che l'*infezione* del *vajuolo* alle braccia aumentava l'*eruzione* alla testa, e per conseguenza gli accidenti che l'accompagnano. Per la qual cosa preferì le gambe per *infezare* il *vajuolo*. Tal è il metodo, ch'egli seguì nell'*inoculazione* del Duca di CHARTRES, e di Madamigella d'ORLEANS nel 1736: e se in appresso se ne allontanò talvolta, ciò fu in riguardo di alcuni soggetti, ne quali temeva che i *vescicatorj* impedissero l'uso delle gambe; sendo l'*esercizio* uno de' punti importanti del governo che si dee prescrivere agl'*inoculati*.

Si vede che il metodo del Sig. BUCHAN non è una innovazione; che l'*empiaastro costringitivo*, ch'egli adopera per contenere il filo imbevuto della materia del *vajuolo*, tiene luogo degl'*empiaastri vescicatorj* del Sig. TRONCHIN, che però crediamo doversi preferire; perchè i *vescicatorj* irritando la parte alla quale sono applicati, staccandone l'*epidermo*, ed eccitando un aumento di moto negli umori, facilitano l'introduzione del veleno, e ne circoscrivono, per così dire, gli effetti; come accadde nella soprammentovata Principessa, dove, dice il Sig. TRONCHIN, tutto lo sforzo dell'*eruzione* si fece alle gambe; ed è verisimile, soggiunge egli, che senza le lagrime che gemono sì facilmente in questa età, ella non avrebbe avuto pustola veruna sulle palpebre.

*Inoculazio-
ne sia ge-
nerale, ac-
ciocchè si
riservano
tutti gli av-
vantaggi
ch'ella è
capace di
produrre.*

non possono aver luogo, se non rendendone la pratica generale. Finchè sarà riservata ad un picciol numero, ella sarà nocevole al totale della società. Per di lei mezzo il contagio si spande e si comunica a parecchi, che senza di ciò forse non avrebbero mai avuto la malattia. Si trova per conseguenza che inuolano oggidì in Inghilterra più persone dal *vajuolo*, che avanti l'*inoculazione*, e questa importante scoperta, con la quale si avrebbe potuto salvare più di persone che per via di tutte l'industrie de' Medici, perde in certa guisa tutti i suoi vantaggi; qualora non si estenda a tutta la società (19).

ARTICOLO QUARTO.

Della preparazione all'innesto.

*Stagioni
nelle quali
bisogna i-
noculare.*

SI riguarda comunemente la primavera e l'autunno come le stagioni le più favorevoli all'*inoculazione*, perchè l'atmosfera è più temperata che in estate o in inverno: ciò non ostante sembra che si dovrebbe considerare che queste due stagioni sono in generale le meno salubri di tutto l'anno.

La migliore preparazione o disposizione per l'*inoculazione*, è, per certissimo; che il malato primamente si trovi nel migliore stato di salute. Ora ho sempre osservato che i fanciulli in particolare sono più malaticci verso il fine di primavera e dell'autunno, che in ogni altra stagione. Per conseguenza proporrei l'ingressò del verno, come la stagione più acconcia all'*inoculazione*, tuttochè la primavera sembri preferibile per ogni altro riguardo.

*Qual' è l'
età la più
propria per*

L'età la più propria per questa operazione, è tra i tre e i cinque anni. Mille circostanze fastidiose,

(19) Questo è il sentimento di tutti quelli, che anno matutamente riflettuto sulla *inoculazione*. V'è un passo d'una lettera del cel. Cavalier PRINGLE, ch'indica la mortalità del *vajuolo* in Inghilterra, più considerabile oggidì che prima della scoperta dell'*inoculazione*. Un Medico ebbe pubblicamente a dire, che bisognava *inoculare o nessuno*, o tutti coloro che non avevano avuto il *vajuolo*.

che qui non possiamo partitamente annoverare, accompagnano l'*inoculazione* de' fanciulli avanti questa età, ma non bisogna però di molto trasmetterla al di là de' cinque anni. (Una delle più forti ragioni è la *dentizione*, che mette a rischio la vita del fanciullo dall'età d'un anno sino ai due, e da quella dei sette anni sino agli otto.) (Ved. Tom. IV, Cap. LI, §. XI.) A misura che le fibre acquistano più di forza, più di rigidità, e che i fanciulli si nodriscono di *alimenti* più grossolani, il *vajuolo* diviene più pericoloso.

La *costituzione* debole e cagionevole de' fanciulli non è una ragione per impedire d'*inocularli*. Sovente questa operazione cangia sì fatta *costituzione* e la migliora; ma in allora forza è di scegliere per *inoculare* il tempo, in cui il fanciullo si stia meglio. Uopo è sempre di guarire le malattie accidentali, anzi che intraprendere cotesta operazione.

In generale è necessario di regolare la *dieta* qualche tempo prima d'*inoculare*. Sembra però poco utile di cangiare la *dieta* de' fanciulli; i loro *alimenti* essendo ordinariamente salubri, e senza apparecchio, non consistendo che in *latte*, *pappa*, *radici addolcite*, in carni bianche, ec. (Ved. Parte I, Cap. I, §. III, che tratta degli *alimenti* dei fanciulli.)

Ma i fanciulli accostumati ad un vitto *riscaldante*; che sono d'un *temperamento* forte; che abbondano d'umori viziosi, devono mettersi ad una *dieta* leggiera, avanti d'essere *inoculati*. I loro *alimenti* saranno di qualità *rinfriscante*; le loro *bevande* saranno del *fiero di latte*, del *latte di butirro*, ec.

Non abbiamo verun altro *rimedio* a raccomandare per cotesta preparazione, fuorchè due o tre *purganti* blandi, che si proporzioneranno all'età e alla forza del malato.

Il successo dell'*Inoculatore* dipende meno dalla preparazione del malato, che dalla maniera con cui lo regola nel corso dell'*inoculazione*. Tutto ciò ch'egli ha da fare, è di tenere frescamente il suo *inoculato*, e di rendergli il ventre libero, affinchè la *febbre* si mantenga in un grado moderato, e che l'*eruzione* sia meno abbondante.

La *costituzione* debole e cagionevole non è una ragione per impedire l'*inoculazione*.

Quale debba essere la *dieta* de' fanciulli avanti l'*inoculazione*.

Bisogna purgare due o tre volte avanti d'*inoculare*.

D'onde dipende il successo dell'*Inoculatore*.

Non v'è
alcun peri-
colo, se le
pustole so-
no scarse di
numero.

In che con-
siste il gran
secreto dell'
inoculazio-
ne.

Non v'è alcun pericolo da temere, allorchè le *pustole* sono in piccola quantità; il numero è per l'ordinario proporzionato alla *febbre* che precede e che accompagna l'*eruzione*.

Il gran secreto dell'*inoculazione* consiste adunque a regolare la *febbre eruttiva*, che si può in generale tenere dentro il grado conveniente, mediante i precetti dati qui sopra §. I, Art. IV di questo Cap. pag. 177 e seg. di questo Vol.

ARTICOLO QUINTO.

Governo da praticarsi durante l'inoculazione.

Lo stesso
che nel va-
juolo natu-
rale.

NEL *vajuolo artificiale* si dee seguire la stessa regola di *visto*, come nel *vajuolo naturale*. Il malato deve essere tenuto frescamente; la *dieta* ha ad essere leggiera, e la bevanda *diluyente*. Se apparissero alcuni *sintomi* molesti, locchè accade di rado, fa di mestieri trattarli nella stessa guisa come nel *vajuolo naturale*. Non bisogna mai discostarsi da questo precetto. (Ved. §. I, Art. III e IV di questo Cap. da poi la pag. 170, sino alla pag. 192 di questo Vol.)

Importan-
za dei pur-
ganti dopo
l'inocula-
zione.

V'ha del
pericolo
nell'inocu-
lare coloro
che anno di
già avuto il
vajuolo?

I *purgativi* non sono meno necessari dopo il *vajuolo inoculato*, che dopo il *vajuolo naturale*. Non se ne dee fare a meno in alcun caso.

E' stato domandato ai Medici, se vi fosse pericolo nell'*inoculare* una persona che avesse di già avuto il *vajuolo*? Anno in generale risposto a sì fatta quistione negativamente. Ma parecchie osservazioni, che la pratica mi ha somministrato, m'anno indotto a pensare ch'ella meriterebbe d'essere più maturamente esaminata.

Osserva-
zioni.

Nel mese di Aprile 1764, per far piacere a' suoi genitori, ho *inoculato* una fanciulla di circa sei anni, e che v'era qualche ragione di credere che avesse avuto altra volta il *vajuolo*. Non successe *eruzione* veruna; ella non ebbe che uno scarissimo numero di *pustole*, rassomiglianti a de' *bitorzoletti*, che non s'innalzarono punto e che non mostrarono di contenere

Stilla di marcia: quando furono svaniti, sopravvenne una *febbre tifica*, accompagnata da *sintomi putridi* che andò a finire in una *cancro* presso che universale, da cui morì.

Uno dei miei amici, il quale ha molto praticato l'*inoculazione*, aveva preso da un solo malato bastante materia di *vajuolo* per *inoculare* quaranta o cinquanta persone. Per raccogliere questa quantità di *marcia*, forza gli fu di aprire un gran numero di *pustole*. Frattanto che le sue mani erano ancora intrise di questa materia, gli avvenne di ferirsi un dito: appressò egli incontante il pollice sopra il taglio per stagnare il sangue: ve lo tenne finchè se gli apportò un pezzolino di tela, con cui involuppò la ferita, e non vi badò d'avvantaggio. Circa otto giorni dopo cominciò a sentire una lassità straordinaria ad ogni menomo movimento: si querelò d'una dolorosa gravità di capo, di doglie nei reni, di svergiatezza, e di perdita di appetito. Verso la mattina del nono o decimo giorno si lagno di sfinimento, e cadette effettivamente in *sincope*: il giorno appresso si fece vedere una *eruzione* che fu universale, ma più copiosa verso i lombi.

Vero è che questa *eruzione* aveva piuttosto le sembianze d'una *scabbia*, che d'un *vajuolo*. Ma siccome ella si manifestò verso lo stesso periodo di tempo dopo la ferita, come si dà a vedere il *vajuolo* mediante l'*inoculazione*; siccome i *sintomi* che anno preceduto cotesta *eruzione*, furono parimente quegli stessi che precedono il *vajuolo*; siccome le *pustole* anno sussistito lo stesso numero di giorni, come quelle del *vajuolo*, ec. sembra esservi gran fondamento, onde poter concludere, che questo male sia stato cagionato dalla materia del *vajuolo* introdotta nel sangue per via della ferita.

Per verità questo malato guarì mercè dei *rimedj* e della sua buona *costituzione*: ma forse che con un malsano temperamento, qual si fu il caso della fanciulla, di cui abbiamo poc'anzi fatta menzione, avrebbe potuto avere la medesima sorte. E' necessario di far osservare, che questo mio amico aveva avu-

216 *Parte Seconda, Cap. XII. §. II. Art. V.*
to il *vajuolo* e la *rosolia* da parecchi anni prima
(20).

Non biso-
gna inocu-
lare allor-
chè non si
preveda di
poter far
nascere il
vajuolo.

La pratica m' ha procacciato parecchie altre offer-
vazioni, che sembrano indurre a credere che la *mac-
china* debba soffrire, allorchè la materia del *vajuolo* è
stata introdotta nel *sangue* senza produrre ciò che si
chiama propriamente il *vajuolo*. Ciò dee almeno im-
pegnare gl' *Inoculatori* a non comunicare cotesto *velo-
no*, qualora non prevedano di poter far nascere sì
fatta malattia.

Non si dee
troppo
cercare di
diminuire il
numero del-

Non devono neppure di troppo cercare di diminui-
re il numero delle *pustole*, poichè sembra che questo

(30) Questi fatti che appajono contraddittorj con quelli che
abbiamo riferito nota 17 di questo Cap., e che avremmo po-
tuto moltiplicare, devono per lo meno essere estremamente ra-
ri. Sarebbe ben stato da desiderare che l' Autore avesse cer-
cato di scoprirne le cagioni. Forse faremmo noi più istrutti,
se egli ci avesse in qualche modo descritte le malattie della
stagione, in cui questi fatti succedessero.

Quanto sia
importante
di prestare
attenzione
alle ma' at-
tie regnan-
ti sopra
tutto rela-
tivamente
all' inocu-
lazione.

Imperticchè sembra fuori di dubbio, che, qualora vi sieno
delle malattie regnanti, e che queste sieno contagiose, gl' *ino-
culati* possano venirne attaccati: il che dimostra al Medico di
prestare la maggiore attenzione alle malattie della stagione e
popolari. Noi ne abbiamo avuto un esempio strepitoso la pri-
mavera del 1776, in cui regnarono alcune *rosolie* d' assai per-
verso carattere. Parecchi *inoculati* anno avuto questa *rosolia*
congiuntamente al *vajuolo*, e due fanciulli tra gli altri sareb-
bero periti, senza l' abilità e l' esperienza d' uno de' primi *ino-
culatori* d' Europa.

Potrebbe dunque essere che gli accidenti accaduti alle due
persone rammentate dal Sig. BUCHAN, fossero derivati da qual-
che male *contagioso* allora regnante. Ciò che v' ha di certo
si è, che tra una folla di esempj che potrei recare, quello del
Dott. POWER prova che un soggetto ben costituito, e che non
sia esposto al contagio di veruna malattia, avendo di già avu-
to il *vajuolo*, può ricevere della materia del *vajuolo* senza
contrarre di nuovo il *vajuolo*, o verun altro male. Il Sig.
POWER raccogliendo la materia del *vajuolo* si ferì un dito,
come accadette all'amico del Sig. BUCHAN: applicò egli egual-
mente il pollice sopra la *ferita* per stagnare il *sangue*, e non
ne provò verun *sintomo* di *vajuolo*, o di qualsivisa altra malattia;
ebbe solamente intorno del taglio alcune *pustole*, che si disse-
carono prontamente.

sia il solo mezzo, per via del quale il *miasma* può scapparne fuori, dappoichè è stato una volta introdotto nel sangue. le pustole? Perché?

CAPITOLO DEGIMOTERZO.

Della rosolia.

LA *rosolia*, la quale apparve in Europa presso poco nel tempo stesso che il *vajuolo*, ha molta affinità con questa ultima malattia. Provengono tutte e due dall'Oriente; sono ambedue *contagiose*, e nessuno ne viene assalito più d'una volta nel corso di sua vita. Affinità della rosolia col vajuolo.

La *rosolia* appare il più comunemente in primavera, e sparisce in estate. Questa malattia quando sia bene medicata, radamente è di per se fatale; ma talvolta ella ha delle conseguenze dolorose. In quale stagione si manifesta la rosolia.

§. I.

Cagioni della rosolia.

LA *rosolia* al pari del *vajuolo* si comunica per contagio; ella è più, o meno pericolosa relativamente alla costituzione del soggetto, alla stagione dell'anno, al clima, ec. Il contagio.

(La *rosolia* si distingue in *benigna* e in *maligna*. Quanto la prima si guarisce facilmente, altrettanto l'ultima è pericolosa, non solamente per l'intensità dei sintomi ch'ella presenta, ma ancora per le conseguenze funeste, che ella seco strascina.) La rosolia si divide in benigna, e maligna.

§. II.

Sintomi della rosolia.

LA *rosolia*, come le altre febbri, si annunzia per via di accessi alternativi di freddo e di caldo, accompagnati da disagio della persona, e da mancan- Sintomi forieri.

za di appetito: la lingua è biancastra, ma in generale umidiccia. Il malato ha una *sosserella breve* (se così puossi dire): si sente la testa pesante: gli occhi sono rossi; carichi, e lagrimosi: egli è assonnato: gli gocciola una copiosa *serosità* dalle narici: talvolta però la *rosse* non si manifesta che dopo l'*eruzione*: v'è dell'*infiammamento* e del calore negli occhi.

Questi *sintomi* sono accompagnati da un *gemito* di lagrime acrisime, e da una sensibilità estrema negli occhi; in guisa che l'infermo non può mirare la luce senza dolore. Assai di sovente le palpebre si gonfiano a segno di tenere gli occhi affatto chiusi.

L'infermo ha ordinariamente delle doglie nel *petto*, e spesse volte l'*eruzione* è preceduta da *vomiti*, o da *scorrenza di ventre*.

Sintomi
particolari
ai fanciul-
li.

Appo i fanciulli le *feccie* sono comunemente verdastre: si laguano d'un *prurito* alla pelle: sono inquieti e mesti. Si vedono per solito mandar sangue dal naso avanti e nel tempo dell'*eruzione*.

Tempo
della ma-
lattia in cui
si dichiara
l'eruzione.

Verso il quarto giorno della malattia alcune *taccherelle*, simili alle *morsicature* delle pulci, si manifestano nel viso, da prima sulla fronte, poscia sul petto, e da ultimo sopra l'*estremità*.

Sintomi
della roso-
lia maligna.

(Nella *rosolia maligna*, l'*eruzione* si fa o più presto, o più tardi: ci sono talvolta tre o quattro giorni di differenza. Ella comincia nelle spalle e nell'altre parti del corpo, anzi che manifestarsi sul volto. Tutti i *sintomi* che precedono o accompagnano questa *eruzione*, sono più violenti: il *polsò* è lento e piccolo: la *respirazione* frequente. V'è della oppressione negl' *ipocondri*: le *orine* sono pallide: v'ha del *delirio*, de' *spasmi*, de' *sussulti dei tendini*, ec.)

Cosa di-
stingue la
rosolia dal
vajuolo.

Si distinguono le *pustole* della *rosolia* da quelle del *vajuolo* dalla loro *elevatezza*, ch'è in quella appena sensibile, e che d'altronde si terminano cadendo in piccole squame; laddove quelle del *vajuolo* divengono delle *pustole* che passano a *suppurazione*. La *febbre*, la *rosse*, la difficoltà di respirare, in luogo di svanire, non altrimenti che nel *vajuolo*, si aumentano dopo l'*eruzione*: ma per l'ordinario il *vomito* cessa. V'è in oltre della *rosse*, e una lagrimazione involontaria, che nel *vajuolo* non si rincontra.

Verso il sesto o settimo giorno, contando dal primo mal stare del malato, le taccherelle si fanno d'un colore pallido da prima sul viso, in seguito e insensibilmente sopra tutto il corpo; in guisa che nel nono giorno elleno sono onninamente svanite.

Tempo in cui l'eruzione sparisce.

Si vede però sovente la febbre e la difficoltà del respiro a continuare, segnatamente se il malato è stato tenuto in una regola di *visso* soverchiamente *risaldante*. Le *petecchie*, o macchie potporine, che sopravvengono in questa malattia, dipendono altresì dallo stesso errore.

Sintomi febbrili e cagionati da un *visso* riscaldante.

La *rosolia* è talvolta seguita da una *scorrenza di ventre* eccessiva; *sintomo* ordinario della *rosolia maligna*. In questo caso la vita del malato corre grandissimo pericolo.

Sintomo ordinario della *rosolia maligna*.

Coloro che muojono di questo male, d'ordinario periscono nel nono giorno dall'invasione, e sono la più parte rapiti da una *infiammazione di petto*.

Giornata la più da temersi in questo male.

Una *smossa di ventre* moderata, la morbidezza della pelle, e una *evacuazione* abbondante d'*urine*, sono i *sintomi* i più favorevoli.

Sintomi i più favorevoli.

Allorchè l'*eruzione* rientra istantaneamente, e che il malato prova del *delirio*, locchè accade di frequente nella *rosolia maligna*, egli corre sommo pericolo. Se il rossore impallidisce prima del sesto o del settimo giorno, questo è un sintomo funesto. Lo stesso si dica della gran debolezza, del vomito, dell'agitazione, e della difficoltà d'inghiottire. Le *macchie porporine* o nere, che si manifestano nel corso dell'*eruzione*, sono pericolosissime. La *tosse* continua, accompagnata da raucedine sul fine della malattia, deve far temere la *tifidezza* o sia la *tube polmonare*.

Sintomi contrari e pericolosi.

§. III.

Visso che si dee prescrivere a quelli che sono attaccati da rosolia.

Tutto ciò che abbiamo da fare in questa malattia, è di aiutare la Natura a cacciar fuori la materia morbosa. Bisogna dare de' *cordiali* appropriati, qualunque volta gli sforzi della Natura sono in-

Scopo da proporsi nella cura di questo male.

sufficienti; ma allorchè sono troppo violenti, fa d'uopo moderarli per via delle *evacuazioni*, delle bevande *rinfriscanti*, *diluenti*, ec. Dobbiamo ancora occuparsi a calmare i più violenti *sintomi*, come la *tosse*, l'agitazione, la difficoltà di respirare, ec.

Vitto rinfriscante. Gli acidi non ci convengono tanto quanto nel vajuolo. Perché?

Il *vitto rinfriscante* è qui altrettanto necessario, quanto nel *vajuolo*. Gli alimenti devono essere leggeri, e le bevande *diluenti*. Ma gli *acidi* non convengono tanto nella *rosolia*, come nel *vajuolo*, perchè possono rendere più violenta la *tosse*. La *birra* leggera parimente, sebbene eccellente nel *vajuolo*, non sarebbe convenevole nella *rosolia*.

Quali debbano essere le bevande.

Le bevande le più convenienti sono le *decozioni di legorizia* con le radici di *altea* e di *salsapariglia*; le *infusioni* di semi di *lino* o di fiori di *sambuco*, di *menta*, ec. il *siero di latte chiarificato*, l'*acqua d'orzo*, ec.

Allorchè il ventre è restio.

Se il ventre è restio, si addolcirà ciascheduna bevanda col *miele*. Se il *miele* ripugna allo stomaco dell'infermo, si aggiungerà a queste bevande della *manna*, proporzionatamente alle circostanze.

§. IV.

Rimedi da somministrarsi a quelli che anno la rosolia.

Circostanze che indicano la cacciata di sangue.

LA *rosolia* sendo una malattia *infiammatoria*, senza veruna *evacuazione* sensibile della materia *critica*, siccome nel *vajuolo*, ella in generale richiede la *cacciata di sangue*, massimamente quando la *febbre* è *gagliarda*, allorchè v'abbia difficoltà di respirare, e *oppressione di petto*: ma il *salasso* diviene inutile nella *rosolia benigna*.

Bagni de' piedi.

Li *bagni de' piedi* e delle gambe, spesso ripetuti nell'*acqua calda*, tendono ad abbattere la violenza della *febbre*, e a favorire l'*eruzione*.

Bisogna aiutare il vomito, allorchè si annunzia naturalmente.

Soventemente il *vomito* alleggia di molto il malato. Quando la Natura inclina a questa evacuazione, bisogna ben guardarsi dall'opporvisi: è di mestieri al contrario di aiutarla mediante l'*acqua calda*; o una *infusione di fiori di camomilla*.

Allorchè la *tosse* è frequente; allorchè il malato si sente arse le fauci; quando egli respira difficilmente, se gli ordinerà di esporre la testa al vapore dell'acqua calda, e se gli farà ricevere di questo vapore dentro il petto.

Cosa bisogna fare per calmare la tosse, l'aridità delle fauci, la difficoltà del respiro.

Se gli darà nel tempo stesso un poco di bianco di balena con del zucchero candi, tritati insieme; se gli esibirà di tanto in tanto un cucchiaino d'olio di mandorle dolci, in cui si avrà disciolto un poco di zucchero candi: questi medicamenti addolciscono il petto; e sedano l'irritazione che fa tossire.

Se verso il tempo in cui le macchie della *rosolia* cominciano a impallidire; la febbre riprende nuovo vigore, e se l'ammalato appattisca in pericolo di restar soffocato, sarà necessario di fargli una cacciata di sangue proporzionata alle sue forze, e di applicar de' vescicatorj alle gambe, ad oggetto d'impedire che la materia morbosa non si getti sui polmoni; perchè se una volta l'infiammazione venisse a fissarvisi, la vita del malato correrebbe il maggiore pericolo.

Allorchè la febbre si riaccende, le macchie cominciano a impallidire.

Nel caso in cui l'eruzione sparisce subitanamente, forza sarà d'usare de' mezzi che abbiamo raccomandato nel *vajuolo* retrocesso, Cap. XII, §. I, Art. IV, pag. 182 di questo Vol. Si sosterrà il malato con del vino e de' cordiali: si applicheranno de' vescicatorj alle gambe e alle braccia: si strofinerà tutto il corpo con flanelle calde: si possono ancora applicare de' senapismi alle piante dei piedi e alle palme delle mani.

Quando l'eruzione sparisce subitanamente.

Allorchè si manifestano delle macchie porporine o nere, si dee acidulare la bevanda del malato con dello spirito di vitriolo: e se i sintomi di putridità vanno aumentando; se gli darà la chinachina, come lo abbiamo consigliato nel *vajuolo*; pag. 181 e seg. di questo Vol.

Allorchè si manifesta delle macchie porporine o petecchiali.

I calmanti sono sovente necessari nella *rosolia*; ma non convienè amministrarli che nel caso di vigilia e di smossa di ventre ostinata, o allorchè la tosse è notabile. Per i fanciulli basta lo sciollo di acodion; o di papavero: se ne porgerà loro uno o due cucchiaini da caffè, relativamente all'età e alla violenza de' sintomi.

Circostanze che indicano i calmanti.

Tempo di
purgare .

Allorchè la *rosolia* è venuta a termine, fa d'uopo d'ordinario di dare al malato uno o due *purganti*, che si amministreranno della stessa maniera che nel *vajuolo*. (Ved. pag. 190 e seg. di questo Vol.)

Cosa sia
da farsi al-
lorchè u-
na smossa
violenta di
ventre sui-
fissa dopo
la malat-
tia .

Ma se in seguito alla *rosolia*, il malato avesse u-
na *smossa* violenta di *ventre*, sarebbe di bisogno di attendere ad arrestarla, usando per alquanti giorni u-
na piccola dose di *rabarbaro* la mattina, e un *calman-
te* la sera. Se tali mezzi non riuscissero, la *cacciata*
di *sangue* non tarderà guari a sopprimerla.

§. V.

Governo nella convalescenza della rosolia.

Quali deb-
bano essere
gli alimen-
ti e le be-
vande .

I Malati dopo la *rosolia* devono mettere ogni loro studio e cautela nella scelta dei cibi e delle bevande . I loro *alimenti* per qualche tempo avranno ad essere leggierissimi e in piccola quantità : la loro bevanda deve essere *diluente*, o piuttosto di qualità *lassativa*; come del *latte* di *butirro*, del *siero*, ec. (Ved. §. III del Cap. II di questo Vol.)

Malattie
che potreb-
be cagiona-
re l'aria
fredda .

Devono ancora stare guardinghi dall'esporli troppo prontamente all'*aria* fredda, perchè ne potrebbe in-
sorgere un *catarro soffocativo*, l'*asma*, o la *tisichez-
za*.

Cosa deesi
prescrivere,
se in que-
sto tempo
si dichiara-
no de' sin-
tomi di ti-
sichezza .

Se la *tosse*, la difficoltà di respirare, e gli altri *sin-
tomi* della *tisichezza* sussistano, dopo che la *rosolia*
è sparita, bisognerà ad intervalli cacciare un po' di
sangue al malato, a misura delle di lui forze e della
di lui *costituzione*. (Ved. nota 10 pag. 109 di que-
sto Vol.) E bene in oltre di ordinargli del *latte a-
sinino*; condurlo in *aria* pura, se egli soggiorni den-
tro una grande Città, e farlo ogni giorno montare
a cavallo . Forza è ch'ei si attenga ad un *vitto*
composto di *latte* e di *vegetabili*. In fine se questi
mezzi non riescono, bisogna prescrivergli di andare
ad abitare in paesi più caldi (a). (Ved. Cap. VII,
§. I, e note 5 e 6 di questo Vol.)

Si può i-
noculare la
rosolia .

(a) Si è tentato di comunicare la *rosolia* mediante l'*ino-
culazione*, come si fa del *vajuolo*; e non v'ha dubbio che

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della febbre scarlattina.

LA febbre scarlattina trae il suo nome dal colore della pelle del malato, che apparisce rossa, come se fosse stata tinta di scarlatta, o con del vino rosso.

Perchè questa febbre sia così appellata.

Questa malattia si manifesta in tutte le stagioni; ma è più comune alla fine dell'estate; e in questo tempo ella attacca sovente le famiglie intere, massime se vi sieno de' fanciulli.

In qual stagione ella sia comune.

I fanciulli e la gioventù ci va il più soggetta.

Chi sono coloro che ci vanno il più sottoposti.

(Questa febbre si divide in *benigna* e in *maligna*, a norma del carattere dei *sintomi*, e del maggiore e minore pericolo, in cui mette l'infermo. Noi imprendiamo a considerarla sotto questi due differenti aspetti.)

Come si divide questa specie di febbre.

col tempo questa pratica non riesca egualmente. Il Dott. HOME d'Edimbourg, dice di avere comunicata la *rosolia* mediante il sangue dei malati. Alcuni altri anno ripetuto sì fatta esperienza e non ne sono riusciti. V'è chi pensa che si comunicherebbe con più certezza cotesta malattia, sfregando con un po' di bambagia la pelle d'un malato di *rosolia*, e applicando poscia questa bambagia sopra una incisione, come si fa del *vajuolo*. Altri per lo contrario consigliano di prendere un pezzo di flanella, di applicarla sulla pelle di colui che ha la *rosolia*, di lasciarvela in tutto il corso del male, e poscia stenderla sul braccio o sulla gamba della persona, cui si vuole comunicare sì fatto male.

Esposizione di differenti metodi di fare questa operazione.

Non si può dubitare che non vi sieno parecchi mezzi d'*inoculare* la *rosolia*, come ve ne sono parecchi di comunicare il *vajuolo*: ma è probabile che il più sicuro sarebbe di applicare la bambagia, con cui si avesse sfregato la pelle dell'infermo, o d'introdurre dentro il sangue una picciola quantità dell'umore *icoroso* che gocciola dal naso o dagli occhi dell'ammalato. Tutti i Pratici si accordano a dire, che coloro che anno avuta la *rosolia* per *inoculazione*, non hanno sofferto che una malattia *benignissima*. Noi dobbiamo per tanto desiderare che questa pratica divenga più generale, tanto più che da qualche tempo in qua la *rosolia* si rende pericolosissima.

§. I.

Della febbre scarlattina benigna.

(Questa specie di *febbre scarlattina* la più comune, è il più sovente cotanto leggiera, che di rado i Medici vengono chiamati a curarla.)

ARTICOLO PRIMO.

Sintomi della febbre scarlattina benigna.

NON altrimenti che tutte le altre *febbri*, ella comincia dalle alternative di freddo e di caldo, senza disagio notabile della persona: la pelle in appresso si copre di macchie rosse, più larghe, più numerose, più cariche di colore, e meno uniformi che nella *rosolia*.

Quanto
duri questa
eruzione.

Elleno durano due o tre giorni, e poscia spariscono; dopo di che si vede l'*epidermo*, o fior di pelle, pelarsi e cadere in isquame. (Ved. prima di andare avanti, il Cap. I e II di questo Vol.)

ARTICOLO SECONDO.

Cura della febbre scarlattina benigna.

I rimedi
qui vi sono
poco neces-
sari. Vit-
to.

RARO è che sieno bisognevoli de' *rimedi* in questa malattia: è tuttavia necessario che il malato osservi il ritiro, e che se gli vietino le carni, i liquori fermentati, e i cordiali, ec.

Bevande.

Fa d'uopo di prendere delle copiose bevande *rinfriscanti* e *diluenti*.

Circo-
stanze che in-
dicano de'
rimedi: eli-
sseri molli-
tivi, nitro,
e rabarba-
ro.

Se la *febbre* diviene impetuosa, bisogna usare de' *clisteri molliativi* che lubrificano il ventre, oppure delle piccole dosi di *nitro* e *rabarbaro*. A cagione di esempio sei grani di *nitro*, con cinque o sei grani di *tabarbaro*, ripetuti due o tre volte per giorno, o più sovente, se sia necessario.

Bagni dei
piedi e del-
le gambe.

I fanciulli ed i giovani sono di frequente travagliati nel cominciamento di questo male da una spe-
zie

zie di stupore e da *convulsioni epilettiche*: è bene in allora bagnargli i piedi e le gambe nell'acqua calda, e fargli prendere un cucchiaino da caffè di *sciotoppo diacodion* ogni sera, fino a tanto che l'infermo sia risanato. (SYDENHAM.)

§. II.

Della febbre scarlattina maligna.

LA febbre scarlattina non è poi sempre tanto benigna: alle volte ella è corredata da *sintomi putridi e maligni*, e in questo caso riesce sempre pericolosa.

La febbre scarlattina maligna è sempre pericolosa.

ARTICOLO PRIMO.

Sintomi che caratterizzano la febbre scarlattina maligna.

NELLA febbre scarlattina maligna l'ammalato sente non solo del freddo e del tremore, ma ancora un *abbattimento*, uno sconcertamento universale, e una grande *oppressione di petto*. A questi *sintomi* succede un calore eccessivo, delle *nausee*, il vomito, e il dolore di gola.

Il polso è *frequentissimo*, ma *piccolo e depresso*; la *respirazione* è anelosa e stentata; la *pelle* è cocente, senza essere arida; la lingua si mantiene umidiccia, e coperta d'una bianca *mucoosità*; le *glandule delle fauci* sono infiammate e *ulcerose*.

Allorchè l'*eruzione* si manifesta, ella non arreca alleggiamento veruno: i *sintomi* per lo contrario aumentano d'*intensità*, e ne insorgono ancora di più fastidiosi, come la *scorrenza di ventre*, il *delirio*, ec.

ARTICOLO SECONDO.

Cura della febbre scarlattina maligna.

Allorchè si prende abbaglio intorno sì fatta *febbre*, e che prendendola semplicemente per una *febbre*, Pericolo delle evacuazioni in

questa spe-
cie di feb-
bre scar-
lattina.

Necessità
de' cordia-
li e degli
antifetici.

malattia *infiammatoria*, s'imprende a curarla colle ripe-
tute cacciate di sangue, coi purgativi e i rimedj rin-
frescanti, rendesi per ordinarlo più pericolosa.

I soli presidj ch'ella richiede, debbono cavarli dal-
la classe dei *cordiali* e degli *antifetici*: tali sono il
vino, la *chinachina*, la radice di *serpentaria virginia-
na*, ec.: ella deve, in corto dire, essere trattata
come la *febbre putrida maligna*, o come l'*angina can-
crenosa*. Ved. il Cap. IX e XIX, §. II di questo
Vol.) (a).

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della febbre biliosa.

Caratteri
di questa
specie di
febbre.

A Llorà quando una *febbre continua*, *intermittente* o
remittente, è accompagnata da una *evacuazione*
copiosa e frequente di *bile*, sia per di sopra, sia per
di sotto, questa prende il nome di *febbre biliosa*.
(Ved. Cap. IV, nota 1 di questo Vol.)

In quale
stagione ci-
la sia fre-
quente.
Paesi dove
ella è co-
mune.

In Inghilterra, (e in Francia) si manifesta per
solito verso la fine della state, e sparisce all'entrare
del verno.

Ella è più comune e più perigliosa nei paesi cal-
di, soprattutto se il terreno è paludoso, e che a delle
grandi pioggie succedano degli eccessivi calori.

Chi ne van-
no più sog-
getti.

Le persone che s'affaticano all'*aria* aperta, che a-
bitano nelle campagne, che si espongono all'*aria*
notturna, ci sono i più soggetti. (Ved. prima di
passare innanzi, i Cap. I e II di questo Vol.)

Osserva-
zione.

(a) Durante il verno del 1774, ha regnato in Edimbourg
una *febbre* di questa specie pericolosissima. Ella sfogava le sue
furie segnatamente tra i fanciulli del popolo: in generale l'
eruzione era accompagnata da *schinanzia*; e i *sincomi infiam-
matorj*, frammeschiati con molti altri ch'erano di natura pu-
trida, rendevano la cura di questo morbo difficilissima. Verso
il fine di questa *febbre*, il maggior numero de' malati era so-
praffatto da un enfiagione considerabile nelle *glandule mascu-
lari*, e molti soggiacquero ad una *suppurazione* in uno degli
orecchi, e anco in tutti e due.

§. I.

Cura della febbre biliosa, allorchè ella è continua.

SE nei principj di questa febbre si appalesino de' segni d'*infiammazione*, la cacciata di sangue diviene necessaria.

Circostanze, che indicano la cacciata di sangue. Vitro è rimedi.

Fa di mestieri al tempo stesso di ridurre il malato ad un vitto rinfrescante, diluente, raccomandato nella febbre acuta continua. Se gli darà parimente la pozione salina, che si ripeterà spesse volte tra giorno; si lubricherà il ventre con de' clisteri, o de' blandi purganti. (Ved. qui sopra Cap. IV, §. III e IV di questo Vol.)

§. II.

Cura della febbre biliosa, qualora sia intermittente o remittente.

SE però la febbre sia intermittente o remittente, la cacciata di sangue è di rado necessaria. Forza è in allora di prescrivere un vomitivo, come l'abbiamo detto nel Cap. III, §. III. e IV, e Cap. XI, §. III e IV di questo Vol.)

Vitto e rimedi.

§. III.

Cura della febbre biliosa, relativamente ai sintomi predominanti.

SE il ventre è chiuso, si prescriverà un purgativo leggero, poscia la chinachina, che conduce ordinariamente a fine la cura. (Se malgrado il purgativo, la bile non venga cacciata fuori, bisogna prescrivere de' clisteri, che si ripeteranno a norma della pertinacia della stiticità di ventre: il vomitorio in forma di beveraggio, vale a dire due o tre granelli di tartaro stibiato, disciolti in sei oncie d'acqua, di cui se ne mette una cucchiataia dentro ciascun bicchiere

Allorchè il ventre è inobbediente;

d'acqua melata, di siero di latte, o di limonea, ec. produce sovente degli effetti saluberrimi.)

Nel caso d'una scorrenza di ventre orinata o disenterica;

Nel caso d'una scorrenza di ventre ostinata, bisogna sostenere le forze dell'infermo mercè de' brodi di pollo, della gelatina di corno di cervio, ec. si può prescrivere il decotto albo, per bevanda ordinaria. Se il flusso di ventre è sanguigno e accoppiato a febbre, conviene curarlo non altrimenti che la disenteria. (Ved. Tom. III, Cap. XXV, §. VII, Art. I.)

Allorchè la pelle è infocata, e ch'ella per nulla si prechi al sudore;

Allorchè la pelle è infocata, e che il malato non può sudare, bisogna attendere a sollecitare questa evacuazione, esibendogli tre o quattro volte per giorno un cucchiaino ordinario di spirito di Menderero, in un bicchiere della sua bevanda solita.

Allorchè si manifestano de' sintomi nervosi, purridi, ec.

Se la febbre biliosa è corredata da sintomi nervosi, purridi, ec. come accade assai spesso in questi casi, il malato è da medicarsi, come lo abbiamo consigliato nel Cap. VIII e IX, pag. 126 e seg. e pag. 144 e seg. di questo Vol.

§. IV.

Mezzi da usarsi, onde prevenire il ritorno della febbre biliosa.

Uso della chinachina come preservativo.

DAppoichè questa febbre è risanata, fa d'uopo mettere ogni suo studio onde prevenire la recidiva. Per conseguenza il malato, massimamente quando siasi verso la fine dell'autunno, continuerà l'uso della chinachina per alquanto tempo, benchè si trovi ristabilito in salute: si asterrà dalle frutta malsane, dai liquori recenti, e da' cibi stattuosi. (Ved. Cap. II, §. III di questo Vol.)

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Della risipola, o fuoco di S. Antonio.

LA risipola è una malattia propria di tutte l'età, ma più comune tra le persone di trenta in quarant'anni.

A quali età ella sia comune.

Le persone d'un *temperamento sanguigno e pletorico* ci sono più esposte. Ella coglie sovente i giovani e le grvide: coloro che l'anno sofferta una volta, sono molto soggetti ad averla di nuovo.

Chi sieno quelli che ci sono esposti.

Si trova talora essere la malattia primitiva o *essenziale*, altra volta non è che *sintomatica*.

Ora essenziale, ora sintomatica.

Tutte le parti del corpo possono essere la sede di questo male; ma il più di sovente attacca il viso e le gambe; il viso in particolare.

Qual sia la sede di questo male.

Ella è più frequente in autunno, e quando una stagione fredda ed umida succede a de' grandi calori.

Stagioni nelle quali è più frequente.

(Noi non intraprenderemo a descrivere tutte le spezie di risipola; questo distinto ragguaglio ci trarrebbe al di là de' confini che ci siamo prescritti, e d'altronde ciò sarebbe lavoro affatto inutile per chiunque che non sia Medico. Che importa in fatti alla maggior parte di quelli, per cui noi scriviamo, che si abbia imposto il nome di *zoster*, o sia di *fuoco persico*, alla risipola che accerchia il corpo a guisa di cintolo; che *universale* si chiami, quella ch'è sparsa su tutta l'estensione del corpo; *intermittente*, quella che appare e dispàre a vicenda, se tutte queste spezie anno assolutamente lo stesso carattere e si curano nello stesso modo? Due però ce ne sono che non possiamo passare sotto silenzio, perchè sebbene sieno *benigne*, anno de' caratteri che le anno fatte confondere con alcune altre malattie, e per conseguenza potrebbero condurre in errore.

Quante sorta di risipola ci sieno.

La prima è quella, cui si dà il nome di *rosalia*; (spezie di ravaglione confluyente,) che si dovrebbe piuttosto chiamare *risipola universale pustolosa*. El.

Cosa sia la risipola chiamata rosalia.

la non assale, dice il Sig. LIEUTAUD, che i fanciulli, ed i giovani.

Cosa sia
la risipola
vescicola
della faccia.
Vera
idea che se
ne dee formare.

La seconda è quella che si appella *risipola vescicola della faccia*, (*erysipelas bullosum*: GORTER; ovvero, *febris erysipelatoza*: SYDENHAM,) la quale è quasi sempre accompagnata da *febbre* violenta. Sarebbe però, dice il Sig. LE ROY, un assai poco conoscere la natura di questo male, qualora si considerasse la *risipola* come l'afezione *primitiva*, e la *febbre* come *accessoria* o *sintomatica*: la cosa è precisamente al rovescio. Questa malattia altro non è che una *febbre eruttiva*, la *crisi* della quale, più o meno perfetta, si fa mediante il *decubito* dell'umore che la eccita, sopra gl' *integumenti* della faccia, della testa e del collo, ec.

§. I.

Cagioni della risipola.

La più comune è il freddo preso dopo aver provato del calore.

LA *risipola* è spesso volte cagionata da *passioni* violente o perturbazioni dell'animo, cioè dallo *spavento*, dalla *collera*, ec.: essa procede ancora dal *freddo* (a). Se dopo aver sofferto un caldo eccessivo, esponesi immediatamente al freddo, di maniera che la *traspirazione* venga di sbalzo a sopprimerfi, ne risulta di sovente la *risipola*.

Il bere ad eccesso; i *bagni* caldi troppo a lungo continuati; tutto ciò ch'è capace di riscaldare il sangue, può darvi motivo. Una *evacuazione consueta*,

(a) I contadini nella maggior parte dell'Inghilterra appellano cotesto male, *a blast*, *un colpo d'aria*, e s'immaginano ch'ella dipenda da un'aria cattiva, o da un *vento* infesto. La verità è, che avendo il costume di coricarsi tutti riscaldati, e stanchi sul suolo umido, dove dormono, e dove restano tempo assai lungo per contrarre del freddo, sono colti sovente dalla *risipola*. Senza dubbio che questa malattia può avere dell'altre cagioni; ma non temiamo di troppo avanzare, asserendo che in dieci volte ve ne sono nove che questa malattia deriva da freddo preso dopo aver patito grandissimo caldo e stanchezza.

onninamente o in parte soppressa, vale altresì a cagionare la *risipola*, non meno che la soppressione d'un *evacuamento* artificiale; come quello d'una *fontanella*, d'un *setone*, ec.

§. II.

Sintomi della risipola.

IL *tremito*, la *fese*, la perdita delle forze, alcune doglie di capo, del collo, il calore, la *veglia*, un *polso frequente*, sono i primi sintomi della *risipola*, a' quali si può aggiungere il *vomitto* e sovente il *delirio*. Verso il secondo, terzo, o quarto giorno, la parte che ne dee essere la sede, si gonfia e diviene rossa. Quanto prima vi si manifestano alcune *pustollette*; allora la *febbre* d'ordinario minora.

Ordine col quale appaiono i sintomi.

(Uno dei caratteri distintivi della *risipola*, è che l'*eruzione*, la quale è di un rosso vivace, bianchisce al tatto; vale a dire che premendo col dito sopra una delle parti infiammate, l'impressione rimane albiccia per alcuni istanti, dopo de' quali ella diviene rossa egualmente che prima. Questo carattere basta sovente per distinguere una *risipola* dall'altre *eruzioni*, con le quali ella ha della rassomiglianza, sopra tutto colla *rosolia*, o sia la *risipola universale pustolosa*, di cui imprendiamo a parlare, la quale viene altresì spesso confusa con la *rosolia*, qualora non abbiasi verun riguardo agli altri *sintomi*.)

Sintomi caratteristici della risipola.

La *risipola universale* si manifesta nei primi giorni per via di *pustole*, poco differenti da quelle della *rosolia*; ma le loro basi si dilatano e si vanno ad unire per ricoprire il corpo d'una vera *risipola*, che dileguasi verso il nono giorno della malattia, e lascia la *pelle* coperta di *squame*. S'è fatta *eruzione* è più da temersi che quella della *rosolia*, con la quale si confonde talvolta. In alcune occasioni ella è stata altresì riguardata come una specie di *vajuolo*; ma comunemente, al pari di parecchie altre *malattie della pelle*, non le viene dato alcun nome. *Précis de la Méd. prat.* T. II, pag. 398, ec.)

Sintomi della risipola universale pustolosa.

Allorchè la *risipola* attacca i piedi, le parti cir-

Sintomi della risipola.

*Polla dei
piedi.*

convicine si gonfiano; e la pelle diviene lucente. Se il dolore è gagliardo, egli si estende a tutta la gamba, che non si può toccare senza recar tormento all'infermo.

*Sintomi
della risi-
pola vesci-
cosa della
faccia.*

La *risipola vescicosa della faccia* gonfia questa parte, la rende rossa, e copre la pelle di vescichette piene d'un'acqua limpida. L'ensiegione si avvanza ad uno ed anche ad amendue gli occhi, e li tiene chiusi. Il malato ha della difficoltà di respiro. Quando v'abbia molta aridità di bocca e delle narici, e che il malato sia assopito, v'è luogo a temere una *infiammazione di cervello*.

(Ella è solita di manifestarsi per via d'un *tremore*, dopo del quale si accende una viva *febbre*. Sul principio l'infermo è tormentato d'ordinario da oppressione di stomaco, da voglie di vomitare; talvolta altresì vomita delle materie *biliose*, e in questo periodo della malattia li *vomitivi* sono comunemente utili. Il secondo giorno, o alla fine del primo, alle volte ancora fin dal primo esordio, si dichiara un rossore con ensiegione lucente sopra alcune parti del naso, donde sembra insorgere l'ensiegione *risipolosa*, per dilatarsi sopra la faccia e sopra una parte del collo, sopra l'orecchie, spesse volte eziandio sopra la testa, e sotto i capelli. Questa ensiegione cessa di stendersi, e perviene al più alto grado nello spazio di tre o quattro giorni. Dacchè ella è una volta formata, per l'ordinario la *febbre* e gli accidenti minorano di molto, e anco talora cessano onninamente; in seguito la *risipola* via via si dilegua: e in fine l'*epidermo* della parte affetta si sgretola in molte squame. Cotesta malattia è *benigna*. Le persone che l'anno avuta una volta, sono soggette a ricadervi in seguito.)

*Sintomi
della risi-
pola sul
petto.*

Allorchè la *risipola* pianta la sua sede sul *petto*, questa parte s'intumidisce, e diviene eccessivamente dura: questi *sintomi* sono accompagnati da grandi dolori, e da disposizione alla *suppurazione*. Il malato risente una doglia violenta sotto l'*ascella* del lato infermo, e ne risulta sovente un *ascesso* (1).

(1) Quanto alla *risipola* cagionata da sì fatti accidenti, si

Se l'enfiagione in uno o due giorni cede; se nello stesso intervallo il calore e la doglia cessano; se la pelle comincia ad ingiallire, e che la cuticola si secchi e cada in isquame, non v'è più pericolo. Sintomi favorevoli.

(Questo termine della malattia non è tanto corto, quanto nelle *risipole* leggiere, che per verità formano il maggior numero: imperciocchè presso le persone attempate, *scorbutiche*, o tocche da qualsivoglia altra malattia cagionata da un vizio nel sangue, la malattia è molto più lunga, anco ne' casi stessi che volgono alla morte. Negli altri casi l'eruzione si cangia in *ulcere* assai rubelli, sopra tutto nelle gambe.)

Ma se la *risipola* sia estesa e profonda; se abbia per sede una qualche parte sensibile, allora ella è sempre accompagnata da pericolo. Se il colore, di rosso ch'era, diviene livido o nero, dee si temere la *cancrena*. Non si può alle volte distruggere l'*infiammamento*, e la *risipola* viene a *suppurazione*. In questo caso ne risultano sovente alcune *fistole* o la *cancrena*. Sintomi pericolosi.

Coloro che muojono di questo male, sono ordinariamente tolti di vita dalla *febbre*, che in tal caso è accompagnata da *difficoltà di respiro*, talora da *delirio* e da *sopore*. Vengono d'ordinario a morte verso il settimo o ottavo giorno.

(La *risipola della faccia* o della testa è tanto più pericolosa, quanto più l'enfiagione è considerabile. Se ella occupa il collo, si dee temere un *angina* o *sebinanzia* molesta.)

La *risipola universale* esige il governo, che si propone in questo Capitolo, modificato secondo le circostanze. La *risipola della faccia* richiede quello della *febbre acuta continua*. (Ved. Cap. IV, §. III. e IV; di questo Vol.)

d'uopo ch'ella abbia la sua sede nelle parti *glandulose*: tali sono le ascelle, di cui parla il Signor BUCHAN, e principalmente le mammelle, come accade assai di sovente; e questa specie di *risipola* è la più fastidiosa.

§. III.

Regola di vitto che bisogna prescrivere a coloro che sono attaccati di risipola.

Bisogna **IN** questa malattia l'ammalato non dee sentire nè caldo, nè freddo soverchio, perchè l'uno e l'altro eccesso contribuirebbe a far retrocedere l'eruzione; il che bisogna sempre prevenire in qualsivoglia specie di risipola.

Bisogna Quando il male è leggiero, basta che l'infermo guardi la camera, senza sforzarlo a restare in letto; fa d'uopo di agevolare la *traspirazione* mediante de' brodi *diluenti* tiepidi, ec. e la parte malata si terrà solo coperta quanto si renderà necessario, acciocchè essa provi un calore moderato.

Alimenti. La *dieta* deve essere leggiera, e di qualità moderatamente *rinfrascriptiva* ed *umettante*. Si farà uso del cremore di *avena*, della *panatella*, dei brodi di *pollo*, o composti con dell' *orzo*, delle *pianze*, e delle frutta *rinfrascriptanti*. Si proibirà la carne, il pesce, i *liquori fermentati*, le *spezierie*, ogni condimento, tutto ciò, che può riscaldare ed infiammare il sangue.

Bevanda. La bevanda consisterà in *tisana d'orzo*, di *fiori di sambuco*, o in *siero di latte*, ec.

Bevanda Ma allorchè il *polsò* è *depresso*, e che il malato è abbattuto, forza è di sostenere le sue forze con del *vino*, o con altre bevande di *cordiale* natura. In tal caso se gli darà per *alimento* del *sagou* con un po' di *vino*; de' brodi nutritivi presi in piccola quantità e ripetuti di spesso. Bisogna però evitare tutto ciò che potrebbe riscaldare.

§. IV.

Rimedj da prescriversi ai malati di risipola.

La risipola **SI** cagiona sovente molto di male in questa malattia con i *rimedj*, e sopra tutto con quelli che si applicano esternamente. Tosto che si rileva una *infiammazione* sopra una qualche parte; si fa ricorso al-

le applicazioni esterne . Senza dubbio ch'esse divengono necessarie nei *flemmoni* considerabili come lo vedremo Tom. IV , Cap. LII , §. III ; ma la *risipola* non ha bisogno di queste applicazioni .

Le *unzioni*, gli *unguenti*, gl' *impiastri*, quasi tutti composti di sostanze grasse, sono piuttosto capaci di ostruire i *pori* della *pelle*, e di respingere gli umori che cercano di sortire, che di aprire queste *porosità*, per dar loro adito al di fuori (1).

Pericoli delle unzioni, degli unguenti, degli impiastri, ec.

Nel principio di questo male, è ugualmente pericoloso, tanto l'eccitare la *suppurazione*, quanto far retrocedere gli umori . La *risipola* rassomiglia in alcuni riguardi alla *gotta*, e deve essere trattata con le maggiori cautele .

Cautele ch' esige la cura della risipola .

Le sole applicazioni che si possono permettere, e che riescono le più sicure, sono una faldella di lana fina, o un pezzo di flanella morbida, con cui si copre la parte affetta, difendendola dalle impressioni dell'aria esterna. Questi preservativi ecciteranno una dolce *traspirazione*, oggetto di massima importanza in questa malattia. Nella Scozia la classe inferiore del popolo applica sopra la parte malata un pannolino coperto di farina ; locchè sembra convenientissimo (3).

Uniche applicazioni da permettersi .

(1) Tutte le sostanze grasse sono pericolose nelle malattie *eruttive*; di più li *fomenti ammollianti* sono altresì spesso nocivi . Ho veduto una *risipola* sulla *faccia*, sebbene leggiera, venire a *suppurazione* a motivo dell'uso d'una *infusione* di fiori di *sambuce* : rimedio consueto, che tutto il mondo adopera in tal caso, anche di sua propria volontà . Questa *suppurazione* fu ostinatissima, e non cedette che ai *purgativi* reiterati .

Dei fomenti, sebbene ammollienti . Perchè è

(2) Tengasi la parte calda, sia con flanella, sia con della lana, ecco l'unico rimedio esterno che questo male richiede . Si farà tosto persuaso di questa verità, quando si vedrà qui in appresso, pag. 237 di questo Vol., che l'Autore non consiglia li *fomenti* e i *cataplasmi maturanti* che per eccitare la *suppurazione*, allorchè le circostanze la esigono .

Un altro pericolo che nasce dall'applicazione dei rimedj esterni in questa malattia, è il retrocedimento dell'*eruzione* . La *risipola*, dice il Sig. LE ROY, è una malattia delle più soggette alla *ripercussione*, alla *metastasi*. Forza è dunque di ben

Non si può
sacchar san-
gue in que-
sta malat-
tia, se non
con riser-
va.

V'è l'usanza di cacciar *sangue* nella *risipola*; ma questa operazione domanda alcune precauzioni. An- corchè sia certo, che il *salasso* venga indicato, se la *febbre* è violenta, se il polso è *duro* e *forte*, se il malato è vigoroso, tuttavia fa di mestieri che la quantità del *sangue* venga regolata a tenore delle cir- costanze; e i *sistemi* devono soli decidere, se abbi- sogni ripetere l'operazione, o ristarsi alla prima.

Caso in
cui il sa-
lasso è ne-
cessario.

Qualunque volta il malato sia abituato nell' uso de' *liquori spiritosi*, e che la sede del male sia nella te- sta, il *salasso* è assolutamente necessario.

Circostan-
ze ch' esi-
gono i ba-
gni ai pie-
di, i cata-
plasmî di
cipolle, o
i *senapif.*
mi;

I *bagni* dei piedi e delle gambe, spesso ripetuti nell'acqua calda, sono di grande efficacia, quando la *risipola* investe la faccia o il *cervello*: procurano una derivazione degli umori dalla testa, e sollevano quasi sempre il malato. Se cotesti *bagni* non producono l'effetto desiderato, si applicano con la stessa inten- zione de' *cataplasmi* di *cipolle*, o de' *senapismi* stuzzi- canti, sotto la pianta dei piedi.

I servizia-
li molli-
vi, il ni-
tro, ed il
rabbarbo.

Nel caso che si rende necessaria la *emissione* di *sau- gue*, bisogna altresì lubrificare lentamente il ventre con de' *clisteri molli- tivi*, e delle piccole dosi di *nitro* e di *rabbarbo*. Ci sono alcuni Medici che in tale circostanza ordinano il *nitro* in grandissime dosi; ma cotesto *sale* d'ordinario sconvolge lo *stomaco*, qualora si prenda in quantità soverchia. Che che ne sia, questo è uno de' migliori *rimedj*.

Quando la *febbre* e l'*infiammazione* sono considera- bili, si possono dare al malato tre o quattro volte per giorno, nella sua solita bevanda, dodici o quindici granelli di *nitro*, e cinque o sei di *rabbarbo*.

Gli stessi
forti pur-
ganti, i
vescicato-
ri.

Allorchè la *risipola* abbandona l'*estremità* per portarsi alla testa, in maniera di cagionare il *delirio* o una *affezione comatosa*, bisogna assolutamente promuovere l'evacuazione del ventre. Forza è altresì d'impiega- re de' *purgativi* forti, quando i *clisteri* e i *purganti*

guardarsi di non cagionare un tale *retrocedimento* con un per- verso governo: non bisogna, allorchè la *risipola* si manifesta, mettervi alcuna cosa al di sopra, ma abbandonarla alla Natu- ra, e non attendere che a correggere la massa degli umori.

blandi mancano del loro effetto. Fa d'uopo parimenti in questo caso di applicare i *vesicatorj* al collo o dietro l'orecchie, e de' *senapismi* sotto la pianta dei piedi.

Allorchè non si può pervenire a far cessare l'*infiammazione*, e che v'abbia motivo di temere che la parte affetta venga ad *ulcerarsi*, bisogna in allora affrettarsi a promuovere la *suppurazione*. Vi si riuscirà coll'applicare sulla parte malata de' *cataplasmi maturanti*, ai quali si aggiungerà del *zafferano*, e col usare dei *fomenti caldi* e altri *rimedi* consimili.

Quando e come convenga regolarsi per eccitare la suppurazione.

Il color nero, livido, ceruleo della parte affetta, che annunzia una disposizione alla *cancrena*, indica che bisogna prescrivere l'uso della *chinachina*. Converrà aggiungervi gli *acidi*, come lo abbiamo consigliato nel *vajuolo*, pag. 172. di questo Vol.

Circoſtanza in cui bisogna somministrare la chinachina.

Ella si prescriverà sotto la forma la più gradevole al malato; ma non bisogna mai dispensarsi dall'esibirla, perchè da ciò ne dipende la vita del malato. Se i *sintomi* sono minacciosi, se ne darà una *dramma* ogni due ore.

Sua importanza in questo caso. Dole.

Si applicheranno in oltre sulla parte malata de' *piumaccioli* inzuppati nello *spirito di vino canforato*, o nella *tintura di mirra* e di *aloes*; questi si rinnovelleranno spesse volte tra giorno. Si può ancora in simil caso applicare sulla parte inferma de' *cataplasmi* di *chinachina*, o fomentare cotesta parte con una forte *decozione* di questa stessa correccia.

Si applica ancora all'esterno in cataplasmi, o in fomenti.

Nella spezie di *risipola* chiamata *risipola scorbutica*, malattia che dura per un corso di tempo notabile, basterà di purgare leggermente, e di esibire de' *rimedi* che purifichino il *sangue* e favoriscano la *traspirazione*. Per la qual cosa dopo di aver calmata l'*infiammazione* con de' *rimedi rinfrescanti* e *rilassanti*, si darà al malato per bevanda una *decozione* di *legni sudorifici*. Dopo un certo tempo dell'uso di questo *decocto*, bisognerà somministrare gli *amari*.

Come bisogna regolarsi nella risipola scorbutica.

§. V.

Mezzi di preservarsi dalla visipola.

Maniera di vivere.

Coloro che sono soggetti ai ricorsi frequenti della *visipola*, devono tenersi singolarmente in guardia contro le *passioni* violente. Devono astenersi dai *liquori spiritosi*, dalle sostanze *salate*, *viscose*, e molto nutritive. Dovranno fare un sufficiente *esercizio*, evitare i calori eccessivi e il freddo estremo.

Alimenti e bevande.

Il loro nutrimento principale dee consistere in *latte*, *frutta*, *piante* e *radiche* di qualità *rinfriscante*. La loro bevanda sarà della *birra leggera*, del *siero di latte*, del *latte di butiro*, ec.

Bisogna evitare la stitichezza.

Le *stitichezze* ostinate sono nocevolissime a questa sorta di persone. Se non possono rimediarsi per via del solo *vitto*, bisognerà che prendano sovente alcune dosi di *rabarbaro*, di *fiordi tartaro*, di *elettuario lenitivo*, o di qualche altro *purgante dolce*, (tal è l'*elettuario*, chiamato *Marmelade de Tronchin*. Ved. questo rimedio nella Tavola.)

CAPITOLO DECIMOSESTIMO.

Della frenitide, o sia infiammazione del cervello.

Questa malattia è più spesso intempestiva che essenziale.

Questa malattia è talvolta la malattia *primaria* o *essenziale*; ma più spesso non è che un *sintomo* d'un altro male, come d'una *febbre infiammatoria*, d'una *febbre eruttiva* o *porporina*, ec. (1).

Quanto questa malattia sia pericolosa, allorché è essenziale.

(1) La *vera frenitide*, vale a dire quel morbo, che secondo BOERRHAAVE, non è che un *delirio furioso* e continuo, dipendente unicamente dall'azione del *cervello*, ed accompagnato da *febbre acuta continua*, è per buona ventura rarissimo nei nostri climi. Questo morbo crudele ammazza spesso volte i malati sin dalla terza o quarta giornata, e non giun-

Non è raro però di vederla la malattia *essenziale* nei climi caldi, dove assale principalmente le persone che sono nel vigor dell'età. Le persone vivaci e passionarie, le genti studiose, quelli che anno il *sistema nervoso irritable*, ci vanno più soggetti.

Facili dond
ella è co-
nosciuta
e persone
che ci van-
no sogget-
te.

§. I.

Cagioni della infiammazione del cervello.

LA *frenitide* è spesso volte cagionata dalle veglie, sopra tutto allorchè queste si impiegano in faticose meditazioni. Ella può ancora esser prodotta dal bere smodato, dalla collera, dalla tristezza, dal cordoglio. La soppressione dell'evacuazioni consueti vi dà sovente motivo; tali sono quelle delle *morici* negli uomini, o dei *mestruj* presso le femmine, ec.

Coloro che si espongono imprudentemente agli ardori del sole, massimamente se dormono col capo nudo all'aria aperta in una calda stagione, sono sovente colti da un tratto da *infiammazione di cervello*, talmente che al loro svegliarsi si trovano *delirare*. Ved. Tom. IV, Cap. LVIII.

Se abbiasi l'imprudenza di adoperare i *ripercussivi* nella *risipola*, di spesso ne risulta l'*infiammazione del cervello*. La *frenesia* può altresì essere la conseguenza di alcuni accidenti esterni, come di percosse, di *contusioni* di testa, ec.

ge giammai al di là della settimana. Ma la *frenitide sintomatica*, assai comune nei mali *acuti*, in quelli sopra tutto ora nominati dal Sig. BUCHANAN, è meno micidiale e di più lunga durata, perchè in tai casi lo sforzo del male s'è già portato sopra alcune altre parti del corpo, prima di attaccare il *cervello*.

Si osserverà che quantunque non si tratti qui che della *frenitide essenziale*, tuttavia i consigli prescritti in questo Capitolo, relativamente ai *rimedj* ed al *vizio*, devono essere seguiti nella *frenitide sintomatica*, unitamente a quelli ch'indica la malattia, da cui essa dipende ed è accompagnata.

§. II.

*Sintomi della infiammazione del cervello.*Sintomi
precursori.

I *Sintomi* che sogliono precedere la vera *infiammazione del cervello*, sono il dolore di testa; il rossore degli occhi; l'accensione del volto; il sonno interrotto, o totalmente perduto; una grande aridità della pelle; la *costipazione del ventre*, e la *ritenzione d'urine*; un qualche gocciolamento di *sangue dal naso*; un ronzio nell' orecchio, ed una sensibilità estrema nel *sistema nervoso*.

Sintomi
che mani-
festano l'
infiamma-
zione del
cervello.

Allorchè l' *infiammazione* è formata, i *sintomi* in generale sono i medesimi che quelli della *febbre infiammatoria*. (Ved. il Cap. IV, §. II. di questo Vol.) Egli è vero che nella *frenitide* il *polso* è sovente *debole*, *irregolare*, *tremolo*; ma talvolta è *duro* e *ristretto*. Quando non v'ha che il *cervello* d'infiammato, il *polso* è sempre *molle* e *piccolo*; ma allorchè l' *infiammazione* si stende anche alle *membrane del cervello*, come la *pia* e *dura madre*, allora il *polso* è *duro*.

Sintomi
caratteristici.

Un *sintomo* caratteristico e ordinario di questa malattia, è la squisitezza dell' *udito*, che fa che il malato oda con una singolare sottigliezza; ma questo *sintomo* non è di lunga durata. Un altro *sintomo* egualmente comune, è il battimento o *pulsazione* dell' *arterie del collo* e delle *tempie*.

La lingua è di sovente nera e secca; il malato però radamente si querela di sete, ed anzi ricusa di bere. Il suo spirito non è occupato che dagli obbietti che lo avevano ferito innanzi alla sua malattia. Immerso talvolta nel più profondo silenzio, si sveglia di sbalzo, e sembra furioso.

(L' infermo è in un continuo *delirio*; l' uomo il più mansueto diviene il più collerico. Sbalza sovente fuori del letto. Ora grida, ora piange, canta talvolta. I suoi discorsi, non altrimenti che le sue risposte, sono stravolte. I suoi occhi girano con una mobilità singolare. Le mani gli tremolano: fa caccia di mosche: spiffuzzica le sue copertine. Le *urine*,
quando

Sintomi della infiammazione del cervello. 241
quando non sieno soppresse sono, limpide, bianche, e in tale stato presagiscono assai di male.)

Il tremito continuo; i *sussulti dei tendini*; la *soppressione dell'orine*; le *veglie* ostinate; lo sputacchiare perpetuo; il digrignare de' *denti*, che devesi considerare come una specie di *convulsione*, sono tutti segnali luttuosi. Sintomi pericolosi.

Allorchè la *frenitide* viene in seguito dell'*infiammazione del polmone*, o degl'*intestini*, o della *gola*, ec. ella è d'ordinario funesta, perchè in allora è cagionata dalla *metastasi*, o sia dal trasporto degli umori da queste parti al *cervello*. Quindi la necessità di evacuare il ventre in tutte le malattie *infiammatorie*, e il pericolo di far retrocedere gli *umori*.

I *sintomi* favorevoli sono una *traspirazione*, o un *fudore* libero e abbondante, una *emorragia* copiosa dal naso, il *flusso emorroidale*, dell'*orine* in grande quantità, e che depongono un'abbondevole *sedimento*. Termina alle volte questo male con una *scorrenza di ventre*, e nelle femmine per via d'una *perdita di sangue* più o meno considerabile. Sintomi favorevoli.

Siccome questa malattia spesso diviene in pochi giorni mortale, essa richiede la più grande diligenza nell'applicazione dei *rimedj*. Allorchè si porti in luogo, o che sia mal curata, spesse volte si cangia in *folia*, o in una specie di *stupidezza*, che dura per tutta la vita. Questa malattia esige de' pronti soccorsi. Perché?

§. III.

Visto da prescriversi a coloro che sono sopraffatti da infiammazione di cervello.

LA cura delle *frenitide* presenta delle *indicazioni*, Quali sono che meritano principalmente la nostra attenzione: cioè di scemare la quantità del *sangue*, ch'è nel *cervello*, e di rallentare il corso di questo fluido verso i *vasi* della testa. Quali sono l'indicazioni ch'ella presenta.

Fa di mestieri che il malato si trovi nella più perfetta tranquillità. La compagnia, lo strepito, tutto ciò che può colpire i sensi o turbare l'immaginazio- Conviene allontanare dal malato tutto ciò che può

disturbarlo, e non si dee tenerlo nè troppo caldo, nè troppo freddo. ne, aggrava questo male; lo stesso lume soverchio gli diviene nocivo: per la qual cosa la camera del malato deve essere un po' scura, e d' una temperatura nè troppo calda, nè troppo fredda.

Non bisogna però giungere sino a privare l' infermo della compagnia d' un caro amico, che sia capace di ricrearlo e tranquillargli lo spirito. Non bisogna nemmeno tenerlo affatto al bujo, per tema che da ciò non cada in una tetra *melanconia*, ch'è ben spesso l'effetto di questo morbo.

E' bene, per quanto sia possibile, di tenerlo lieto; di compiacerlo in tutte le occasioni: il contraddirgli inasprirebbe il di lui spirito, e aggraverebbe il male. Nel caso ancora ch'egli domandasse delle cose, dove fosse impossibile di contentarlo, o che gli divenissero nocevoli, non è bene di negargliele positivamente; bisogna al contrario promettere di dargliele tosto che si potranno avere, o usare qualche altro ripiego. Meno danno si recherà al malato accordandogli un poco di ciò che brama, per quanto ciò sembri di dover essergli contrario, di quello che disconsentirvi assolutamente.

Conviene In una parola fa d'uopo di mettere in opra tutto ciò ch'era capace di ricrearlo, allorchè godeva salute. Bisogna narrargli delle storielle piacevoli, fargli sentire qualche cosa di musica; impiegare tutto ciò che vale a blandire le sue passioni ed appagare il di lui spirito. BOERRHAAVE propone in questa occasione di tentare parecchie sperienze; come di eccitare un piccolo strepito, lasciando cadere goccia a goccia dell' acqua dentro un bacile, e impegnando il malato a numerare le percosse che fanno le goccioline, ec. Un suono uniforme, qualora sia grato e perenne, può richiamare il sonno, e per conseguenza divenire utile.

Gli alimenti devono essere leggieri, e composti principalmente di sostanze farinose. La *panatella*, il *cremore di avena* addolcito colla *gelatina d' uva spina*, o col *succo di limoncelli*; le *frutta* cotte dinanzi al fuoco, o condite, i *geli*, le *confetture*, ec. sono convenienti.

La bevanda sarà tenue, *diluente*, e *rinfriscante*; come del *siero di latte*, dell'acqua d' *orzo*, o una *deco-*

disturbarlo, e non si dee tenerlo nè troppo caldo, nè troppo freddo. Si terrà allegro, e la sua camera non sarà nè troppo chiara, nè troppo scura.

Non bisogna contrariarlo, ma anzi promettergli ciò, che sembrerebbe dover essergli nocivo.

Conviene in fine mettere in opra tutto ciò ch'era capace di ricrearlo, allorchè era in salute.

Quali debbano essere gli alimenti.

La bevanda.

Rimedj contro l' infiammazione di cervello . 243
zione d'orzo e di tamarindo . I tamarindi non solo ren-
 dono questa bevanda più gradita , ma ancora più uti-
 le , perchè sono *lubrificativi* .

§. IV.

*Rimedj che si devono somministrare ai malati compresi
 d' infiammazione del cervello .*

Niente al certo reca maggior sollievo al malato di frenitide , quanto una *emorragia* dal naso . Quando ella si ecciti spontaneamente , ben lungi dal volerla arrestare , bisogna al contrario cercare di man- tenerla , applicando sul naso de' pannolini inzuppati nell' acqua calda .

*Vantaggi dell' emor-
 ragia di
 sangue dal
 naso .*

Allorchè si fatta *emorragia* non accada naturalmen- te , forza è di provocarla , introducendo nelle narici una paglia , o qualsivisia altro corpo irritante .

*Mezzi di
 provocarla .*

La *cacciata di sangue* dall' *arterie temporali* alleggerisce singolarmente il capo : ma siccome le circostanze non sempre permettono di fare coteſta operazione , noi raccomandiamo quella delle *vene jugulari* .

*Cacciata di
 sangue alle
 vene iugu-
 lari .*

(Questi *salassi* , assolutamente necessarj in tai ca- si , non possono eseguirſi che da mano esercitata . Noi parimenti consigliamo coloro che sono soliti di *cac- ciar sangue* , di giammai intraprenderle , e di chiama- re perciò un Chirurgo sperimentato .)

Allorchè il *pulso* e le forze dell' ammalato sono tal- mente depresse , che non è più in istato di sopporta- re una *apertura di vena* con la lancetta , conviene ap- plicare le *sanguisughe* alle *tempie* : non solamente trag- gono il sangue con una proporzione più graduata che una lancetta , ma ancora essendo applicate vicinif- simo alla parte ammalata , portano in generale più pronto sollievo all' infermo .

*Circostan-
 ze che es-
 sgono le
 sanguisug-
 he alle
 tempie .*

Il *flusso emorroidale* è parimente d' un grande van- taggio : fa d' uopo impiegare tutti i mezzi possibili per eccitarlo . Se il malato è stato soggetto alle *emo- rroidi* , e che questa *evacuazione* sia soppressa , è neces- sario di tutto impiegare per richiamarla .

*Importan-
 za del flus-
 so emor-
 roidale .*

Per la qual cosa si applicheranno alquante sangui- sughe all' *ano* , si farà sedere il malato sopra il vapo-

*Mezzi di
 eccitarlo :
 sanguisughe .*

ghe, clisteri irritanti, supposte.

re dell'acqua; se gli faranno de' *clisteri irritanti*, e si adopereranno delle *supposte* composte di *mele*, di *aloe*, e di *sal gemma* (2).

Bisogna ripristinare l'evacuazioni oppresse, o sostituirne dell'altre in loro luogo.

Nei casi che questa malattia prendesse origine dalla *soppressione* di qualche *evacuazione* sia naturale, sia artificiale; come quella de' *mestru*, delle *fontanelle*, de' *setoni*, ec. bisogna ripristinare queste *evacuazioni* il più prontamente possibile, o sostituirne dell'altre in loro luogo.

Tenere il ventre lubrico con de' clisteri, de' purganti, ec.

Giova tenere il ventre libero mediante de' *clisteri* stimolanti o di *purganti* forti. Fa d'uopo amministrarne il *nitro* in piccole dosi, di spesso ripetute, che si daranno disciolte nella bevanda del malato. Si può giungere sino a due dramme, e anco più, nell'intervallo di ventiquattr'ore, quando il caso sia urgente.

Rader la testa all'infermo, e irrigarla con aceto, ec.

Si raderà la testa dell'infermo e si stropiccerà spesso volte tra giorno con una *mescolanza* calda di *aceto* e d'*acqua rosa*. Se li applicheranno sulle *tempie* de' *pannolini* imbevuti di questa *mistura*.

Fargli mettere i piedi nell'acqua calda, che s'involgeranno poscia con de' *cataplasmi* di *mollicca di pane* e di *latte*. (I bagni dei piedi saranno più attivi, se si aggiunga all'acqua una certa quantità di *aceto*, come lo abbiamo consigliato, Cap. IV, §. III, pag. 59 di questo Vol. Si avrà cura di mette-

Se gli faranno immergere i piedi nell'acqua calda, che s'involgeranno poscia con de' *cataplasmi* di *mollicca di pane* e di *latte*. (I bagni dei piedi saranno più attivi, se si aggiunga all'acqua una certa quantità di *aceto*, come lo abbiamo consigliato, Cap. IV, §. III, pag. 59 di questo Vol. Si avrà cura di mette-

Maniera di preparare le supposte.

(2) Per fare le *supposte* di cui presentemente si tratta, prendersi un pezzo di pannolino, o una quantità convenevole di bambagia, o un porro grosso come un dito mignolo, o una costola di cavolo, ec. abbiassi pronto del *mele* impregnato di *aloe*, e di *sal gemma*. S'immerge parecchie volte l'uno o l'altro di questi corpi in detta preparazione. Quando il pannolino o la bambagia sono un poco asciugati, e che anno acquistato certa consistenza, si avvolgono in forma di cono: quanto agli altri, non v'è bisogno, giacchè anno la forma prescritta.

Attenzione che bisogna avere nel applicarle.

Nell'introdurre la *supposta* della lunghezza di due pollici dentro l'*ano*, un'attenzione che bisogna avere, è di attaccare un filo a più doppi alla base della *supposta*. Si lascia questo filo al di fuori, a fine di potere introdurre e ritirare la *supposta*, in caso che il moto *antiperistaltico* degl'*intestini* venisse a trarnela al di dentro, come è parecchie volte accaduto.

te l'acqua dentro un vaso profondo, in guisa ch'ella giunga, se sia possibile, fino al ginocchio dell'infermo. E' d'uopo altresì d'immergere il malato dentro un *bagno totale*; e quando la *frenitide* è prodotta dalla rarefazione del *sangue*, e dalla sua troppo grande affluenza verso i *vasi* del capo, forza è che l'acqua sia più fredda che calda. Il *bagno freddo* è sopra tutto convenevole nella *frenitide melanconica*. Questi sono appunto que' casi, dove alcuni Pratici di gran merito applicano il ghiaccio sulla testa de' *frenetici*, dopo di aver fatto precedere la *cacciata di sangue* dal piede.)

Se la malattia diviene ostinata, e che non ceda ai *rimedi*, farà d'uopo coprire tutto il capo con il *vescicatorio*.

Circostanza che indica che i vescicatori.

(L'applicazione de' *vescicatori* richiede molta prudenza. Siccome giova nella cura della *frenitide* l'interdirsi ogni *rimedio* acre ed irritante, così sarebbe a temersi che l'*infiammamento* del *cervello* o delle sue *membrane*, essendo troppo forte, le *castorelle* non dessero più d'intensità allo *spasmo* delle *fibre*, aumentassero il *delirio*, e cagionassero le *convulsioni*. Tal è il sentimento dell'*HOFFMAN* e del *BAGLIVI*. Questo ultimo assicura, ch'essendo a Roma, egli ha veduto più uomini uccisi che guariti dall'applicazione de' *vescicatori*, ma che questi erano più salutiferi e meno pericolosi alle femmine.

Crediamo per tanto che i *vescicatori* debbano riservarsi per le *frenitidi*, in cui l'*infiammamento* delle *membrane* del *cervello* non è notabile, e per quelle che dipendono da un ristagno d'umori densi nei *vasellini* di questo *viscere*. Convergono ancora allorchè abbisogni richiamare all'esterno una *cruzione* retrocessa.)

CAPITOLO DECIMO OTTAVO.

Delle differenti specie di ottalmie, o infiammazioni degli occhi.

L' *Ottalmia* può essere *essenziale*, cioè a dire attaccare una persona che non ha alcun' altra malattia; altre volte ella è *sintomatica*, o *sintomo* d' una malattia qualunque, come il *morbo venereo*, le *scrofole*, ec.: il che forma la divisione di questo Capitolo in due *Paragrafi*. Noi cominceremo dall' *ottalmia essenziale*.

§. I.

Del ottalmia, o infiammazione degli occhi essenziale.

Sede di
questo ma-
le.

IN questa malattia non v' ha che le *membrane* dell' *occhio*, e principalmente l' *albuginea*, che sieno tocche d' *infiammazione*; in guisa ch' ella non è, per così dire, che una malattia esterna dell' *occhio*, non alterando essenzialmente quest' *organo*, come la *gotta serena*, la *catterata*, ec. che sono vere malattie dell' *organo della vista*, di cui parleremo Tom. III, Cap. XLVI, §. I. Non è però che l' *ottalmia* non riesca sovente pericolosa: essa giunge talvolta sino ad alterare l' *organo*, e anco sino a produrre la *cecità*, come lo vedremo in appresso.

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni dell' ottalmia, o infiammazione degli occhi essenziale.

L' *Infiammazione degli occhi* può essere prodotta da alcune cagioni esterne; come da alcune percosse, da alcuni corpicciuoli caduti dentro degli *occhi*, ec. Ella viene sovente generata dalla *soppressione* di alcune *evacuazioni consuete*, dalla guarigione di alcune antiche *ulcere*, dalla cessazione dello *spurgo* d' una *fon-*

tanella , o dalla soppressione del tenue sudore del mar-
tino, di quello dei piedi, ec.

Lo stare lungamente esposti all' *aria notturna* , sopra
tutto quando regna un vento freddo settentrionale :
soggiacere a qualche *soppressione* subitanea della *traspi-
razione* , massimamente dopo aver patito un eccessivo
caldo sono pure cagioni adattatissime a far nascere l'
infiammazione degli occhi .

Il tener lungamente fisso lo sguardo sopra la neve ,
o sopra altri corpi d' una grande bianchezza ; mirare
applicatamente il sole , un fuoco ardente , o qualun-
que altro corpo lucido ; passare repentinamente da una
profonda oscurità al bagliore d' una viva luce , posso-
no egualmente produrre questo male .

Ma niente al certo è più atto a cagionare l' *inflam-
mazione degli occhi* , quanto il vegliare , sopra tutto il
leggere o scrivere al chiaro dei lumi accesi .

I *liquori spiritosi* , gli eccessi nei piaceri d' amore
conducono parimenti all' *infiammazione degli occhi* . Il
fummo acre, ch' esalano i *metalli* , e certe spezie di
fiamma , e li vapori *metfici* delle fognelli danneggia-
no egualmente .

Alle volte l' *infiammazione degli occhi* dipende da un
vizio *venereo* ; di sovente da un vizio *scrofoloso* , o
dalla *gota* . Può ancora essere cagionata dalle *ciglia* ,
o pli della palpebre rovesciati al di dentro , onde
irritino gli *occhi* .

In altre occasioni questa è una malattia *epidemica* ,
che regna sopra tutto dopo una stagione piovosa .
Ho spesso volte osservato ch' essa diveniva anche *con-
tagiosa* , segnatamente a coloro che convivevano nel-
la stessa casa del malato .

Ella è tal-
volta epi-
demica , e
contagio-
sa .

Si vede ancora ch' essa attacca coloro i quali abi-
tano in case basse e umide , o che respirano un' *aria*
umida , massimamente quando non sono avvezzi a si-
mili dmore . Questa *infiammazione* assale altresì i fan-
ciulli cui s' è fatto disseccare imprudentemente la *ti-
gna* , gli *acori* del capo , alcune spurgazioni dall' orec-
chio , e qualsivisa altra *suppurazione* di questo genere .
In fine l' *infiammazione degli occhi* succede sovente
al *vajuolo* , o alla *rosolia* , segnatamente nei fanciul-
li , che hanno una disposizione alle *scrofole* .

Chi sono
quelli che
ne sono
soggetti .

ARTICOLO SECONDO.

Sintomi dell'ottralmia, o infiammazione degli occhi essenziale.

L' *Infiammazione degli occhi* è congiunta a dolore acuto, a calore, rossore, e gonfiezza di questi organi. Il malato non può più soffrire la luce. Talora risente un dolore pungitivo, talmente che i suoi occhi gli sembrano trafitti da una spina; talora gli sembrano pieni di puntolini neri, o crede vedere delle mosche volargli dinanzi. Gli occhi sono bagnati da un umore cocente, che gocciola copiosamente, ogni volta che vuole fissarli in alto.

Il polso d'ordinario è duro e veloce: vi si trova un certo grado di febbre. Allorchè il male è violento, le parti vicine si gonfiano, e si sente un battimento notabile nell'arteria temporale, ec.

Quando l'infiammazione degli occhi è leggiera, ella è facile a risanarsi, massime quando conosca una cagione esterna.

Conseguenze dell'ottralmia quando si grave.

Ma qualora sia violenta, e che duri da lungo tempo, ella lascia sovente sugli occhi alcune macchie, offusca la vista, e talvolta conduce a perderla interamente, e ad una vera cecità.

Sintomi favorevoli.

Allorchè il malato ha una scorrenza di ventre, questo è un buon segno; e quando l'infiammazione passa dall'uno all'altro occhio, come per contagione, questo è un segnale che non è punto disfavorevole.

Sintomi molesti.

Ma quando la malattia è accompagnata da loggia violenta di capo, e ch'ella sia insistente, il malato corre pericolo di perdere la vista.

ARTICOLO TERZO.

Regola di vitto da prescriversi a coloro che sono presi da infiammazione degli occhi essenziale.

L A dieta almeno fuori del caso d'un vizio scrofoloso, non può mai essere severa abbastanza, sopra

tutto nei principj del male. L'infermo dee astenersi da tutto ciò ch'è di qualità *riscaldante*.

I dolci *vegetabili*, i brodi leggieri, le *zuppe* di *cremore d'avena*, sono i soli alimenti che convengono.

La bevanda sarà dell'*acqua d'orzo*, o una infusione di *menta*, del *siero comune di latte*, ec.

La camera del malato deve essere tenebrosa, o i suoi *occhi* avranno a coprirsi con un *velo*, di maniera da intercettare la luce, ma senza appoggiarsi sugli *occhi*. Deve schivarsi dal riguardare il chiaro del *lume acceso* e del *fuoco*, o di ogni altro corpo *risplendente*. Bisogna parimente ch'egli eviti il *fummo* d'ogni maniera, come quello del *tabacco*, ec. non altrimenti che tutto ciò che può *risvegliare la tosse*, lo *starnuto*, o il *vomito*.

Si dee tenere tranquillissimo, e fare ogni sforzo, perchè non abbia a provare verun moto violento, tanto di corpo, come di spirito. Bisogna da ultimo cercare, per quanto è possibile, di non opporsi al sonno.

Quali debbano essere gli alimenti.
La bevanda.

Bisogna che gli occhi del malato sieno al coperto da ogni oggetto luminoso, dal fummo d'ogni sorta, ec.

Deve restare tranquillissimo di corpo e di spirito.

ARTICOLO QUARTO.

Rimedi da somministrarsi a coloro che sono afflitti da infiammazione degli occhi essenziale.

Questa malattia è una di quelle, nelle quali i *medicamenti* esterni sono spesso *nocevolissimi*. Quasi tutto il mondo si crede in possesso di qualche *rimedio* per la guarigione delle malattie degli *occhi*: *rimedi*, che d'ordinario non sono altro che de' *collirj*, de' *lenimenti*, e altre applicazioni esterne, che giovano una sola volta, in venti che riescono dannose. Deesi per tanto star bene in guardia contro tutte sì fatte applicazioni, perchè tutto ciò che mettesi immediatamente sugli *occhi*, non contribuisce sovente che ad *inasprire il male*.

Il *salasso* è sempre necessario in una violenta *infiammazione di occhi*. Fa di mestieri farlo il più da vicino ch'è possibile alla parte malata. Si può cavare ad un adulto dieci o dodici oncie di *sangue* dalla *vena jugulare*, e ripetere questa *emissione di sangue*, se

I rimedi esterni sono più sovente nocivi che utili in questo male.

Il salasso è necessario, dove sia d'uopo il farlo.

condo l'urgenza dei *sinomi*. Qualora riesca incomodo il *cacciar sangue* dal collo, gioverà trarne la stessa quantità dal braccio, o da qualsivoglia altra parte del corpo.

Utilità delle mignatte applicate alle tempie, o alle palpebre.

Con molto frutto spesse volte si appiccano le mignatte alle *tempie*, o alle palpebre inferiori. Bisogna lasciar gocciolare il *sangue* dalle piccole ferite per alcune ore di seguito; e qualora egli troppo presto ristagni, se n'eccita lo scorrimento applicando sopra le ferite de' *piumaccioli* inzuppati nell'acqua calda. Se l'*infiammazione* è ostinata, si ripeterà parecchie volte questa operazione (1).

Importanza de' diluenti e de' lassativi. Lassativi che sono convenienti.

I *rimedj diluenti* e *lassativi* non devono per qualsivoglia ragione negligerli in questo male.

Il malato prenderà adunque ogni due o tre giorni una piccola dose di *sal glauberiano* e di *cremor di tartaro*, o una *decozione di samarindi* e di *sena*. Qualora egli trovi spiacevoli cotesti *rimedj*, adempiranno la medesima *indicazione* una picciola quantità di *raubarbaro* e di *nitro*, un poco di *elettuario lenitivo*, o qualsivoglia altro lento *purgante*.

Bevande diluenti che devono preferirsi.

Il malato nel tempo stesso prenderà in copia del *cremore d'avena acquoso*, del *tè*, del *siero di latte*, o qualsivoglia altra bevanda *diluente* leggiera. Ogni sera mettendosi a letto berrà un gran bicchiere di *siero di latte vinoso* leggero, onde eccitare la *spaspirazione*.

Bagni de' piedi.

Se gli faranno soventi volte tra giorno mettere in molle i piedi e le gambe dentro l'acqua calda.

Bisogna radergli il capo e lavarlo con l'acqua fredda.

Due o tre volte per settimana si raderà, e si farà tostantemente lavare il capo coll'acqua fredda. Abbiamo di spesso veduto sì fatto rimedio produrre de' buoni effetti, e d'una singolare maniera.

Mezzo facile di trarre la quantità di sangue necessaria con le mignatte.

(1) Alle volte le *sanguisughe* non attraggono più *sangue*, perchè ne sono satolle, e in questo stato tosto si staccano. Qualora abbiasi bisogno di fare la *cavata* di *sangue* più copiosa, vi si riesce con un mezzo assai semplice, ed è quello di recidere loro con le forbici l'estremità della coda. Il *sangue*, di cui sono ripiene, scappa fuori per l'apertura, e a misura che si sentono vuote, si riempiono, succhiando di bel nuovo le parti cui sono appiccate.

Se l'*infiammazione* non cede a queste *evacuazioni*, si applicheranno i *vescicatorj* alle *tempie*, o dietro l'*orecchio*, o alla *nuca*, e si manterrà lo *spurgo* per qualche tempo, mediante l'*unguento vescicatorio temperato* (2).

Quando e dove fa d'uopo applicare i vescicanti.

Qualora si sieno lasciati spurgare per un tratto convenevole di tempo, li ho sempre veduti trionfare della più ostinata *infiammazione degli occhi*; ma è spesso volte necessario per giungere ad ottenere l'effetto, il mantenere questa spurgazione pel corso di parecchie settimane.

Giovano naturalmente, quando si mantengono aperti per qualche tempo.

Allorchè il male sussiste da lungo tempo, si ottengono degli effetti veramente straordinari dal *setone* passato nel collo, o meglio ancora tra le due spalle.

Importanza del setone in questa malattia.

Si apre questo dall'alto al basso, o sia lungo la direzione della *spina del dorso* tra le due spalle; si medica due volte al giorno con l'*unguento basilico giallo*. Ho veduto alcuni malati, ciechi da gran tempo, ricuperare la vista mercè d'un *setone* situato nel modo or ora proposto.

Maniera di farlo e di medicarlo.

Quando il *setone* è posto a traverso del collo, si chiude troppo prontamente, ed è molto più doloroso e più incomodo, che quando sta tra le due spalle: d'altra parte quegli lascia una *cicatrice* spiacevole, e non espurga tanto copiosamente.

Nei casi che il calore e il dolore degli *occhi* sono notabilissimi, forza è di applicare su questi *organi* un *cataplasma* di *mollica di pane* e di *latte*, temperato con ottimo olio o burro fresco: questo si applicherà almeno la notte; e la mattina si bagneranno gli *occhi* con una mescolanza tiepida di acqua e di *latte*.

Cosa debba fare, allorchè il calore, ed il dolore degli occhi sono notabilissimi.

Se il malato non può dormire, come accade di spesso, si potranno dargli la sera quindici o venti gocciole di *laudano* (3), o due cucchiaini di *sciloppo dia-*

Circostanze, che indicano i narcotici.

(2) Vale a dire l'*unguento*, nel quale vi entra meno di *cantarelle*. Si può supplirvi con l'*unguento basilico*, che si avvalora colla polvere di queste stesse *mosche*, e di cui se ne mette più o meno, secondo il grado di attività che si vuole dare a questo *unguento*.

(3) La dose che quivi il Sig. BUCHAN prescrive, è una delle più forti che si possa dare in una volta di cotesto *medica-*

Con questi cautele bisogna amministrarli.

152 *Parte Seconda, Cap. XVIII. §. 1. Art. IV.*
edion, più o meno, secondo l'età dell'infermo e la
violenza dei sintomi.

Maniera
di fortifi-
care gli oc-
chi, dopo
che l'in-
fiamma-
zione è
dissipata.

Dopo che l'*infiammazione* è dissipata, se gli *occhi* sono indeboliti, e la vista languida, s'irrigaranno se-
ra e mattina con un po' d'acqua fresca e d'*acquavi-
se*, mettendo una parte di questa in sei parti di quel-
la. Bisogna adagiarsi in modo di potere bagnare l'
occhio intero con questa *mislura*, e trattenervela per
qualche tempo. Per solito niente ho trovato che al
pari di questo rimedio rinforzi gli *occhi*, o come l'
acqua e l'*aceto*; e si possono riguardare altrettanto
proprij a fortificare gli *occhi*, quanto i più decantati
collirj.

Attenzio-
ne, che con-
viene aver-
si in ogni
infiamma-
zione degli
occhi.

Cura dell'
ortalmia
cagionata
da una per-
cossa rice-
vuta negli
occhi.

Sarà bene il riguardare frequentemente gli *occhi* del
malato, per vedere se alcun pelo delle *ciglia* si fosse
rovesciato al di dentro, e se questi li ferissero: in tal-
caso, forza è il reciderle senza indugio.

(Allorchè l'*ottalmia* è semplicemente prodotta da
una percossa fatta sull'*occhio*, basta il far cacciar san-
gue una o due volte, secondo la forza dell'*infiamma-
zione*, e applicare sugli *occhi* dei *cataplasmi risolutivi*.)

Quando l'*infiammazione* è passata, si umetteranno
gli *occhi* con de' piumacciuoli inzuppati nel vino cal-
do, nel quale si faranno versate alcune goccioline di
balsamo del Commendatore, e questi si lasceranno po-
scia applicati al di sopra.)

mento. Abbiamo già fatto vedere con quali cautele bisogna
somministrare gli *antispasmodici*. Queste cautele riguardano so-
pra tutto i *narcotici* o sia i *rimedj*, ne quali v'entrà l'*opa-
pio*, ed egli forma appunto la base del presente. „ Certo è,
„ dice il Sig. LIEUTAUD, che tutti i *narcotici*, di cui parec-
„ chi Medici abusano, sono sempre pericolosi, allorchè si ado-
„ perano senza riserva e troppo lungo tempo. Essi per verità
„ procurano una calma passeggera, ch'è talvolta preziosissi-
„ ma; ma possono gettare un velo sulla malattia, e maschie-
„ rarla, renderla sovente più terribile. I buoni Pratici an-
„ no osservato che non poche malattie, che farebbero termi-
„ nate senza accidenti, sono divenute, per l'abuso di sì fat-
„ ti *rimedj*, assai burrascose e anco mortali „.

§. II.

Dell'ottalmia, o infiammazione degli occhi sintomatica.

Allorchè l'infiammazione degli occhi riconosce per cagione un vizio scrofoloso, o le scrofole stesse, ella è ordinariamente pertinace (4).

In questo caso la *dieta* deve essere meno austera: si può permettere di bere un po' di *negus* leggiero, o di tempo in tempo un bicchierino di vino.

Il rimedio più appropriato è la *chinachina*, che si può prendere in sostanza, o preparata nella maniera seguente.

Prendete *chinachina* della migliore, un'oncia;
scorza d'arancia, o
cannella bianca due dramme.

Riducete tutto in polvere; fate bollire in una pinta d'acqua fino alla riduzione d'una foglietta.

Aggiungete mezz'oncia di *legorizia* tagliata minutamente. Lasciate in *infusione* per una mezz'ora; filtrate.

Se ne darà tre o quattro volte al giorno, due, tre, o quattro cucchiaj, più o meno, secondo l'età dell'infermo.

E' impossibile prescrivere quanto tempo abbisogni continuare questo rimedio, perchè la guarigione di questa malattia può essere più pronta in un soggetto, più tarda in un altro: ma in generale fa d'

Essa è pertinace, quando dipende dalle scrofole. Dieta e bevanda in questo caso. La chinachina è il rimedio più appropriato. Maniera di amministrarla.

Bisogna continuarla per lungo tempo.

(4) Il Sig. BUCHAN prende qui per esempio dell'infiammazione sintomatica degli occhi quella che ha per cagione le scrofole; perchè dessa è il più frequente sintomo di questa ultima malattia che di qualunque altra. Ma quanto ci dice, deeasi egualmente intendere di quella ch'è un sintomo della gotta, del morbo venereo, ec.

In generale non si potrà giammai pervenire a vincere questa spezie di *ottalmia*, se prima non abbiassi guarito la malattia di cui è sintomo. Per la qual cosa solo dopo di avere prescritto i rimedj della malattia principale, si passerà all'uso di quelli che sono qui proposti. Quanto all'*ottalmia* che sopravviene al *vajuolo*, vedi il Cap. XII di questo Vol.

Ciò che ora diceasi dell'*ottalmia* che dipende dalle scrofole, deeasi intendere di tutte le altre infiammazioni sintomatiche degli occhi.

uopo continuarlo lungo tempo, acciocchè produca un effetto durevole.

Etiopo minerale.
Cautele
con le quali deve essere amministrate, non meno che tutte le altre preparazioni mercuriali.

Il Dottor CHEYNE dice, che l'*etiopo minerale* rade volte manca di guarire le *infiammazioni degli occhi* le più contumaci, eziandio quelle che riconoscono per loro cagione le *scrofole*, qualora venga esibito in una dose e per un tratto di tempo convenevole. E' fuor di dubbio che questo *rimedio*, e le altre preparazioni del *mercurio*, possono essere d'una utilità singolare nelle *ostalmie* pertinaci; ma non devono giammai essere amministrate che con le più grandi cautele, e da Medici di professione.

§. III.

Mezzi per preservarsi dall' infiammazione degli occhi.

Fontanella.

LE persone soggette ai frequenti ricorsi di questo male, devono mantenersi perennemente una *fontanella* in una delle due braccia.

Salasso e purgazione, nella primavera e nell'autunno.

In oltre si faranno fare un *salasso*, e prenderanno un purgativo nella primavera e nell'autunno.

Regola austera di vitto.

Devono osservare il metodo il più esatto di vivere; evitare i *liquori spiritosi*, e tutto ciò che può riscaldare: devono più di tutto fuggire l'*aria notturna*, e gli studj protratti a lunga notte (a).

(a) Siccome è usanza tra il popolo di giammai curare questa, e le altre malattie degli *occhi*, senza adoperare i *collirj*, perciò abbiamo descritto nella Tavola que'tali tra questi rimedj che sono i più approvati. (Ved. nella Tavola la voce *collirio*.)

CAPITOLO DECIMONONO.

Della schinanzia infiammatoria, o sia infiammazione di gola; dell' angina maligna, o sia male di gola canceroso; dell' angina spuria, o sia male di gola semplice.

(SI dà il nome di *schinanzia* ad ogni malattia delle diverse parti della gola, che incomoda, o impedisce, o il respirare, o l'inghiottire, ovvero l'una e l'altra di queste funzioni ad un tempo; in maniera però che la sede del male sia fuori dello stomaco e dei polmoni, e al di sopra di questi visceri.

Cosa caratterizza una schinanzia.

Questa malattia viene descritta dagli Autori sotto un gran numero di nomi differenti; ma, dice il Sig. LIEUTAUD, cotesti nomi barbari sono piuttosto il linguaggio delle Scuole che quello dei Pratici. Basta sapere che il nome più familiare ai Medici è comunemente quello di *angina*.)

I Medici comunemente nominano questo male, angina.

§. I.

Della schinanzia infiammatoria, o sia dell' infiammazione di gola.

Q uesto male è comunissimo in Inghilterra, e spesso va congiunto a pericolo. È frequente nel verno e nella primavera; e le persone cui riesce più funesto, sono i giovani di *sanguigno temperamento*.

In qual Ragione ella è frequente, e chi sono coloro che ci vanno soggetti. Sede della schinanzia infiammatoria.

(La sede della *schinanzia* può essere ciascuna delle parti, che concorrono a formare ciò che si chiama il gorgozzule o le fauci; tali sono il *velo del palato*, l'*ugola*, le *tonsilli*, la *glottide*, l'*epiglottide*, la *laringe*, la *trachea*, la base della lingua, la *faringe*, ec. Talvolta essa non attacca che una sola parte; ma più spesso ne sorprende parecchie ad un tratto: di là le differenti spezie di *schinanzia infiamma-*

toria, tanto moltiplicate dagli Autori, e che non sono altro che varietà dello stesso male, sempre pericoloso e soventemente mortale; ma che lo è più o meno, relativamente al sito e al numero delle parti che sono attaccate.

Maniera con cui bisogna condursi per iscoprire la sede di questo male. Sovente l'ispezione non presenta niente alla vista.

La sede di questo male non sempre si discopre, facendo soltanto aprire la bocca al malato. Fa di mestieri portare la vista più lontano; bisogna abbassare la base della lingua mediante il manico d'un cucchiaino, e al lume d'una candeluzza guardare ed esaminare più a fondo che sia possibile. Sovente ancora cotesta ispezione fatta con la maggiore solerzia, non presenta punto alla vista; il che ha dato luogo alla grande divisione della *schinanzia*, in quella nella quale l'*enfiatura* è visibile, e in quella dove non lo è; e questa ultima, dopo *IPPOCRATE*, fu riputata mortale da tutti i Pratici.)

ARTICOLO PRIMO.

Divisione della schinanzia infiammatoria.

CRediamo dunque di poter ridurre tutte queste divisioni alle spezie che seguono, caratterizzate ciascuna dai *sintomi* che ne sono particolari.

Caratteri della prima spezie, che occupa la trachea.

1. Allorchè l'*infiammazione* attacca la membrana muscolosa dell'*aspera arteria*, il calore, il dolore, e la febbre sono notabilissimi; e se l'*infiammazione* non sormonta alle parti vicine, per qualunque modo che alcuno si adoperi, è impossibile lo scoprire la *tumefazione*. Devesi però sospettarla dalla violenza dei *sintomi* che abbiamo poc'anzi specificato: di più la voce è acuta, e sentesi una spezie di sibilo quando il malato vuol parlare: l'*inspirazione* è dolorosa, frequente e difficile; il *pulso* è minuto e tremulo, ec. finalmente la morte è più o meno pronta, secondo che l'*infiammazione* assale più da vicino la *glottide* o l'*epiglottide*.

Caratteri della seconda spezie, la di cui sede è la laringe.

2. Quando l'*infiammazione* è nella *laringe* e nei muscoli della *glottide*, il malato corre sommo pericolo di restar soffocato. I *sintomi* sono presso poco i medesimi che quelli del num. 1. Ciò che per altra
la

la caratterizza, si è un dolore violento, quando l'ammalato vuole parlare o inghiottire. La voce è acutissima e tremola, ec. Anche qui è ugualmente impossibile di scoprire la *tumefazione*. Per la qual cosa un tal caso è il più periglioso di tutti.

3. Allorchè l'*infiammazione* attacca i muscoli dell'*osso joido*, e quelli che servono ad elevare la *laringe*, la *respirazione* è assai libera; ma l'*inghiottire* riesce doloroso, sopra tutto nell'atto dell'ingozzare la prima boccata, o del tracannare il primo sorso di liquido. Questo caso è assai più frequente che i due precedenti. Se l'*infiammazione* non investe che le parti or ora annunziate, non si può assolutamente scoprire la *tumefazione*: laonde ella diviene perigliosa, e per la difficoltà dell'inghiottire, e perchè di sovente è seguita dal trasporto dell'umore dentro ai polmoni.

La terza specie occupa i muscoli dell'osso joido e della laringe. Suoi caratteri.

4. Se la *faringe* sola è infiammata, avvedesi della *tumefazione* per via de' mezzi che abbiamo poc'anzi indicato. La *respirazione* è bastantemente agevole, l'*inghiottire* difficile, e ben presto impossibile. Gli *alimenti* tornano indietro per la via del naso, cadono talvolta nella *trachea*, e risvegliano una *tosse* violenta. Il malato non può nè bere, nè mangiare: quindi la depravazione di tutti gli umori. Tutta volta questo caso è meno periglioso dei precedenti, quando il malato riceve un tempestivo soccorso.

Caratteri della schinanzia della faringe, ch'è la quarta specie.

5. Finalmente allorchè l'*infiammazione* attacca l'*ugola*, le *tonsilli*, il *velo del palato*, o i suoi *muscoli*, la *tumefazione* può ravvisarsi. La *respirazione* è difficile: l'ammalato non può respirare per le narici: non può inghiottire senza de' vivi dolori: sputacchia perpetuamente: sente un dolore acuto nell'interior dell'orecchio, e divien sordo talvolta. Qualora non v'abbia punto di *febbre*, o che ve n'abbia pochissima, un tal caso non è periglioso; ma è da temersi assai quando questo sia un sintomo di *mal venereo*.

Schinanzia dell'ugola, delle tonsilli, del velo del palato, ec. ch'è la quinta specie. Suoi caratteri.

Si conoscono due altre specie di *schinanzia*. Si chiama la prima *convulsiva-paralitica*, perchè dipende dalla *paralisi* degli organi che servono all'*inghiottire* e al *respirare*; ma ella può altresì essere generata dallo *slogamento* d'una o più *vertebre* del collo.

Caratteri
della schi-
nanzia con-
vulsiva: se-
sta specie.

6. Allorchè ella deriva dalla prima cagione, il *respiro* resta libero, perchè un gran numero de' *muscoli* inservienti a questa operazione della Natura, sono situati più in giù della sede del male; ma l'*inghiottire* è difficilissimo, quando pure non sia impossibile. Gli *emiplegici* ci vanno soggetti. Si sono veduti degli ammalati a perire per l'impossibilità d'inghiottire stilla di *checcheffia*. (Ved. TULPIO *Observ. Med.* Lib. I, Cap. XIII, pag. 79.) VAN-SWIETEN riferisce il caso d'una femmina di 45 anni, che godendo il più bel fior di salute, un giorno mentre era a tavola, cadde repentinamente in una improvvisa impossibilità d'inghiottire: ella non provava dolore alcuno, e non avvedevasi di enfiagione alcuna. Se le diedero molti *rimedj*, che non la poterono risanare interamente. A capo di nove mesi vi rimaneva ancora una difficoltà d'inghiottire massimamente i liquidi, qualora non ne tracannasse cinque o sei oncie almeno in una volta, e con avidità. Se ne prendeva meno, e che avesse a suo bel agio bevuto, ella non poteva assolutamente inghiottire.

L'*angina convulsiva*, ch'è prodotta dalla *paralisi* degli organi del *respirare* e dell'*inghiottire*, richiede i *rimedj* della *paralisi*, che noi esporremo Tom. III, Cap. XLV, §. III, Art. II.

L'altra, ch'è l'effetto dello *slogamento* d'una o più *vertebre* del *collo*, è venturosamente assai rara, giacchè ella è quasi sempre mortale. Le *convulsioni* possono cagionarla ai fanciulli, e gli *accessi* violenti di *epilessia* agli adulti. Tutto che la difficoltà di *respirare* e d'*inghiottire* dà indizio di questa malattia, è necessario il ricorrere ai Professori i più sperimentati.

Caratteri
della schi-
nanzia
convulsiva
soffocati-
va; setti-
ma ed ul-
tima spe-
cie.

7. La seconda specie di *schinanzia*, di cui qui si favella, chiamasi *convulsiva soffocativa*; ella non è però di per se stessa mortale. Essa è un *sintomo* frequentissimo dell'*affezione isterica* e *ipocondrica*, e i *rimedj* sono quelli che convengono in questi morbi. (Ved. Tom. III, Cap. XLV, §. XII e XIII. Noi ne tratteremo Tom. IV, Cap. LI, §. X, il quale tratta della malattia de' fanciulli chiamata *croup*, (secondo il BROOKS) o sia *soffocazione stridula*: ivi si

Cagioni della schinanzia infiammatoria. 259
troverà una osservazione interessante sopra questa malattia della gola particolare ai fanciulli.)

ARTICOLO SECONDO.

Cagioni della schinanzia infiammatoria.

LA *schinanzia infiammatoria* d'ordinario procede dalle stesse cagioni dell'altre malattie *infiammatorie*. Per ciò ella è l'effetto della soppressione della *traspirazione*, e di tutto ciò ch'è valevole a riscaldare ed infiammare il sangue.

L'*infiammazione* di *gola* proviene spesso volte dall'aver mancato di coprirsi il collo, quando abbiassi sì fatta consuetudine; dall'aver bevuto de' liquori freddi nel mentre sentivasi caldo; dall'aver corso a cavallo, o a piedi, contro il soffio d'un vento freddo settentrionale: in fine da tutto ciò che può raffreddare troppo fortemente la gola e le parti vicine.

Essa può ancora derivare dalla trascuranza d'un *salasso*, d'una *purgazione*, o di qualsivoglia altra *evacuazione* consueta.

Il cantare o il parlare ad alta voce per lungo tempo, e tutto ciò che può violentare i *muscoli* della fauci, possono egualmente cagionare una *schinanzia*. Ho spesso veduto questa malattia divenire funesta ad alcune persone del *bel tempo*, ch'essendo restate lungamente racchiuse in una stanza calda, occupate a tracannare de' liquori riscaldanti, e a cantare di tutta lor forza, in seguito si esposero con imprudenza all'aria notturna.

Restare coi piedi bagnati, portare degli abiti umidi; intertenersi lungamente in un luogo umido, o presso una finestra aperta; coricarsi in letti umidi; abitare degli appartamenti fabbricati di fresco, sono pure altrettante cagioni che possono dar luogo a questo male. Conosco alcune persone che non mancano mai di contrarre il male di gola, per poco che si trattengano in un appartamento il quale si fa poco anzi lavato. (Ved. Vol. I, Cap. XII, §. III, e gli Articoli annessi.)

Gli alimenti *acri ed irritanti*, possono parimenti in-

fiammare la gola, e produrre una *schinanzia*. Questa malattia può egualmente essere cagionata da qualche scheggia d'osso, da qualche spina di pesce, o da altri corpi appuntati rimasti nella gola; dai vapori caustici de' *metalli*, o di altri *minerali* che si respirano, come quelli dell'*arsenico*, dell'*antimonio*, ec. Da ultimo cotesta malattia è soventemente *epidemica* e *contagiosa*.

La contagione.

ARTICOLO TERZO.

Sintomi della schinanzia infiammatoria.

Sintomi precursori.

SI riconosce l'*infiammazione* di gola dall'*ispezione*. Le parti sono rosse e gonfie. Di più il malato si querela di sentir del dolore nell'inghiottire. Il suo *polso* è *veloce* e *duro*, vi si aggiunge il corredo di tutti gli altri *sintomi* della *febbre*. (Ved. pag. 54 di questo Vol.)

Caratteri del sangue e degli sputi.

Il *sangue* tratto dalla vena è d'ordinario coperto da una *cotenna* bianchiccia; e gli sputi del malato sono *tenaci* e *viscosi*.

Sintomi della schinanzia confermata.

A misura che l'*infiammazione* e la gonfiezza fanno de' progressi, la difficoltà di *respirare* e d'inghiottire si aumenta. Il dolore sormonta all'orecchio, gli occhi appaiono rubicondi, e gonfia la faccia. L'infermo è di sovente sforzato a mettersi sedente, sendo in pericolo di soffocarsi. Soffre delle *nausee* continue, o delle voglie di vomitare; e quando bee, il liquore in vece di passare allo stomaco, fa spesso ritorno per la via delle narici. Finalmente il malato muore talvolta di fame, per la sola impossibilità d'inghiottire alcuna specie di *alimento*. (Ved. di sopra pag. 256 e seg. di questo Vol. le diverse specie di *schinanzia*.)

Sintomi favorevoli.

Ancorchè il dolore dell'inghiottire sia molto acuto, se la *respirazione* dura tuttavia libera, non v'è poi tanto da temersi. *Sintomo favorevole* si è quando il gonfiamento apparisce all'esterno.

Sintomi pericolosi.

La *respirazione* laboriosa, accompagnata da dolori nel petto, annunzia un grande pericolo.

(Niente di periglioso al pari dell'*angina*, dice

IPPOCRATE, nella quale non comparisce al di fuori alcun prodotto d'un effetto salutare. *Coac.* n. 372. Allorchè dunque si manifesta una *risipola*, o una *tumefazione* nell'alto del collo e del petto, sì fatti sintomi additano che la malattia passa dall'interno all'esterno.)

Ma se cotesta *tumefazione*, cotesta *risipola* improvvisamente spariscano, e che il male si porti al petto, deesi in allora tutto temere per il malato. (Sopra tutto se non abbia fatto alcun sputo.) *Coac.* n. 363.

Quando la *schinanzia* è la conseguenza d'un'altra malattia che abbia omai indebolito l'infermo, il suo stato è molto dubbioso.

I malati compresi d'*angina*, e che anno le fauci lisce ed asciutte, con degli sputi poco maturi, sono in pericolo. V'è molto da temere per que' malati, eh'essendo afflitti di *angina*, non isputano prontamente delle materie concotte. *Coac.* n. 369 e 371.

La schiuma alla bocca, la lingua ingrossata, il sembiante pallido e svisato, sono *sintomi mortali*.

ARTICOLO QUARTO.

Visto che bisogna prescrivere a coloro che sono attaccati da schinanzia infiammatoria.

LA regola di visto in questa malattia, è per tutti i conti la stessa che nella *pleuritide* e nella *pneumonia*. (Ved. Cap. V, §. I, Art. III di questo Vol.)

Gli *alimenti* devono essere leggieri, e dati in piccola quantità. La bevanda deve essere abbondante, leggiera, *diluyente*, acconcia cogli *acidi*.

Importa moltissimo di custodire il malato tranquillo e con tutto il suo comodo. Le gagliarde affezioni dell'animo, e i movimenti violenti del corpo di verrebbero pericolosi. Bisogna ch'ei non parli che a voce dimeffa, e giova tenerlo in un grado di calore capace di eccitare un moderato *sudore*.

Quando il malato si trova a letto, è bene che la sua testa stia sensibilmente più elevata del solito.

E' necessario principalmente che il collo si mantenga

Quali vogliano esfergli alimenti e la bevanda.

Il malato deve custodirsi tranquillo, e guardarsi dal non parlare che a voce dimeffa.

La sua testa dee stare elevata. Cosa convenga met-

tergiti d'
intorno al
collo per
generio cal-
do .

Mezzo
praticato
in ifcosia
a questo ef-
fetto .

ga caldo. Per la qual cosa se gli metterà d' intorno al collo un pezzo di *flanella* a più doppi . Questo solo ajuto , quando è stato prestato a tempo , ha spesse volte dissipato de' mali leggieri di gola . Non possiamo dispenfarcì di far parola d' un uso assai comune tra i contadini di questo Regno. Quando anno male di gola , si avvolgono il collo con una calzetta , e sì la conservano tutta la notte . Questo rimedio è salutare cotanto , che in parecchi contorni lo riguardano come un incantesimo , e perciò applicasi cotesta calzetta con delle ceremonie particolari .

Che che ne sia , bisogna accordare che sì fatta usanza è buona , e che non si dee giammai negligere . Allorchè s'è tenuto il collo avvolto in tal guisa per tutta la notte , preme di non lasciarlo allo scoperto durante il giorno , ma di ravvilupparlo con un moccichino , o con un pezzo di *flanella* , sino a tanto che l' *infiammazione* sia onninamente svanita .

Buoni ef-
fetti della
gelatina di
uva spina
nera , o in
sua man-
canza, della
gelatina d'
uva spina
rossa , o di
more .

La *gelatina di uva spina nera* è riguardata come un buon rimedio nei mali di gola , e merita in fatti cotesta riputazione . A far bene bisogna tenerne costantemente in bocca , e non inghiottirla che poco a poco . Si può ancora stemperarla nella bevanda del malato , o farla prendere in qualsivoglia altro modo . Qualora non si possa avere di sì fatta *gelatina* , si adopererà in sua vece la *gelatina di uva spina rossa* , o di more .

Vantaggi
che si ri-
traggono
dag garga-
rismi . Ma-
niera di a-
doperarli .

I *gargarismi* sono parimente vantaggiosissimi in questo male . Si preparano con un po' di *aceto* e di *mele* dentro l' acqua , ovvero aggiungendo ad un mezzo sestiero di *decozione pettorale* , due o tre cucchiaini di *mele* , ed altrettanto di *gelatina di uva spina nera* . Se ne usa per *gargarismo* tre o quattro volte per giorno .

Se l' infermo è tormentato da *flemme viscosse* , è bene di avvalorare questo *gargarismo* con un cucchiaino da caffè di *spirito di sale ammoniaco* .

Alcune volte si raccomandano in questi casi de' *gargarismi* fatti con una *decozione* di foglie o di scorze di rovo ; ma quando si possa ottenere alcuna delle *gelatine* summentovate , questi ultimi divengono inutili .

Rimedi contro la schinanzia infiammatoria. 263

Non v'è malattia, in cui i *bagni ai piedi* e alle *gambe* riescano d'un effetto più notabile che in questa. Per tanto non deesi giammai negligere di metterli in opra.

Eccellenti effetti d' i bagni ai piedi e alle gambe.

Se fin dai principj del male, si custodisca caldo l' infermo: se gli venga posto intorno al collo un pezzo di *flanella*: qualora si bagni i piedi e le gambe nell' acqua calda: se la *dieta* sia leggiera: se le bevande sieno *diluenti*, questo male farà di rado gran progressi, o diverrà poche volte pericoloso.

Mezzi d' impedire che quella malattia non divenga pericolosa.

Ma qualora si trascurino tutti questi presidj, i *sintomi* acquisteranno vigore, e converrà venire a de' rimedi più attivi. (1)

ARTICOLO QUINTO.

Rimedi da somministrarsi a coloro che sono colti da schinanzia infiammatoria.

L' *Infiammazione della gola* essendo una malattia *acutissima*, pericolosissima, e che talvolta uccide prestamente il malato, è necessario, tosto che se ne discoprono i *sintomi*, di cavar *sangue* dal braccio, o piuttosto dalle *vene jugulari*, e ripetere altrettante volte l' operazione, quante le circostanze lo richiederanno. (2)

Quando e dove abbia forniti l' assistito.

(1) Si offerverà che in questa malattia i soccorsi esterni sono di massima importanza: mentre l' *infiammazione*, per poco che sia notabile, riduce l' ammalato all' impossibilità d' inghiottire, o gle lo rende almeno difficilissimo. Non si trascurerà dunque nel primo principio veruno de' mezzi proposti dall' Autore: si metterà in opra la *flanella* e la *calzezza*, egualmente in uso tra il popolo de' nostri paesi, e di cui ne ho provato degli effetti eccellenti: si farà uso dei *gargarismi* e dei *bagni ai piedi*, che si praticeranno tre quattro volte per giorno durante una mezz' ora, tre quarti d' ora, un' ora eziandio. (Ved. Cap. IV, §. III, pag. 59 di questo Vol.)

Importanza dei rimedi esterni in questa malattia.

(2) Per quanto importante sia la *cacciata di sangue* in questo male, bisogna però guardarsi bene dal ripeterla inconsideratamente. AEZIO osserva espressamente, che ad ARCHIGENE non andavano a genio le *cacciate di sangue* sì pronte e sì co-

Riservazioni sulle copiose cacciate di sangue ed

Lattativi
blaudi.

Preme egualmente di lubrificare leggermente il ventre. A tal oggetto si esibirà al malato per bevanda sua ordinaria, o una decozione di fichi e di samarin-

i purgativi
gagliardi.

piose nell' *angina*, per tema che da questo modo di operare, la materia non venisse a cadere sui *pulmoni*. FERNELIO, e TRALLIANO prima di lui, aveva usato di cotesto metodo. „ Ella si adatta benissimo, dice il cel. DE BORDEU, all' aforismo d' IPPOCRATE, riguardante la discesa dell' *angina* ai *pulmoni*. (Ved. num. 3, pag. 157 di questo Vol.) Posso assicurare, soggiunge egli, di aver veduto la *cacciata di sangue* far sparire il *mal di gola*, e sopprimere gli sputi; ma i *pulmoni* in seguito ne restarono imbarazzati.

„ Lo stesso e anche peggio ne dico de' *purgativi violenti*: forse potrei eccezzuare l' *emetico*.

Idea che
deesi avere
della schi-
mazia.

„ In corto dire, l' *angina* la più eminentemente *infiammatoria* spesso non è che un moto violento della Natura, che fa sforzo per rinvenire nella gola una sortita che liberi dal nimico i *pulmoni* e le sue vicinanze. La burrasca più minacciosa riconduce talvolta una calma molto felice.

„ Questa *infiammazione* mantienlisi da un ingorgamento *mucoso, caravoso*, e, per così dire, *cellulare*. Il luogo di sì fatto ingorgamento può cadere in un languore mortale; a cagione dell' *evacuazioni* eccessive; l' ostinarsi, cimentando la sorte, a far svanire il *mal di gola* mediante i copiosi *salsi* ed i *purgativi* validissimi, egli è un urtare nello scoglio additato da IPPOCRATE, sulla discesa dell' *angina* nel *petto*; egli è perdere di vista gli aforismi sulla necessità degli sputi. (Ved. pag. 161 di questo Vol.) Totali errori non possono a meno di non accadere, qualora si caccia, e si caccia di bel nuovo sangue fino ad insievolire i *vasi*, e che si purga fuor d' ogni misura, senza sapere quando, nè come, nè perchè. (*Recherches sur le tissu muqueux*, pag. 147 e seg.)

L' emetico
dato a pro-
posito può
essere salu-
tare.

Abbiamo ora veduto che il Sig. DE BORDEU, condannando l' *evacuazioni* forti e ripetute, eccezzua l' *emetico*. Eccovi i fatti su quali si pianta. „ L' *emetico* dato a proposito vale a dire nei principj, dopo la prima *cacciata di sangue*, può togliere gli ostacoli al corso naturale della malattia, e favorire la maturazione. Questo è un fatto, di cui credo che tutti i Medici Francesi avranno delle prove da somministrare: ciascuno dee contentarsi di dire ciò ch' egli ha osservato.

„ Mi risovviene che al tempo di mia giovenezza il padre mio reed in parecchi incontri la calma, e procurò la salvezza in alcuni contadi e villaggi interi, dove de' *mal di gola epidemici* facevano le stragi le più crudeli. L' *emetico*

di, o delle piccole dosi di *rabarbaro* e di *nitro*, come lo abbiamo raccomandato nella *risipola*, pag. 236 di questo Vol. Si aumenteranno sì fatte dosi in proporzione dell'età dell'infermo, e si replicheranno fino a tanto che abbiano prodotto gli effetti desiderati.

Ho sovente veduto degli ottimi effetti dal *saltpetella*, o sia *crystallo minerale*, o dal *nitro purificato*, che il malato teneva in bocca, ed inghiottiva a misura che si scioglieva. Egli eccita l'evacuazione della *scialiva*, e con ciò fa le veci di *gargarismo*; mentre contribuisce nel tempo stesso a scemare la *febbre*, facilitando la *secrezione dell'orine*.

Buoni effetti del crystallo minerale; o del nitro purificato. Modo di servirsene.

E' bene ancora di stropicciare due o tre volte al giorno la gola del malato con un poco di *linimento volatile*.

Del linimento volatile.

„ *co* era uno de' suoi principali soccorsi. Questo *rimedio* mi
 „ sembra essere in sì fatto male, secondo il voto della Natura,
 „ più che la *emissione di sangue* e le *purgazioni*. Aprè
 „ le vie alla *piuista*, agli *spuri*, e alle *serofisè* che inonda
 „ no la bocca e la gola, allorchè il male giunge a termine
 „ venturoso.

„ Del 1744 e 1745, in Béarn, mia patria, vi furono molti
 „ mali di gola, di cui parecchi malati morirono, massime
 „ tra i fanciulli; ne preservai mercè dell'*emetico*, e talvolta
 „ di quelli che apparivano agli estremi. Del 1745 e 1746,
 „ si vide a Montpellier una *epidemia* di mali di gola, do-
 „ ve ho veduto dare arditamente l'*emetico* a' malati di ogni
 „ età e d'ogni sesso nell'*angine* le più *infiammatorie*. Le
 „ stesse osservazioni feci a Parigi nel 1747 e 1749, e segnatamente
 „ nel 1758, 1759 e 1761, dove ho espressamente notato
 „ un *male di gola* da prima leggiero, aumentarsi incessante-
 „ mente fino al quarto decimo giorno che condusse a morte
 „ l'infermo, dopo sette *emissioni di sangue*. Buon effetto
 „ dall'*emetico* in un Convento, dove fui chiamato con alcu-
 „ ni altri Medici, che consentirono ai *vomitivi*, cui il Me-
 „ dico ordinario non aveva badato, ec.

„ Se fosse finalmente permesso di non abbandonare (nei
 „ mali di gola, come in tante altre malattie) i tre quarti
 „ dell'affare alla Natura, mi sembra che vi sarebbero minori
 „ inconvenienti nell'insistere sui *vomitivi*, che sui *salassi* e i
 „ *purgativi*, principalmente sui *purgativi gagliardi*. „ (Loc.
 „ cit. pag. 149 e seg. Ved. altresì *Obs. sur les Malad. epid.*
 „ par. M. LEPICQ DE LA CLOTURE, an. 1770, p. 13 e seg.)

sile: il che non manca quasi mai di produrre un buon effetto (3).

Necessità
di ben co-
prire il
collo.

Si terrà nel tempo stesso ben coperto il collo con pannolino, o con *flanella*, per impedire che il freddo non penetri a traverso la *pelle*, che resta singolarmente ammorbidita mediante sì fatte applicazioni.

Rimedi
decentati,
ma che non

Ci sono molti altri *rimedj* esterni raccomandati contro questa malattia: tali sono i *nidi* di *rondinelle*;

Ricetta d'
una spezie
di balsamo
tranquillo
pubblicato
dal Sig.
Chomel.

(3) Ecco una spezie di *balsamo tranquillo*, che sul rapporto di parecchie persone, fa de' miracoli nella *schinanzia infiammatoria*. Siamo debitori della *ricetta* al Sig. CHOMEL, il quale nel suo *Trattato delle piante usuali*, così si esprime:

Questa spezie di *balsamo* m'è stata comunicato da un mio amico, come un secreto di famiglia. Ne ho veduto degli effetti sorprendenti nella *schinanzia*, e nei *mal*i di *gola*. Ecco la maniera di prepararlo.

Prendete foglie verdi di *josciamo*, } di ciascheduna una
cinoglossa, } libbra.
nicoziana, }

Fate bollire in tre pinte di *vino* fino a tanto che non restino più di due, o all' incirca: feltrate e spremete con forza; aggiungete a questo *suco* altrettanto *olio* buono di *uliva*: fate bollire il tutto ad un lento fuoco, finchè si riduca alla metà; abbiate cura che l'*olio* non si abbruci, e non annerisca; versate poscia bel bello questo *balsamo* in un catino. Si ratchierà quanto si potrà di ciò che resta al fondo del padellino, e si mescolerà col *balsamo* del catino. Si lascerà freddare: si verserà questo *balsamo* adagio a chiaro dentro alcune bottiglie.

Maniera
di adope-
rarlo.

Se ne ungono con una piuma fina la *glandula* della *gola*, dopo una o due *emissioni* di *sangue*, se sieno necessarie. Questa *unzione* replicata di due in due ore accelera la *suppurazione*, che non avviene sovente che nel nono giorno, e guarisce in tre giorni un male de' più perigliosi.

Non si getta via la *feccia* che resta, dopo che s'è ridotto, come s'è detto di sopra, il *balsamo* a chiarezza: se ne fa un *empiaastro* con parti eguali di *cera gialla*, che si fa fondere al fuoco, e che si mescola esattamente con questa *feccia*. Questo *empiaastro* è molto *risolutivo*.

Ma l'*olio* o *balsamo*, di cui si è dato ora la *ricetta*, non è solamente *risolutivo* e sommaramente *anodino*, egli è altresì *vulnerario*, e utilissimo nelle *piaghe* e nelle *ulcere*: ne ho parimenti veduto de' buoni effetti nei *reumatismi* e nelle *doglie di sciatica*.

i cataplasmi fatti con la sostanza fungosa che cresce alle radici della * *canna volgare* (*roseau*), e che si chiama *orecchio di Giuda*. Ma siccome questi non meritano per verun conto la preferenza sopra i cataplasmi ordinarij di mollica di pane e di latte, noi non ne diremo di più.

meritano alcuna preferenza sopra i cataplasmi di mollica di pane e di latte.

V'è chi raccomanda la gomma di guajaco come uno specifico in questo male. Se ne prepara un elisir nella maniera seguente.

Gomma guaiaco in elisir. Maniera di ammorzarlo.

Prendete della gomma di guajaco in polvere, mezza dramma.

Mescolate con del rob di sambuco, o della gelatina di uva spina, in quantità sufficiente per inviluppare questa polvere.

Si porge questa dose in una volta, e si ripete secondo le occasioni. (Il Dott. HOME.)

Nelle gravissime infiammazioni di gola si ritrarranno de' grandi vanraggi da un vescicatorio applicato alla nuca, o dietro l'orecchie: e quando il male sarà ancora più violento, sarà bene che il vescicatorio sia grande quanto basta per coprire tutto il di dietro del collo, dall'una fino all'altra orecchia.

Nell'augere di considerazione, se si fa di mestieri applicare un vescicatorio alla nuca.

Dopo che si avrà levato il vescicatorio, sarà d'uopo di mantenerne lo spurgo, mediante l'applicazione d'un unguento stimolativo, indicato di sopra Cap. XVIII, nota 2 di questo Vol. fino a tanto che l'infiammazione sia onninamente svanita: avvegnachè se si lasciasse asciugare la piaga, il malato correrebbe pericolo d'una ricaduta.

Quanto tempo bisogna mantenere la spurgo della piaga.

Allorchè la schinanzia è stata governata come lo abbiamo in adesso consigliato, raro è che l'infiammazione si riduca a suppurazione. Questa però accade talvolta, malgrado tutto ciò che si mette in opra per impedirla.

Per la qual cosa, quando l'infiammazione e l'enfiagione persistono, in guisa che appaja evidentemente che ne susseguirà la suppurazione, bisogna affrettarsi ad agevolarla, introducendo in gola, mediante un imbuto, il vapore dell'acqua calda; applicando

Cosa bisogna fare allorchè l'infiammazione passa a suppurazione.

(* Qui ci è errore: dovrebbe dire *sureau*; *sambuco*.)

268 *Parte Seconda, Cap. XIX. §. II. Art. V.*
esternamente de' *cataplasmi molliuivi*, e ordinando al
malato di tenere costantemente in bocca un *fico secco*
cotto nel latte.

(Ci sono alcuni che si lagnano, che il *fico* reca
bruciore e aumenta loro i dolori. Questi useranno
in sua vece del *latte*, o dell'acqua calda, o una
mescolanza calda di *latte* e d'acqua, che terranno in
bocca più lungamente che sia possibile. Alle volte
il malato non può aprire la bocca; forza è in
allora d'iniettargli sì fatti liquori per la via delle
narici.)

Come ab-
bisogni nu-
trire il ma-
lato allor-
chè la tu-
mefazione
è tanto
considera-
bile, che
impedisce
affatto l'
inghiottir-
e.

Avviene talvolta che l'apertura dell'*apostema* sia
preceduta da una tumefazione tanto grande, che
chiude il passaggio, a segno che l'infermo non può
assolutamente niente affatto inghiottire. Il solo rifu-
gio è quello di fargli de' *clisteri nutritivi*, composti di
brodo, o di *cremore* di *avena* e di *latte*, ec. Si sono
veduti alcuni malati nutrirsi in tal foggia pel corso
di parecchie giornate, sino a che in fine l'*ascesso*
scoppia; ed essi ricuperarono in seguito la loro sa-
lute (4).

Cosa con-
viene fare
allorchè la
tumesenza
impedisce
l'inghiottir-
e il respira-
re.

Non solamente questa *tumesenza* interiore può
impedire l'inghiottire, ma il *respiro* eziandio; in tal
caso niente può salvare il malato fuori che l'apertu-
ra della *trachea*, o sia del condotto per dove l'aria
passa ai *polmoni*. E siccome questa operazione, chia-
mata *broncosomia*, è spesso volte riuscita bene, così
non v'è persona che in circostanze cotanto disperate
debba esitare un solo istante a valersene. Ma non
essendovi che il Cerusico che possa eseguirla, è inu-
tile di qui farne la descrizione.

Quando è
come biso-
gna aprire
il tumore.

(4) Allorchè il *tumore* impedisce solamente d'inghiottire,
bisogna assicurarsi del luogo ch'egli occupa. Sovente egli è po-
co considerabile, ancorchè sembri molto incomodare l'infer-
mo. Cercando col dito si ritrova facilmente; e quando sia ma-
turo, la menoma pressione lo apre. Se non cede alla pressio-
ne leggera del dito, un Chirurgo intelligente lo forerà con una
lancetta, attaccata ad un piccolo bastoncello, e ravvolta d'
un pannolino fino in tutta la di lei estensione, eccettuata la
punta.

§. II.

*Dell' angina maligna, o sia de' mali di gola
cancerofosi e con ulcere.*

Questa specie di *angina* è poco conosciuta nel Nord della Gran-Bretagna, sebbene ella abbia fatto alcuni anni addietro delle grandi stragi nelle provincie Meridionali di questo Regno. I fanciulli ci vanno più soggetti degli adulti; le femmine più che gli uomini; e le persone delicate, più di quelle che sono forti e robuste. Si fa particolarmente vedere nell'autunno, o dopo le stagioni umide e caldissime.

*Persones
che ci van-
no sogget-
te, e sta-
gioni nel-
le quali el-
la si offer-
va più fre-
quente.*

ARTICOLO PRIMO.

*Cagioni dell' angina maligna, o dei mali di gola
cancerofosi e con ulcere.*

Cotesto male è evidentemente *contagioso*, e si prende ordinariamente per comunicazione. Una sola persona lo ha sovente comunicato a tutta una famiglia, anzi a de' villaggi interi. Convien dunque guardarsi bene dal restare vicino ad una persona compresa di questo male; poichè per sì fatta imprudenza si rischierebbe non solo la propria vita, ma quella ancora de' suoi amici e de' suoi conoscenti.

*La contage-
zione.*

Tutto ciò che può cagionare le *febbri putride e maligne*, vale ugualmente a produrre i *mali di gola cancerofosi*, come l'*aria malsana*, le *vetrovaglie guaste*, la *immondezza*, ec. (Ved. Cap. IX, §. I di questo Vol.)

*Tutte le
cagioni
delle feb-
bri mali-
gne.*

ARTICOLO SECONDO.

*Sintomi dell' angina maligna, o sia de' mali di gola
cangrenosi e con ulcere.*

Sintomi
precursori.

Questa malattia comincia da alcune alternative di freddo e di caldo. Il *pulso* è *frequente*, ma *concentrato* e *ineguale*, e d'ordinario rimane lo stesso per tutto il corso del male.

Sintomi
ordinari ai
fanciulli.

L'infermo si lagna assai di debolezza e di *oppressione di petto*. E' abbattuto, e vicino a cadere in languore, quando si mette a federe. Soffre delle *nausee*, accompagnate sovente da *vomito*, o da *diarrea*; ma questi due *sintomi* sono più proprj ai fanciulli. Gli occhi sono rossi ed umidi come nella *rosolia*; il volto è tumido.

L'*urina* è da prima pallida e *cruda*; ma prende poi un colore più gialliccio, a misura che il male avanza. La lingua è bianca, e in generale umida; *sintomo* che distingue questa malattia da quella ch'è puramente *infiammatoria*.

Sintomi
dell' inter-
no della
gola.

Se si mira dentro in gola, essa si vede tumida e d'un rosso vivace. Si scoprono però alcune macchie pallide, livide, di color cinericcio sparse qua e là per le fauci; alle volte non se ne vede che una sola larga quanto un neo, di figura irregolare, d'un bianco pallido, circondata da un rosso infocato. Queste macchie albiggine, livide, coprono altrettante *ulcere*.

Sintomi
particolari
a questa
malattia.

Un *sintomo* particolare a questa malattia è una *efflorescenza*, o una *specie di eruzione*, che si manifesta verso il secondo o terzo giorno, sopra il collo, le braccia, le dita, il *petto*, ecc. ma allora l'*evacuazione* per di sopra e per di sotto cessa per l'ordinario.

Il malato ha di sovente un po' di *delirio*. Il viso spessissimo cangia di colore, e l'interno delle narici è rosso ed infiammato. Egli si lamenta di avere in bocca un ingrato puzzo di fradiciume, e il suo fiato n'è infetto.

Sintomi ca-
ratteristici.

(La voce è rauca ed oscura, non come nelle in-

freddature, ma come presso le persone tocche di *ulcere veneree* nella gola; di modo che a questa sola alterazione di voce, alcuni Medici anno riconosciuta questa malattia. (Ved. *An account of the sore throat attended with ulcers*. By IONH FOTHERGILL M. D. ediz. quarta, p. 14.)

I mali di gola *cancerofosi* si distinguono dalla *scbi-* Sintomi
che distin-
guono que-
sta angina
dalla in-
fiammato-
ria.
nanzia infiammatoria, mediante il vomito e la *scorren-*
za di ventre, che li accompagnano talvolta nei loro
principj; mediante la natura dell' *ulcere* coperte di
crosta biancastra, o livida; per via dell' *eccessiva de-*
bolezza del malato; e di tutti gli altri *sintomi* della
febbre maligna. (Ved. Cap. IX, §. II, pag. 137
di questo Vol.)

I *sintomi* fastidiosi sono una *smossa* di corpo ostina- Sintomi
fastidiosi;
ta; una debolezza estrema; la vista offuscata; il co-
lore livido o nero delle macchie; de' frequenti ri-
brezzi o tremori, con un polso *piccolo e tremolante*.

Allorchè l' *eruzione della pelle* improvvisamente spa- Pericolosi;
risce, o diviene d' un color livido, e ch' ella è ac-
compagnata da una *emorragia* dal naso e dalla bocca,
il pericolo diviene grandissimo.

Ma se verso il terzo o il quarto giorno, un *sudo-* Favore-
vole.
re moderato si manifesta sotto il collo, e vi conti-
nua, con un *polso eguale, fermo*, benchè piccolo; se
le croste delle ulcere si staccano in un modo favo-
revole; se le macchie al di sotto appajono belle, e
d' un rosso vivace; se la *respirazione* diviene facile;
se gli occhi si rattivano, v' è ogni motivo di spe-
rare una *crisi* favorevole.

(Spesse volte i malati risentono le conseguenze Sintomi
che persi-
stono se-
venze dopo
la guarig-
ione.
di questa malattia lungo tempo dopo ch' ella s' è di-
leguata; rimangono deboli, languidi per il corso di
parecchi mesi, e conservano una mutazione di voce,
o una difficoltà d' inghiottire, talvolta parecchi anni
appresso.)

ARTICOLO TERZO.

Vitto da prescriversi a coloro che sono attaccati da schinanzia maligna, ec.

Bisogna tenere il malato in quiete, e coricato per la maggior parte del tempo, perchè restando su piedi, egli è soggetto a de' frequenti languori. Gli alimenti saranno ristorativi e nutrienti. Se gli darà del cremore di *sagou* con del vino rosso, delle *gelatine animali*, de' brodi sostanziosi, ec. La bevanda sarà della stessa natura e di qualità *antisettica*; come del *negus* col vino rosso, del siero di latte preparato col vino bianco ec. (Ved. Cap. IX, §. III di questo Vol.)

ARTICOLO QUARTO.

Rimedi che si devono somministrare a coloro che sono travagliati da male di gola cancerosa, ec.

IL governo in questa specie di *angina* è totalmente differente da quello che conviene all'*infiammazione di gola*. Ogni *evacuazione*, come il *salasso*, le *purgazioni*, che non tenderebbero che ad indebolire il malato, devono proibirsi. I rimedi *rinfriscanti*, come il *nitro*, il *fior di tartaro*, sono parimenti nocivi.

Non v'ha che i *cordiali corroboranti*, de' quali si possa far uso con sicurezza, e che non si debba giammai trascurare di adoperarli. Se il malato nel principio patisce delle forti inclinazioni al vomito, se gli darà per ripulirgli lo stomaco una *infusione di tè verde*, di *fiori di camomilla*, o di *cardo santo*. Se si fatte *infusioni* prese in copia non isgombrano lo stomaco, se gli daranno quindici in dieciotto grani d'*ipecacuana* in polvere, o qualsivoglia altro *vomitatorio* blando.

Allorchè la malattia non è perigliosa, si fa gargarizzare il malato con una *infusione* di foglie di *salvia* e di *rose*, in cadaun mezzo settiere della quale

Il malato deve essere tenuto in letto. Quali debbano essere gli alimenti e la bevanda.

Qualità che devono avere i rimedi. Cosa bisogna prescrivere nel principio, se vi sieno delle forti inclinazioni al vomito.

Gargarismo, allorchè la malattia non è perigliosa;

le si aggiunge uno o due cucchiaj di mele e di aceto, quanto è necessario a fargli prendere un'acidità gradevole.

Ma quando i *sinтоми* sono violenti, che le croste sono ampie e spesse, e che il fiato ha un odore ingratiſſimo, forza è di preſcrivere il *gargarismo* ſe-
Allorchè i ſintomi ſono violenti.

Prendete radice di *conyaxerva*, mezz'oncia; fate bollire per qualche tempo in ſei oncie di *decozione pettorale*; ſeltrate.

Aggiungete aceto di vino bianco, due oncie; mele di Spagna,) di cadauno un'oncia, tintura di mirra,)

Non ſolamente ſe ne porge al malato per gargarizzarſi, ma ſe ne dee ancora iniettare frequentemente delle piccole quantità dentro in bocca, ad oggetto di ben nettarla, anzi ch'ei prenda alcuna coſa, sì da bere, come da mangiare. Queſto ajuto deveſi principalmente impiegare pei fanciulli, che non fanno da ſe ſoli gargarizzarſi. Maniera di uſarlo.

Un rimedio ſaluberrimo in queſto caſo è il far ricevere affai di ſpeſſo dentro in bocca del malato, mediante un tubo ricurvo, i vapori caldi di una miſtura compoſta di aceto, di mirra, e di mele. Vapori che devonſi far ricevere dentro in bocca.

Ma quando i *ſintomi* di malignità ſono in grado altiſſimo, e che la malattia addita pericolo, il ſolo rimedio, da cui ſi debba in allora ſperare qualche vantaggio, è la *chinachina*. Coſa biſogna preſcrivere allorchè la malignità è a grado altiſſimo: la china-china.

Si può darla in ſoſtanza, vale a dire, in polvere, ſe lo ſtomaco del malato può tollerarla; ſe ciò non è poſſibile, ſi darà nella maniera ſe-
Maniera di amminiſtrarlo.

Prendete *chinachina* della migliore, un'oncia; *ſerpentaria virginiana*, due dramme.

Acciaccate il tutto; fate bollire in tre ſestieri d'acqua, ſino a che reſtino una ſola foglietta.

Aggiungete un cucchiaino da caffè di *eliſſire* di vitriolo,

Se ne porgerà al malato la quantità d'una piccola chicchera da caffè ogni tre o quattr'ore.

I *veſcicatorj* ſono utiliſſimi in queſto morbo, ſe-
Veſcicatorj: dove biſogna applicarli.
gnatamente quando il poſſo e le forze dell'ammalato ſono depreſſe. Si applicano ſulla gola, dietro l'orecchie, o alla nuca.

Cosa biso-
gna fare al-
lorchè il
malato è
stanco dal
vomitare .

Allorchè l'infermo è infiacchito da un vomito pertinace, bisogna dargli ad ogni ora due cucchiariate di *giulebbe salino*. L'*infusione di menta*, e d'una piccola quantità di *cannella*, sono molto convenevoli in questo caso, come bevanda ordinaria, massimamente se vi si aggiunga egual porzione di *vino rosso*.

Per il sfu-
so di ven-
tre .

Allorchè il *sfusso di ventre* è notevole (5), si fa prendere al malato due o tre volte al giorno, o più spesso, se sia necessario, un boccone della grossezza d'una noce moscata di *diascordio*, o di *confezione del Giappone*.

Allorchè
sopravvie-
ne un'e-
morrhagia
di sangue
dal naso .

Se sopravviene un' *emorrhagia di sangue dal naso*, si esporrà con frequenza questa parte al *vapore dell'aceto caldo*, e si acconcerà la bevanda dell'infermo con lo *spirito di vitriolo*, o la *tintura di rose*.

Una stran-
guria .

Nel caso che sopravvenga una *stranguria*, vale a dire, una *difficoltà d'orinare*, sarà bisogno di *fomentare* il ventre con l'acqua calda, e fare tre o quattro volte al giorno alcuni *clisteri mollitivi*.

Tempi di
purgare .

Allorchè il male avrà scemato di sua violenza, si lubricherà il ventre con de' blandi *purganti*, come la *manna*, la *sena*, il *rabarbaro*, ec.

Cosa abbi-
fogna fare,
allorchè il
male effea-
do guarito,
vi ri-
mane del-
la debo-
lezza, dell'
abbatti-
mento, ec.

Se dopo la malattia vi rimanga una gran debolezza, un *abbattimento* sommo, delle *febbri* notturne, e tutti gli altri *sintomi di tifezza*, sarà d'uopo che il malato continui l'uso della *chinachina*, a cui si aggiungerà l'*elissire di vitriolo*, come s'è poco fa prescrito, e che prenda di sovente un bicchierino di ottimo *vino*. Questi *rimedj*, il *latte* per totale nutrizione, e il *moto a cavallo*, sono i mezzi i più convenevoli a far ricuperare le forze.

(5) Bisogna, dice il Dott. FOTHERGILL, (loc. cit. p. 256.) stare attentissimi alla *scorrenza di ventre*. Per l'ordinario ella cessa dentro le due prime ore dell'attacco col vomito. Ma se continua più lungamente, massime negli adulti, bisogna studiarla di arrestarla: altrimenti ella ha le conseguenze le più pericolose.

In tal caso, ciascheduna volta che l'infermo scarica il ventre, si darà l'uno o l'altro dei *rimedj* che il Sig. BUCHAN di presente prescrive.

§. III.

Dell' angina spuria, o sia de' mali di gola semplici.

(S^o tratta in adesso dello stagnamento d'umori nelle differenti parti che giacciono d'intorno alla gola, tali sono l'*ugola*, le *tonsilli*, le *parotidi*, le *glandule mascellari*, finalmente tutte quelle che somministrano la *scialiva*: stagnamento, che si appella *angina spuria*, perchè non è accompagnato da *sintomi d'infiammazione*, descritti nell' Art. II, del §. I di questo Capitolo. Le *cagioni* di questa spezie di *schinnanza* sono le stesse che l'espone nell' Art. I del medesimo §. I.

Caratteri
e sede de'
mali sem-
plici di go-
la.

ARTICOLO PRIMO.

Sintomi de' mali di gola semplici.

Questa malattia, la più frequente di tutte quelle che invadono la gola, comincia ordinariamente da una delle *tonsilli*, la quale diviene grossa, rossa, dolente, e non permette d'inghiottire, se non con gran stento. Alle volte il male si restringe ad un solo lato; ma più comunemente passa all'*ugola*, e di là all'altra *tonsilla*. Se il male non è grave, la prima è d'ordinario in miglior stato, quando la seconda viene investita.

Sintomi
precursori.

Allorchè tutte e due queste *glandule* sono nel tempo istesso attaccate, il dolore e il disagio divengono notabilissimi: il malato non può inghiottire che con grandissimo stento, e la sensibilità è sì molesta, che sovente le persone irritabili soffrono delle *convulsioni*, ogni volta che fanno degli sforzi per inghiottire la loro *scialiva*, o qualunque altro liquore. Si resta talvolta eziandio parecchie ore di seguito senza poter prendere cosa veruna. La volta del palato e la base della lingua sono leggermente rosse.

Sintomi
del mali di
gola sem-
plici com-
fermati.

Parecchi ammalati inghiottono i liquidi più diffi-

Sintomi
caratteri-
fici -

cilmente che i solidi , perchè il liquido ha bisogno di maggiore azione muscolare per essere diretto al basso . La *scialiva* s' ingoja ancora più difficilmente degli altri liquori , perchè essendo un poco *viscosa* , scorre meno agevolmente . Questa difficoltà d'inghiottire , congiunta alla copia di *scialiva* che da ciò stesso si forma , produce lo sputacchiamento quasi continuo , che tanto molesta alcuni malati , quanto più l'interno delle guancie , tutta la lingua , e le labbra si scorticano sovente .

Ciò impedisce altresì di dormire ; ma questo non è male : il sonno non è utile nelle malattie *febrili* ; e di spesso ho veduto, dice il Sig. TISSOT , che coloro i quali si supponevano la loro *gola* quasi interamente guarita la sera , si trovavano male assai dopo alquante ore di sonno .

La *febbre* in questa specie di male è alle volte fortissima , e il *tremore* dura sovente parecchie ore : egli è susseguito da calore notabile , e da violenta doglia di capo , accoppiata talvolta ad assopimento . V' è d'ordinario molta *febbre* la sera , ma alcune volte pochissima ed anco niente nella mattina .

Un leggier sentore di *male di gola* precede spesso volte il *tremore* ; ma più ordinariamente non si manifesta se non dopo , nel tempo stesso del calore *febrile* .

Il collo si fa talvolta un po' gonfio , e parecchi ammalati si querelano d'un dolore assai acuto nell'orecchia del lato più infermo ; di rado risentesi in tutte e due .

ARTICOLO SECONDO.

Cura de' mali di gola semplici .

Circo-
stan-
ze che in-
dicano il
salasso .

IN questa specie di *male di gola* si è spesso volte sforzato a fare un *salasso* , nè bisogna mai ometterlo , quando il *polsò* è *duro* e *pieno* . È cosa importantissima il farlo da principio . Raro è che abbisogni replicarlo ; ma non conviene giammai passare fino al terzo .

Il male di gola semplice si guarisce le più spesse volte senza la cacciata di sangue; e ciò accaderebbe quasi sempre, se tosto che il malato ne risente i primi sintomi, si coprisse il collo, in maniera di tenerlo caldissimo; se immergesse i piedi e le gambe nell'acqua tiepida; se prendesse alcuni clisteri, e se bevvesse copiosamente alcuna delle bevande prescritte nel Cap. V, §. I, Art. III di questo Vol.

Cosa biso-
gnerebbe
fare per
omette-
re la cac-
ciata di
sangue.

Ma niente maggiore avvertenza si usa ai principi di questo male, che di tutti gli altri. Si aspetta che il male sia pervenuto a grado che impedisca di attendere ai propri affari, e allora è quasi impossibile di fare a meno d'una cacciata di sangue; che per verità spesso rimuove il male, se il malato beva copiosamente, e se mantenga la parte caldissima. (Ved. pag. 261 e 266 di questo Vol.)

Negligen-
za che si
commette
nei princi-
pi di que-
sto male e
di tutti gli
altri.

Allorchè la difficoltà d'inghiottire non è congiunta a dolore acuto, siccome ella non dipende che da un ingorgamento delle glandule della gola; richiede solamente che la parte sia tenuta calda. Il malato si gargarizzerà sovente con alcuni rimedj che vellicano leggermente le glandule, come una decozione di fichi con dell'aceto e del mele: si può alle volte aggiungervi un po' di senape, o alquante goccioline di liquore spiritoso.

Cosa con-
viene fare
allorchè il
dolore non
è violento.

Ma bisogna ben guardarsi dall'impiegare questo ultimo gargarismo, qualora vi abbiano alcuni segni d'infiammazione: imperocchè in allora giova il regolarli come abbiamo detto di sopra nell'Articolo V, del §. I di questo Capitolo.)

Allorchè
vi abbiano
alcuni se-
gni d'in-
fiamma-
zione.

Cotesta spezie di male di gola ha differenti nomi tra il popolo; e per guarirlo, v'è l'usanza di alzare il malato per i capelli, e di premere fortemente con le dita sotto le mascelle. Si fatti mezzi ed altri parecchi, sono sovente dannosi, o per lo meno inutili affatto (6).

(6) Dalla maniera di trattare cotesto male, si fa evidente che si vuole intendere l'allungamento dell'ugola. Non v'è chi non abbia veduto tra il popolo a svelle de' pizzichi di capelli a coloro che anno l'ugola gonfia e allungata, in mo-
gola;

Pratica
perniciosa
del popol
contro il
gonfiamen-
to dell' u-

§. IV.

Mezzi di preservarsi dalle differenti spezie di angine, e di mali di gola.

Afferità di vitto. **L**E persone soggette alle *infiammazioni della gola*, devono, per preservarsene, vivere con molta temperanza.

Purgazioni spesse ripetute. Coloro che non vogliono sottometterli alle leggi dietetiche, devono fare sovente ricorso alle *purgazioni*, o ad altre *evacuazioni*, a fine di cacciar fuori il superfluo degli umori.

Fa d'uopo ancora che schivino di pigliar freddo, e che si astengano dagli *alimenti* e dai *rimedj astringenti o irritanti*.

L'*esercizio* violento aumentando il movimento e la forza del *sangue*, dispone singolarmente all'*infiammazione della gola*, massime se bevasi immediatamente in seguito de' liquori freddi, o qualora espongasi subitamente al freddo. Coloro che vorranno ripararsi da questo male, devono dunque, dopo di avere ad alta voce gridato, cantato, corso, bevuto de' liquori caldi, o fatto qualsivisa altra cosa che possa riscaldare la *gola*, o produrre della celerità nella *circolazione del sangue* di questo organo, avere l'attenzione di non rinfrescarsi che gradatamente; di tenersi il collo più coperto dell'ordinario, ec,

do che impedisce l'inghiottire. Questa pratica assurda e dolorosa è principalmente in uso tra i soldati.

Di parecchi altri mali di gola appellati grecchioni. Ma ci sono alcune altre spezie di *mali di gola* che si appellano *orecchioni*. Questo è un ingorgamento delle *glandule* che servono a filtrare la *saliva*, sopra tutto delle due grosse, chiamate *parotidi*, e delle due altre che giacciono al di sotto della mascella, dette *mascellari*. Cotesse *glandule* in questa malattia si gonfiano notabilmente, e impediscono non solo d'inghiottire, ma ancora di aprire la bocca, perchè tai movimenti in allora riescono dolorosissimi: i fanciulli ci vanno molto più soggetti che gli adulti. Siccome d'ordinario non v'è punto di *febbre*, i soli ajuti che propone il Sig. BUCHAN, sono bastevoli.

Ho spesse volte veduto alcune persone soggette a' *mal di gola*, liberarsene interamente col portare costantemente, o un pezzo di *flanella* d'intorno al collo a guisa di cravatta, o delle scarpe più grosse del solito, o un farfettino di *flanella*, ec. Questi presidj possono parere frivoli; ma producono degli effetti mirabili. E' vero che v'ha del pericolo nel disfarfene, qualunque volta vi si sia avvezzato; ma gl'inconvenienti che possono incontrarsi dal servirsene in tutta la vita, non sono certamente da paragonarsi ai pericoli che risultano dal trascurarli.

Importante di tenerli si il collo e i piedi caldi.

Alle volte dopo che l'*infiammazione* della *gola* è dileguata, le *glandule* restano tumide, e divengono dure e *callose*. Non è agevole il rimediarvi, e sovente si aumenta il pericolo coll'iterare l'applicazione de' *rimedj stimolanti*. Tutto ciò che si dee fare in questa occasione, è di custodire calda la parte, e di ordinare al malato di gargarizzarsi due volte al giorno con un decotto di *ficchi*, *acidulato* con alcune goccioline di *elissire*, o di *spirito di vitriolo* (7).

Cosa si abbia a fare allorché dopo l'infiammazione della gola, le glandule restano gonfie.

CAPITOLO VIGESIMO.

Dell'infreddatura, delle diverse spezie di tosse, e del mal di castrone.

§. I.

Dell'infreddatura.

Abbiamo omai fatto osservare che l'*infreddatura* sono cagionate dalla *soppressione della traspirazione*.

(7) Questi *simptomi* persistono, massime allorché la malattia è stata mal curata. Non è giammai avvenuto, almeno io non so, dice il Sig. Tissot, che la *schinanzia infiammatoria*, ben curata, si terminasse in *cancro*, o in induramento delle *glandule*; ma sono stato testimonio che l'uno e l'altro succede, quando si vuole nei principj sforzare il sudore, per via di *rimedj riscaldanti*.

ne. (Ved. Parte I, Cap. XII, §. III, dalla pag. 261, fino alla 271.) Ci siamo studiati di additarne le cagioni; perciò non le ripeteremo. Non ci applicheremo nemmeno a riferire tutti i differenti *sintomi* che le caratterizzano, perchè sono cogniti generalmente.

Idea, che
bisogna
formarsi
dell' in-
freddatura.

Crediamo però di dovere far osservare che bisogna riguardare quasi tutte l'*infreddature* come specie di *febbri*, che non differiscono da alcune di quelle di cui abbiamo poc' anzi favellato, massimamente dalla *pleurisia*, dalla *polmonia*, e dalla *schinanzia*; se non dalla loro minore intensità (1).

Nessuno è
al coperto
dall' infred-
datura e
raffreddasi
in tutti i
climi.

Nessuno è al coperto dall'*infreddature*: questo male non rispetta nè età, nè sesso, nè *costituzione*. Nè i *rimedj*, nè il *viaggio* possono prevenirlo. Raffreddasi in tutti i climi; e malgrado le maggiori cautele, è impossibile il preservarsene in tutti i tempi. Per verità un uomo che si mantenesse costantemente nella medesima temperatura, potrebbe pervenire a tanto di *giammai raffreddarsi*. Ma siccome nessuno può, nè dee assoggettarvisi a sì fatta uniformità, la *traspirazione* si trova esposta a tutte le rivoluzioni che producono nel corpo le vicende del caldo. Bisogna però convenire che quando queste variazioni sono di poco momento, non sono mai capaci di disordinare la *santità*. Acciocchè producano di tali effetti, forza è che sieno notabili.

(1) Ciò che il volgo falsamente chiama *raffreddore di cervello*, ha la sua sede nell'interiore delle narici, e dei *seni frontali e mascellari*. Questo è un ingorgamento, spesse volte leggermente *infiammatorio* delle *membrane* che involgono coteste cavità, le quali corrispondono tutte tra loro. Si fatto ingorgamento cagionato dalla soppressione della *traspirazione*, viene appellato dai Medici *corizza* o *gravedine*; ma il popolo gli dà il nome, come l'abbiamo detto, di *raffreddore di capo* o di *cervello*, riferbando il nome semplice di *raffreddore*, allorchè vi abbia congiunta la *tosse*. La *tosse* però è per se stessa un'altra malattia, la quale più spesso dipende dall'*infreddamento trascurato*, e di cui parleremo nel §. II di questo Cap.

ARTICOLO PRIMO.

Sintomi dell'infreddatura.

L'Oppressione del petto; una lassezza, a cui non s'è punto avvezzo; la doglia di testa; il peso di tutte le parti d'intorno al naso; il riserramento delle narici, ec. danno luogo a credere, che la *traspirazione* siasi soppressa, o piuttosto che abbiassi preso l'*infreddamento*. (Ben tosto il malato non può soffiarsi le narici; ma da esse stilla un umore tenue ed acre, che poco a poco si addensa, a misura che l'*ingorgamento* si dissipa; l'infermo perde l'odorato, il gusto, e l'appetito, ec.)

ARTICOLO SECONDO.

Regola di vitto da seguirsi quando si sia molestato da infreddatura.

IL malato deve alla prima mettersi alla *dieta*, o almeno diminuire la quantità degli *alimenti solidi*, ed astenersi da qualunque *liquore spiritoso*. In luogo di carne, di pesce, d'ova, di latte, o di qualsivoglia altro alimento nutritivo, non prenderà che delle zuppe leggiere, dei brodi di vitello e di pollo, delle *panatelle*, de' *cremori di avena*, ec. Berà dell'*acqua d'orzo* acconcia col *mele*, ovvero una *infusione di menta*, o di *femi di ...*, acidulato col *succo d'arancia*, o di *cedro*; una *decozione d'orzo* e di *legorizia*, con de' *tamarindi*, o alcune altre bevande *refrescanti, diluenti, acidule*.

La cena sopra tutto deve essere leggiera: il malato in questo pasto non prenderà che un poco di *posset*, o di *cremore di avena acquoso*, acconcio con un po' di *mele*: vi si può aggiungere un poco di *paine abbrastolito*. Se il *mele* ripugna allo stomaco, si *addolcirà* questo *cremore* col *mascavato*, o con un poco di *feccia dello zucchero*, volgarmente detta *me-lazzo*, e si *acidulerà* il tutto con *gelatina di uva spina*. Le persone assuefatte ai *liquori fermentati* beran-

Alimenti

Bevande

In che debba consistere la cena

no in vece di *cremore di avena*, del *siero di latte vinoso*, *addolcito* con le sostanze summentovate.

Il malato
dee trattener-
si in let-
to e al
caldo.

Il malato dee trattenerfi in letto più lungamente dell'ordinario, e studierà di procurarsi un lieve *sudore*: il che è facile verso il mattino, prendendo del *sè*, o qualche altra bevanda *diluente calda*. Ho sovente veduto s'è fatto ajuto guarire in un sol giorno un' *infreddatura*, che se fosse stata negletta, avrebbe probabilissimamente costato la vita al malato, o lo avrebbe almeno tenuto in letto pel corso di alquanti mesi.

Importan-
za del va-
pore d'ac-
qua calda:
maniera di
adoperarlo.

(Un altro mezzo saluberrimo e prontissimo per liberarsi da una *infreddatura*, è il respirare il vapore dell'acqua calda, o di alcune *infusioni* di *pianze molli-ve* o *aromatiche*, come quelle di *fiori di sambuco*, o di *camomilla*, di *foglie d'isopo*, ec. Se ne riempie un catino, al disopra del quale si presenta la testa, coperta d'una salvietta, ripiegata a due doppi, in maniera che tutto il vapore sia sforzato a dirigersi verso il viso.)

Mezzi fi-
cili di pre-
venire gli
effetti dell'
infreddatu-
ra, se si
mettessero
in pratica.

Se tosto che i primi *sintomi* dell' *infreddatura* si manifestano, si volesse sacrificare qualche tempo al riposo, a custodirsi al caldo, e ad usare un po' di *dieta*, non v'ha dubbio che si prevenirebbero una parte degli effetti che risultano dalla *soppressione della traspirazione*.

A cosa ef-
ponefi,
quando si
trascurano.

Ma qualora indugiando si lascia che il male prenda possesso, i tentativi che si fanno in seguito per debellarlo, divengono spesse volte infruttuosi. La *pleuritisa*, la *peripneumonia*, una *tube mortale*, sono gli effetti ordinarj dell' *infreddature* che si sono affatto neglette, o mal curate.

Temerità
di coloro
che vogliono
guarire
le infred-
dature coi
liquori spi-
ritosi;

Buon numero di persone tentano di risanarsi da una *infreddatura* coll'ubbricarsi; ma questa esperienza è temeraria, per non dire di più, e non può essere che da stolto. E' vero che può talvolta riuscire, ristabilendo prontamente la *traspirazione*; ma se vi si trovi qualche grado d'*infiammazione*, ciò che avviene sovente, i *liquori spiritosi*, in vece di scemare il male, non fanno che aumentarlo. Ond'è che una semplice *infreddatura* può cangiarsi in una *febbre infiammatoria*.

(Alcuni altri prendono della *teriaca*, delle *confessioni*, dei *rosoli*, ec. Questi mezzi sono egualmente perniciosi per le stesse ragioni. La *teriaca* può convenire nell'*infreddature*, anche nella *tosse*; ma questo è in sul fine. Presa da principio, potrebbe produrre una *infiammazione*, o di *petto*, o di *gola*; e quando si prende sul finire dell'*infreddamento*, bisogna fare una cena leggiera, ed attendere che questa sia digerita.)

Quando coloro che non vivono che del lavoro della giornata, anno la disgrazia d'incontrare un'*infreddatura*, loro è difficile, e quasi sempre impossibile di sacrificare una o due giornate per custodirsi al caldo, e usare alcuni *rimedj*: quindi si fatta indisposizione facendo sovente de' rapidi progressi, cotesti infelici si trovano ben presto obbligati a trattenerli in ritiro per un tempo assai lungo; e anco divengono per sempre incapaci di sostenere de' faticosi lavori.

Coloro in oltre tra questi operaj che avrebbero il modo di prendersi sì fatte cure, quando sono *infreddati*, sdegnano sovente di farlo. Essi aspettano di sprezzare gl'*infreddamenti*, e finchè possono condursi d'intorno, non vogliono restare ritirati per un male che poi non è, come dicono, che un *semplice raffreddore*: d'onde ne avviene che un sì gran numero di persone di questa classe perisce per le conseguenze di questa indisposizione; perchè a guisa d'un nimico, cui non si fa fronte, l'*infreddatura* fra tali indugi prende nuovo vigore, finchè alla fine diviene invincibile (2).

Questa verità si verifica tutto giorno presso i viaggiatori, che per tema di perdere una sola giornata, rischiano la loro vita col proseguire il loro cammino, benchè colti da questo male, anche nella stagione la più rigorosa.

Con la *teriaca*.

Conseguenze fastidiose che anno le *infreddature* appo gli *artigiani*, che non vogliono sacrificare alcuni giorni al riposo.

O che sdegnano di farlo, riguardando l'*infreddatura* come un male troppo leggero.

Questo male ha le stesse conseguenze appresso de' viaggiatori per le stesse ragioni.

(2) Non si muore effettivamente da una *infreddatura*, dice il Sig. TISSOT, finchè essa non è più che una *infreddatura*, ma quando si trascuri, essa produce de' mali di *petto* che ammazzano. Gl'*infreddamenti ammazzano più uomini che la peste*, rispose un abilissimo Medico ad un suo amico, che gli diceva: *lo sto bene; non ho che un raffreddore*.

L'*infreddature* ammazzano più uomini che la *peste*.

Pericoli
del darli
troppo pen-
siero di una
infreddatu-
ra.

Forza è però l'accordare che si può talvolta al-
tresi prendersi soverchia cura degli *infreddamenti*. U-
na persona che, per una *infreddatura* leggiera, si tie-
ne racchiusa in una stanza calda, dà luogo con ciò
ad un tale rilassamento dei *solidi*, ch'è poscia mol-
to difficile di restituir loro il *tuono* che avevano per
lo innanzi:

(Non bisogna in questa malattia esporrli senza ne-
cessità ad un gran freddo; ma fa d'uopo egualmen-
te preservarli dal soverchio calore: coloro che si rac-
chiudono dentro stanze caldissime, non risanano: e
come mai guarire? Coteste camere, indipendentemen-
te dal pericolo che s'incorre nell'abbandonarle, raf-
freddano come i *liquori spiritosi*, producendo una leg-
giera *infiammazione di petto*.)

Bisogna
aggiungere
alla regola
del vitto
un esercizio
moderato.

Per tanto quel che conviene fare, quando il ma-
le e la stagione lo permettono, è di aggiungere al
vitto di sopra prescritto, pag. 281 e seg. di questo
Vol., un *esercizio* moderato; come il passeggio, il mo-
to a cavallo; in vettura ec. Spesse volte un *infred-
damento* ostinato, che ha resistito ad ogni *rimedio*,
cede ad una *regola* di *vitto* e ad un *esercizio* con-
venevole, qualora si continui tutto il tempo neces-
sario.

Utilità
dei bagni
dei piedi.
Grado di
calore che
deve avere
l'acqua di
questi ba-
ghi.

Un mezzo sicuro di ristabilire la *traspirazione*, è
di bagnarsi i piedi e le gambe ogni sera nell'acqua
calda. Ma non bisogna che tale lo sia di troppo,
perchè in allora farebbe nocevole. Non è giammai
bene che l'acqua abbia maggior calore di quello del
latte munto di fresco, e fa d'uopo che il malato
si metta a letto incontanente dopo questa specie di
bagno.

Immergere i piedi nell'acqua tiepida; starsene a
letto; bere dell'acqua di *avena*, o qualsivoglia altro
liquore leggiero tiepido, cancellerà più prontamente
lo *spasmo*, e ristabilirà con più sicurezza la *traspira-
zione*, che tutti i *sudorifici riscaldanti* degli *Spezia-
li*. Ecco tutto ciò che conviene fare per un *infred-
datura* semplice, e se vi si metta di buon'ora, di ra-
do si mancherà di risanarsi.

ARTICOLO TERZO.

Rimedi da somministrarsi a coloro che sono molestati da infreddatura che non cede alla buona regola di vitto.

MA allorchè i *sintomi* non cedono alla *dieta*, al *metodo di vivere*, alle bevande calde e *dilucenti*, si ha gran motivo di temere che sopraggiunga qualche altro male, come una *flussione di petto*, una *febbre infiammatoria*, ec.

Malattie che risultano da una ostinata infreddatura.

Se dunque il *polso* sia *duro e frequente*; se la *pelle* è *infocata e secca*; se il malato senta alcuni dolori di *capo* o nel *petto*, converrà *cavar sangue*, e usare della *polvere rilassante e rinfrescante*, raccomandata nella *febbre scarlattina*. Ne prenderà ogni tre o quattro ore, fino a che abbia fatto la sua operazione. (Ved. Cap. XIV di questo Vol.)

Circostanze che indicano la cacciata di sangue.

Bisognerà ancora applicare un *vesicatorio* alla *nuca*, e dare al malato due cucchiaini di *mistura salina* di due in due ore; in una parola trattarlo assolutamente come d'una *febbre leggiera*. Ho di spesso veduto cotesti presidj, adoperati nei principj, togliere il male in due o tre giorni, nei casi eziandio che v'erano tutti i *sintomi* forieri d'una *febbre infiammatoria*, o d'una *flussione di petto* (3).

Un vesicatore.

(3) Noi preghiamo il *Lettore* di ponderare attentamente i consigli or' ora suggeriti dal Sig. BUCHAN. Egli in questo incontro non si troverà d'accordo con le donniciuole, gli assistenti a' malati, e con quella folla dannosa di scioperati che stancano incessantemente gl' infermi con la loro presenza e coi loro consigli. Li *bagni dei piedi* ed il *salasso* non sono, per loro avviso, rimedi che convengano in una *infreddatura*. Cominciano dal dichiarare che li *bagni dei piedi* fanno discendere il *raffreddore* nel *petto*, senza considerare ch'essi sono uno de' migliori mezzi per ristabilire la *traspirazione*, e che il ristabilimento di questa *evacuazione*, solo basta a guarire l'*infreddatura* nei suoi principj.

Pregiudizj del popolo sulla maniera di curare l'infreddatura.

Quanto al *salasso*, dicono positivamente ch'è micidiale. Non potendo giudicare dei gradi diversi, di cui cotesto male è suscettibile, l'*infreddamento* non sembra loro giammai che

ARTICOLO QUARTO.

Mezzi sicuri di preservarsi dall'infreddamento.

IL gran secreto per ripararsi dalle *infreddature*, è l'evitare, il più che sia possibile, gli eccessi del freddo e del caldo; e allorchè si abbia caldo, il non rinfrescarsi che gradatamente.

Errore di
quelli che si
tengono
troppo al
caldo per
prevenire
le infredda-
ture.

(Ciò non fanno le persone che sono soggette agli *infreddamenti*. Si credono di non poter fare di meglio che di tenersi caldissime; questo è un errore che termina di rovinare la loro salute. Questa disposizione alle *infreddature* nasce per motivo che la *traspirazione* si sconcerta agevolmente; e in allora quanto più mantienfi al caldo, tanto più si promuove il *sudore*, e perciò questa disposizione deve crescere maggiormente. L'*aria* che si respira, essendo perennemente tiepida, allenta e ammolisce la *pelle*, la quale bagnata incessantemente da lieve *sudore*, non può più fare le sue *funzioni*; e la menoma cagione potendo sopprimere questa *traspirazione* sforzata, anzi questo *sudore*, si ricade tosto nell'*infreddamento* che vuolsi evitare.

Non v'è adunque verun altro mezzo di preservarsi dall'*infreddature*, che quello di assuefarsi alle vicende dell'*aria*; di sfuggire le stanze calde; di alleggerire poco a poco i propri vestimenti; di fare un *esercizio* moderato, come l'abbiamo fatto osservare, Parte I, Cap. XII, §. III, e negli Art. I, II, III, IV, V, VI, e VII, dove si tratta di tutti questi

una malattia leggiera, malgrado ciò che abbiamo detto nella nota precedente: e fondati non so su quale ragionamento, pretendono che il *salasso* sia assolutamente contrario.

Non ci so-
no rimedj
esclusivi a
tale o tal
altro male:
i sintomi
sono gli'in-
dicanti dei
rimedj.

Ma le persone sensate e ragionevoli, e che si regolano a seconda dei principj certi, fanno che non v'è *rimedio* alcuno esclusivo a tale o tal altro male; che i *sintomi* della malattia sono i veri indicanti de' *rimedj*; e che in qualunque si voglia male subito che i *sintomi* d'*infiammazione* si manifestano, il *salasso* è il *rimedio* il più capace di opporsi ai disordini che essi cagionano.

obbietti importanti, in maniera di potere tralasciarne la ripetizione in questo luogo.)

§. II.

Delle diverse spezie di tosse.

ARTICOLO PRIMO.

Della tosse di petto.

LA tosse è per l'ordinario l'effetto d'una *infred-*
datura, che sia stata o mal curata, o intera-
mente negletta. (Ved. nota 1 di questo Cap.)
Quando ella diviene ostinata, v'è sempre luogo a
temerne delle conseguenze funeste, perchè essa an-
nuncia la debolezza dei *polmoni*, ed è di spesso il
foriere della *tifidezza*.

Sintomi della tosse di petto.

(La *tosse di petto*, per poco che sia forte, non va
disgiunta da *febbre*, che dura talvolta parecchi gior-
ni. Questa *tosse* è secca al primo attacco; e mentre
mantienfi in questo stato, l'ammalato risente soven-
tamente alcune lievi *trafitture* passeggere di *lato*, dell'
oppressione, e un po' di *male alla gola*; ma poco a po-
co vengono gli *sputi* che scemano la *tosse* e l'*oppres-*
sione; ed è appunto allora che dicesi che l'*infredda-*
mento è maturo.

La *tosse di petto* è un morbo più lungo dell'*infred-*
datura; che non oltrepassa i due o tre giorni, quan-
do non sia trascurata, ma curata nei modi poc'anzi
descritti nel §. precedente; laddove la *tosse di petto*
dura almeno cinque o sei giorni.

Qualora ella continui più lungamente, può avere
le conseguenze le più fastidiose; perchè la *tosse* in-
cessantemente spinge il *sangue* alla testa; perchè
priva del sonno, toglie l'appetito, e turba le *dige-*
stioni; perchè le scosse continue che i *polmoni* rice-
vono, infraliscano cotesto *viscere*, che divenendo la
parte la più debole, serve, per così dire, di serbato-

Quanto
duri la tosse
di petto.

Quali
sieno le
conseguen-
ze fastidio-
se, allor-
chè è per-
tinace.

jo a tutti gli umori : quindi la *respirazione* riesce breve e laboriosa ; si dichiara l'*oppressione del petto*, e la *febbre lenta* si manifesta . Il corpo più non si nutre ; il malato cade in debolezza , in languore , in vigilia , ec. e muore sovente assai prontamente .

Si vede quanto sia importante di non trattare di cosa frivola , come si fa tutto giorno , la *tosse di petto*, poichè può avere le conseguenze le più funeste . Non v'è chi non abbia un qualche esempio da esporre di una qualche persona morta da *infreddatura*, o da una *tosse di petto* negletta , o mal curata . (Ved. nota 2 di questo Cap.)

Cura della tosse di petto accompagnata da febbre.

Sintomi
che indica-
no la cac-
ciata di
sangue ;

Se la *tosse* è violenta ; se il malato è giovane e forte ; se il *polso* è duro e veloce ; se la *dolia di capo* è assai grave , la *cacciata di sangue* riesce neces-
saria .

Contrain-
dicanti .

Ma se l'infermo è debole , e d'una languida *complesione*, il *salasso* trarrà a lungo la *malattia* . Allorchè il malato sputa liberamente , cotesta operazione riesce inutile , e talora anco nociva , il suo effetto d'ordinario tendendo a scemare sì fatta *evacuazione* dello spuro . (Ved. Cap. VI, §. I, nota 2, pag. 89 di questo Vol.)

Vitto .

(Il malato seguirà appunto la regola di *vitto* prescritta di sopra per l'*infreddatura*, Art. II del §. I di questo Cap. Non prenderà dunque se non degli *alimenti* e delle *bevande addolcitive* . Ogni sera nel tempo di coricarsi immergerà le gambe nell'acqua tiepida ; e malgrado l'antico pregiudizio , dice il Sig. Tissot, che faceva riguardare i *pediluvj* come dannevolissimi in questo male , essi recano un grande sollievo al malato , diminuendo la *febbre*, la *dolia di capo*, e la *tosse*. I *clisteri* sono altresì utilissimi , qualora il malato soffra di *stitichezza* .

Chiacchi .

Finalmente , se la *cacciata di sangue* sia bene indicata , a tenore dei *sintomi* qui sopra descritti , si cacciano due o tre scodellini di *sangue* ; e nei casi contrarj , cioè in quelli specificati subito dopo , se semplicemente e scrupolosamente si segua la regola di *vitto*

visto da noi descritta, questa tosse si guarirà con tutta prontezza.)

Cura della tosse di petto senza febbre, ma accompagnata da sputi densi, e viscosi.

Allorchè la tosse non è accompagnata da veruna specie di febbre, e che gli sputi sono densi e viscosi, si ordinano de' rimedj pectorali incisivi: quali sono le preparazioni di squilla, di gomma ammoniaco, ec.

La soluzione di gomma ammoniaco si farà come lo abbiamo raccomandato, pag. 80 di questo Vol., e se ne daranno due cucchiaj, tre o quattro volte per giorno, più o meno, secondo l'età e il temperamento del malato. Soluzione di gomma ammoniaco.

Le preparazioni di squilla possono esibirsi sotto differenti forme, come le seguenti. Rimedj scilittici.

Prendete aceto scilittico, ovvero ossimele scilittico
oppure sciloppo scilittico, } di cadauno due oncie;
acqua di cinnamomo semplice, }
acqua comune, } di cadauno un'oncia.
sciloppo balsamico, }

Mescolate. Si danno due cucchiaj di questa mistura due o tre volte al giorno.

Uno sciloppo fatto con parti eguali di succo di cedro, di zucchero candi, e di mele è ancora convenientissimo in questa specie di tosse. Il malato ne prenderà un cucchiaino a sua voglia. Sciloppo pectorale incisivo.

Cura della tosse di petto senza febbre, ma accompagnata da sputi tenui e limpidi.

Ma quando gli sputi sono tenui e limpidi, questi rimedj ben lungi dall'essere utili, diverrebbero nocivi. In tal caso gli elettuarij addolcitivi, i rimedj oliosi, e mucillagginosi sono più convenevoli. Rimedj addolcitivi e oliosi.

Bisogna che l'infermo beva sovente un bicchiere d' una infusione fatta con i fiori di papavero rosso e di radice di altea, o di fiori di tussilagine. Tisana.

Si può ancora dargli due volte per giorno un cucchiaino da caffè di eliffire paretorico, in un bicchiere di tisana. Eliffire paretorico.

Infusione
di suco di
Spagna.

L'infusione di suco di Spagna del Fuller conviene parimenti in questo caso: se ne può dare una chichera tre o quattro volte per giorno (4).

Cura della tosse di petto senza febbre, ma accompagnata da umore acre.

Suco di le-
gorizia,
zucchero d'
orzo, mor-
selletti bal-
samicì, il
suco di
Spagna, ec.

Allorchè la tosse è cagionata da un umore acre che irrita le fauci e la canna della gola, l'ammalato terrà costantemente in bocca alcuni *morselletti pectorali* dolci, come del suco di legorizia, del zucchero d'orzo, alcune *pastiglie balsamiche* comuni, del suco di Spagna, ec. Questi medicamenti, acquistando l'acrimonia degli umori e i loro principj irritanti, calmano la tosse (a).

Solo caso,
che indica i
rimedio
olio di
si e mucil-
lagginosi.
Errore che
si commette
tutto giorno
nell'uso di
si fatti ri-
medj;

(4) Si osserverà, che il Sig. BUCHAN non prescrive i *rimedj di oliosi e mucillagginosi* che nel caso presente, vale a dire allorchè la tosse di petto è accompagnata da *spusti* limpidi e chiari. Negli altri casi, massime quando gli *spusti* sono densi e viscosi, egli non sarebbero nocevolissimi, poichè aumenterebbero quell'impastricciamento che cerca di distruggere: questo è però che si fa tutto giorno. Non v'è persona che non prescriva l'olio di mandorle dolci e lo sciollo di malva, tosto che v'abbia tosse, senza darsi pena del di lei particolare carattere. La predilezione che presta a sì fatti *rimedj*, e ch'è pur troppo fomentata da coloro che s'impacciano nell'arte di guarire, è una della cagioni principali che prolunga sì sovente la tosse, la quale diviene talvolta incurabile, come lo faremo vedere qui in appresso, nota 5. di questo Cap.

E de' mor-
selletti di
malva, del-
lo zucchero
d'orzo, ec.

Quanto abbiamo ora detto dei *rimedj oliosi*, deesi egualmente intendere de' *morselletti di malva*, dello *zucchero d'orzo*, del suco di legorizia, delle *pastiglie pectorali*, di cui ve n'ha un sì gran numero. Tutte coteste droghe non convengono che nel caso seguente; in tutti gli altri, sono inutili e sovente nocevoli.

Noi osiamo sperare, che per poco che si usi attenzione ai caratteri che distinguono li *spusti*, nella tosse di petto, non si cadrà più in sì fatti errori; e che se, malgrado i pregiudizj di cui abbiamo fatto menzione §. I di questo Cap., si segua scrupolosamente il governo prescritto, si guarirà facilmente e prontamente dall'*infreddatura*, dalla tosse, di qualunque specie esse sieno.

(a) Nella precedente edizione di quest'Opera, io aveva raccomandato contro queste tosse irritanti ostinate una *emulsione*

Cura della tosse di petto senza febbre, ma fomentata da umori che concorrono al polmone.

Nella tosse cagionata da umori che concorrono al polmone, e che la rendono ostinata, farà di spesso necessario, oltre i rimedj *essensoranti* che abbiamo ora consigliati contro gli *sputi densi e viscosi*, pag. 289, di fare una *fontanella*, o di promuovere alcune altre *evacuazioni*.

Rimedj *essensoranti* e *cauterio*.

In questi casi medesimi ho sovente osservato i più felici *effetti* dall' *empiastro* di *pece di Borgogna*, applicato tra le due spalle.

Empiastro di *pece di Borgogna*.

Ho prescritto questo semplice *rimedio* contro le tosse le più ostinate, in gran numero di casi, e in *temperamenti* differentissimi, senza averlo mai veduto mancare del suo effetto, quando però non vi sieno stati de' segni evidenti di *ulcerazione* nel polmone.

Utile in quasi tutte le specie di tosse, eccetto quando v'abbia *ulcerazione* nel polmone.

Per formare questo *empiastro*, si prende una quantità di *pece di Borgogna* della *grossezza* d'una noce *moscata*; se ne distende uno strato sottile sopra un pezzo di pelle molliccia della grandezza della palma della mano, e si applica tra le due spalle. Questo *empiastro* si leva via ogni tre o quattro giorni; si asciuga, e si rimette di nuovo; ma bisogna rinnovellarlo di fresco ogni quindici giorni, ovvero ogni tre settimane.

Si siera di prepararlo, di applicarlo e di curarlo.

Siccome questo *rimedio* è semplice e di poco prezzo, si troveranno per conseguenza non poche persone disposte a sprezzarlo: tuttavia non temo di asserire, che tra tutti quei che ci somministra la *Matéria Medica*, non ve n'è alcuno, il di cui uso sia

A ciò che riesca, bisogna portarlo lungo tempo.

oliofa, coll'aggiunta dell'*eliffre paregorico* della *Farmacopea di Edimbourg*, in luogo dello *spirito alcalino comune*; e molti Pratici m'hanno detto in appresso che questa *emulsione*, preparata in questo modo, era un *rimedio* eccellente in tal caso; possedendo nel più alto grado tutte le proprietà che gli aveva assegnato. Allorchè non si possa procacciarsi di questo *eliffre*, vi si supplisce aggiungendo all'*emulsione oliofa comune* una quantità proporzionata di *tintura sabaica*, o di *laudanum liquido*.

aggiunta dell'*eliffre paregorico*, o della *tintura sabaica*, o del *laudanum*.

più efficace in quasi tutte le spezie di *tosse*. E' però vero che non sempre produce il suo effetto nel primo istante. Ma se si tenga applicato per qualche tempo, riuscirà, laddove la maggior parte degli altri *rimedj* saranno frustranei.

Come si rimedia al prurito che suole eccitare.

Il solo inconveniente di questo *empiaastro*, è il *prurito* ch'ei cagiona; ma a ciò non si baderà, qualunque volta si abbiano in vista gli vantaggi che il malato potrà ritrarne. D'altra parte se il *prurito* diviene molesto, si toglie via l'*empiaastro*, si strofina la parte con un pannolino asciutto, ovvero si può umettarla con un po' d'acqua tiepida e di *latte*.

Cautela da usarsi, quando vogliasi lasciarne l'uso.

E' vero per altro, che bisogna usare alcune cautele quando si voglia lasciarne l'uso. Non si avrà però nulla a temere, allorchè si scemerà poco a poco la grandezza dell'*empiaastro*, e che non si abbandonerà interamente, se non in una temperie d'aria calda, o nella buona stagione (b).

ARTICOLO SECONDO.

Della tosse stomacale.

La *tosse* può essere cagionata da altre cagioni che dal concorso degli *umori* dentro il *pulmone*. In questi ultimi casi i *rimedj pettorali* non anno più luogo. Così in una *tosse* che abbia per cagione o una debolezza di *stomaco*, o delle materie corrotte ammassate in questo *viscere*, i *sciloppi*, gli *olj*, le *mucillagini*, tutti i *rimedj balsamici* sono contrarij.

(b) Si sentono alcune persone a lagnarli che l'*empiaastro* di *pece* s'appicca troppo fortemente alla *pelle*, e perciò di soffrire molto nel distaccarlo, mentre alcuni altri si querelano di avere della difficoltà a mantenerlo saldamente attaccato. Questo avviene dalle diverse spezie di *pece*, e dalla maniera con cui si distende sopra il camoscio. In generale ho osservato che meglio si riusciva, quando vi si aggiungeva un po' di cera, e che si stendeva questa mescolanza quanto più si poteva fredda. La miglior *pece* è quella ch'è *dura*, *bianca*, e *trasparente*. (Ved. nella Tavola la parola *Pece di Bergogna*.)

Cosa bisogna aggiungere alla *pece*, acciocchè non si attracchi troppo fortemente alla *pelle*, ma che per altro vi si mantenga attaccata.

Sintomi della tosse stomacale.

La tosse di stomaco si distingue da quella che viene da vizio dei polmoni, in quanto che il malato in questa ultima tosse nell' *inspirazione*, o sia nel tempo che l'aria entra nel *petto*, laddove ciò non accade nella tosse di stomaco.

Cosa di-
stingue la
tosse di sto-
maco da
quella del
petto.

(La tosse stomacale è più sonora, più aspra, più breve che la tosse di petto. Sembra che il malato non faccia che rimandare l'aria; ben differente in ciò dalla tosse di petto, nella quale, come s'è poc' anzi osservato; l'infermo tosse nell'inspirare l'aria.)

La tosse di stomaco è ordinariamente accompagnata da sensazione più o meno dolorosa in questo *viscere* e nel dorso. Quando è violenta, essa risveglia talora il vomito, massime se sia cagionata da alcune materie corrotte, ammassate dentro lo stomaco. Quando deriva da debolezza di questo *viscere*, ella è secca; o non si fa che sputacchiare una materia limpida, e in piccola quantità.

Ella è molto più comune che d'ordinario non credesi: soprattutto le femmine delicate vi vanno soggette di frequente: presso di tali persone ella è in generale l'effetto di *digestioni* depravate, o di qualche malattia, in cui abbiassi fatto molto uso di *diluenti* che abbianio indebolito lo stomaco.)

Ella è più
di tutto co-
mune alle
femmine
delicate, ecc.
Sue cagio-
ni.

Cura della tosse stomacale cagionata da materie raccolte dentro lo stomaco.

La cura di questa tosse consiste nel ripulire lo stomaco dalla *zavorra* di cui è aggravato, e nel corroborarlo quando questa sia scacciata.

Indicazio-
ne.

Per la qual cosa si darà principio da qualche vomitorio *blando*, come da dodici, o quindici grani d' *ipecacuana* in polvere; (Ved. Cap. III, nota 4 di questo Vol.) e poscia si farà passaggio ad alcuni purgativi *amari*. Così dopo di avere procurato il vomito una o due volte, si potrà esibire il rimedio appellato *tintura sacra*, alla dose d' uno o due cucchiaini, due

Vomitivi
blandi, e
purgativi
amari.
Tintura
sacra.

volte per giorno, o tutte le volte che farà necessario di tenere lubrico il ventre. Il malato ne continuerà l'uso per un tempo assai lungo.

Maniera di Si può di per se stessi apprestare questa tintura nel-
prepararla. la maniera seguente.

Prendete della polvere di *gera-picra*, un' oncia, Lasciata infondere in una foglietta di *vino bianco* per alquanti giorni; *feltrate*, e si serbi per usarne (5).

Offervazione.

(5) Nel Mese di Maggio 1777, fui chiamato per una femina di quarant'anni incirca delicatissima e convulsionaria. Ella era travagliata da una *tosse* ostinata fin dalla Quaresima precedente. S'era chiesto soccorso fin dai primi segni del male. Ma siccome non le fu prescritto che del *brodo* leggiero di *visello*, delle *porzioni* *oliose*, delle *passiglie* *peccorali*, ec. la *tosse* divenne sempre più *stomacale*; in guisa che a capo di due mesi e mezzo, che la vidi la prima volta, ella vomitava tutti gli alimenti, e anche una parte delle bevande che prendeva. Ella s'era estremamente smagrita: più non dormiva, la sua debolezza era tale, che appena poteva restare alzata alcune ore di seguito. Tutte le volte ch'essa tossiva, e tossiva quasi senza interruzione, soffriva uno stracciamento nello stomaco e nel dorso. Secca era la *tosse*, e i colpi brevi: il *polso* *piccolo*, *ristretto*, e per nulla *vivace*. Aveva sempre freddo, e si querelava d'un *tremore* continuo.

Cominciai dallo prescrivere il *siero di latte vinoso*, di cui raccomandai di berne più che potesse, a piccoli tratti sovente ripetuti: Ella non ne vomitò che alcuni forsi, che presi aveva troppo precipitosamente, perchè trovando questa bevanda aggradevole, non si sapeva stancare di berne. Il dì seguente le parve di trovarsi meglio: feci continuare la bevanda, e così pure nel terzo giorno. Nel quarto la malata si trovava sensibilmente più forte, e la *tosse* appariva meno frequente; ma durava tuttavia la noia estrema pegli *alimenti*, e si sentiva impastricciata la bocca. Tutte queste cagioni mi fecero pigliar il partito di darle dodici grani d'*ipecacuana* in polvere, dentro un bicchiere d'*infusione* di *camomilla*, e questa stessa *infusione* fu presa per bevanda durante l'effetto del vomitorio.

Ella vomitò tre volte, e sebbene avesse fatto pochi sforzi, le scosse la stancarono molto. Se le diede un buon brodo due ore dopo, e lo tenne assai bene. Nel resto della giornata riprese il solito *siero*, che continuò fino al sesto e settimo giorno. La purgai nell'ottavo con una dramma di *rabarbaro*, infusa in un bicchiere del *siero vinoso*.

Cura della tosse stomacale cagionata da debolezza dello stomaco.

Nella tosse cagionata da languore di stomaco, la ^{Chinachina} *chinachina* riesce di grande efficacia. Il malato ne masticherà, ne prenderà in polvere, o ne farà una tintura con gli altri amari *stomachici*.

(Si può prescrivere in questo caso la *chinachina*, ^{Polvere} *stomachica*, nella seguente maniera.

Prendete *sal essenziale di chinachina*, una dramma; *rabarbaro* in polvere, mezza dramma. Mescolate; dividete in nove prese uguali. Se ne prende una dose ogni giorno dentro il primo cucchiaino di zuppa. Si proporzionano le dosi relativamente alle circostanze.

Ho spesso volte adoperato questo rimedio, e posso dire di non averne ritrovato alcuno di migliore contro le debolezze di stomaco, e contro le malattie lente e pertinaci che ne sono le conseguenze; ma fa d'uopo continuarlo pel tratto di parecchi mesi senza interruzione, come si può vedere nell'osservazione inserita nella nota precedente. La tosse stomacale, di cui si favella, può essere riguardata come dipendente dalle due cagioni menzionate di sopra, cioè da alcuni umori ammassati dentro lo stomaco, e da debolezza di quest'organo; poichè non avendo nei principj badato a distruggere la prima di queste cagioni, si porge dappoi motivo al nascimento della seconda, annegando lo stomaco del malato con beveraggi scipiti ed acquosi.)

Scaricò benissimo: le feci dare nel dopo pranzo in due differenti fiate un bicchierino di ottimo vino di *Malaga*, in cui inzuppò un crostino di pane, che le riuscì buonissimo. Il giorno seguente prese una dose della *polvere stomachica*, di cui do la ricetta in questa pagina: la continuò col solito *siero* per tutto il mese.

La tosse, le doglie dello stomaco e del dorso, e la debolezza poco a poco disparvero; le forze ritornarono insensibilmente, e l'appetito fu, molto prima che si dismettessero questi rimedj, qual era avanti la malattia.

ARTICOLO TERZO.

Della tosse nervosa.

Chi sono
coloro che
vanno sog-
getti alla
tosse ner-
vosa.

(**L** A *tosse nervosa* è una malattia più spesso *sintomatica* ch' *essenziale*. Non si rincontra che presso le persone *vaporose* ed i fanciulli. Ma siccome questi ultimi ci vanno assai soggetti, e che ragionevolmente non si possono mettere nella classe delle persone attaccate da *mal de' nervi*, si è dovuto distinguere questa *tosse* da quella che forma il soggetto dell' Articolo seguente.

In cosa
distinguesi
dalla tosse
stomacale;

La *tosse nervosa* è secca come la *stomacale*: ma ella è impetuosa: e in vece di essere sonora, ed aspra acuta. come la prima, ella manda un suono sordo, che sembra venire da lungi. D' altra parte essa assale per via di *accessi*, che ritornano sovente dentro periodi regolari, come alquante ore avanti o dopo il pranzo, dopo di averli coticato, dopo di essersi alzato, ec.

E dal mal
di *castrone*
appo i fan-
ciulli.

Appo i fanciulli si potrebbe confondere con il *mal di castrone*, del quale si tratterà subito dopo, §. III. di questo Cap., se questa ultima malattia non fosse bastantemente caratterizzata dai *parossismi*, che non si osservano nella *tosse nervosa*.

*Cura della tosse nervosa negli adulti e nei
fanciulli.*

Vitto. I *rimedj* proposti negli Articoli precedenti, sareb-
bero assolutamente contrarj in questa specie di *tosse*.
Il gran *rimedio* è l'*oppio*. Ma bisogna prima di tut-
to ordinare al malato di mutar cielo, e di trasferirsi
in campagna, se sia che soggiorni in Città. Questo
precetto è del pari importante nella *tosse nervosa*, che
nella *convulsiva*, o *mal di castrone*. (Ved. qui in ap-
presso pag. 300.) Di più bisogna ch' egli faccia al-
trettanto *esercizio*, quanto le sue forze glielo permet-
teranno. Se il soggetto sia un fanciullo, si ordinerà
di farlo passeggiare ogni giorno all' *aria aperta*. Si
faranno agli uni e agli altri immergere le mani ed

pièdi nell' acqua calda . Questi contribuiranno in singolar modo a calmare questa spezie di tosse.

Bagni dei
pièdi e del-
le mani .

Frattanto si somministreranno i *calmanti* ; ma in luogo di *pillole saponacee*, di *elissire paregorico*, ec. che non sono altra cosa che l'*oppio mascherato*, si daranno dieci, quindici, venti, venticinque goccioline di *laudano liquido*, più o meno, secondo le circostanze. Il malato ne prenderà nel tempo che giace a letto, o quando la tosse gli sarà molesta, come abbiamo detto, Cap. XVIII, nota 3 di questo Vol.

Calmanti .

ARTICOLO QUARTO.

Della tosse sintomatica .

Quando la tosse non è che il *sintomo* d' un altro male, in vano si tenterà di guarirla, qualora non abbiai prima risanato la malattia di cui è l' effetto .

Della tosse, sintomo del metter de' denti .

Sicchè quando la tosse è cagionata dalla *dentizione*, o sia dal metter dei *denti*, bisogna lubrificare blandamente il ventre, *scarificare* le *gengive* (6); fare in fi-

Bisogna lu-
bricare il
ventre, e
scarificare
le gengive .

(6) Vale a dire, ferire con de' colpi di lancetta la *gengiva*; aprire la *pelle* di questa parte, e fare un passaggio al *dente*: con questo mezzo si apre la *pelle*; si toglie quella *sensazione* sì dolerosa che soffre la *gengiva*, e per comunicazione tutte le parti vicine, e ch'è la sola cagione del gran numero di accidenti che accompagnano la *dentizione*. Questa operazione è dunque importantissima, poichè essa previene e guarisce la tosse di cui favella l' Autore, e sopra tutto le *convulsioni*, che uccidono un sì gran numero di fanciulli.

Cosa sieno
le scarifica-
zioni . Lo-
ro impor-
tanza .

Ma per riuscire, non bisogna farla che quando il *dente* è presso a sortire; quando la *pelle* della *gengiva*, che lo ricopre, è bastantemente attenuata, onde poter sentire perfettamente il *dente*. Imperciocchè se si facesse questa operazione più di buon' ora, sarebbe da temere che la piccola *ferita* fatta dalla lancetta, fosse *rammarginata* avanti che il dente avesse superato il passaggio, e in allora gli accidenti ricomparirebbero con maggiore violenza, perchè la *cicatrice* rende la *pelle* più dura.

Cosa sieno
le scarifica-
zioni . Lo-
ro impor-
tanza .

Momento
in cui biso-
gna farla .

ne tutto ciò che conviene, perchè i *denti* spuntino : questo è l'unico mezzo di acchetare la *tosse*, come lo prescriveremo più distesamente Tom. IV, Cap. LI, §. XI, che tratta della *denizione* difficile.

Della tosse, sintomo dei vermini.

Parimenti quando ella è prodotta dai *vermini*, i soli *rimedj*, che possono in allora guarirla, sono i *vermifugi*, gli *amari*, i *clisteri oliosi*, ec. che noi ordineremo Tom. III, Cap. XXX, che tratta dei *vermini*.

Della tosse, sintomo di gravidanza.

Salasso e
purgativi
dolci.

Le femmine sono molto soggette alla *tosse* negli ultimi mesi di gravidanza. Questa *tosse* si guarisce ordinariamente coi *salassi*, e per via di alcuni *purgativi blandi*. Di più esse devono evitare gli *alimenti flatuosi*, non portare che degli abiti comodi, che non terranno in alcun modo strettamente allacciati. Del resto noi ne parleremo Tom. IV, Cap. L, §. III, che tratta della *gravidanza*.

Della tosse, sintomo foriere della gotta.

La *tosse* è non solamente il *sintomo* d'un'altra malattia, ma ancora essa spesse volte ne forma il *sintomo foriere*. Così è appunto che la *gotta* si annunzia frequentemente per via d'una *tosse* molestissima, che tormenta il malato parecchi giorni innanzi che il primo *accesso* si manifesti.

Si aspetta che la *pelle* sia bastevolmente affottigliata, e anche per agevolarla a pervenire a questo grado di tenuità, si può toccare soventi volte nella giornata la *gengiva* con una spugna imbevuta d'una mescolanza tiepida di *acqua*, di *latte* e di *mele*: si possono altresì aggiungere alquanto goccioline di *laudano liquido*. Si farà trattenere al fanciullo un sorso di questa mescolanza in bocca, più a lungo che sarà possibile. Se gli darà da masticare un bastoncino di *segorizia*, ec.

Siccome questa *iosse* d'ordinario svanisce alla comparsa del primo *accesso*, è giovevole l'eccitarlo . A tal oggetto si terranno l'*estremità* al caldo; si daranno delle bevande calde , e si bagneranno i piedi e mani nell'acqua calda , impregnata di *supone* , o di *sale* , come lo diremo più ampiamente Tom. III, Cap. XXXIII, §. I. Quanto alla *iosse*, cagionata da debolezza, in seguito delle malattie , Ved. nota § di questo Capitolo .)

Il mezzo di guarirla è di eccitare l'accesso di gotta .

§. III.

Del mal di castrone ,

SI vede di rado che il *mal di castrone* attacchi gli adulti ; ma è di sovente funesto ai fanciulli . Coloro che si nutrono di *alimenti acquosi* e di nessuna consistenza, che respirano un'aria malsana , che non fanno *esercizio* bastevole , sono soggettissimi a questo morbo , e ne sono generalmente i più travagliati ,

Fanciulli i più esposti al mal del castrone .

Questo male è sì ben noto , anche alle stesse nutrici , che riesce inutile il descriverlo , Tutto ciò che può turbare la *digestione* , sopprimere la *traspirazione* , infralire i *solidi* , dispone a sì fatto malore ,

Cagioni ,

ARTICOLO PRIMO.

Vitto da prescriversi nel mal di castrone ,

LAonde per guarire questo male , fa d'uopo nettare lo *stomaco*, corroborare, rinforzare i *solidi*, e nel tempo stesso agevolare la *traspirazione*, ed eccitare le altre *secrezioni* .

Scopo che dee proporsi nella cura .

Gli *alimenti* devono essere leggieri e di facile *digestione* . Del pane bollito nell'acqua, o condito in zuppa , del brodo di pollo , e tutte le vivande liquide convengono in questo caso ai fanciulli .

Alimenti per i bambini .

Ma per coloro che sono più attempati, si farà uso del *cremore di sagou* ; e se non v'abbia che pochissima *febbre*, un po' di pollo allesto , o di qualsivia altra carne bianca ,

Per coloro che sono più attempati .

Bevanda. Per loro bevanda si esibirà una *infusione d'isopo* di *puleggio*, acconcia col *mele* e col *zucchero candi*, o un poco di *siero di latte vinoso*. Se l'ammalato è debole, si può di tanto in tanto porgergli un po' di *negus* leggiero.

La muta-
zione dell'
aria è un
rimedio nel
mal del ca-
strone.

Uno de' migliori rimedj nel *mal di castrone* è la *mutazione dell'aria*. Spesse volte ciò solo risana il malato, anche quando si fa passaggio da un'aria più pura in un'aria men pura. Questo può senza dubbio dipendere dal motivo che il malato si sottrae dal luogo della *contagione*; avvegnachè la maggior parte delle malattie de' fanciulli sono *contagiose*.

Egli è con-
tagioso.

Non è raro il vedere regnare questo morbo in una Città o Villaggio; mentre che in un altro luogo, che non giace che a piccolissima distanza, nessuno vi è tocco. Ma qualunque ne sia la cagione, questo è un fatto di cui siamo certi. Non bisogna dunque perdere momento di tempo; e tosto che un fanciullo, o un adulto è preso di questo male, trasportarlo in qualche distanza dal luogo dove egli infuria, e scegliere, se sia possibile, un'aria più pura e più calda (c).

ARTICOLO SECONDO.

Rimedj da somministrarsi nel mal di castrone.

Quando è
quante vol-
te abbiso-
gna cacciar
sangue.

Quando la malattia diviene violenta, e che l'infermo corre pericolo di soffocarsi, forza è di *cavar sangue*, massimamente se v'abbia *febbre*; e se il *polso* sia *duro*, e *pieno*: ma siccome nel *cavar sangue* l'oggetto primario è di prevenire la rottura de' *vasi sanguigni* dei *polmoni*, e di adattarli all'azione de' *vomitorj*, di rado v'è bisogno di ripetere sì fatta

(c) Alcune persone s'immaginano che non bisogni che il malato cangi d'aria, anzi che la malattia sia nella sua declinazione; ma questa opinione sembra mal fondata, poichè si sono veduti de' malati trarre un gran vantaggio dal cangiamento d'aria in tutti i periodi della malattia. Non basta far forse tirare il malato il giorno in vettura: questo mezzo è di rado salutare, e sovente anzi espone l'infermo ad *infreddarsi*.

operazione . Nulladimeno se il male sia accompagnato da' *sintomi* d' *infiammazione* di *petto*, una seconda e anco una terza cacciata di *sangue* può rendersi necessaria . (Ved, nota 3 di questo Capitolo ,)

Si riguarda per l'ordinario siccome un *sintomo* favorevole, quando il malato vomita nel tempo d'un parossismo; perchè in allora lo stomaco essendo sgombrato, la tosse si scema d'affai, E dunque cosa utile il sollecitare il vomito, facendo bere una infusione di *camomilla*, o dell'acqua tiepida; e somministrando, allorchè questi mezzi non riescono, alcune piccole dosi d'*ipecacuana*: di questa se ne faranno prendere cinque in sei grani ad un fanciullo di tre o quattro anni, e più o meno agli altri, proporzionatamente all'età e alle forze; ovvero si farà prendere lo sciloppo vomitivo, di cui si troverà la ricetta nella Tavola, Tom. V.

I vomitori
ri vi sono
utili. Per-
chè?

E' difficilissimo di far bere i fanciulli dopo di avere loro fatto prendere un vomitivo . Spesse volte ho veduto che si poteva felicemente ingannarli, facendo infondere un mezzo scrupolo o una mezza dramma d'*ipecacuana* in polvere, dentro una foglietta d'acqua bollente . Se si maschera questa infusione con un po' di latte e di zucchero, prendendo questa bevanda per del tè, essi se la beono con avidità, Se ne porge ogni quarto d'ora, o piuttosto ogni dieci minuti una piccola chicchera, e si continua sino che il rimedio abbia operato. Tosto che si comincia a vederne l'effetto, non è necessario di farli bere d'avvantaggio, perchè anno già abbastanza d'acqua dentro lo stomaco .

Maniera
di far pren-
dere l' ipe-
cacuana ai
fanciulli .

Non solamente i vomitori nettano lo stomaco, che in questo male è carico di *flemme viscosse*, ma ancora eccitano la *traspirazione* e le altre *secrezioni*: devono dunque essere iterati a norma dell'intensità de' sintomi, e della ostinatezza del male .

Altri van-
taggi de'
vomitori
in questo
male .

Non bisogna però che sieno troppo violenti: i blandi vomitivi, soventemente ripetuti, riescono e meno perigliosi, e più efficaci di quelli che più farebbero attivi .

Bisogna,
che sieno
blandi .

Siccome il malato è d'ordinario stitico, rendesi necessario di lubrificargli leggermente il ventre . I mi-

Sciloppo
di riacura
di rabarba-
ro .

gliori lassativi in tai casi sono il *rabarbaro* e le sue preparazioni, come lo *sciloppo* o la *tintura* di *rabarbaro*.

Dose per i bambini : Se ne dà ai bambini uno o due cucchiaj da caffè, due o tre volte al giorno, secondo l'esigenza.

Per quelli che sono più attempati. Quando sono più avanzati in età, se ne aumenta la dose in proporzione, e la si ripete fino a tanto che abbiassi ottenuto l'effetto bramato.

Altra maniera di muovere il ventre di quelli che anno difficoltà a prendere i rimedj. Quanto a quelli co' quali non si può pervenire di far prendere questa *tintura amara*, loro si esibisce una *infusione* di *sena* e di *prugna*, che si addolcisce con la *manna*, il *mascavato*, o con il *mele*: oppure si sostituiranno benissimo alcuni grani di *rabarbaro* in polvere, stemperati in uno o due cucchiaj da caffè di *sciloppo* o di *gelatina d'uva spina*, per nascondere il sapore. Il maggior numero de' fanciulli è ghiotto de' *sciloppi*, delle *confetture*, ec. e rade volte rifiuta di prendere i *rimedj* mascherati in questa guisa, per quanto sieno disgustosi. (7)

I rimedj oliosi, pettorali, ec. sono contrari nel mal di castrone. Perché? Quasi generalmente si crede, che i *rimedj oliosi*, *pettorali*, e *balsamici* possedano alcune maravigliose virtù per guarire il *mal di castrone*: laonde si offrono in abbondanza ai malati di qualsivoglia età e *costituzione*; senza considerare che tutte le sostanze che possiedono tali qualità, impastricciano e caricano lo *stomaco*, sono nocive alla *digestione*, e per una conseguenza necessaria aggravano il male. (Ved. nota 4 di questo Cap.)

Utilità del kermes minerale in questa malattia. (7) E' sorprendente che l'Autore abbia passato sotto silenzio il *kermes minerale*, che in questa malattia ha il doppio vantaggio di far vomitare e di purgare il ventre, sopra tutto i fanciulli, benchè dato in piccolissima dose, come d'un quarto di grano per un fanciullo d'un anno, d'un mezzo grano per quello di due, ec. una o due volte nella giornata. Ho spesso volte veduto il *mal di castrone* cedere alla prima presa.

Come conviene esibirlo. Si dà loro questo *rimedio* con una quantità più o meno grande di *zucchero* in polvere, dentro un cucchiaino d'acqua. Egli ha in oltre la proprietà di aumentare le forze; di eccitare una *traspirazione* più abbondante; di agevolare l'*especcazione*; e di provocare lo scorrimento dell'*orina*.

Circostanza dove ei non conviene. Bisogna però confessare ch'ei non conviene nei casi dove lo *fibro* del malato mantenessero molta rigidità.

I *millepiedi* o *aselli* vengono estremamente raccomandati in questa malattia . Coloro che preferiranno l'uso di questi insetti, li prenderanno nella maniera seguente .

Millepiedi.
di . Manie-
ra di usar-
li .

Prendete de' *millepiedi* vivi e lavati, due oncie , Tritateli in un mortajo ; poneteli in una foglietta di vino bianco leggiero, lasciandoli in infusione per tutta la notte ; feltrate per un pannolino , e ne darete un cucchiaino da tavola , tre o quattro volte per giorno .

Qualche volta i *calmanti* sono necessari per moderare la violenza della *tosse* . In tal caso si fa uso d' un po' di *sciloppo* di *papavero*, o di *diacodion* ; ovvero di cinque , sei, o sette goccioline di *laudano liquido*, secondo l'età e il *temperamento* dell' infermo . Si fanno prendere questi *calmanti* in una tazza d' *infusione* d' *isopo* o di *puleggio*, e si ripetono , qualora sia necessario (*d*) .

Quando
abbisogni
dare de' cal-
manti .

Il *lenimento* d' *aglio* è un *rimedio* notissimo in Iscozia contro il *mal di castrone* . Si prepara tritando l' *aglio* in un mortajo , con parti eguali di lardo strutto : se ne stropiccia la pianta dei piedi due o tre volte per giorno . Ma la migliore maniera di adoperarlo, sta nello stenderlo sopra un pannolino, ed applicarlo in forma d' *empiastro* . Questo si rinnovella sera e mattina , perchè l' *aglio* perde prontamente la sua virtù : Egli è un eccellente *rimedio* contro il *mal di castrone*, e contro la maggior parte dell' altre *tosse* ostinate .

Lenimento
d'aglio com-
eui si stro-
picciano le
piante dei
piedi, e che
si applica
in empia-
stro .

Tuttavolta deeſi avere grande avvertenza nell' adoperarlo , quando il malato sia riscaldato, o che abbia qualche disposizione alla *febbre*, perchè darebbe aumento a così fatti *sintomi* .

Circoslan-
ze, che lo
contro-in-
dicano .

Bisogna immergere i piedi nell' acqua calda , ogni due o tre giorni una volta , e applicare tra le due

Bagni alle
gambe, ed
empiastro

(*d*) Ci sono de' Pratici che raccomandano l' *estratto* di *cicuta*, siccome un *rimedio* maraviglioso nel *mal di castrone* ; ma per quanto potei osservare, egli non è superiore all' *oppio*, il quale bene amministrato , calma sovente per sempre i *sintomi* i più tumultuosi di questa malattia .

L' estratto
di cicuta
non è su-
periore all'
oppio .

di pece di
Borgogna .

spalle l' *empiaſtro* di *pece* di *Borgogna* . (Ved. pag. 291 di queſto Vol.) Queſto *empiaſtro* ſi terrà applicato per tutto il corſo del male .

Vefcicato-
rio .

Ma ſe la malattia ſi rende più violenta, in luogo di queſto *empiaſtro*, conviene applicare un *veſcicatorio*, e mantenervi lo ſpurgo per qualche tempo mediante un *unguento ſuppurativo* .

Tempo di
dare la chi-
nachina, e
gli amari .

Allorchè la malattia divenga oſtinata, e che il ma- lato non abbia punto di *febbre*, la *chinachina* e gli altri *amari* ſono i *rimedj* i più convenevoli . Si darà la *chinachina* in ſoſtanza, vale a dire in polvere, o in *decozione*, in *infuſione*, ec. a piacere dell' infermo . Se ſi dà in polvere, la doſe per un fanciullo è di dieci, quindici, venti grani, ſecondo l'età, tre o quattro volte per giorno involta in un po' di *ſciloppo*, o tra due zuppe di pane .

Doſe per
un fanciul-
lo ;

Per un
adulto .

La doſe per un adulto, è da una mezza dramma fino a quaranta otto grani, ripetuti lo ſteſſo numero di volte .

Se ſi farà prendere in *decozione*, ſi facciano bollire due dramme di *chinachina* in un mezzo ſeſtiere di acqua, per lo ſpazio di quattro o cinque minuti ; ſi feltrerà, e il fanciullo berà queſta quantità due volte per giorno . Per un adulto ſi raddoppierà la doſe .

Rimedio
che non
può eſſere
ammini-
ſtrato ſe
non da un
Medico .

Ci ſono alcuni che configliano in queſto caſo l' e- ſtrato di *chinachina* con la polvere di *canterelle* ; ma non v'è che un Medico che poſſa dirigere l' uſo d' un tal rimedio ; perchè ei richiede molta perizia ed attenzione .

Caſtoreo
congiunto
alla china-
china .

Doſe per
un fanciul-
lo .

L' uſo di alcuni grani di *caſtoreo* congiunto alla *chinachina* rieſce più ſicuro . La doſe, per un fanciullo di ſei in ſette anni, è di ſette in otto grani di *caſtoreo* e quindici di *chinachina* in polvere . Si forma di queſte due ſoſtanze una *miſtura* con due o tre oncie di *acqua di cinnamomo ſemplice* e un poco di *ſciloppo di garofano*, e ſe ne porge tre o quattro volte per giorno .

Ricapito-
lazione del
governo
nel mal
del caſtro-
ne .

(Il mal di *caſtrone* è in generale una malattia ru- belle . Non è raro il vederlo durare parecchi meſi , allorchè ſopra tutto non ſi abbia cominciato dal far cangiar cielo al malato , come l'abbia preſcritto , pag. 300 di queſto Volume , o che abbiaſi curato con

con de' *rimedj* contrarj, o anche con quelli prescritti, ma amministrati senza regola. Importa dunque moltissimo di seguire scrupolosamente quella con cui sono indicati i *rimedj* di questo Articolo.

Per la qual cosa si comincerà dal cacciar sangue, se i *sintomi* che indicano questa *evacuazione* sono urgenti; si farà vomitare, e si purgherà. Se i *parossismi* non minorano il loro impeto, si daranno dei *calmanti*, con le precauzioni ch' esigono sì fatti *rimedj*. Se poi l'effetto loro non sia che poco, o nulla notabile, si verrà all' uso del *lenimento d'aglio*, dell' *empiastro di pece di Borgogna*, si passerà da ultimo al *vescicatorio*; e si riserverà la *chinachina* e il *castoreo* per i casi ostinati, che avessero resistito al metodo da noi ora proposto.)

CAPITOLO VIGESIMO PRIMO.

Dell' infiammazione di stomaco, e delle viscere del basso ventre.

Ogni *infiammazione delle prime vie* riesce pericolosa, e richiede i più attivi e i più pronti soccorsi, perchè ella va di spesso a finire nella *suppurazione*, e alle volte in *cancro*, che cagiona una morte sicura.

Questi mali sono perigliosi, e richiedono i più pronti soccorsi. Perchè?

§. I.

Dell' infiammazione di stomaco.

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni dell' infiammazione di stomaco.

L' *Infiammazione di stomaco* può essere prodotta da ognuna delle cagioni che generano la *febbre infiammatoria*, come le bibite di liquori freddi quando alcuno sentasi caldo; la *soppressione della traspirazione*; il retrocedimento subitaneo d'una *eruzione*, ec.

Cagioni generali della febbre infiammatoria.

Cagioni
Particolari.

Ella può essere cagionata dall'acrimonia della bile, o dalle sostanze acri e irritanti che soggiornano nello stomaco; dai vomitorj e dai purgativi troppo forti; dai veleni corrosivi; ec. La gotta risalita, sia per aver preso del freddo, sia per aver adoperato de' rimedj contrarij, accende altresì sovente l'infiammazione di stomaco. Le sostanze dure o indigeste, ritenute dentro questo viscere, come le ossa, i nocciuoli delle frutta, ec. possono parimenti produrre lo stesso male.

ARTICOLO SECONDO.

Sintomi dell' infiammazione di stomaco.

L' *Infiammazione di stomaco* è accompagnata da un dolore fisso e da un calore ardente nella regione di questo viscere; da veglia e da ansietà. Il polso è minuto; frequente, e duro.

Il malato vomita, o almeno prova delle nausea e delle svogliatezze; egli ha una sete eccessiva; le sue estremità sono fredde, e difficilmente respira: si strugge in sudori freddi colliquativi; e talvolta è travagliato da convulsioni e da sinimenti. Lo stomaco è tumido, e spesse volte rassembra duro alla pressione.

Sintomi
caratteristici.

Uno dei sintomi di questo male è un senso doloroso, che l'ammalato prova qualunque volta che prende qualche cosa, tanto solida, che liquida, massime se la bevanda o gli alimenti sieno troppo caldi o freddi soverchiamente.

La colica
dello sto-
maco n' è
sovente un
sintomo
precursore.

(Lo stomaco è altresì soggetto ad un dolore acuto, mordace, cui si ha dato il nome di *colica dello stomaco*: che il più spesso deriva da *ventosità*, o *flatulenza*, e da una affezione *spasmodica*. Si riconosce da alcune enfiagioni assai sensibili e da frequentissime ruttazioni. Questa malattia, quando non sia accoppiata a febbre, si tratta con li rimedj riscaldanti e antispasmodici, che l'Autore prescriverà nell' Art. I del §. III di questo Cap. Ma quando sia accompagnata da febbre, essa dee far temere l' *infiammazione*, su cui quivi si versa.)

Sintomi
pericolosi.

Allorchè il malato vomita tutto ciò che prende

Vitto nell' infiammazione di stomaco. 307
per via di bevanda o di *alimento* ; qualora la *veglia*
sia ostinata ; che v'abbia il *singhiozzo* : in fine allor-
chè il *pulso* è *intermittente* , e che gli accessi di lan-
guore sono frequenti , egli corre sommo pericolo .

ARTICOLO TERZO.

*Vitto da prescrivarsi nell' infiammazione di
stomaco .*

Bisogna con la maggiore sollecitudine evitare le
bevande , e gli *alimenti riscaldanti , acuti , e irrita-
tivi* . La debolezza dell' infermo può ingannare colo-
ro che gli stanno vicino , onde indurli a dargli del
vinò , de' *liquori spiritosi* , o de' *cordiali* d' altra sorta ;
ma sì fatti *rimedj* non mancano mai di aggravare il
male , e sovente cagionano una morte sollecita .

Pericoli
de' cordiali
in questa
malattia .

(La cagione la più ordinaria del cattivo successo
di questo morbo , è la falsa opinione che universal-
mente prevale , che i dolori violenti di *stomaco* o
degl' *intestini* sieno sempre prodotti dai *flatj* . Appena
alcuno si querela di sì fatti dolori , che si vedono
coloro che lo assistono , a dar di piglio all' *acquavite*
di *anici* e agli *spiriti* d' ogni maniera . Il malato ne
sente talvolta qualche sollievo , che non è però di
lunga durata ; e su tutti il male acquista tanto più
di forza , quanto più anno preso di *liquori spiritosi* .
E' dunque di somma importanza il prestare un' atten-
zione scrupolosa ai *simptomi caratteristici* surriferiti ,
pag. 306 , e di confrontarli con quelli che caratte-
rizzano la *colica ventosa* , e che noi descriveremo qui
in seguito pag. 319. di questo Vol.)

Cagione
ordinaria
del poco
buon esito
nella cura
dell' in-
fiammazio-
ni di sto-
maco .

Le propensioni al vomito possono ancora inganna-
re gli astanti e coloro che assistono al malato , e
portarli per conseguenza a riguardare i *vomitoy* co-
me necessarj ; ma questi uccidono con celerità non
minore .

Pericoli
de' vomito-
ry .

Gli *alimenti* vogliono essere *liquidi* , leggeri , *rin-
frescativi* , e di facile *digestione* . Devonsi porgere in
piccola quantità : non bisogna che sieno nè troppo
caldi , nè di soverchio freddi . Il *cremore* leggero di
avena , o d' *orzo* ; del pane leggero , abbrustolito , in-

Quali deb-
bano essere
gli alimen-
ti .

zuppato e disciolto dentro l'acqua bollente, o il brodo tenuissimo di pollo, sono i cibi i più convenevoli.

Le bevande.

Per bevanda si darà il *siero di latte chiarificato*, l'*acqua d'orzo*, l'*acqua di pane*, o quella in cui si abbia fatto bollire una crosta di pane abbrustito; ovvero anco le *infusioni*, le *decozioni* di *pianze mollitive*, tali sono la *legorizia*, la radice di *altea*, di *salsapariglia*, ec.

ARTICOLO QUARTO.

Rimedi da amministrarsi nell'infiammazione di stomaco.

Importanza della cacciata di sangue.

LA cacciata di sangue in questo male si rende assolutamente necessaria; essa è quasi il solo rimedio da cui possa dipendere il buon esito della malattia. Se l'*infiammazione di stomaco* resiste al primo *salasso*, sarà spesso necessario di ripeterlo parecchie volte, nè deesi a motivo della piccolezza del *polso* guardarsi di replicarlo. Il *polso* d'ordinario s'inalza dopo le *cacciate di sangue*; e finchè avvedasi di questa elevazione di *polso*, si può cacciar sangue con tutta sicurezza (1).

Perchè?

(1) Deste:à maraviglia il sentirsi inculcare sì fortemente in questo luogo i *salassi*, dopo di averli prescritti con tanta riserva nella maggior parte delle malattie precedenti. Ciò è perchè l'*infiammazione di stomaco* è particolarmente caratterizzata da una *costrizione* estrema in tutto il *sistema vascolare*: locchè procede senza dubbio dalla quantità prodigiosa de' *nervi* ch'entrano nella struttura dello *stomaco*, sede di questa *infiammazione*. Ora i gran rimedi contro questa *costrizione* sono i *rilassanti*, tra' quali la *cacciata di sangue* tiene uno de' primi luoghi; e i segnali evidenti di questa *costrizione* sono la durezza e la piccolezza del *polso*, congiunta a vivacità.

Se dunque dopo la prima *emissione di sangue*, e dopo alquante ore dell'uso de' *somenti* e dei *bagni ai piedi*, di cui accingesi a parlare, il *polso* non si allenta, forza è di passare ad una seconda, e anche ad una terza, se questi stessi *suffidi* replicati, giacchè bisogna adoperarli tutti in una volta, non producono un effetto sensibile.

Li *fomenti* frequenti con l'acqua tiepida, o con la decozione di *piante ammollienti* sono egualmente vantaggiosi; se ne inzuppano alcune flanelle, che si applicano successivamente sulla *regione dello stomaco*, rinnovellandole subito che cominciano a freddarsi.

Non bisogna che sieno applicati soverchiamente caldi, nè attendere per cangiarli che sieno divenuti affatto freddi; perchè il soverchio freddo e il soverchio caldo sono del pari nocivi in questo male.

(Un *rimedio* che ci è stato di gran servizio in simili casi, sono alcune *stropicciature* sulla forcilla dello stomaco con la mano asciutta, o bagnata in una decozione *mollitiva*, ec. Queste si fanno qualunque volta che si applicano, o che si rinnovellano il *fomenti*.

Si tufferanno sovente i piedi, e le gambe dentro l'acqua tiepida. Si applicheranno alle piante dei piedi alcuni mattoni caldi, o de' *cataplasmi*.

Sarà di grande giovamento il bagno caldo, se v'abbia il caso di poterse ne servire.

Uno de' migliori *rimedi* che in questo male io conosca, e contro tutte l'altre *infiammazioni* delle *prime vie*, è un *empiastro epispastico*, o *vescicatorio*, applicato sopra la parte offesa. L'ho di spesso adoperato, e giammai ho veduto che non abbia recato sollievo all'infermo.

I soli *rimedi* interni che possiamo consigliare in questa malattia, sono alcuni *clisteri lenienti*. Si comporranno semplicemente di acqua tiepida, o di decozione leggiera di *avena*; e se il ventre sia restio, vi si aggiungerà un po' d'olio di *mandorle dolci*, di *mele*, o di *manna*.

I *clisteri* fanno le veci di *fomenti* interni; lubrificano leggermente il ventre, e nutricano al tempo stesso il malato, che sovente in questo morbo non può trattenere alcun *alimento* nello stomaco. Sicchè non bisogna giammai trascurarli, poichè la vita del malato può da essi dipendere.

Non bisogna in questo male affrettarsi troppo ad abbandonare i *rimedi*; fa di mestieri che i dolori sieno almeno da due o tre giorni addietro svaniti. Si sono veduti alcuni malati dismettere i *rimedi* tosto che non anno più sentito dolori; ma, come se que-

Dei fomenti.

Anno ad essere nè troppo caldi, nè troppo freddi.

Stropicciature sulla forcilla dello stomaco.

Bagni delle gambe. Mattoni caldi, o cataplasmi ai piedi. Bagno caldo.

Importanza del vescicatorio sulla parte addolorata.

Clisteri lenienti.

Quanto sieno utili in questo male.

Non bisogna abbandonare troppo presto i rimedi, e si deve continuare la regola.

del vitto
parecchi
giorni do-
po d'essere
guarito.

310 *Parte Seconda, Cap. XXI. §. II. Art. I.*

si non fossero che assopiti, sono ricomparsi con maggiore violenza di prima, e sempre con pericolo del malato: conviene altresì che osservino la regola di *visso* prescritta, almeno per otto giorni dopo che la malattia è guarita.

Gli altri mali, di cui lo *stomaco* è suscettibile, sono i *dolori* di questo *viscere*, la *perdita* di *appetito*, l'*indigestione*, la *cardialgia*, e la *pirosi*, o sia ardore di *stomaco*, de' quali si tratterà Tom. III, Cap. XXIX, XLII, XLIII e XLIV.)

§. II.

Dell' infiammazione degl' intestini, o del basso ventre.

Male dolorosissimo e acutissimo.

Questo male è uno de' più dolorosi e de' più perigliosi, cui soggiacciono gli uomini.

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni dell' infiammazione del basso ventre.

Ella è in generale prodotta dalle cagioni stesse dell' *infiammazione* di *stomaco*. La *stitichezza*, i *vermi*, le frutta che non sono mature, le noci mangiate in gran copia; la *birra* flatuosa, come l'*aile*, o la *birra* vecchia serbata in bottiglie; il *vino* aspro e il *sidro* agro, possono produrre cotesto male. Egli può ancora essere cagionato da una qualche *ernia*; da alcuni tumori *scirrofi* negl' *intestini*, o dall'adesione dell' una coll' altra delle loro pareti; da una qualche *pietra* che si formi nel *canale intestinale*, ec.

Nomi differenti che porta questa malattia. Quali sono passioni iliaca, enteritide, colica infiammatoria, ec.

Si sono apposti differenti nomi all' *infiammazione degl' intestini*; si è appellata *passione iliaca*, *enteritide*, ec. secondo la parte del *basso ventre* che n'è assalita; si denomina ancora talvolta *colica infiammatoria*, ec. Frattanto siccome in qualsivoglia parte del *canale intestinale* che la malattia sia situata, la cura n'è quasi sempre la stessa, noi crediamo di dovere omettere

Sintomi dell' infiammazione del basso ventre. 311
tutte queste divisioni per tema d'imbarazzare il Let-
tore (2).

ARTICOLO SECONDO.

*Sintomi dell' infiammazione del basso
ventre.*

I *Sintomi dell' infiammazione degl' intestini sono presso
poco gli stessi che quelli della malattia prece-
dente.*

La sola differenza si è, che il dolore riesce più a-
cuta, ed è situato più basso, d'intorno al *bellico*. Il
ventre è stretto come da una spezie di corda; la *si-
stichezza* è costante, il *polso frequente, piccolo, depresso,
mancante*, la sete eccessiva, e il calore ardentissimo.
Il *vomito* è altresì più violento: il malato dapprima
rigetterà una materia viscosa, poscia schiumosa e d'in-
grato sapore: a questa materia tien dietro una *bile
acre* che rosecchia la gola: in fine rendono *alle volte*
per la bocca gli *escrementi*, i *clisteri*, le *supposte*, ec.
(3) Manda egli continuamente fuori pel di sopra dei
fiati, e spesso soffre una *soppressione d'urina*.

Sintomi
particola-
ri.

(2) Noi diremo solamente che l'*infiammazione del basso
ventre* viene altresì descritta dagli Autori sotto il nome di *vol-
vulo*, che significa attorcigliamento; perchè gl' *intestini* di
coloro che ne muojono, sembrano per qualche guisa attorciglia-
ti gli uni cogli altri. D'altra parte avendo riguardo allo sta-
to veramente degno di compassione, a cui il *vomito* crudele
e pertinace riduce i malati, s'è apposto a questa malattia il
nome di *colica di miserevole*.

Volvulo,
colica di
miserevole.

(3) Il Sig. BUCHAN dice *alle volte*; imperciocchè il *vo-
mito* degli *escrementi* non è essenziale a questa malattia, seb-
bene la maggior parte degli Autori asseriscano il contrario. Si
sono vedute delle *passioni iliache*, nelle quali questo *sintomo*
ha mancato, e se ne sono vedute alcune altre, dove s'è fat-
to vedere. D'altra parte egli non ha luogo che quando gli
scarichi del ventre sono onninamente soppressi.

Non ignoro, dice il Sig. LE ROY, che tutti gli Autori so-
stengono ch'è il *vomito stercoraceo* che caratterizza la *passio-
ne iliaca*; ma è certo che i malati periscono sovente senza
aver rigettato simili materie, e che la feccia che depongono
le materie *biliose*, rese per *vomito*, n'è un segno molto più

Sintomi
caratteri-
stici.

Sintomi
favorevoli.

Allorchè i dolori cangiano di luogo; che il vomito non si risveglia che ad intervalli, e che i clisteri si rimandano pel basso, si dee sperare bene del male.

Sintomi
pericolosi.

Ma se il malato vomita i clisteri e le feccie; se sia eccessivamente debole; se abbia un polso piccolo e formicante; se sia pallido, sparuto; se il suo fiato mandi odore disagiata e puzzolente, v'è motivo di temere che la malattia abbia un esito infelice.

Sintomi
mortalis.

I sudori viscosi, le deiezioni nericie e fetide, accompagnate da un polso intermittente, e da cessazione totale del dolore, sono segnali di *cancera* omai cominciata, e di morte vicina.

ARTICOLO TERZO.

Visto da prescriversi a coloro che sono tocchi d'infiammazione del basso ventre.

Lo stesso
che quello
dell'infiam-
mazione di
stomaco.

IL vitto in questa malattia è lo stesso che quello prescritto per l'infiammazione di stomaco. Bisogna tenere il malato tranquillo, impedire che non senta freddo, e rimuovere da lui tutto ciò che può eccitare le passioni dell'animo. Gli alimenti saranno leggerissimi, ed esibiti in piccola quantità. La bevanda sarà diluente, come il *siero chiarificato*, l'acqua d'orzo, ec. (Ved. Art. III del §. I di questo Cap. pag. 307 e seg. di questo Vol.)

costante, e che apparisce fino dal cominciamento del male. Cotele materie *biliose* sono in tali casi dense, glutinose, sovente d'un colorito verde carico, e depongono una specie di sedimento, o di posatura dello stesso colore. (Ved. *Mélag. de Phys. & de Méd.* T. I. pag. 304.)

ARTICOLO QUARTO.

Rimedj che si devono somministrare nell'infiammazione del basso ventre.

LA cacciata di sangue, del pari che nell'infiammazione di stomaco, è quivi di somma importanza. Deve si fare tosto che i sintomi si manifestano, e ripetere a norma delle forze del malato e della violenza dei dolori. (Ved. nota i di questo Cap.)

Importanza della cacciata di sangue i

Fa d'uopo nel tempo stesso applicare un vescicatorio sul sito dove il dolore è più sensibile; questo non solamente calma il dolore degl'intestini, ma ancora produce un effetto cotanto felice, che i clisteri e i purgativi, che per lo innanzi riuscivano vani, operano subito che il vescicatorio comincia ad agire.

Del vescicatorio applicato nel sito del dolore.

Li fomenti e i clisteri lassativi sono della stessa importanza. Si bagneranno sovente i piedi e le mani del malato nell'acqua tiepida. Si applicheranno sul ventre de' pannolini inzuppati nell'acqua calda; sul bellico, una qualche vescica piena d'acqua calda, e sotto le piante dei piedi, alcuni mattoni caldi, o delle bottiglie piene d'acqua calda.

Dei fomenti, dei clisteri lassativi, dei bagni alle gambe, ec.

I clisteri saranno composti d'acqua d'orzo, o di avena con del sale, e addolciti con l'olio di mandorle dolci, o col burro fresco. Se ne farà uno ogni due o tre ore, e più spesso, qualora la stitichezza sia ostinata.

Come debbano essere composti i clisteri.

(Quanto più i dolori sono violenti, tanto più l'infiammazione è considerabile, e più i rimedj devono essere addolcitivi. I clisteri con il sale non devono dunque essere usati che con cautela, e bisogna che sieno sempre addolciti coll'olio di mandorle dolci.

Crediamo eziandio che in questi casi i clisteri composti di decozioni ammollienti, o d'infusioni mucillaginose addolcitive, convettranno ancor meglio di quelli prescritti cogli oli e coi grassi. Per la qual cosa se ne appresteranno con i fiori e radici di altea, con i semi di lino, ec. Si potrà aggiungere ad ogni clistero un mezzo capo di papavero, o un capo intero, a norma dell'intensità dei dolori.)

Allorché la malattia non cede ai rimedi precedenti, bisogna far uso dei purgativi, accompagnati dai calmanti.

Se la malattia non cede nè ai *clisteri*, nè alli *fo-menti*, uopo è di ricorrere ai *purgativi* d'una indubitata forza. Ma siccome dal loro irritare gl' *intestini* aumentasi di sovente la contrazione di coteste parti, e per ciò appunto non corrispondono all'intenzione con cui si esibiscono, bisogna accompagnarli ad alcuni *calmanti*, i quali nell'assopire i dolori, e nell'allettare le *contrazioni spasmodiche* del *basso ventre*, favoriscono singolarmente in questi casi l'operazione dei *purgativi*. (4)

Un *rimedio* che riesce a far scaricare il ventre, si è una *soluzione* dei *sali amari purganti*, che si prepara nella seguente maniera.

Prendete del *sal catartico*, o sia *sale d' Epsom*, due oncie.

Avanti di passare a questi purgativi bisogna usare le *stropicature oleose*.

(4) Avanti di passare a questi *purgativi*, che, come l'osserva benissimo l'Autore, possono irritando gl' *intestini* aggravare la malattia, noi vorremmo che s'impiegassero le *stropicature oleose* sul *basso ventre*, da cui il Sig. LE ROY riconosce un sì grande vantaggio, e di cui noi stessi abbiamo fatto uso con molto frutto. Ecco come si usano queste *stropicature*.

Maniera di farle.

Abbiasi dell'*olio di mandorle dolci*, o di *uliva*, e facciasi riscaldare dentro un conveniente tegame. Quando sia caldo a certo grado, vi s'immerge la mano, e si sfrega il ventre del malato per tutti i versi. Allorché l'*olio* della mano è assorbito, la s'intinge di bel nuovo, e si risfrega. Si continua questa operazione per un quarto, e per una mezz'ora. Ho veduto il ventre rendersi lubrico al primo tentativo; ma spesso volte, bisogna replicare questa operazione tre o quattro volte ad un'ora di distanza l'una dall'altra.

Bisogna parimenti prescrivere i bagni talsali.

Osservazione.

Se contro ogni apparenza queste *sfregazioni* convenevolmente ripetute non riescono, crediamo che debbasi altresì venire all'uso dei *bagni*, che l'Autore consiglia più basso, anzi di prescrivere i *purgativi* gagliardi. I bagni sono singolarmente riusciti in una giovane, che il Chirurgo aveva abbandonata, riguardando come impossibile che se le potesse mai far sciogliere il ventre. La feci porre dentro un *bagno* d'un calore moderatissimo. Ella non potè, per quanto mi fu detto, restarvi che un quarto d'ora. Tuttavia la malata rimessa in letto provò una calma, che le fece chiedere un secondo *bagno*. Questo le fu accordato a capo di due ore di distanza dal primo; vi rimase più d'una mezz'ora, e non ne sortì che per fare uno scarico copioso.

Rimedi contro l'infiammazione del basso ventre, 315

Scioglietele in una foglietta d'acqua calda, o di *cremore* leggiero di *avena*.

Si porge una piccola tazza di questa *soluzione* ogni mezz'ora, finchè si cominci a provarne l'effetto.

Si danno nel tempo stesso quindici, venti, venticinque goccioline di *laudano liquido* in un bicchiere d'acqua di *menta*, o di *cannella semplice*, per impedire l'irritazione e prevenire il vomito.

Gli *acidi* anno di sovente arrestato il vomito, e calmato gli altri *sintomi* di questa malattia. Sarà dunque bene di *acidulare* le bevande del malato con il *cremore* di *sartaro*, col *suco* di *cedro*, o coll'*aceto*, in caso che quelli manchino.

Avviene però sovente che il malato non è capace di ritenere niente di liquido nello *stomaco*; allora uopo è purgarlo con alcune *pillole*. Ho provato in generale, che le presenti riescono egregiamente.

Prendete *sciarrappa*,) di cadauno
sartaro vitriolato,) mezza dramma;
oppio,) un grano;
sapone d'alicante, quantità sufficiente.

Riducete la *sciarrappa* in polvere, così pure l'*oppio*, mescolate tutte queste sostanze; fatene una pasta col *sapone d'alicante*, e riducetela in *pillole* più o meno grosse.

Il malato prenderà tutta questa dose in una sola volta, e se dopo alquante ore non ne ottenesse l'effetto, ne ripiglierà una dose eguale.

Se malgrado tutti questi mezzi non si può pervenire a sciogliere il *ventre*, s'immergerà il malato in un *bagno caldo*, in guisa che l'acqua vi giunga sino al *petto*. (Ved. qui sopra nota 4 di questo Cap.) Ho veduto questo mezzo riuscire, allorchè tutti gli altri *rimedi* erano stati adoperati senza frutto. L'infermo resterà dentro l'acqua tanto a lungo, quanto le forze glielo permetteranno; e se il primo *bagno* manca dell'effetto bramato, ne farà un secondo, subito che le sue forze si saranno ristabilite. E più utile, e più sicuro il ripetere parecchi *bagni*, che il restare soverchiamente a lungo dentro lo stesso, e sovente fa d'uopo rimettervisi parecchie volte di seguito, prima ch'ei produca il suo effetto.

Dose.

Dose del calmante che bisogna dare nel tempo stesso.

Cosa bisogna fare per arrestare il vomito.

Allorchè il malato non può ritenere niente nello stomaco.

Purgante in pillole.

Dose.

Bagno totale di acqua calda.

Mezzi da
tentarsi,
quando di-
sperati di
poter guarire il ma-
lato.

Alle volte si è veduto, che dopo di avere in van-
no tentato ogni sorta di *rimedio* per evacuare, vi si
riesce da ultimo col tuffare l'*estremità* inferiori del
malato dentro l'acqua fredda; o facendolo passeggiar-
re a piedi nudi sul pavimento inumidito; ovvero
gettandoli dell'acqua fredda sopra le gambe, sopra
le coscie; e quando tutti gli altri ajuti sono stati
frustranei, questo merita almeno d'essere tentato. Per
verità egli non è senza pericolo, ma in sì fatto ca-
so disperato, conviene meglio il cimentare un *ri-
medie* incerto, che non adoperarne veruno affatto.

Mercurio
crudo:

V'è costume nei casi disperati di somministrare il
mercurio crudo. Se ne danno parecchie oncie, anzi
una libbra intera; ma non bisogna giammai oltrepa-
sare cotesto peso (a).

Utile al-
lorchè non
v'abbia
luogo di te-
mere la
cancrena.

Allorchè v'abbia sospetto di *cancrena* nel ventre,
non bisogna tentare questo *rimedio*. Incapace in al-
lora di guarire il malato, non servirebbe che ad af-
frettare la di lui morte: ma quando il socchiudi-
mento o l'avvicchiamento dell'*intestino* è di tal
natura da poterli superare mercè la forza, il *mercurio*
non solo è in allora un *rimedio* convenevole, ma an-
cora il migliore che si possa somministrare, perchè
tra tutte le sostanze che noi conosciamo, egli è il
più atto ad aprirsi un passaggio nel *canale intestinale*.

Cosa con-
viene fare
allorchè l'
infiamma-
zione del
basso ven-
tre è cagio-
nata da un
ernia.

Se la malattia è cagionata da un' *ernia*, bisogna
adoprarsi per far rientrare l'*intestino*. A tal oggetto
si posa il malato in guisa che abbia la testa bassissi-
ma, e bel bello leggermente si va premendo con le
dita e la mano l'*intestino* caduto fuori. Se questo ar-
tificio, i *clisteri*, li *fomenti* non riescono, forza è di
ricorrere all'operazione Chirurgica, che sola può re-
care sollievo all'infermo. (Ma non v'ha che un
esperto Chirurgo, il quale possa eseguirla.

(a) Quando si dà il *mercurio* in dose troppo grande, egli
manca del suo effetto, perchè facendo col suo peso abbassare
il fondo dello *stomaco*, questo *minerale* non può più trapela-
re pel *piloro*, o per l'apertura dello *stomaco*, che mette agl'
intestinali. (Ved. Parte I, Cap. II, nota 3.) In questo ca-
so forza è di sospendere il malato pei piedi, affinchè possa ri-
gettare per la bocca il *mercurio*.

La prima avvertenza che bisogna avere presso una persona travagliata da sì fatto male, è di vedere, se v'abbia alcuna *rottura*. E' d'uopo fare cotesto esame con molta diligenza, perchè il disordine non è sempre apparente, massime nelle femmine. Non bisogna contentarsi di palpare le anguinaglie e la *coggia*, fa di mestieri esplorare per via del tatto tutte le parti del ventre, perchè possono ritrovarsi dell' *ernia* in tutte le parti di questa cavità, come si vedrà Tom. IV, Cap. LIV, §. III. Tosto che accorgasi che v'abbia una *rottura*, bisogna farla ritirare, o far rientrare il budello, come lo abbiamo detto poc' anzi. Questo è il solo *rimedio* da praticarsi in allora, e sovente non v'è più bisogno di verun altro.)

Quanto sia necessario di esaminare sul principio se il malato patisca qualche rottura, e con quale attenzione bisogna fare cotesto esame.

ARTICOLO QUINTO.

Mezzi di preservarsi dall'infiammazione del basso ventre.

Chiunque vorrà evitare questo morbo crudele e periglioso, non dee giammai restare troppo lungo tempo senza scaricare il ventre; imperciocchè si sono trovate negl' *intestini* di coloro ch'erano morti di questo male, parecchie libbre di *materia feccosa* disecata e indurita.

Evitare la stitichezza; Perchè è

Non mangierà frutta che sieno acerbe; nè berà liquori infortiti, *flatuosi*, ec. Ho veduto prodursi questa malattia da una troppo grande quantità di frutta cotte nel forno, poichè sono di rado delle migliori quelle frutta che si mangiano apprestate in questa forma.

Le frutta acerbe, i liquori flatuosi;

Viene altresì originata dal freddo che si prende per via de' vestiti bagnati, e segnatamente a cagione dell'umidità dei piedi, come l'abbiamo avvertito §. I di questo Cap. pag. 305 del presente Vol.

Il freddo umido.

§. III.

Delle diverse spezie di colica.

Caratteri,
e governo
della colica
in ge-
nerale.

Divisione
delle coliche
che relati-
vamente
alle loro
cagioni.

LE *coliche* anno una grande relazione con le due malattie precedenti, sia per i *sintomi*, sia per la *cura*. Elleno sono d'ordinario accompagnate da *stitichezza* e da dolori acuti negl' *intestini*; e ricercano un *visito diluente*, l'*evacuazioni*, li *fomenti*, ec.

Le *coliche* anno de' nomi differenti, secondo le cagioni da cui derivano. Tali sono la *colica ventosa*, la *biliosa*, l'*isterica*, la *nervosa*, ec. Siccome cadauna delle *coliche* presentemente nominate, ricerca un metodo particolare di *cura*, noi si accingiamo a descriverne i *sintomi* i più generali, come pure i mezzi di guarirle (§).

ARTICOLO PRIMO.

Della colica flatulosa, o ventosa.

Caratteri
della colica
flatulosa.

(**L**A *colica ventosa* è cagionata dai *flati*, o *ventosità*, che distendono e gonfiano gl' *intestini*: ella è spessissime volte complicata con la *colica spasmodica*, o *nervosa*. (Ved. qui appresso Articolo IV di questo §.) Essa deve la sua origine ad alcune materie *viscose* e tenaci, che riserrano molt'aria, la quale viene sprigionata dal calore.)

Definizione
del vocabolo
colica.
Cosa deb-
basi inten-
dere per
questa vo-
ce.

(§) Vien dato, principalmente dai Francesi, il nome di *colica* a tutti i dolori, più o meno *acuti*, che si fanno sentire nel *basso ventre*, segnatamente nel tragitto che fa l'*intestino colon*, donde viene la voce di *colica*. Si distinguono parecchie spezie di *colica*, in ragione della sede del dolore, e delle cagioni che lo fanno nascere. Il Sig. BUCHAN non ammette che questa ultima divisione, e ciò con grande ragione. Imperocchè le malattie chiamate *colica nefritica*, *colica epatica*, e *colica di stomaco*, nella vera significazione del termine non sono *coliche*. Le due prime non sono altro che le malattie conosciute sotto il nome d'*infiammazioni dei reni* e del *fegato*, da cui non possono essere distinte, (Ved. qui in seguito, §a IV e VI di questo Cap.) e l'ultima è la *cardialgia*. (Ved. Tom. III, Cap. XLIV.)

Cagioni della colica ventosa.

La *colica ventosa*, o *flatuosa*, è cagionata da un uso smodato di frutta immature, di alimenti di difficile digestione, di *vegetabili flatuosi*, di liquori in istato ancora di fermentazione, ec. Può altresì essere l'effetto della traspirazione soppressa, o del freddo.

Le persone delicate, di cui le facoltà digestive sono debolissime, ne vanno le più soggette.

Chi fosse
quelli, che
ci vanno
soggetti.

Sintomi della colica ventosa.

La *colica ventosa* ha la sua residenza nello stomaco, o negl'intestini. E' accompagnata da una tensione dolorosa nella parte opprèssa. Il malato sente de' gorgoglii, o de' borbottamenti di ventre.

(L'aria, che grado a grado si dilata, gonfia gl'intestini, distende le loro pareti oltre il loro suono ordinario, e li fa cadere nell'atonìa. Cotesta flatulenza è sensibile, segnatamente nell'ipocondrio sinistro: si sente, allorchè vi si presta attenzione, l'intestino colon gonfio: il ventre è tumido, duro, e risuona come un tamburo. Alle volte il suo volume cresce a segno, che si crederebbe ch'ei non potesse resistere a tanto distendimento: ciò è che cagiona la difficoltà del respiro, la quale accompagna sovente questa specie di colica.)

L'infermo d'ordinario si trova sollevato dopo di avere mandato fuori de' flati, sia pell'alto, sia pel basso. Di rado è stabile il dolore. I flati scorrono dall'uno nell'altro intestino, finchè alla fine sortono. (Quando si preme il ventre, questo non è punto addolorato, come nell'infiammazione del basso ventre.

Sintomi
caratteristici
della.

Questa malattia è ancora accompagnata da *sbavigli*, da *nausee*, da *cardialgie*, e da *costipazioni* di ventre. La distensione de' budelli è talvolta sì eccessiva, che il bellico n'è sforzato, onde vi si forma un'ernia o rottura. Quando i dolori sono piantati negl'intestini sottili, e che tormentano il duodeno e il colon, è malagevole di distinguere questa colica dalla *cardialgia*. (Ved. Tom. III, Cap. XLIV.)

Cura della colica ventosa.

Quando questa malattia è cagionata dai liquori flatuosi, dalle frutta acerbe, dagli *acidi vegetabili*, ec. il miglior rimedio nelle prime apparenze dei *sintomi* è di bere un po' d'*acquavite*, o di qualsivoglia altro *liquore spiritoso* di buona qualità.

L'ammalato dee ancora tenerli i piedi caldi, mediante un caldanino, o alcuni *mattoni* riscaldati, e se gli applicheranno sullo *stomaco* e sul ventre alcuni pannolini caldi.

(Se gli faranno alcune strofinazioni secche sullo *stomaco*, e sul ventre, con la mano calda, o con de' morbidi pannolini caldi egualmente. Queste strofinazioni ajutano d'ordinario a scacciare de' *fiati*: per tanto si replicheranno finchè l'infermo si trovi sensibilmente alleggiato.)

Questa *specie di colica* è la sola in cui si possono adoperare gli *spiriti ardenti*, gli *aromati*, e gli altri *rimedj riscaldanti*: nè ciò ancora è da farsi che sul principio, e avanti che si sia manifestato *sintomo* alcuno d'*infiammazione*. In fatti abbiamo motivo di credere che le *coliche* prodotte dagli *alimenti flatuosi* possano sempre guarirsi mediante gli *spiriti ardenti* e i *liquori riscaldanti*, qualora si adoperino incontanente dopo i primi indizj dei *fiati*.

Ma allorchè i dolori esistono da qualche tempo, e che vi sia motivo di temere che v'abbia omai un principio d'*infiammamento* negl' *intestini*, forza è d'astenersi da tutti i *rimedj riscaldanti*, come da altrettanti *veleni*. Bisogna in allora governare il malato, come se avesse una vera *infiammazione d'intestini*, o di *basso ventre*. (Ved. qui sopra Art. III e IV del §. II di questo Cap. pag. 312 e seg. di questo Vol.)

Ci sono alcuni *temperamenti*, a' quali parecchie *specie di alimenti*, che pur non sono di lor natura *flatuosi*, come il *melo*, le *ova*, ec. risvegliano alcune *coliche ventose*. In generale ho conosciuto che la miglior maniera di fugarle, era quella di far bere in copia al malato alcuni liquori leggeri *diluenti*, come l'*acqua*

Allorchè ella è cagionata dai liquori flatuosi, dalle frutta acerbe, ec. deve esser bibe l'acquavite.

Tenere i piedi, lo stomaco, e il ventre caldo.

Fargli su quelle parti alcune strofinazioni secche. Ma l'acquavite è il rimedio riscaldante non convenevole, se non quando la colica dipende da quelle cagioni: e ancora non bisogna adoperarli che nei principj.

Essi farebbero perniciosi, qualora ci fosse il medesimo sintomo d'infiammazione. Come abbisogni allora trattare il malato.

l'acqua di *avena*, del *posset* leggiero, dell'acqua di *pang*, ec.

La *colica ventosa*, che nasce da stravizzo e da *indigestioni*, svanisce ordinariamente da se sola, per via di vomito, o di scarichi di *ventre*: ragione per ben guardarsi dall'arrestare sì fatte *evacuazioni*: bisogna al contrario agevolarle, facendo bere copiosamente dell'acqua calda, o del *posset* leggiero; e quando la violenza dei *sintomi* è cessata, l'infermo può prendere una dose di *rabbarbaro*, o qualsivoglia altro *purgativo* blando, per cacciar fuori i rimasugli dell'*indigestione*.

Le *coliche ventose*, che sono cagionate dall'umidità dei piedi o dal freddo, d'ordinario si curano nel principio bagnandosi i piedi e le gambe nell'acqua calda, e prendendo alcune bevande *diluenti* calde, capaci di ristabilire la *traspirazione*, come del *siero di latte vinoso*, o del cremore di *avena* acquoso, cui si aggiunge una piccola quantità di *liquore spiritoso*.

Mezzi onde preservarsi dalla colica ventosa.

Gli abitanti della campagna, tanto soggetti alle *coliche ventose*, se ne preserveranno facilmente, avendo cura di cangiarsi di vestiti tosto che li sentiranno inumiditi. Dovrebbero parimenti bere un po' d'*acquavite*, o di qualsivoglia altro *liquore spiritoso*, dopo aver mangiato delle frutta immature.

Ordinando in cotal guisa l'*acquavite*, non abbiamo per verun modo in animo di raccomandarne l'uso; ma in tal caso gli *spiriti ardenti* sono *rimedj* veraci, e non temiamo di asserire ch'essi sono anzi i migliori che si possano amministrare (6).

Allorchè è cagionata dagli alimenti che non sono stati di loro natura, conviene dare i diluenti.

Allorchè dipende da irregolarità, e da indigestioni, s'intestengono l'evacuazioni, e si finisce coll'usare il rabbarbaro.

Allorchè è cagionata dall'umidità dei piedi, dal freddo, ec. si esibiscono le bevande diluenti calde, ec.

Acquavite, o liquori spiritosi. Perché?

(6) Non si dee giammai perdere di vista, che il Sig. BUCHAN non raccomanda i *liquori spiritosi* che nelle *coliche puramente ventose*, e nel principio di sì fatte *coliche*. In tutte le altre, e anco nelle *coliche ventose* avanzate, o che diano motivo di temere l'*infiammazione*, cotesti liquori riuscirebbero *veleni*, com'ei lo dice benissimo, pag. 320. di questo Vol. Per le altre malattie *stasiose* ved. qui in appresso Tom. III, Cap. XLV, §. X.

Acqua di
menta col
pepe.

Un bicchiere di buona *acqua di menta col pepe* produrrà presso poco gli stessi effetti d'un bicchierino d'*acquavite*, e devesi pure in certi casi darle la preferenza; a cagione d'esempio nelle persone convulsionarie, d'altra parte assai soggette a questa spezie di *colica*, sendo l'*acqua di menta col pepe* un *sedativo corroborante*.

ARTICOLO SECONDO.

Della colica biliosa.

Qual'è
la sede di
questa co-
lica.

(Questa *colica* è suscitata da una *bile acre*, che irrita e corrode le *membrane* degl' *intestini*. Ella ha la sua residenza negl' *intestini tenui*, ma principalmente nel *duodeno*.

Chi sono
quelli che
ci vanno
soggetti.
Cagioni.

Ella è frequente tra la gioventù d'una *complexione* vigorosa e adulta, che bevono molto *vino*, o *liquori spiritosi*, che sono collericici, stizzosi, ec.

Alle volte la *colica biliosa* sopravviene a un tratto, dopo che si abbia bevuto dell'*acqua fredda* in tempo d'estate, o allorchè la *traspirazione* sia soppressa per qualche altro motivo.)

Sintomi della colica biliosa.

Sintomi
esterni.

Questa *colica* è accompagnata da dolore acutissimo verso la *regione ombelicale*, o verso il *bellico*. Il malato soffre una sete ardente; ha d'ordinario il ventre chiuso, (molto meno però che nell'*infiammazione* del *basso ventre*. Il *polsò* è frequente, il più delle volte piccolo, senza essere duro o teso; il malato ha de' stordimenti e la voce rauca.)

Sintomi
carattari-
stici.

Egli vomita della *bile* gialla, ardente, amara. Dopo questo vomito l'infermo sembra sollevato; ma tosto i dolori riedono con la stessa violenza di prima.

A misura che il male fa de' progressi, la disposizione al vomito s'accresce, e talvolta a segno che il vomito diviene quasi continuo, e il movimento degl' *intestini* è talmente cangiato, che si ravvisano quasi tutti i *sintomi* d'una *passione iliaca* comincian-

te. (Ved. di sopra §. II , Att. II di questo Cap. pag. 311 di questo Vol.)

(Questa malattia si fa ancora palese dall'amarezza di bocca, dal calore ardente dell' *interiora* . I dolori sono ora fissi, ora vaganti. Corrispondono talora al *bellico*, talora al dorso, e tal' altra volta allo *stomaco*, secondo la parte degli *intestini* ch'è offesa. La maggior parte degli ammalati si querela d'un dolore simile a quello che potrebbe produrre una corda che li stringesse. Le *urine* sono dense, rossigne, e sortono in piccola quantità: a sì fatti *simptomi* alcuna volta succede l' *isterizia*; ec.)

Cura della colica biliosa:—

Se l'ammalato è giovane e forte; se il suo *pulso* caldo e pieno è pieno e frequente, fa d'uopo cavar *sangue*, e poscia fargli alcuni *clisteri*.

Berà copiosamente del *siero di latte chiarificato*, o Bevanda acidula. del *cremore acquoso di avena*; l'uno e l'altro *acidulato* col *succo di cedro*, o col *cremore di tartaro*. Se gli daranno dei brodi leggieri di pollo; nei quali si scioglierà un po' di *manna*, o se gli farà una *decozione di tamarindi*, o qualsivoglia altra *risana* Tisana lassativa. leggiera, *acida* e *lassativa*.

(Se gli applicheranno de' *clisteri addolcitivi*, composti con la *decozione delle piante mollitive*, o con l' *infusione della semenza di lino*, cui si aggiungerà l' *olio d'uliva*.) Come debbano esser composti i clisteri.

Oltre i *salassi* e i *diluenti*, è necessario di *somentare* Somenta fomenta e fomenta fomenta. il ventre del malato con de' pannolini inzuppati nell'acqua calda; e quando questi mezzi non riescono, fa d'uopo immergere l'ammalato sino al *petto* dentro un bagno caldo.

(Le *stropicciature*, di cui abbiamo favellato nella *nota 4* di questo Cap. convengono egualmente in questa malattia.) Stropicciature oleose.

In questa *colica* il *vomito* è di sovente difficilissimo a fermarsi: allora bisogna dare al malato dell' *acqua panata*, o una *infusione di menta di giardino* nell'acqua bollente. Se questi *rimedj* non riescono, si somministrerà la *pozione salina*, alla quale si aggiunge- Cosa bisogna fare allorché il vomito è ostinato.

ranno alquante goccioline di *laudano*, e si ripeterà secondo l'urgenza dei casi.

Teriaca
sopra la
forcella
del petto. Si potrà applicare sulla *forcella* del petto un *empia-*
stro di *seriaca*, e fare frequentemente dei *clisteri* con
sufficiente quantità di *seriaca* o di *laudano* (7).

Mezzi di preservarsi dalla colica biliosa.

vegetabili
teneri. Coloro che sono soggetti a de' ritorni frequenti di
colica biliosa, mangeranno pochissima carne, e si no-
driranno di leggeri *vegetabili*. In oltre prenderanno di
Lassativi
acidi, e
rinfriscan-
ti. tanto in tanto una *dose* di *fior di tartaro*, e di *tama-*
yindi, o qualunque altro *lassativo acido* e *rinfriscante*.
(Non possiamo raccomandare di più vantaggioso
Marmel-
lata di
Tronchin. in simili casi, quanto le frutta in gran copia, o il
lassativo dolce, conosciuto sotto il nome di *marmella-*
ta di Tronchin.)

ARTICOLO TERZO.

Della colica isterica.

Malattia
peculiare
alle fem-
mine. (**L** A *colica isterica* è, come si vede abbastanza, u-
na malattia peculiare alle femmine. Ella ri-
torna ad intervalli, e senza veruna cagione evidente.
Chi sono
quelle che Le femmine di *complexione* *lassa* e *molle*, di *tem-*

E' impor-
tante di at-
taccare co-
retto male,
rosso che si
presenta ..
Perché ? (7) Allorchè non opponesi di buon'ora ai progressi che può
fare la *colica biliosa*, il male imperversa sovente a segno che
i soccorsi dell'arte divengono inutili. La *bile* si altera, si di-
scioglie, e si corrompe di più in più; gl'*intestini* si gonfiano
prodigiosamente: restano ben presto corrotti e *cancerati*, e il
malato muore in mezzo ai soccorsi che se gli prestano.

Osservazio-
ne. In prova di quanto presentemente avanzo, trovasi una os-
servazione nell'*Effemeridi* di *Lamagna*. Un uomo d'una *co-*
stisuzione calda e asciutta, soggetto da lungo tempo ad una
colica biliosa, ebbe de' dolori atroci, evacuò delle materie
verdastre, e vomitò alcune materie nere. Ben presto dopo se
ne morì, senza che abbiassi potuto calmare la violenza del suo
male. Incontinentemente dopo la sua morte il ventre si gonfiò con-
siderabilmente. Si sparlò il cadavere: la maggior parte dei *vi-*
sceri furono trovati corrotti, o *ulcerati*, e il puzzo, che n'
esalò, era orribile.

peramento flemmatico e pituitoso, sono le più soggette a questa malattia. Quelle che anno di già patito alcuni accessi di male nervoso, e che sono state inviolite da parti laboriosissime, non stanno guari a provare sì fatta colica, che è loro sovente funesta.)

ci vana
soggette

Sintomi della colica isterica.

La colica isterica ha molta rassomiglianza con la colica biliosa. Ella è accompagnata da dolori acuti verso la regione dello stomaco, da vomiti, eci ma quanto l'inferma in questo male rigetta, è ordinariamente di colore verdastro.

L'ammalata si trova in un grande abbattimento, e in un avvillimento notabile: essa respira difficilmente. Caccia fuori delle fecce verdastre; i dolori non sono fissi, ma ora da una parte, ora dall'altra del ventre. Alle volte questi dolori cessano per quindici giorni o tre settimane, e riedono poscia con più di furore che mai. Tali sono i sintomi che caratterizzano particolarmente cotesto male, che talvolta va congiunto all'isteria; ma d'ordinario questa isteria da se sola in pochi giorni sparisce.

Sintomi
caratteri-
stici.

(La più leggera passione, uno smodato esercizio, la menoma fregolatezza sono capaci di far rinascere questa specie di colica, allorchè s'è dileguata.)

Cura della colica isterica.

In questa specie di colica tutte l'evacuazioni, come quelle che risultano dal salasso, dai vomitori, dai purgativi, sono nocive, e bisogna evitare tutto ciò che tende a infievolire e ad abbattere la malata.

Ogni specie di evacuazione è contraria in questa colica.

Tuttavolta se il vomito diviene considerabile, si darà dell'acqua tiepida, o del posset leggiero, per nettare lo stomaco. Poscia se le faranno prendere quindici, venti, venticinque goccioline di laudano liquido in un bicchierino d'acqua di cannella; il che si ripeterà ogni dieci o dodici ore, finchè i sintomi sieno calmati.

Cosa bisogna fare allorchè il vomito è considerabile.

Si può far prendere ogni sei ore, quattro o cinque pillole fesside, e subito dopo un bicchiere d'infuso.

Pillole fesside.

Tintura di
castoreo.

Balsamo
del Perù.
Empiastro
antistenterico.

Gli uomini
ipocondri-
ci sono sog-
getti ad u-
na colica
più o meno
frequente.

sione di *puleggio*. Se l' *assa fetida* paresse troppo spiacevole, come accade talvolta, si porgerà un cucchiaino da tavola di *tintura di castoreo* in un bicchiere d' *infusione di puleggio*; o trenta, quaranta goccioline di *balsamo del Perù*, stillato sopra un pezzo di zucchero. Si può ancora far uso dell' *empiastro antistenterico*, che spesso produce dei buoni effetti.

(Gli uomini *ipocondriaci* sono di spesso soggetti a de' dolori che anno molta rassomiglianza con quelli della *colica isterica*: per la qual cosa tutto ciò ch' ora s'è detto in questo Articolo, conviene altresì nella *colica* che si può chiamare *ipocondriaca*. Del resto presso gli uomini e le femmine, si fatta *colica* non è talora, che un *sintomo* dell' *affezione ipocondriaca e isterica*, delle quali parleremo Tom. III, Cap. XLV, §. XII e XIII.)

ARTICOLO QUARTO.

Della colica nervosa.

Chi sono
quelli che
vanno sog-
getti a que-
sta malat-
tia, e in
qual paese
si scopre
frequente-
mente.

I Lavoratori delle *miniere*, i *fonditori*, i *facitori di biacca*, ec. come abbiamo detto Tom. I, Cap. II, nota 5, sono molto soggetti a questa *colica*. Essa è comunissima nelle provincie d' Inghilterra e di Francia, dove si bee del *sidro*; e si crede originata dai vasi di *piombo* che si adoperano per preparare sì fatto liquore. E' ancora frequente nell' Indie Occidentali, dove si appella *colica secca* (8).

Nomi dif-
ferenti che
porta que-
sta spezie
di *colica*.

(8) Tutti coloro che bevono del *vino* addolcito col *litare giro*, come si è osservato Parte I, Cap. III, nota 9; i *piratori*, che fanno uso di parecchie preparazioni di *piombo*, i *vasaj*, che lo fanno entrare nelle loro invetriature; i *fonditori di caratteri*; i *lapidari*; coloro che bevono dell'acqua che sia passata per de' tubi, o trattenuta in vasi di *piombo*; che mangiano del *burro*, in cui si abbia mescolato della *biacca* per renderlo più pesante; coloro che bevono de' vini aspri ed *agri*, ec. ci vanno soggettiissimi. Ecco perchè questa malattia si nomina ancora *colica de' Piombaj*, o del *piombo*, de' *Piratori*, de' *Vasaj*, del *Poisou*, *vegetabile*, *metallica*, *spasmodica*, *convulsiva*, ec. Imperciocchè non è da dubitare che il Sig.

Sintomi della colica nervosa.

(Viene annunziata da alcuni dolori vaghi del ventre, da inquietudini, e da scuotimenti convulsivi. La *frischezza*, i dolori di *stomaco*, i *vomiti*, il pallore del viso, accompagnano eziandio questo periodo. I malati anno la testa pesante e aggravata, gli occhi stralunati: perdono alle volte l'uso della ragione.

Sintomi
caratteristici.

Il dolore del ventre prende ben presto aumento, e si fissa verso il *bellico*, ch'è avvallato e ritirato all'intentro. Spesso questo dolore è sì vivo, che il malato si dimena per il letto, mandando dell'altre gridi. Sembra in allora che una compressione violenta diminuisca i suoi mali. In questa epoca le *orine* e gli escrementi sono trattenuti: l'orificio dell'*ano* sembra risalito e chiuso *spasmodicamente*. Sopravvengono altresì delle *convulsioni*, la perdita della vista, e della voce: talvolta ancora degli *accessi epilettici*.

Sintomi
caratteristici.
Raci.

In questo tempo il *polsò* è *vario* e presso che naturale. Se i malati non sono prontamente soccorsi, l'*estremità* superiori si rendono paralitiche; le dita si piegano, e questi accidenti secondarj sembrano essere la *crisi* della malattia: altre volte, allorchè il male peggiora, gl'infermi muojono tormentati da dolori terribili.)

Questa *colica* cagiona de' dolori più violenti che tutte le altre malattie degl'*intestini*, e spesso dura

Questa specie è la più dolorosa di

BUCHAN non confonda con la *colica nervosa* tutte quelle che abbiamo or' ora nominato.

Noi sappiamo che questo sentimento non è quello di tutti i Medici. Ma egli è tanto più fondato, che le differenti descrizioni che abbiamo di queste malattie, fatte dai Medici dell'uno e dell'altro partito, presentano sempre i medesimi caratteri essenziali. V'abbisogna molto affai perchè si vada egualmente d'accordo sulla cura. I metodi che si seguono, sono diametralmente opposti. Il primo, che prescrive l'Autore, si chiama *antisflogistico*; l'altro si nomina *metodo forse*. Siccome questo ultimo sembra avere molti fatti in suo favore, noi ne faremo l'esposizione in seguito di quello del Sig. BUCHAN.

tutte le coliche.

per lungo tempo. L' ho veduta continuare pel tratto di otto o dieci giorni, accompagnata in tutto questo tempo da pertinace *stitichezza* di ventre, che resisteva a tutti i soccorsi della Medicina, ma cedere però alla fine, e il malato riaversi (b). Ma in generale questa malattia lascia l'infermo debole, termina sovente con la *paralisi*.

Cura della colica nervosa.

Metodo
antiflogi-
stico.

Il governo generale di questa malattia s' accosta sì da vicino a quello della *passione iliaca*, o *infiammazione del basso ventre*, che non crediamo dovere insistervi d'avvantaggio. Bisogna lubrificare il ventre mercè di blandi *purgativi*, dati in piccole dosi, e ripetuti soventemente: fa di mestieri ajutare l'azione di questi *purganti* col mezzo di *clisteri oliosi*, di *fomenti*, ec. L'olio di *castoreo* passa per un rimedio singolarmente appropriato in questo male. Si esibisce a cucchiaj, sino a due o tre oncie, e in *clisteri*, alla dose di cinque o sei oncie.

Catrame
internamente.
Dose.

Il *catrame* delle *Barbadi* è ancora riguardato come un *rimedio* efficace nella *colica nervosa*. Si può usarlo alla dose di due dramme, tre volte al giorno, o più sovente, se lo *stomaco* può soffrirlo.

Effervamente in
stropicciatura.

Il *catrame* meschiato con una quantità eguale di *rum* forte, conviene ancora per stropicciare la spina del dorso, nei casi di formicolio, o di qualche altro *sintomo* di *paralisi*. Se non si può procacciarsi di questo *catrame*, si stropiccerà il dorso con degli *spiriti gagliardi*, o con un po' d' *olio di noce moscata*, o di *samerino* (9).

(b) Siccome il *summo* del *sabacco* introdotto negl' *intestini* per la via dell' *ano* riesce sovente a lubrificare il ventre, ladove tutti gli altri *rimedj* sono frustranei; richiedesi che tutti i *Cerusici* si procurino l' *strumento* inventato a tal oggetto, di cui parleremo Tom. IV, Cap. LV, §. II. Si può averlo con poca spesa, e servirà in parecchie altre occasioni, come per ravvivare le persone sommerse, ec.

(9) Noi non addurremo già le ragioni, per cui il metodo che imprendiamo a descrivere, differisca così essenzialmente

Se il malato si trova debole e languido dopo che il male è guarito, fa d'uopo ch'egli faccia del *me-* Cosa biso-
gna fare se
il malato è

da quello che s'è di presente letto. Tali disquisizioni non potrebbero interessare che i Medici, e non ve n'ha pur uno che non lo sappia. Diremo solamente che tutte le *calci metalliche*, e sopra tutto quelle del *piombo*, essendo potentissimi *disseccativi*, è più che probabile che i primi *simptomi* della *colica nervosa* non sieno prodotti che dal disseccamento degli umori destinati a lubrificare gl'*intestini*. Ciò sembra provato dai *Pittori*, dai *Doratori*, ec. che sentono alla bella prima una grande siccità nelle narici, nel gorgozzule, al palato, e del dolore nelle *sonfili*, ec.

Ciò supposto, la malattia non è dunque essenzialmente *infiammatoria*. E' anzi possibilissimo, come alcuni l'anno preteso, ch'essa non lo sia giammai che per effetto del tempo, allorchè si ha temporeggiato col *metodo antisflogistico*, e che la malattia s'è avanzata a segno di divenire *infiammatoria*.

Ora, ecco il metodo per prevenire questi accidenti. Questo fu il metodo del Sig. DUBOIS Medico della Carità, che si segue anche oggidì in questo Spedale, ed è praticato dal maggior numero dei Medici della Capitale e della Francia.

Allorchè la malattia è recente, (ed è di somma importanza l'attaccarla ne' suoi principj con questo metodo, per le ragioni poc'anzi esposte,) si comincia dall'applicare al malato un *clistere* con quantità sufficiente di *vino* puro e di *olio* di *noce*, sbattuti insieme. Una o due ore dopo, se ne fa un altro composto nella seguente maniera:

Prendete <i>sena</i> mondata,	due dramme;	<i>Clistere</i>
<i>elektuario diascenico</i> ,	un'oncia;	forte.
<i>benedetto lassativo</i> ,	mezz'oncia;	
<i>male mercuriale</i> ,	due oncie;	
e la <i>pulpa</i> d'una <i>colloquintida</i> .		

Fate bollire tutte queste sostanze in una foglietta d'acqua; filtrate.

Dopo l'effetto di questo *clistere*, si ripete quello d'*olio* e di *vino* puro. Il dì seguente si farà vomitare il malato con tre o quattro grani di *emetico* in beveraggio; e subito dopo l'azione del vomitorio, se gli fa prendere una dramma di *seriaca*, con un grano di *laudano*.

Nel terzo giorno della malattia si ritorna all'uso dei *clisteri*, e si provoca parimente il vomito. Il quarto giorno si purga con la medicina seguente:

Prendete <i>sena</i> mondata,)	<i>Purgativo</i>
<i>samarindi</i> ,) di ciascheduno un'oncia;	in parecchi
<i>sal d'Epsom</i> ,)	bicchieri.
<i>sal di tartaro</i> ,	due oncie.	

debole dopo la guarigione della colica, o che usi la chinachina infusa nel vino.

Fate bollire il tutto in

acqua comune, due libbre.
Feltrete, e sciogliete nella colatura

elettuario diasenico, quattro dramme.
sciloppo di vanno, mezz' oncia.

Nella mattina si darà questa *porzione purgativa* in parecchi bicchieri, a tre quarti d'ora di distanza l'uno dall'altro.

Si sosterranno i rimedj, che abbiamo di presente indicato, con la mezza dramma di *seriaca* e il grano di *laudano*, esibiti tutte le sere, e con la seguente tisana sudorifera.

Prendete legno guajaco, e *sassafrasso*, un' oncia;
radice di *squina*,)
salsaparilla,) tagliate, di ciascuna tre oncie.
bardana,)

Si farà macerare tutto per dodici ore in un vaso di terra invetriato, e dentro tre fogliette d'acqua, che si faranno bollire, sicchè si riducano a due.

Il malato ne berà parecchi bicchieri per giorno.

Si darà altresì, allorchè le forze dell'infermo saranno da troppo abbattute, la *porzione cardiale*, di cui eccone la formula.

Prendete acqua di *melissa semplice*,) di ciascheduna un' oncia;
di *cardo sano*,)
di *tre noci*,) due oncie;
confezione giacintina tre dramme;
sciloppo di garofani un' oncia.

Miscolate.

La dose di questa *porzione* è un cucchiaino ordinario per ora.

Allorchè si abbia fatto fronte alla malattia dai primi giorni della sua esistenza, se ne ottiene il più sovente la guarigione a capo d'una settimana. Se i dolori non sono in allora totalmente calmati, bisogna continuare il cammino ora indicato, e dar luogo a' *purgativi*, tanto l'uno all'altro vicino, quanto le forze del malato lo permetteranno.

Nei giorni d'intervallo dei *purgativi*, si potranno esibire i bocconcini seguenti.

Prendete aloè succosino,) di ciascheduno dieci grani;
estratto di *rabarbaro*,)
di *elleboro*,)
diagridio,) di ciascuno quattordici grani;
sciarrappa,)

sciloppo di *vanno*, quantità sufficiente per fare cinque o sei bocconcini, che l'ammalato prenderà il giorno innanzi del *purgativo*.

Quando Non deesi farli leciti la cacciata di sangue in questa colica, se non quando i *segni* sono al più alto grado d'intensità,

Mezzi di preservarsi dalla colica nervosa. 331

Se la malattia termina in una *paralisi*, allora l'*acqua di Bath* convengono singolarmente (10).

Altrorchè
termina in
paralisi.

Mezzi di preservarsi dalla colica nervosa.

Per prevenire questa *colica* non bisogna mai mangiare frutta acerbe, nè giammai bere liquori *acidi*, *aspri*, ec.

Coloro che lavorano il *pianco*, non devono mai metterli all'opera digiuni; i loro *alimenti* devono essere *aliosi* o *grassi*. Prenderanno un bicchiero d'*olio di uliva*, con un po' d'*acquavite*, o di *rum*, in ciascuna mattina; ma non useranno mai questi *liquori spiritosi* soli.

Alimenti
grassi e
olio.

Gli *alimenti liquidi* sono quelli che loro più convengono, come li brodi *grassi*, ec. ma richiedesi che questi *alimenti* sieno nutritivi.

Liquidi.

Sortiranno di spesso, e per poco tempo, dalle loro officine, dove l'*aria* è corrotta. Eviteranno sopra tutto la *stitichezza*, con li mezzi prescritti Tom. III, Cap. XLI.

Sortire all'
aria, ed e-
vitare la
stitichez-
za.

Nell'Indie Occidentali e sulle Coste della *Guinea*,

Come si
giunga a

o che la malattia è inveterata e accompagnata da *febbre*. In allora conviene in *metodo antispasmodico* del Sig. BUCHAN; in tutti gli altri tempi di cotesto male il *salasso* sarebbe inutile: sovente anzi potrebbe avere delle conseguenze pericolose.

(10) Queste acque traggono il loro nome da una Città d'Inghilterra situata nel Ducato di *Somerset*. Elleno sono calde; possono venire rimpiazzate dalle nostre *acque termali*, come quelle di *Vichi*, di *Berbone*, di *Monte d'oro*, di *Plombières*, di *Berege*, di *Bagnere*, ec. sopra tutto da quelle di *Balaruc*, che passano per *specifiche* contro la *paralisi*. Questa specie di *paralisi* sembra essere quella su cui l'*elettricità* ha il più di potenza. (Ved. *Conject. sur l'Electr. Med.* del Sig. GARDANE.)

Elettricità.

Ma questo Autore crede che per rendere l'elettrizzazione più salutare, si dovrebbero preparare i malati con alcune *acque minerali*, quali sono quelle che abbiamo or' ora nominato, e combinare l'azione dei *rimedj* interni ed esterni con quella dell'*elettricità*, come lo diremo Tom. III, Cap. XLV, §. III, nota 4.

preferarsi
nell' India
Occidentale.
li.

s'è ricavato un gran vantaggio, per prevenirè sì fatta *colica*, dallo portare un pezzo di flanella intorno alla cintura, e dal prendere per bevanda una *infusione di ginepro* in guisa di tè.

ARTICOLO QUINTO.

Riflessioni sopra la cura delle coliche in generale.

NOI potremmo far menzione di molte altre specie di *colica*; ma tante divisioni non servirebbero che a stancare il Lettore. Abbiamo favellato delle più essenziali, e si dee farvi attenzione, perchè la loro cura è difficilissima.

Soccorri
egualmen-
te utili in
ogni specie
di colica.

Nulla di meno, quando anche ogni qualunque persona non fosse bastante di capire queste distinzioni, si può tuttavia, aspettando il Medico, essere d'una assai grande utilità al malato, coll'osservare i precetti seguenti. A cagione d'esempio, in ogni specie di *colica*, di bagnare i piedi e le gambe nell'acqua calda; di applicare sul ventre e sopra lo *stomaco* de' pannolini, o delle flanelle inzuppate nell'acqua calda; di far prendere all'infermo delle copiose bevande *diluenti*, *mucilaginosi*; di fargli da ultimo alcuni *clisteri molli* ogni due, o tre ore.

§. IV.

*Dell'infiammazione dei reni, o nefritide,
e della colica nefritica.*

Ci sono due
specie di
nefritide:
la vera e la
calcolosa.

(GLI Autori distinguono due specie di *nefritide*: la vera, ch'è l'*infiammazione dei reni* propriamente detta; e la calcolosa, ch'è la *colica nefritica*. Ma la cura di queste due malattie essendo la stessa, noi le faremo passare d'accordo parlando del governo, riserbandoci a darne i caratteri peculiari a ciascuna d'esse, nella descrizione dei *simptomi*.)

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni dell' infiammazione dei reni , e della colica nefritica ,

Questa malattia può essere cagionata da tutte le cagioni che producono una *febbre infiammatoria*. Può ancora provenire da percosse, o da contusioni dei *reni*; da calcoli, o da *renella* arrestata in questi *visceri*, da *rimedj diuretici forti*, come lo *spirito di serebinto*, la *sintura di canterelle*, ec.

I moti violenti, come un passeggio sforzato o a piedi, o a cavallo, massime in tempo caldo, o tutto ciò che può sospingere il *sangue* in troppa abbondanza dentro i *reni*, è valevole a cagionare questa malattia. Essa può egualmente procedere dallo stasene coricato troppo mollemente, dal tenersi troppo a lungo sul dorso. Gli sforzi involontarj, gli *spasmi* nei *canali orinarj*, ec. possono ancora darvi motivo.

(Questa malattia è sovente ereditaria. Le persone studiose; e quelli che menano una vita sedentaria, ci sono soggetti. Ella è ancora più funesta ai bevitori e ai libertini. I *melancolici*, e principalmente i *gottofi*, ci sono assai esposti. Quelli alla fine che ne anno sofferto uno o più attacchi, devono aspettarne il ritorno, se non seguano la *regola* di *visto* prescritta alla fine di questo §.)

Chi sono
quel che ci
sono espo-
sti.

ARTICOLO SECONDO.

Sintomi dell' infiammazione dei reni, e della colica nefritica.

IL malato sente un dolore *acuto* nel dorso e nei *reni*. Egli ha della *febbre*: sente un intormentimento, o un dolore oscuro nella coscia del lato infermo.

L'*urina* è dapprima chiara, in seguito diviene rossa; ma nella maggior furia del male, d'ordinario è pallida, esce con difficoltà, con ardore, e non se

Sintomi
comuni al-
le due spa-
zie di ne-
fritide e al-
la colica
nefritica.

ne caccia ordinariamente fuori che poca alla volta.

L' infermo soffre molto , quando vuole camminare , o tenersi drizzato . Si corica più agevolmente sopra il lato malato , che sull' altro . Egli ha delle propensioni al vomito ; anzi vomita pressò poco come nella *colica biliosa* .

Caratteri
che la di-
stinguono
dalla coli-
ca biliosa .

Queste malattie però differiscono da sì fatta *colica* , in quanto che il dolore ha la sua sede più al di dietro , e che difficilmente si urina ; *sintomi* costanti nell' *infiammazione dei reni* , e che sono rari nella *colica biliosa* .

(Ecco i *sintomi* caratteristici dell' *infiammazione dei reni* propriamente detta , e della *colica nefritica* .

Sintomi
particolari
all' infiam-
mazione
dei reni , o
sia alla vera
nefritide .

La *nefritide vera* , o *infiammazione dei reni* , comincia dalla *febbre* ; e questa *febbre* non è l' effetto del dolore che cagiona il *calcolo* , come nella *colica nefritica* . Ella non è accompagnata da intormentimento nelle gambe , e da contrazione dei *testicoli* , *sintomi* della *colica nefritica* . Del resto la *febbre* è ora forte ed ardente ; ora mediocre , con un po' di durezza di *polsò* . Il malato sente in uno de' *reni* , o in tutti e due in una volta , un dolor gravativo , che corrisponde alla terza costola cominciando a contar dal basso , e a tre dita trasverse dalla *spina del dorso* . A questo *sintomo* si accoppia l' *ansietà* , la *vigilia* , le *nausee* , e il vomito . Rigetta da prima ciò ch' è contenuto dentro lo stomaco , poscia della *bile* : il ventre è stitico ; l' *urina* è d' un rosso infiammato , e talvolta sanguigna : talvolta nel colmo della malattia ella cessa di uscire .

Sintomi
particolari
alla nefri-
tide o co-
lica nefri-
tica .

La *nefritide calcolosa* , o *colica nefritica* , si distingue dalla vera *nefritide* , o *infiammazione dei reni* , 1. da un dolore più *acuto* cagionato da un *calcolo* , che sarà stato posto in movimento da un *esercizio* violento , dalle scosse d' una vettura ; ec. questo dolore è *gravativo* per intervalli , e riede più ostinatamente : 2. perchè l' *urina* è sanguinosa , mucosa , e talvolta sabbiosa : 3. dall' intormentimento della gamba dello stesso fianco : 4. dalla contrazione del *testicolo* , e da un dolore che scorre lungi la via dell' *uretere* : (Ved. in appresso la nota e di questo §.) 5. dal vomito

Rimedj contro l'infiammazione dei reni. 335
 che ricompare in ciaschedun attacco. Questo parossismo dura parecchie ore; alle volte una, due ore di seguito: il fine viene annunziato da uno scorrimento di urine, o dalla fortita di renella, o d'un calcolo.)

ARTICOLO TERZO.

Visto che bisogna prescrivere nell'infiammazione dei reni, e nella colica nefritica.

Bisogna evitare tutto ciò ch'è di *riscaldante* e d' *Alimenti*.
irritante natura. Per la qual cosa gli *alimenti* faranno leggieri: il malato prenderà della *panatella*, del brodo tenue, de' vegetabili teneri, ec.

Prenderà in abbondanza alcune *bevande ammollienti* *Bevande*.
 leggieri, come il *siero di latte*; una *infusione di menta* acconcia col *mele*; una *decozione di radice di altea*, di *orzo*, e di *legorizia*, ec.

Fa di mestieri che, malgrado il *vomito*, il malato beva assiduamente de' semplici *forfi*, o a piccole *Vantaggi*
fiate soventemente ripetute, di questi liquori, o di *de' diluati*
 qualunque altro egualmente *diluente*. Niente v'ha di *prescritti in*
 migliore, nè più calma l'*infiammazione*, nè distrugge più efficacemente la cagione *ostruente*, quanto i *gran quan-*
diluenti, presi così in grande quantità, ma poco per *tà, ma*
 volta. *poco per volta.*

Si terrà l'infermo agiato e tranquillo. Si difenderà dal freddo, finchè sussisteranno i *fantomi d'infiammazione*.

ARTICOLO QUARTO.

Rimedj che bisogna amministrare nell'infiammazione dei reni, e nella colica nefritica.

La *emissione di sangue* è ordinariamente necessaria, *Salassi ne'*
 massime nei principj di questo male. Si possono *principj*
 levare dieci o dodici oncie di *sangue* dal braccio o *dove biso-*
 dal piede; e se i dolori e l'*infiammazione* persistono, *gna farli.*
 bisognerà ripetere il *salasso* dentro le ventiquattr'ore, principalmente se il malato è di *temperamento*
pletorico.

Mignatte. Si possono ancora applicare le *mignatte* alle *vene emorroidali*; poichè sì fatta *evacuazione* apporta singolar sollievo al malato.

Fomenti. Si applicheranno sulla parte oppressa de' pannilini imbevuti d'acqua calda, o delle vesciche piene d'acqua calda, e si rinnovelleranno a misura che perderanno il calore. Si renderanno queste vesciche più efficaci, riempiendole d'una *decozione* di fiori di *malva* e di *camomilla*, cui si aggiungerà un po' di *zafferano*, mescolato con circa un terzo di *latte fresco*.

Clisteri
mollitanti
o lassativi. I *clisteri mollitivi* devono essere ripetuti di spesso; e se non muovono il ventre, vi si aggiungerà del *sale*, (Ved. pag. 313 di questo Vol.) del *mele*, o un po' di *manna*.

Stropicciare nel caso di renella o di calcolo; diuretici blandi. Si metteranno in opra gli stessi *rimedj*, se v'abbia della *renella*, o qualche *calcolo* nei *reni*. Ma se la *renella*, o il *calcolo* parte dai *reni*, e viene a situarsi in uno degli *ureteri* (c), oltre li *fomenti*, farà bene di stropicciare il fianco infermo coll'olio di *mandorle dolci*, e di dare qualche blando *diuretico*; come dell'*acqua di ginepro*, *acconcia* con un po' di *sciloppo di altea*; ovvero un cucchiaino da caffè di *spirito di nitro dolcificato*, con alquante goccioline di *laudano liquido* in un bicchiere della bevanda ordinaria del malato.

Esercizio. Richiedesi ancora dell'*esercizio* sia a cavallo, sia in carrozza, qualora l'infermo si trovi in istato di tollerarlo.

Conseguenze del male, allorchè non termina dentro gli otto primi giorni. Allorchè il male si prolunga sino al settimo o ottavo giorno; che il malato si lagna d'infortimento, di peso nei *reni*, e che soffre dei frequenti *accessi* di *freddo*, e de' movimenti febbrili irregolari, ec. v'è ogni motivo di sospettare che si ammassi della materia in queste *viscere*, e che vi si formi un *ascesso*.

Segni che indicano la (Si rileva la formazione di questo *ascesso* dalla remissione del dolore, dai *brividi* più o meno frequenti,

Cosa sieno gli ureteri. (c) Gli *ureteri* sono due canali lunghi e stretti, uno da ciascun fianco, pei quali l'*orina* scola dalla bacinella dei *reni* dentro la *vescica*. Essi restano alle volte ingorgati da alcuni *calcoli*, o da *renella*, che nel partire dai *reni* ivi s'impegna.

ti, dal senso di peso e d'intormentimento nella parte. E' certo ch'egli è già formato, allorchè dopo questi accidenti, v'è *abbattimento*, ardore, tensione nello stesso luogo, e allorchè l'*orine* sopo *putrido e fetide*.

Formazione d'un ascesso; Che lo in dicano formato;

Questa *infiammazione* viene alle volte seguita da *cancrena*, ch'è annunziata dalla cessazione subitanea dei dolori; da un *polsa intermittente*, da *sudor freddo*, da *singhiozzo*, da soppressione totale d'*orine*, o da *urina* d'un color livido, *nericcio*, e puzzolente, ec.

Che indicano la cancrena;

Allorchè l'*infiammazione* del *rene* termina in *scirro*. Una scirro. la coscia dello stesso lato diviene paralitica, o il malato zoppica; e questo male è senza *rimedio*; il che sovente produce una lenta *tabe*, o l'*idropisia*, ec.)

Quando le *orine* additano che l'*ascesso* è omai formato in questa parte, bisogna che l'infermo si astenga da ogni *alimento* acre, crudo, salato: conviene che si nodrisca di *vegetabili teneri* e *mucillaginosi*; di frutta, di brodi di animali giovani, fatti con dell'*orzo* e degli erbaggi comuni, ec.

Alimenti quando l'ascesso è formato.

Se gli darà per *bevanda* del *siero* di *latte*, del *latte* di *butirro*, che non sia punto *inagrito*. Il *latte* di *butirro* passa per uno *specifico* nell'*ulcere* dei *reni*. Ma acciocchè egli agisca a tenore delle sue facoltà, deve si continuare l'uso per un tempo ben lungo.

Bevanda nello stesso caso. Latte di burro.

Si riguardano ancora le *acque ferrugginose*, o *marziali*, come sovrane in tai casi. E' facile il procacciarsi questo *rimedio*, poichè se ne ritrova in tutte le parti dell'Inghilterra (11). Devonsi parimente prendere alla lunga, se si voglia ritrarne de' buoni effetti.

Acque minerali ferrugginose.

(Se l'*ascesso* sbocca al di fuori, il che avviene talvolta, sebben di rado, e che si senta la *fluttuazione* a traverso de' *integumenti*, forza è in allora

(11) Le *acque ferrugginose*, o *marziali*, non sono meno comuni in Francia. Quelle di cui servesi comunemente, sono quelle di *Passy*, presso Parigi; di *Cransac*, nel Rouergue; di *Vals*, nel Vivarais; di *Forges*, in Normandia; di *Provins*, in Champagné; di *Boulogne*, in Picardia, ec.

di chiamare un Cerufico abile, il quale farà l'operazione chiamata *nefrotomia*; dopo la quale si continuerà il *vizio* e i *rimedj* prescritti durante l'*ascesso*.

Se il male da indizio di voler terminare in *scirro*, si consulterà Tom. III, Cap. XLVII, §. II; e se minaccia la *cancro*, si leggerà Tom. IV, Art. III del §. III del Cap. LII.)

ARTICOLO QUINTO.

*Mezzi di preservarsi dall'infiammazione dei reni,
e dalla colica nefrica.*

Da cosa
convenga
astenersi.

Alimenti.

Esercizio.
Come deb-
bano ada-
giarsi nel
letto i ma-
lati.

Coloro che vanno soggetti a ricorsi frequenti dell'*infiammazione de' reni*, o degl'ingorgamenti di questi *visceri*, si asterranno dal *vino*, segnatamente da quello che abbonda di *tartaro*. I loro *alimenti* faranno leggieri, e di facile *digestione*. Faranno un *esercizio* moderato. Non devono nè troppo coprirsi nel letto, nè giacere troppo lungo tempo sul dorso. (Uopo è che rinunzino di collocarsi sulle piume e sulle lane, e che si contentino di riposare sui crini.)

§. V.

Dell'infiammazione della vescica.

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni dell'infiammazione della vescica.

L'*infiammazione della vescica* ha in generale le stesse cagioni che quella dei *reni*: (la troppa copia d'*urina* può ancora cagionarla. Ella può egualmente procedere dalle *cancerelle*, dagli *empiastrì vescicatorj*, da una piaga, ec.)

ARTICOLO SECONDO.

Sintomi dell' infiammazione della vescica.

Ella si manifesta da dolore acuto nella parte inferiore del *basso ventre*, da difficoltà d' *orinare*; accompagnata da un poco di *febbre*; da incitamenti continui di scaricare il *ventre*, e di cacciar fuori l' *urine*.

(Questa malattia viene caratterizzata da un tumore ovale nel *bacile*. Questo tumore è doloroso, e il dolore si esaspera, quando si palpa il ventre: sopravviene senza indugio la *disuria*, l' *iscuria*, e una *febbre* continua, cui tien dietro la *vigilia*, la *sete*, e il *delirio*. L' *estremità* sono fredde; il malato soffre una *stitichezza* ostinata; il tumore è più duro quando l' *urina* stagna nella *vescica*.)

Sintomi caratteristici.

ARTICOLO TERZO.

Cura dell' infiammazione della vescica.

PER guarire questa malattia fa di mestieri seguire lo stesso governo che abbiamo consigliato nella malattia precedente Art. III e IV del §. IV di questo Cap. Bisogna che la dieta sia tenue e poco nutritiva; che la bevanda sia rinfrescante e diluente.

Dieta tenue. Bevande diluenti e rinfrescative.

La cacciata di sangue è necessarissima sul principio di questo male, e presso le persone robuste riesce spesso utile il ripeterla. Si applicheranno replicatamente alcuni *fomenti* sul *basso ventre* con l' acqua calda, o con una *decozione* di *pianze mollicanti*. Si faranno tre o quattro *clisteri mollicivi* per giorno, ec. il malato farà uno o due *bagni* d' acqua tiepida dentro lo spazio di ventiquattr' ore. Si asterrà da ogni sostanza riscaldate, acre, irritante; viverà assolutamente di brodi leggeri, di *cremore* di *avena*, e di altri *vegetabili teneri*.

Cacciata di sangue.

Fomenti.

Clisteri mollicivi.

Bagni.

La soppressione d' *urina* può dipendere non solamente dall' *infiammazione* della *vescica*, ma ancora da parecchie altre cagioni; come da una tumefazione del-

La soppressione d' urina, conseguenza ordinaria

dell' in-
fiamma-
zio-
ne della ve-
scica, può
dipendere
da molte
altre ca-
gioni.

le *vene moroidiali*; da *materie fecciose* indurite, e ar-
restate nel *retto*; da una *pietra* nella *vescica*; da *car-*
nosità nel canale dell' *uretra*; da una *paralisi* della *ve-*
scica; da *affezione isterica*, ec. Ciascheduna di queste
cagioni richiede un governo particolare, che non es-
porremo in questo luogo. (Ved. Cap. XXI, §. II,
di questa Parte II.)

Idea della
cura che
esigono
queste ca-
gioni.

Offerveremo solamente che in ciascheduna di esse i
rimedj i più blandi sono sempre i più sicuri; imper-
ciocchè i *diuretici* forti e gli altri *rimedj* di natu-
ra *irritante*, ordinariamente aumentano il male, o il
pericolo. Ho veduto alcune persone che si sono am-
mazzate, per aver introdotto una *tenta* nel canale dell'
uretra, a fine di distruggere, per quanto dicevano,
l'ostacolo che si opponeva all' uscita dell' *orina*; e al-
cuni altri si cagionarono una violenta *infiammazione*
della *vescica*, prendendo pel medesimo oggetto de' for-
ti *diuretici*, come l' *olio di terebinto*, ec.

§. VI.

Dell' infiammazione del fegato, o colica epatica.
(Ved. nota 5. di questo Cap.)

Essa è dif-
ficilissima a
guarirsi.
In qual-
modo ter-
mini il più
delle vol-
te.

IL *fegato* è meno soggetto all' *infiammazione* che la
maggior parte degli altri *visceri*, perchè la *circo-*
lazione vi si eseguisce lentissimamente; ma ogni qual
volta vi si è formata l' *infiammazione*, è difficilissimo
il guarirla, e va di spesso a terminare nella *suppura-*
zione, o nello *scirro*.

ARTICOLO PRIMO.

Cagione dell' infiammazione del fegato.

Oltre le cagioni comuni a tutte l' *infiammazioni*,
quella del fegato può ancora procedere da uno
stato di eccessiva *grassezza*; da uno *scirro* della sostan-
za del *fegato*; da sforzi violenti cagionati da *vomiti*;
in tempo che il *fegato* è già viziato; da un *sangue*
riscaldatissimo, *atrabile*; da tutto ciò che può rin-
frescare subitanamente il *fegato*, dopo ch' è stato for-

temente riscaldato; da *calcoli* che si oppongono al corso della *bile*; da stravizzi di vini gagliardi e di *liquori spiritosi*; dall' uso di alimenti conditi con *aromi*, riscaldanti; *affezioni ipocondriache* pertinaci, ec.

ARTICOLO SECONDO.

Sintomi dell' infiammazione del fegato.

Questa malattia si palesa da una tensione dolorosa nel lato dritto, sotto le *costole spurie*, accompagnata da un po' di *febbre*; da senso di peso o di ripienezza in questa parte; da *difficoltà di respiro*; da noia pegli *alimenti*; da sete ardente, con una tinta pallida o gialliccia alla *pelle* e negli occhi.

I *sintomi* di questa malattia variano a tenore del grado d' *infiammazione*, e anco secondo la parte del *fegato* ch'è infiammata. Talvolta il dolore è sì leggero, che nemmeno si sospetta che v'abbia *infiammazione*.

Quando però accade che la parte superiore o convessa del *fegato* ne sia attaccata; il dolore è allora più acuto, il *pulso* più *veloce*; e il malato è di spesso tormentato da una *tosse secca* e dal *singhiozzo*: il dolore si estende sino alla spalla: L' infermo soffre della difficoltà a tenersi colcato sul lato manco, ec.

Questa malattia differisce dalla *pleurite*, in quanto che il dolore è meno vivo; ch' egli è situato sotto le *costole spurie*; che il *pulso* non è sì duro, e che il malato prova della difficoltà a coricarsi sul lato opposto a quello ch'è la sede dell' *infiammazione*, cioè sul lato sinistro.

La si distingue dall' *affezioni isteriche* e *ipocondriche*, dal grado di *febbre* da cui ella è sempre accompagnata.

Si ravviva sopra tutto dal colorito pallido e verdastro dei malati che ne sono molestati; colore che non si osserva nell' altre malattie soprammentovate; questo n'è quasi il solo carattere distintivo. Da questo segnale appunto, dice il Sig. LIEUTAUD, si distingue principalmente l' *infiammazione del fegato*; da quella della *pleura* e dei *muscoli dell' addomine*; malattie

Sintomi dell' infiammazione della parte convessa del fegato.

Cosa distingue questa malattia dalla pleurite;

Dall' affezioni isteriche e ipocondriche.

Sintomi caratteristici.

che, a giudicarne dal luogo dove corrisponde il dolore, si rassomigliano assai, Avviene ancora che il dolore del *fegato* si comunichi all'altre parti del *bassa ventre*; il che presenta, come si vede benissimo, delle difficoltà che non si possono superare che da una lunga esperienza e da molta sagacità,)

Maneggiata convenevolmente, questa malattia è di rado mortale,

Sintomi
pericolosi :

I *sintomi* pericolosi sono in generale un *singhiozzo* continuo, una *febbre* eccessiva, sete ardente, *vomito* d'una materia nera, *delirio*, *deliquij*, *sudori freddi*, ec.

Il malato resta esposto al maggiore pericolo, quando la malattia termina in *suppurazione*; e che la materia non può farsi strada al di fuori.

Sintomi
che annun-
ziano la
cancrena.

(Ma niente è sì da temersi, quanto la cessazione improvvisa dei dolori, sussistendo gli altri *sintomi*, perchè allora il malato è minacciato da *cancrena*.)

Conse-
guenze di
questa ma-
lattia, al-
lorchè de-
genera in
scirro.

Quando il male degenera in *scirro*, l'infermo può vivere buon numero di anni senza molto patire, purchè osservi una regola conveniente di *vitto*; ma se si dà troppo in preda ai *liquori spiritosi*, e ad una nutrizione troppo forte, o di sostanze animali; se prende dei *rimedj acri e irritanti*, il *scirro* si convertirà in *cancro*, le conseguenze del quale sono sempre funeste,

Maniera
con cui
termina l'
infiamma-
zione del
fegato.

(L'*infiammazione* del *fegato* è d'ordinario una malattia da temersi moltissimo, L'esito dipende dalla parte del *fegato* ch'è attaccata. Ella termina alle volte per *risoluzione*, ma più spesso nell'una o nell'altra delle maniere ora descritte. Allorchè termina per *risoluzione*, non oltrepassa il terzo o il quarto giorno. Quando s'avanza di là dal settimo, si dee temere la *suppurazione*, o l'*ingorgamento scirroso*. V'è poco riparo contro l'*ascesso* del *fegato*, quantunque si diano alcuni esempj dell'*evacuazione* della *marcia* per vomito, per scarichi, per urine, ec.)

ARTICOLO TERZO.

Vitto che bisogna prescrivere nell'infiammazione del fegato.

SI dee osservare in questa malattia la stessa regola di vitto che nell'altre malattie infiammatorie, e che abbiamo esposta qui sopra Art. III, e IV, dei §. I, e II, di questo Cap.

Bisogna evitare tutto ciò che riscalda, e bere copiosamente delle tisane rinfrescanti e diuanti, ec. come del siero di latte, dell'acqua d'orzo, ec.

Gli alimenti faranno leggieri e poco nutritivi, e bisogna che l'infermo sia tranquillo di corpo e di spirito.

ARTICOLO QUARTO.

Rimedj che si devono amministrare nell'infiammazione del fegato.

LA cacciata di sangue conviene nel principio di questo male, ed è sovente necessario il ripeterla, nei casi eziandio che il polso non sembra duro. Ma non si devono moltiplicare senza la più grande necessità, al di là della quarta giornata.

Devesi astenere da qualsiasi purgativo violento; bisogna per altro tenere il ventre libero. A tal oggetto si darà una decozione di samarinidi, con un po' di mele, o di manna.

Si faranno sul lato infermo dei frequenti fomenti con dell'acqua calda, nel modo da noi consigliato nelle malattie precedenti, pag. 336 di questo Vol.

Si applicheranno spesso de'clisteri leggermente lassativi; e se il dolore persiste nella sua violenza, si applicherà un vescicatorio sul fianco dritto.

I rimedj ch'eccitano la secrezione dell'urina, sono qui d'un grande ajuto. Per ciò si daranno al malato in un bicchiere della sua tisana, quattro grani di nitro purificato, o sei gocciolate di spirito di nitro dolcificato: si ripeterà questo rimedio tre o quattro volte al giorno.

Y A

La cacciata di sangue nei quattro primi giorni.

Lassativi.

Fomenti.

Clisteri lassativi, e vescicatori.

Diuretici.

Maniera
di favorire
il sudore,
allorchè si
presenta
natural-
mente.

Grado di
calore che
devono a-
vere le be-
vande in
tutte le in-
fiammazio-
ni locali.

Cosa biso-
gna fare se
il ventre è
sciolto.

Come bi-
sogna rete-
larli, allor-
chè l'in-
fiammazio-
ne del fe-
gato si con-
verte in
ascesso;

Se il malato ha della disposizione al sudore, è be-
ne di eccitare questa *escrezione*, ma giammai per via
de' *sudoriferi* caldi. Tutto ciò che si può permettere
in tal caso, è di far bere abbondantemente delle *ti-
sane diluenti*, calde al grado del calore del sangue,
cioè al trentesimo grado circa del *termometro di M.
de Réaumur*. Imperciocchè in questo caso, e in tutte
le altre *infiammazioni* locali, il malato non dee bere
cosa che sia più fredda del calore del sangue.

Se il ventre è sciolto, se parimenti le materie so-
no *sanguigne*, non bisogna esibire cosa veruna per
sospendere questa *evacuazione*, quando almeno essa
non indebolisca di troppo il malato: questa *scorrenza*
di *ventre* è sovente *critica*, e toglie in allora la ma-
lattia.

Allorchè l'*infiammazione* del fegato si converte in
ascesso, è d'uopo di usare di tutti i mezzi cognitivi,
perchè si apra e si evacui *esteriormente*: tali mezzi
sono li *fomenti*, le *polsiglie*, i *cataplasmi maturanti*,
ec. E' vero che accade talvolta che la *materia* dell'
ascesso, o la *marcia* si evacui per *urina*, o pei *scari-
chi* di *ventre*; ma questi sono sforzi della Natura
ch'è impossibile di determinare.

Allorchè l'*ascesso* s'apre dentro l'*addomine*, è che
la *materia* si spande in quantità dentro il *basso ven-
tre*, egli cagiona la morte. La sorte del malato non
è più felice, allorchè si apre *esteriormente*, median-
te una *incisione*, qualora almeno non avvenga che in
tal caso il fegato non sia aderente al *peritoneo*, in gui-
sa di formare un sacco, o una borsa, che contenen-
do il *marciume*, e ne impedisca lo spandimento dentro
la cavità del *ventre*. In fatti se in questa circostanza
si apra l'*ascesso* con una larga *incisione*, è probabile
che si salvi il malato (12).

(12) Si conosce bene che il caso ora esposto dall'Autore è
gelosissimo, e che non vi sono che le persone dell'Arte che
possano ben maneggiarlo. Per ciò, tosto che accorgasi che l'
infiammazione non cede ai *rimedj* proposti, fa d'uopo chia-
mare un Medico sperimentato, e riportarsi assolutamente ai
di lui consigli.

Se malgrado tutti questi soccorsi la malattia si converte in *scirro*, bisogna che il malato regoli la sua *dieta*, ec. in maniera di non aggravare il male. Non dee permettersi nè troppa carne, nè troppo pesce, nè *liquori spiritosi*, nè verun'altra vivanda troppo salata, o troppo condita. Fa di mestieri che si nodrisca in gran parte di *vegetabili*, come di *frutta*, di *radiche*; che faccia un'esercizio moderato, che beva del *siero* di *latte*, dell'*acqua d'orzo*, del *latte di burro*, ec. Se vuole che se gli porga qualche bevanda più forte, questa non potrà essere che dell'*aile*, o della *birra leggera*, la quale è meno *riscaldante* del *vino* e degli altri *liquori spiritosi*.

Io scirro.
Regola di
vitto che
il malato
deve seguire
in tal caso.

Avvertasi che noi non faremo parola dell'*infiammazione* degli altri *visceri del basso ventre*. Esse devono in generale curare a norma dei principj, che abbiamo di presente esposti. (In fatti non v'è alcun *rimedio* particolare per l'*infiammazione* della *milza*, dell'*omento*, de' *muscoli del basso ventre*, ec.) La prima regola da seguirsi, relativamente a ciascuna di esse, è di evitare tutto ciò che è di difficile *digestione* e di qualità *riscaldante*; di applicare dei *fomenti caldi* sulla parte inferma, e di far bere al malato una quantità sufficiente di *tisana calda*, *diluente*, ec.

Riflessioni
sopra l'in-
fiammazio-
ne degli al-
tri visceri
del basso
ventre.

CAPITOLO VIGESIMOSECONDO.

Del morbo collera; della smossa di ventre; della diatrea; e del vomito.

§. I.

Del morbo collera.

IL morbo collera è una *evacuazione eccessiva* per di sopra e per di sotto, accompagnata da *dolori*, da *ansietà*, e da voglie perpetue di vuotare il *ventre*. Questa malattia assale tutto ad un tratto: è più comune nell'autunno che nell'altre stagioni dell'anno;

Caratteri
di questa
malattia.

(sopra tutto se abbiano regnato de' gran calori, e se non vi sieno state frutta estive, l' uso delle quali tempera l' *acrimonia putrescente* della *bile*. Ella è acutissima; malattia non v'è che uccida il malato più prontamente di questa, quando non si adoprinò a tempo i *rimedj* convenevoli. (Le persone le più robuste vi soccombono talvolta dentro le ventiquattr' ore, o in due o tre giorni,

Di quante
specie ve
n' è.

IPPOCRATE, distingue due specie di *morbo collera*: l' uno *umido*, e l' altro *secco*, ch'è quanto a dire, uno con *evacuazione*, e l' altro senza *evacuazione*.)

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni del morbo collera.

Il *morbo collera* è cagionato dall'abbondanza e dall' *acrimonia putrida* della *bile*; dagli alimenti che facilmente inagriscono e divengono *vandidi* nello stomaco, come dal *burro*, dal grasso di *majale*, dalle *confetture*, dai *cocomeri*, *meloni*, *ciliegie*, e altre frutta di *fredda natura*. Proceede alle volte dai *purgativi*, o dai *vomitoy acri e violenti*; dalle sostanze *velenose*, *arsenicali*, *mercuriali*, *antimoniali*, o *vitrioliche*, ricevute dentro lo *stomaco*; dal *raffreddamento* del corpo; dai *dolori della dentizione*, ec. il perchè ne vanno soggetti i *fanciulli*. Finalmente può ancora provenire da *passioni violente*, e da forti *impressioni* sull' *animo*, come dalla *paura*, dalla *collera*, ec. (1).

Cagioni
nelle quali
questo mor-
bo si offer-
va il più
frequente.

(1) Dalla prima di queste cagioni il Sig. LE ROY appella il *morbo collera* una *febbre biliosa acutissima*, che fa *crisi* per via di *vomito* e di *flusso di ventre*. Bisogna però osservare che quando riconosce sì fatta cagione, essa non infuria che nei grandi calori dell' estate, laddove può aver luogo in qualunque altro tempo, allorchè viene suscitata da qualche cosa di pernicioso introdotta dentro lo *stomaco*; dalle *passioni violente*, ec. Si osserverà parimenti che il *morbo collera*, che dipende da una soverchianza di *bile acre e putrida*, è assai meno periglioso di quello che deriva dall' altre cagioni; questo non è più in allora che una *insudata diarrea biliosa*. Impero

ARTICOLO SECONDO.

Sintomi del morbo collera.

IL morbo collera è ordinariamente preceduto da una *cardialgia*, o da un calore ardente alla regione dello stomaco e negl' *intestini*; da *vusti acidi*; da dolori di stomaco e degl' *intestini*. Sintomi precursori.

A questi *sintomi* susseguono de' *vomiti* strabocchevoli, ed una *evacuazione* copiosa pel basso di *bile* verde, gialla, nera, accompagnata da una distensione di stomaco, e da *tormini* violenti di *ventre*. Caratteristiche.

(Si sono veduti de' malati a fare cento *scarichi* in alcune ore. Essi dimagrano a vista d'occhio, e a capo di tre, o quattr'ore; se queste *evacuazioni* continuano, essi non possono più essere ravvisati,)

Il malato soffre altresì una sete ardente; il suo *polso* è *velocissimo*, *picciolissimo*, *concentrato*, *ineguale*; sovente risente un dolore acutissimo verso il *bellico*.

A misura che la malattia si avvanza, il *polso* si deprime, e sovente a segno di divenire quasi impercettibile. L'*estremità* divengono fredde, o il malato vi soffre de' *granchj*, e spesso si coprono d' un freddo *sudore*. L'*urina* è soppressa, ed egli prova delle *palpitazioni* di cuore. Ma il *singhiozzo* violento, i languori, le *convulsioni* sono segnali d' una morte vicina. Sintomi della malattia avanzata.

(Coteſta enumerazione di *sintomi* appartiene specialmente al morbo collera umido, che, pervenuto al suo ultimo grado, presenta anche i seguenti: le dita s' incurvano: le unghie divengono livide; il viso color di piombo; il malato patisce delle *vertigini*; la Sintomi peculiari del morbo collera umido.

ciocchè malgrado i *sintomi* formidabili che lo accompagnano, è raro che il malato ne muoja. Molti affai, dice il Sig. Tissot, ne risanano. Coloro che si trovano presenti ai primi affalti di questo male, non devono dunque perdersi di coraggio; e se la loro sensibilità li sforza a cedere al dolore, alla tema, allo spavento, ec. forza è che chiamino dell'altre persone, che sieno capaci di possedere tutta la franchezza di spirito in questo momento critico, e di prestare al malato tutta l'assistenza ch'egli esige.

voce si estingue; il battimento dell'arterie è appena sensibile; le *convulsioni* e gli soffocamenti si succedono con rapidità. L'infermo fa da ultimo degli sforzi inutili per vomitare; e la morte viene a metter fine a tutti questi accidenti.

Sintomi
particolari
del morbo
collera sec-
co.

Quanto al *morbo collera secco*, egli è sì raro nei nostri climi, ch'è quasi inutile il descriverlo: SYDENHAM dice di non averlo rincontrato che una o due volte. Del resto eccone i *sintomi* principali. Il ventre è duro, stitico; e qualora si percuota, rende un suono a guisa di tamburo. Il malato manda fuori de' *flati* per l'alto e pel basso: non vomita, nè scarica: si querela di dolori cocenti nel *petto* e nel *fianco*. Ma dalle *evacuazioni* in fuori, prova tutti i *sintomi* del *morbo collera umido*.

Cosa distin-
gua il mor-
bo collera
umido dal-
la diarrea
biliosa e
dalla dis-
senteria.

Sebbene il *morbo collera umido* abbia molta rassomiglianza con la *diarrea biliosa* e la *dissenteria*, ne differisce però, in quanto che 1. egli attacca quasi in un subito il malato, che i suoi progressi sono rapidissimi, e che finisce in sette ovvero otto giorni al più: 2. in quanto che le *dejezioni* non sono sanguigne nel *morbo collera*, se non quando la malattia è nel suo maggiore vigore; laddove nella *dissenteria* gli *scarichi* sono sovente intrisi di *sangue*, anche nel primo principio del male: 3. il *tenesmo*, o vani sforzi, di vuotare il ventre, non è tanto ostinato nel *morbo collera*: 4. il *vomito* non è che accidentale nella *dissenteria*, nè forma l'essenza del male; mentre costantemente accompagna il *morbo collera*: 5. la *dissenteria* è contagiosa, e il *morbo collera* non l'è. Finalmente il *morbo collera* differisce dalla *diarrea biliosa*, in quanto che quest'ultima non è prodotta che da una *diarrea biliosa* determinata alla volta del retto per la contrazione *peristaltica* degli intestini; mentre nel *morbo collera* questo movimento si fa in parte contraria; il che cagiona il *vomito*, ch'è uno de' suoi principali caratteri, come abbiamo notato nota 1 di questo Capitolo.)

Non è con-
tagioso.

ARTICOLO TERZO.

Cura da tenersi nel morbo collera.

GL' sforzi che la Natura adopera nel cominciamento di questa malattia, per liberarsi dalla *malattia morbosa*, devono essere secondati, mantenendo il vomito, e gli scarichi.

Indicazio-
ni.

Per ciò fa di mestieri che l'infermo prenda di mano in mano alcuni bicchieri di bevande *diluenti*, come di *siero di latte*, di *latte di burro*, d'una *infusione* leggiera di *cremore di avena*, o, quel ch'è a tutto ciò preferibile, del brodo leggierissimo di pollo, vale a dire del *brodo sciocco*. Bisogna non solamente che il malato ne beva copiosamente, per agevolare il vomito, ma che se gliene porga altresì ogni ora in *clistere* per eccitare gli *scarichi del ventre*.

Acqua di
pello a gran
bicchieri, e
ripetuta fo-
ventemen-
te.In clisteri
ad ogni ora.Mezzi di
arrestare i
vomiti. Ac-
qua di pa-
ne: in qual
guisa si pre-
pari.Ginebbre
salino e
laudano li-
quido.Non biso-
gna tentare
d'arrestare
l'evacua-
zioni, quan-
do alme-
no non in-
deboliscano
il malato.Dose del
laudano, e
del gineb-
bre salino.

Dopo che queste *evacuazioni* avranno per alquanto tempo continuato, si farà bere al malato un' *acqua di pane*, fatta con del pane di *avena* abbrustolito, ad oggetto di moderare e di arrestare poco a poco il vomito. Questo pane dee essere abbrustolito, finchè abbia preso un colorito bruno. Si fa poscia bollire nell'acqua di fonte. Qualora non si possa avere cotesta spezie di pane, si sostituirà il pane di frumento, o della semplice farina di *avena*, che si avrà cura di fare bene abbrustolire.

Se questa bevanda non sopprime il vomito, si exhiberà in cadauna ora, finchè esso cessi, due cucchiaini di *ginebbre salino*, cui si aggiungeranno dieci goccioline di *laudano liquido*.

Fa però duopo di ben guardarsi dall'arrestare troppo presto il vomito e la *scorrenza di ventre*; bisogna al contrario mantenerle, anzi eccitarle, fino a tanto che queste *evacuazioni* non debilitano l'ammalato.

Ma tosto che producono questo effetto, e che scemano le di lui forze, locchè si conosce facilmente dal tocco del *polso*, ec. forza è di prestamente ricorrere ai *calmanti*, da noi or' ora raccomandati, vale a dire al *laudano liquido*, alla dose di dieci goccioline in due cucchiaini di *ginebbre salino*, cui si può aggiungere dell'

ottimo *vino*, dell' *acqua spiritosa di cannella*, o di qualche *livoglia altro cordiale*.

Stato di latte vino. so forte.

Il *negus caldo*, o il *siero di latte vinoso forte*, si rende altresì necessario per sostenere le forze del malato, ed eccitare la *traspirazione*.

Bagni alle gambe. Stropicciature sulle gambe che devonfi tenere calde.

Fomenti spiritosi sopra lo stomaco.

D' uopo è di ruffargli le gambe nell' *acqua calda*, poscia fregarle con alcune *flanelle*, o avvolgerle con alcune *copertine calde*, e applicargli de' *mattoni caldi* sotto la pianta dei piedi. Oltre ciò se gli applicheranno sullo *stomaco* delle *flanelle inzuppate in alcuni liquori spiritosi caldi* (2).

ARTICOLO QUARTO.

Cura del morbo colera, allorchè il male ha rimesso di sua violenza.

Bisogna continuare il laudano dentro il vino.

Quando il male ha rimesso di sua violenza, è necessario, per impedirne il regresso, di continuare per qualche tempo l'uso del *laudano* in piccole dosi. Se ne porgeranno dieci in dodici goccioline in un bicchierino di *vino*, due volte dentro le ventiquattr' ore, per otto o dieci giorni.

Alimenti, ed esercizio.

Gli *alimenti* del malato saranno nutritivi; ma si somministreranno in piccola quantità; e il *convalescente* farà un *esercizio moderato*.

Infusione di chinachina, o di qualsiasi altro amaro dentro il vino acidulato.

Siccome lo *stomaco* e gl' *intestini* sono debolissimi nel corso di questo male; l' infermo prenderà per qualche tempo una *infusione di chinachina*; o di qualsiasi altro *amaro* dentro il *vino* leggiero; reso *acidulato* mediante l' *elissire di vitriolo*; come si è prescritto Cap. II, §. III di questo Vol.

Bagno tiepido e deiezione di tamarindi.

(2) Il Sig. Tissot consiglia in questo caso il *bagno tiepido*. Egli dice che bisogna tenervi lungamente il malato, e profittare di questo tempo per fargli prendere sette ovvero otto bicchieri d' una *decozione* fatta con tre oncie di *tamarindi* in una foglietta d' acqua. Egli osserva che avendo prescritto questi due *rimedj* ad un ammalato, i *vomiti* si arrestarono, e che al sortire dal *bagno*, ebbe parecchi *scarichi copiosi*, che sembrarono considerabilmente la forza del male.

Sebbene i Medici sieno di rado chiamati a tempo in questo male, non devono però disperare di portar sollievo all'infermo, anche nelle circostanze le più calamitose. Ne ho poc' anzi avuto l'esperienza in un vecchio ed in suo figlio, che furono insieme assaliti da questo male verso la mezza notte. Io non fui chiamato che la dimane mattina. Essi rassomigliavano piuttosto a de' cadaveri che ad uomini. Loro più non si trovava orma di *pulso*. L'*estremità* erano fredde e rigide; le loro forze erano quasi totalmente esaurite; il loro aspetto era spaventevole. Ciò nulla ostante si trassero da questo stato deplorabile mercè dei *calmans* e dei *cordiali* preferiti qui sopra.

Per quanto sia spaventevole questo male, non bisogna perdersi di coraggio. Osservazione per prova.

§. II.

Della smossa di ventre.

(**L**A smossa di ventre, cioè questa evacuazione più copiosa e più frequente dell'ordinario, di materie escrimentizie e di escrimenti liquidi, che il celebre RIVERTO chiamava *diarrea stercorale*, è meno una malattia che un mezzo salutare che impiega la Natura per ristabilire l'ordine nelle naturali funzioni e richiamare l'appetito.

La smossa di ventre non è sempre una malattia.

Non esige dunque verun rimedio; nemmeno regola alcuna particolare di *vitto*; quando però non accade in conseguenza di qualche eccessiva gozzoviglia, dopo di aver mangiato degli *alimenti indigestibili*, o perchè non si abbiano ben masticato i cibi che si sono presi. (Ved. Parte I, Cap. II, nota 23.)

Quando esige della regola nel vitto.

Cura della smossa di ventre.

(In questi ultimi casi la *dieta* diviene necessaria. Il malato si asterrà dunque dalle carni e dai brodi. Berà del tè, o una *infusione* di fiori di *camomilla*, o qualsivoglia altra *infusione*, o *decozione diluente*, e leggermente *stimolante*.

Userà alcuni *clisteri* di acqua semplice; e vivrà di *riso* o di altre sostanze farinose, e di legumi, sine

Clisteri e Alimenti.

chè il suo stomaco indebolito abbia riparate le sue forze , e che l'appetito si sia perfettamente ristabilito .

Quanto dura la smossa di ventre . Quando ella prenda il nome di diarrea .

La *smossa* di ventre è radamente di lunga durata . In generale questa è la faccenda d'un giorno , o al più di due . Quando ella oltrepassa cotesto termine , allora procede da qualche cagione morbosa , e prende il nome di *diarrea* , di cui passiamo ad occuparsi nel Paragrafo che segue .)

§. III.

Della diarrea , o scorrenza , o flusso di ventre .

La diarrea si divide in sierosa , biliosa , colliquativa , essenziale , sintomatica , e critica .

LA *diarrea* è una *evacuazione* per *secesso* di materie liquide e di differente natura . Per ciò si divide in ragione delle materie ch'essa caccia fuori . Ella è ora *sierosa* , ora *biliosa* , e talora *colliquativa* . Si divide ancora in *essenziale* , in *critica* , e in *sintomatica* .

La *diarrea sierosa* di rado è *essenziale* , spessissimo *sintomatica* , e giammai *critica* . La *biliosa* per lo contrario è spesso *essenziale* , spessissimo *critica* , radamente *sintomatica* . Finalmente la *diarrea colliquativa* non è giammai che *sintomatica* , e sempre d'infauito presagio , come si è potuto vedere nelle *febbri lente* , *nervose* , *putride* , *maligne* , ec.

Non si tratta in questo paragrafo che delle diarree , che possono essere essenziali .

Non si tratterà in questo luogo che delle *diarree* che possono essere *essenziali* , e che lo sono sovente , come la *sierosa* , e sopra tutto la *biliosa* , ch'è altresì la più frequente .)

Sintomi della diarrea .

(La *diarrea* è per l'ordinario accompagnata da inappetenza , da gorgoglii o borbottamenti di ventre ; da dolori leggieri degl' *intestini* ; da incitamenti frequenti di scaricare il ventre ; alle volte da *tenesmo* , da tumidezza , e da dolori di ventre , da *granchi* nelle gambe , e quando la malattia sia prolungata , da debolezza , ec. : le *urine* sono cariche , rosse , e in piccola quantità . Finalmente quando venga trascurata , o mal curata , prende tutti i caratteri della *dissenteria* .

enteria, da cui non si può più distinguere, e di cui parleremo Tom. III, Cap. XXV, §. VII.

Ma quando la *diarrea* è spontanea, e che non sia punto contrariata dai *rimedj*, ella non è punto più perigliosa che la *smossa di ventre*, e deve essere riguardata nella maggior parte delle circostanze, piuttosto come una *evacuazione* salutare, che come una malattia: non si dee dunque giammai arrestarla, qualora almeno non continui da troppo lungo tempo, e che non indebolisca evidentemente il malato. Tuttavolta siccome alle volte si trovano degli ammalati in questo ultimo caso, si accingiamo a descrivere le cagioni le più comuni di questa specie di *scorrenza di ventre*, e il governo che a ciascheduna di esse conviene.)

La diarrea spontanea non è più pericolosa della smossa di ventre.

ARTICOLO PRIMO.

Cura della diarrea, o scorrenza di ventre cagionata dal freddo, o dalla soppressione della traspirazione.

Allorchè la *scorrenza di ventre* è cagionata dal freddo, o dalla soppressione della *traspirazione*, bisogna che il malato si custodisca al caldo; che beva copiosamente d'una *tisana diluente*; che si bagni i piedi e le mani dentro l'acqua calda; ch'egli porti della flanelle sopra la pelle; che metta al fine in opra tutti i mezzi cogniti per ristabilire la *traspirazione*. (Ved. Parte I, Cap. XII, §. III.)

Custodirsi al caldo. Tisana diluente. Bagni dei piedi e delle mani. Flanelle sulla pelle, ec.

ARTICOLO SECONDO.

Cura della diarrea cagionata da soverchia copia d'umori.

Nelle *diarree* che dipendono da una soverchia copia d'umori, un *vomitario* è il *rimedio* il più convenevole. I *vomitarij* non solamente nettano lo stomaco, ma favoriscono ancora le altre *escrezioni*; cosa che li rende d'una grande importanza, per cacciar fuori i residui delle indigestioni ed il superfluo

Importanza del vomitorio in questo caso.

Ipecacua-
da.degli stravizzi. Quindici o venti grani d'*ipecacuana* soddisferanno benissimo a questa indicazione.Rabarba-
ro.Un giorno o due dopo il vomitivo, si darà una mezza dramma di *rabarbaro*, e si ripeterà due o tre volte, se la *scorrenza di ventre* persista.Cibi e be-
vanda.Il malato durante questa cura, dee vivere di *vegetabili teneri* e di facile *digestione*. Berà del *siero di latte*, del *cremore tenue di avena*, o dell'*acqua di orzo*, come lo diremo Tom. III, Cap. XLIII, che tratta dell'*indigestione*.

ARTICOLO TERZO.

*Cura della diarrea, o scorrenza di ventre cagionata dalla soppressione d'una evacuazione consueta.*Salasso, e
allorchè
non basti
evacuazio-
ni analo-
ghe a quel-
le che sono
soppressa.

Allorchè la *diarrea* è cagionata dalla *soppressione d'una evacuazione consueta*, come quella delle *emorroidi*, d'un *flusso di sangue dal naso*, dei *mestruai*, ec. bisogna in generale far ricorso al *salasso*. Se questo non riesce, forza è supplire per via di altre *evacuazioni analoghe* a quelle che sono arrestate, e nel tempo stesso impiegare tutti i mezzi capaci di facilitare l'*evacuazioni* ordinarie; poichè non solamente la guarigione della malattia, ma la vita altresì del malato da ciò ne dipende (3).

(3) Da quanto ora dice il Sig. BUCHAN si fa evidente, che il *salasso* non conviene nella *diarrea* che quando ella sia cagionata dalla *soppressione di una evacuazione sanguigna*, come quella che abbiamo specificato; e non si dee cimentarlo che in questi casi solamente. Somma imprudenza sarebbe il *cavar sangue*, se questa si fosse la *soppressione d'un causerio*, d'un *ulcere*, d'una *piaga*, ec. in qualunque parte del corpo ciò fosse. I soli mezzi da impiegare in questi ultimi casi, sono il ristabilire l'*evacuazione soppressa* nel luogo stesso che ne fu la sede, se ciò sia possibile, mediante un *cauterio che possa farne le veci*.

ARTICOLO QUARTO.

Cura delle scorrenze di ventre, o diarree periodiche.

LE scorrenze periodiche di ventre non devono giammai essere arrestate. Sono sempre sforzi della Natura per espellere la *materia morbosa*, che avrebbe degli effetti funesti, se essa rimanesse dentro la macchina.

Questa specie di scorrenze di ventre non deve giammai essere arrestata. Perché?

(Ci sono in fatti delle persone soggette ad una *diarrea* spontanea in certi tempi fissi dell'anno, come nella primavera, e sopra tutto nell'autunno. Questo è un tributo che pagano alla Natura, per poscia godere d'una salute costante. Si sente abbastanza quanto sarebbe pericoloso il non rispettare sì fatte *evacuazioni*; poichè da esse appunto dipende la sanità futura di colui che le soffre.

Ho veduto una Signora, che all'età di trenta otto anni; osservò che le sue *purghe mensuali* erano costantemente seguite da una *diarrea*, che durava altrettanto tempo che le suddette, cioè da quattro in cinque giorni. Ella fu da prima inquieta; ma avendo consultato un abile Medico, restò facilmente tranquillata: dopo questa età sino a quella di quarantacinque anni, le sue *purghe* insensibilmente svanirono; ma la *diarrea* si prolungò nella stessa proporzione; in guisa che le *purghe* essendo assolutamente cessate, le restò la *diarrea*, che durava sempre da sette in otto giorni, dopo i quali da se cessava. Del resto questo sconcerto non le cagionava nè inappetenza, nè dolori di ventre, nè debolezza. Questa Signora si contentava di astenersi dalla carne, finchè durava l'incomodo, e di prendere un *clistere* in ciascheduna mattina.)

Osservazione.

I fanciulli vanno assai soggetti a questa specie di *flusso di ventre*; segnatamente nel metter dei denti; ma egli è sì poco capace di nuocere ai fanciulli, che quando vi si manifesti, la maggior parte mettono i loro denti senza esser malati.

La scorrenza di ventre periodica è vantaggiosa ai fanciulli nel tempo della dentizione. Ella non domanda

Se per altro questo *flusso di ventre* cagionasse de' tormini, si potrebbe dare al fanciullo un cucchiaino de

ta che si dee tenere in questo caso , Tom. III,
Cap. XLVIII.

ARTICOLO SETTIMO.

Cura della diarrea cagionata dalla gotta rimontata .

SE la *gotta rimontata* cagiona una *scorrenza di ventre*, d'uopo è intertenerla mercè di alcune piccole dosi di *rabarbaro*, o di altri *purgativi blandi*. Bisogna ancora adoperarsi di richiamare la *gotta* all'*estremità*, mediante li *fomenti*, i *cataplasmi*, ec. Si ecciterà nel tempo stesso la *traspirazione* per via di bevande *diluenti calde*, come il *siero di latte*, cui si aggiugne dello *spirito di corno di cervio*, o alquante goccioline di *laudano liquido*, come faremo vedere Tom. III, Cap. XXXIII; §. II, il quale versa sulla *gotta*, e sui soccorsi ch'essa esige, allorchè è fissata nei *visceri del basso ventre*.)

Rabarbaro,
e purgati-
vi blandi .
Fomenti
e cataplas-
mi per ri-
chiamare
la gotta .

ARTICOLO OTTAVO :

*Cura della scorrenza di ventre cagionata e
mantenuta dai vermini :*

Allorchè la *scorrenza di ventre* è cagionata dai *vermini*, la qual cosa si riconosce dalli *scatichi* che sono *viscosi*, tenaci, e frammeschiati di porzioni di *vermini* morti, ec. ella richiede l'uso dei *rimedj* che uccidono e scacciano i *vermini*: tal'è la polvere di *siagno*, o l'*olio di Palma Christi*, e i *purgativi* composti di *rabarbaro* e di *calomelano*.

Polvere di
siagno, ra-
barbaro, e
calomela-
no .

Si darà poscia dell'*acqua di calce*, o *sola*, o in cui si avrà fatto *infondere* d'un po' di *rabarbaro*, per *invigorire* gl'*intestini* ed impedire la *rigenerazione* dei *vermini*. Noi daremo, Tom. III, Cap. XXX, la dose di questi *rimedj*.

Acqua di
calce .

ARTICOLO NONO.

Cura della diarrea dipendente da certe spezie d'acqua.

Interdirsi
l'uso di si-
fatte acque,
o correg-
gerle me-
diante la
calce viva
e la creta,
ec.

SOventi volte le acque corrotte cagionano de' *flussi di ventre*. In tal caso la malattia è ordinariamente generale o *epidemica*. Qualora v'abbia motivo di credere che questa malattia, o qualunque altra, sia dipendente dall'uso d'un'acqua insalubre, o di mestieri di averne tosto dell'altra, o se non sia ciò possibile, bisogna correggerne le qualità malsane, mediante la *calce viva*, la *creta*, e altre sostanze consimili, come abbiamo detto Tom. I, Cap. III.

ARTICOLO DECIMO.

Cura della scorrenza di ventre cagionata dalla delicatezza dello stomaco.

Privarsi
dell'eserci-
zio violen-
to dopo di
aver man-
giato.

Infusione
di china-
china.

Vino.

LE persone che anno lo *stomaco* delicato, sono soggette alla *scorrenza di ventre*, tosto che abbiano fatto un violento *esercizio* immediatamente dopo di aver mangiato. Ancorchè in tal caso tutto il mondo possa prevedere ciò che bisogna fare, tuttavia, oltrecchè bisogna che coteste persone si privino di ogni *esercizio* violento, fa ancora d'uopo che facciano uso di *rimedj* che tendano a corroborare lo *stomaco*: come le *infusioni* di *chinachina*, e di altre *pianze amare e astringenti*, dentro del *vino* bianco. Prenderanno ancora di tempo in tempo un bicchierino o due di *vino* vecchio di *Porto*, o di altro ottimo *vino*.

ARTICOLO UNDECIMO.

Preceſſi generali ſulla maniera di curare una ſcorrenza di ventre qualunque, allorchè le circoſtanze eſigono che ſi arreſti.

DA qualunque cagione proceda una ſcorrenza di *Regola di*
ventre, ſubito che le circoſtanze eſigono che ſi *vivere.*
 arreſti, è neceſſario di mettere il malato ad una re- *Alimenti.*
 gola di *viſto*, compoſto di *riſo* bollito nel *latte*, e *Bevanda.*
 aromatizzato con la *cannella*; o di *cremore di riſo*,
 di *ſagou* col *vino roſſo*, e pochiſſima carne arroſta.
 Prenderà per bevanda del *cremore di avena* diluto,
 dell'*acqua di riſo*, o del brodo leggiero. Il brodo *Brodo di*
 più convenevole in queſto caſo, è quello di vitello *teſta di ca-*
 magro, o di teſta di caſtrato, per eſſere più *ſtrato.*
gelatino-
ſo che quello di carne di caſtrato, di bue, o di
 pollo.

(Da quanto s'è poc' anzi detto nel preſente e nel precedente §., riſulta che non biſogna giammai intraprendere di guarire una *ſmoſſa di ventre*, una *diarrea*, o una *ſcorrenza di ventre*, qualora non ſi abbia prima cercato di riconoſcerne la cagione: che queſta una volta riconoſciuta, il *viſto* è il primo oggetto cui biſogna dirigere l'attenzione: che non conviene mai paſſare ai *rimedj* che nei caſi, in cui, per li continui ſcarichi, l'ammalato molto s'infievoliſſe; che ogni qual volta ſi ſia obbligato di uſare de' *rimedj*, è d'uopo ſempre cominciare dagli *addolcitiſſi*, dai *diluenti*, e dai *clifteri*; che poſcia ſi dee paſſare agli *ſtomachici*, di cui la *chinachina*, l'*aſſenzio*, la *centaurea minore*, la *cannella*, l'*eſtrato di ginepro*, il *diſcordeo*, l'*ottimo vino*, ſono i più valevoli, e quei che ſi devono ſempre preferire; che da ultimo non biſogna venire che rariffime volte, e con le maggiori riſerve, agli *aſtringenti*; *rimedj* che le donniciuole non mancano giammai di conſigliare ſin dai primi indizj d'una *ſcorrenza di ventre*, e per via de' quali ſovente elleno danno motivo a delle *inflammazioni*, o ad alcune *oſtruzioni* molto più moleſte che il male ſteſſo che vogliono riſanare.)

Epilogo dell'ordine che biſogna ſeguire nella cura della ſmoſſa di ventre, della diarrea o ſcorrenza di ventre.

ARTICOLO DUODECIMO.

Mezzi di preservarsi dalla diarrea, o scorrenza di ventre.

Coloro che per una debolezza particolare dello stomaco, o per una soverchia irritabilità degl' intestini, sono soggetti a de' frequenti ricorsi di questa malattia, devono vivere con esatta regola; evitare le frutta acerbe, gli alimenti insalubri e di difficile digestione. Devono parimenti guardarsi dal freddo, dall'umidità, da tutto ciò che può arrestare la traspirazione, e devono portare una flanella sulla pelle. Fa di mestieri che stieno egualmente in guardia contro tutte le passioni violente, come lo spavento, la collera, ec.

Evitare gli
alimenti di
difficile di-
gestione, il
freddo, l'
umidità,
le passioni
violente,
ec.

§. IV.

Del vomito.

Il vomito
non è sem-
pre una
malattia.

IL vomito in molte circostanze è piuttosto un rimedio che una malattia. In tai casi egli è uno sforzo che fa la Natura per liberarsi da un soverchio carico di materia che diverrebbe infallibilmente cagione di morbo. Si comprende che in allora, ben lungi dal sopprimerlo, conviene mantenerlo, e anco eccitarlo, allorchè il malato non fa, che degli sforzi lenti, o inutili, come lo diremo nell' Articolo II di questo §.

Ma il vomito non è sempre uno sforzo così salutare; e noi vedremo quali soccorsi egli esiga, a norma delle cause che lo producono.)

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni generali del vomito.

Gozzovi-
glie.
Materie
ammassate

IL vomito può dipendere da molte cagioni differenti. Può essere cagionato da alcune sregolatezze nel mangiare e nel bere; da alcune materie corrot-

te ammassate dentro lo stomaco; dall'acrimonia degli alimenti; dal trasporto allo stomaco della materia morbosa d'un ulcere, della gotta, d'una risipola, o di qualunque altro male. Il vomito può ancora derivare da un flusso di ventre soppresso troppo subitanamente; dalla soppressione di qualche evacuazione consueta, come delle moroidi, dei flussi mestrui, ec.

La debolezza dello stomaco, la colica, la passione iliaca, una crepatura, la renella, il calcolo, i vermini, o qualche veleno che sia penetrato dentro lo stomaco, possono darvi motivo. Il vomito è altresì un sintomo delle ferite, e dell'infiammazione del diaframma, degl'intestini, della milza, del fegato, dei reni, ec.

Il vomito può essere suscitato da alcuni movimenti, cui non si sia avvezzo; tali sono quelli d'un naviglio; quelli che si provano andando a ritroso in un cocchio, ec.

Può ancora essere risvegliato da passioni violente, o dall'idea di oggetti disgustosi, massime di quelli, che fanno ordinariamente vomitare.

Alle volte dipende da un riflusso di bile dentro lo stomaco. In tal caso la materia che il malato vomita, è per l'ordinario gialla, verde, ed amara. Coloro che sono in preda alle malattie nervose, vanno soggetti a de' vomiti violenti che li assalgono all'improvviso.

In fine il vomito è un sintomo ordinario della gravidanza. In questo caso comincia in generale verso la seconda settimana dopo la soppressione de' mestrui, e continua per i tre o quattro primi mesi.

ARTICOLO SECONDO.

Maniera di curare il vomito cagionato dall'indigestione; o dalle sostanze venefiche.

Allorchè il vomito è dipendente dalla ripienezza dello stomaco, da una indigestione, o da alcune sostanze venefiche introdotte dentro di questo viscere, non bisogna considerarlo come una malattia, ma piuttosto come il rimedio della malattia. D'uopo è adunque di mantenerlo con dell'acqua calda, e del

dentro lo stomaco.
Flusso di ventre soppresso troppo subitanamente.
Soppressione d'una evacuazione consueta.
Diverse specie di malattie.

Movimenti straordinari.

Passioni violente
oggetti disgustosi.

Bile dentro lo stomaco.

Malattie nervose.

Gravidanza.

Si come in tal caso egli è piuttosto rimedio che male, bisogna mantenerlo.

Ipecacu-
ana .

362 *Parte Seconda, Cap. XXII. §. IV. Art. IV.*
cremore acquoso di avena. Se il malato fa tuttora de'
sforzi, se gli darà una dose d'*ipecacuana*, di cui si
ajuterà l'operazione con una *infusione* leggiera di fio-
ri di *camomilla*, come diremo Tom. III, Cap. XLIII
e XLVIII.

ARTICOLO TERZO.

*Cura del vomito cagionato dalla gotta risalita, e dalla
soppressione d'una evacuazione consueta.*

Fomenti
cataplas-
mi, &c.

Allorchè la *gotta risalita*, o la *soppressione* d'una
evacuazione consueta cagionano il vomito, forza
è di tutto mettere in opra per ristabilire il corso
della Natura; vale a dire, d'impiegare li *fomenti* e
i *cataplasmi* per richiamare la *gotta* all'estremità, al-
lorchè sia la *gotta retrocessa* quella che cagiona il vo-
mito, come lo diremo Tom. III, Cap. XXXIII.
E nel caso di *soppressione* d'una *evacuazione consueta*,
bisogna usare il *salasso*, se questa era una *evacuazione*
sanguigna, e il *vescicatorio*, o il *cauterio*, qualora el-
la si fosse l'*evacuazione* d'una *piaga*, o d'un *ulcere*,
o anco d'un *cauterio*, come si è detto Artic. III, e
nota 3 del §. precedente.

Salasso,
purgativi,
bagni al
piedi e alle
mani, cau-
terio, se-
tone, ve-
scicatorio,
&c.

Se malgrado tutti questi mezzi non si può perve-
nire a richiamare la Natura allo ristabilimento d'u-
na *evacuazione* abituale e necessaria alla conservazione
della salute, uopo è supplirvi per via del *salasso*, dei
purgativi, dei *bagni* caldi dei piedi e delle mani,
che si ripetono di tanto in tanto; o mediante il *cau-
terio*, il *setone*, il *vescicatorio*, &c. che si manterrà
finchè il vomito sia interamente svanito, e la salute
perfettamente ristabilita.

ARTICOLO QUARTO.

*Maniera di curare il vomito cagionato da gra-
vidanza.*

Piccole le-
vate di san-
gue e lassa-
tivi blandi.

IL vomito cagionato da *gravidanza* viene ordinaria-
mente mitigato dalla *emissione* di *sangue* e da al-
cuni *lassativi*; non bisogna però levare che pochissi-

no sangue per volta, e i lassativi devono essere blandissimi; tali sono i fichi, le prugna, la manna, la senna, ec.

Le femmine incinte vomitano più ordinariamente la mattina, immantinente dopo di essere sortite dal letto; il che deve in parte al cangiamento di posizione, ma più ancora allo stomaco, che trovasi vuoto. Per l'ordinario si previene questo vomito facendo loro prendere una tazza di tè, o una leggiera collezione stando in letto (4).

Tè: collezione in letto.

Le gravige che sono soggette a vomitare, devono essere tenute tranquille di corpo, e di spirito. Non bisogna che il loro stomaco resti affatto vuoto di nutrimento, nè che ne prendano troppo alla volta. L'acqua fredda è una bevanda convenevole in tal caso; e allorchè lo stomaco è debole, si può aggiungervi un po' d'acquavite. Se la malata è abbattuta, se sia soggetta a cadere in languore, se le porgerà un cucchiaino di acqua di cannella, con un po' di confettura

Tranquillità di corpo e di spirito; alimenti ripetuti sovente; acqua fredda, o con un po' di acquavite di acqua di cannella, ec.

(4) Il caffè ha singolarmente questa proprietà di arrestare il vomito. Si sono vedute alcune persone, tormentate da un vomito, cui niente valeva a calmare, liberarsene col solo uso del caffè; e queste persone sono segnatamente le gravige. Ne ho veduto una che vomitava assolutamente tutti gli alimenti ch'essa prendeva, eccetto il caffè ch'ella usava col latte. Ella prese partito di pigliarne due volte al giorno, e di questa maniera visse per il corso di quasi tre mesi. Io non mi sono accorto ch'egli abbia molto nociuto alla sua gravidanza, ch'è stata d'altronde assai burrascosa a motivo di due cadute ch'ella fece, e d'una eccessiva, ma sforzata stanchezza.

Vantaggio del caffè;

Ho altresì vedute una Signora, la quale dal terzo al quarto mese di gravidanza, provava, sopra tutto dopo il desinare, una gonfiezza di stomaco dolorosissima che la faceva cadere in languore, e che veniva generalmente suffeguita da una grande quantità di flati ch'essa rendeva per l'alto, e sovente anco con vomito. Le venne un giorno il capriccio di mangiare alquante ostriche; non ne mangiò che una dozzina, per tema di aumentare e di aggravare i suoi accidenti. Ella passò benissimo quella giornata; non patì nè gonfiezza, nè languore, nè vomito; ma rendette sempre dei flati, a' quali è d'altra parte soggettissima, essendo estremamente convulsiva. Continuò le ostriche, di cui ne mangiò fino a due o tre dozzine con eguale successo.

Dell'ostriche che. Offervazione.

364 *Parte Seconda, Cap. XXII. §. IV. Art. VII.*
 di *cosogno* o di *ayancia*. Noi parleremo di questa af-
 fezione nelle femmine gravide, Tom. IV, Cap. L,
 §. III.

ARTICOLO QUINTO.

Cura del vomito cagionato da debolezza dello stomaco.

*Chinachina
 nel vino
 col rabar-
 bare.*

*Polvere
 Stomachica.*

*Elisire di
 vitriolo.*

IL vomito cagionato da debolezza di stomaco richie-
 de gli amari. La *chinachina infusa nel vino* o nell'
acquavite, cui si aggiunge del *rabarbare*, quanto è
 necessario per lubrificare il ventre, è un rimedio ec-
 cellente. (La *polvere stomachica* prescritta di sopra,
 pag. 295. di questo Vol., è un rimedio che non man-
 ca quasi mai di riuscire, qualora si prenda pel corso
 di tempo convenevole.) L'*elisire di vitriolo* è egual-
 mente buono in tai casi. Si esibisce alla dose di
 quindici o venti goccioline, due o tre volte per gior-
 no, dentro un bicchiere di acqua o di vino.

ARTICOLO SESTO.

Cura del vomito cagionato da agrezza.

*Magnesia
 Abs. Dose.*

Si seda il vomito cagionato dalle *acidità*, facendo
 prendere de' *purgativi alcalini*. Il migliore rimedio
 di questa classe è la *magnesia alba*: se ne dà un
 cucchiaino da caffè dentro una tazza di tè, o in un
 po' di latte, tre ovvero quattro volte per giorno, e
 anche più spesso, se sia necessario, per lubrificare
 il ventre.

ARTICOLO SETTIMO.

Cura del vomito cagionato da passioni violente.

*Né vomiti,
 tori, né
 purgativi.*

*Tranquil-
 lità di cor-
 po, e di
 spirito; al-*

Allorchè il vomito dipende da *passioni violente*, o
 da forti affezioni dell'animo, bisogna guardarsi
 da ogni rimedio evacuante, sopra tutto dai *vomitivi*.
 In tai casi sarebbero essi pericolosissimi. Conviene in-
 allora che il malato si tenga in riposo, che il suo
 spirito sia tranquillo; che si rallegri; che prenda al-

cuni cordiali leggeri , come del *negus* , o un po' d' *legria*. Cor,
acquavite e d'acqua, cui si aggiungerà secondo le oc-
 cazioni alquante goccioline di *laudano*. diali, 124^a dano.

ARTICOLO OTTAVO,

Cura del vomito cagionato dalle affezioni nervose.

SE il vomito è cagionato dalle affezioni *spasmodiche* Antispas-
 dello stomaco, bisogna far uso del *muschio*, del modici.
castoreo, e degli altri *rimedj antispasmodici*. Muschio,
castoreo.

Gli *empiastr* aromatici sono ancora d'un ottimo ef- Empiastr
 fetto. Si può applicare sulla forcilla del petto l'*em-* stomachico
piastro stomachico del Dispensatorio di *Londra* o di o di teriaca
Edimbourg, o un *empiastr* di *teriaca*, che corrispon- sulla forcil-
 derà ancora meglio a questa indicazione. Si appliche- la del petto.
 ranno l'uno o l'altro un poco verso il lato sinistro,
 in guisa che ricopra una parte delle *coste spurie*.

Si daranno internamente dei *rimedj aromatici*, co- Infusione
 me l'*infusione* di *cannella* o di *menta*; del *vino*, do- di cannella,
 ve si abbia fatto bollire alcune *spezierie*, ec. Si stro- o di menta.
 piccerà lo stomaco con lo *spirito* di *vino raffinato*, o Stropiccia-
 se non si può averne, con l'*acquavite* gagliarda, o ture sullo
 con altri *liquori spiritosi*. Si faranno dei *fomenti* sul stomaco
 ventre con dell'acqua calda, o s'immergerà il ma- collo spiri-
 lato in un *bagno* caldo, in maniera che abbia dell' to di vino
 acqua fino al petto, come lo esporremo più estesamen- raffinato
 te Tom. III, Cap. XLV, che tratta delle *malattie* o acqua-
nervose (5), vite.
Fomenti
femicupi
caldi.

(5) Ho veduto pure le *ostriche* arrestare un vomito di que- Ostriche.
 sta specie. Una giovane soggetta a de' sconvolgimenti di *sto-* Osservaz.
maco periodici, segnatamente nel tempo degli *equinozi*, e che ne.
 le duravano de' mesi interi, non poteva mangiare senza vo-
 mitare una mezz'ora o un'ora dopo. Ella rigettava quasi
 nulla, e sovente anco niente affatto degli alimenti. Ciò ch'
 essa tendeva, non era che acqua densa e viscosa. Non aveva
 punto d'appetito, massime per la carne; in guisa che non
 mangiava il più sovente che delle *droghe*. S'avvisò nel mese
 di Settembre 1776, di voler mangiare delle *ostriche*, subito
 che la stagione ne presentasse. Ne mangiò, e non vomitò;
 continuò l'uso per tutta la stagione di queste conchiglie, che

ARTICOLO NONO.

Mezzi sicuri di guaire il vomito, qualunque ne sia la cagione; allorchè si rende necessario l'avresiarlo.

Pozione
salina.

IO ho sempre provato che la *pozione salina*, presa nel momento di sua *effervescenza*, aveva una virtù singolare per fermare il vomito, qualunque ne sia la cagione. Si prepara questo rimedio nella maniera seguente:

Maniera
di prepara-
tela.

Prendete *sal di tartaro*, una dramma;
suco di cedro, spremuto di fresco,
 un' oncia e mezzo;
acqua di menta col pepe,)
di cinnamomo semplice,) un' oncia;
zucchero, quantità sufficiente.

Si mescolano tutte queste sostanze, si eccita una *effervescenza*, cioè un movimento nel liquore sul momento della mescolanza; e si porge questa *pozione* al malato, anzi che questa *effervescenza* abbia cessato.

Si ripeterà questo rimedio ogni due ore, o più spesso, se il vomito è violento. (Si può adoperare in luogo di questo rimedio, l'*Antiemetico del Riverio*.)

ARTICOLO DECIMO.

Riflessioni sulle diverse specie di vomito, e sul governo ch' esigono.

Non in-
fatti i vo-
miti si de-
vono am-
ministrare
del rimedi.

(**Q**uantunque qui si proponga un rimedio per fermare il vomito, qualunque ne sia la cagione, bisogna guardarsi bene dall'amministrarlo in tutti i casi. Ci sono dei vomiti, come s'è detto, che ben

si fa durare a Parigi otto mesi, e si trovò benissimo; queste le donarono dell'appetito: per la qual cosa nella seguente primavera si sentì ella una buona salute, e s'è sempre conservata di bene in meglio da questo tempo in appresso. (Ved. *Traité des Malad. nerv.* del Sig. WHITT. Tom. II, pag. 376. nota *.)

lungi dall'essere una malattia, ne sono essi stessi il rimedio.

Si ucciderebbe il malato, qualora si volesse opporsi al vomito cagionato da una indigestione; da qualche veleno entrato nello stomaco; dal barcollamento d'un naviglio; dallo scrollo d'una vettura; da passioni violente; da ferite, ec. In tutti questi casi bisogna rispettare l'intenzione della Natura, che si sbriga per questa via d'una materia che se non venisse scacciata, diverrebbe cagione d'una malattia. Forza è al contrario di mantenere sì fatto vomito, che d'ordinario è di poca durata, mediante alcune bevande leggere, ma abbondanti, e non bisogna dar di piglio ai rimedj che quando si prolungasse oltre misura, o che indebolisse considerabilmente l'infermo.

Quanto ai vomiti cagionati dalla gravidanza, di rado riescono perigliosi. Avviene anzi che malgrado tutti i rimedj, essi tuttavia continuano fino al quarto mese, quarto mese e mezzo, termine ordinario in cui cessano da per se stessi. Ma è però sempre prudenza il seguire la regola di vitto che di presente prescrive; e se divenissero eccessivi, se giungessero a snuire la malata, dopo le piccole evacuazioni che si propongono, si potrebbe senza timore somministrare la pozione salina, o l'antimetico del Riverio.

Il vomito prodotto dalla debolezza dello stomaco non ha bisogno che degli amari. L'ho veduto cessare fin dal primo giorno dell'uso di sì fatti rimedj. Ma non n'è poi lo stesso di quello che proviene dalle affezioni nervose: egli è per l'ordinario de' più ostinati, e non cede che ai rimedj che convengono a questi mali. Fa di mestieri adunque in tai casi di consultare Tom. III, e Cap. XLV, che tratta delle malattie nervose.

ARTICOLO UNDECIMO.

Mezzi di prevenire il ritorno del vomito.

Siccome il menomo movimento può suscitare il vomito, anche dopo che si sarà fermato, d'uopo è che l'infermo si tenga in una inazione perfetta.

Quali sono quelli in cui farebbero pericoli.

Non convengono che quando i vomiti indeboliscono considerabilmente l'infermo.

Il vomito della gravidanza cessa ordinariamente da se nel quarto o nel quarto mese e mezzo: egli non richiede che la regola di vitto.

Il vomito cagionato dalla debolezza dello stomaco non richiede, che gli amari.

Bisogna che la *dieta* sia tale, che non carichi di soverchio lo *stomaco*, e non si dee prender nulla di difficile *digestione*. Noi non vogliamo però dire che abbisogni che il malato non viva che di *alimenti* liquidi. Gli *alimenti* solidi, ma leggieri, sono sovente in tal caso più facili da digerire.

CAPITOLO VIGESIMOTERZO.

Del flusso eccessivo d'orina, o sia diabete; dell'incontinenza d'orina; della soppressione e della ritenzione d'orina.

§. I.

Del flusso eccessivo d'orina, o diabete.

Chi sono
quelli che
ci vanno
soggetti.

IL *diabete* è una evacuazione eccessiva, e frequente d'*orina*. Questa malattia è rara presso la gioventù; ma è familiare alle persone avanzate in età, a quelle sopra tutto che si sono occupate in lavori faticosissimi, o che nella loro età giovanile anno bevuto con eccesso de' *liquori fermentati*.

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni del flusso eccessivo d'orina.

IL *diabete* succede sovente ad alcune malattie acute, ad alcune febbri, a delle smodate evacuazioni ec. Può essere cagionato da una grande stanchezza, da un viaggio lungo, sopra un cavallo di trotto incomodo, dal trasporto di fardelli troppo pesanti, da alcune corse sforzate, ec. Le bevande eccessive, l'uso dei *diuretici* forti ed irritanti, come la *sintura di canterelle*, lo *spirito di serbinto*, ec. possono darvi motivo.

Le acque
minerali
spesso lo
cagionano.
Perché?

Egli è sovente l'effetto d'un uso troppo prolungato dell'*acque minerali*. V'è chi s'immagina che queste acque non possano essere salutari, qualora almeno

meno non si prendano in grandissima copia. Da questo errore ne deriva sovente ch'esse cagionano delle malattie, peggiori di quelle che si volevano per via di esse guarire.

Finalmente il *diabete* può dipendere da un eccessivo rilassamento degli *organi secretorj* dell'*urina*, o da un'acrimonia che irrita troppo fortemente i *reni*, o dalla dissoluzione del *sangue*, che per questo mezzo passa in troppo grande abbondanza per le *vie urinarie*.

ARTICOLO SECONDO.

Sintomi del flusso eccessivo d'urina.

IN questa malattia la quantità dell'*urine* eccede per l'ordinario tutte le sostanze liquide che il malato prende. Esse sono chiare, pallide, d'un gusto dolce scipito, d'un odore più o meno gradevole. L'infermo soffre una sete continua, e un certo grado di *febbre*. Egli ha la bocca secca, e rende incessantemente degli *sputi* schiumosi. Le forze si perdono, l'appetito manca totalmente, la carnagione svanisce, in guisa che il malato ben presto non ha che la *peste*, e l'*ossa*. Prova del calore negl'*intestini*, e assai spesso i *lombi*, la *caglia*, ed i piedi divengono gonfi.

Sintomi che offrono si dall'urina;

Dal malato.

(Nei primi tempi della malattia non si prova quasi verun incomodo, o almeno è assai leggiero: ma questa calma non dura: il malato ben presto perde l'appetito; una febbricciuola lo consuma insensibilmente; il ventre si chiude, ec.)

Sintomi precursori.

Questa malattia è suscettibile di guarigione nei suoi principi; ma se esiste da qualche tempo, la cura diviene difficilissima. Non bisogna sperare di risanare i gran bevitori, i vecchi, ec. molestati da questo morbo.

Quando è presto che questa malattia è suscettibile di guarigione.

ARTICOLO TERZO.

*Vitto da prescriversi a coloro che sono molestati
da flusso eccessivo d'urina.*

Bevanda. L'Attenzione che si dee sopra tutto avere in questa malattia, è di evitare tutto ciò che può irritare gli *organi urinarij*, o fiaccare il *temperamento*. Il malato dee per tanto vivere di alimenti solidi. Se gli smorzera la sete con degli *acidi*, come quello di *acetosa*, di *cedro*, dell'*aceto*, ec. I *vegetabili mucillaginosi*, come il *riso*, il *sapou*, il *salep* col *latte*, sono alimenti convenientissimi. Tra tutte le sostanze animali si devono preferire i *testacei*, tali sono le *ostreche*, i *granchi* di mare, ec.

Alimenti. Se gli daranno per bevanda l'*acqua di Bristol* (1). Se non si può averne, se gli farà bere dell'*acqua di calce*, in cui si avrà fatto *macerare* una quantità sufficiente di *scorza di quercia*.

Ortiche.
Acque di Bristol.
Acqua di calce con la scorza di quercia.
Decotto bianco: colla di pesce.

Esercizio moderato.

Il *decotto bianco*, in cui si avrà fatto sciogliere della *ichtbyocola*, o sia *colla di pesce*, è parimente una bevanda convenevole.

L'infermo dee ogni giorno fare dell'*esercizio*; ma bisogna che questo *esercizio* sia moderato, in modo che non ne risenta stanchezza.

(1) E' difficile l'indicare un' *acqua minerale* di Francia che possa supplire a quelle di *Bristol*. Imperciocchè dall'analisi dell'*acqua di Seine*, dell'*Yvette*, d'*Arcueil*, di *Ville d'Avray*, di *Sainte-Reine*, e di *Bristol*, sotto il titolo di *Conseil reso alla Facoltà di Medicina di Parigi dai Commissarij nominati per l'esame dell'acqua del fiume d'Yvette*, dalla *Stamperia Reale*, 1767, è dimostrato che l'*acqua di Bristol* non sono punto *sulfuree*, che non contengono porzione veruna di *sale d'Epsom*, come si è preteso in Inghilterra, e che non sono *minerali* che in pochissima proporzione, relativamente a quelle cui si dà comunemente questo nome.

Se dunque per qualsivoglia circostanza taluno fosse costretto, dopo avere usato l'*acqua di calce*, come l'Autore lo consiglia in appresso, di somministrare un' *acqua minerale*, in tal caso sarebbe necessario di chiamare un Medico che preferisse, o le acque di *Bristol*, o quelle che l'esperienza gli avesse dimostrato convenire in tal caso.

Rimedi contro il flusso eccessivo d'urina. 371

Bisogna che sia coricato sopra un letto duro, o semplicemente sopra una coltrice. Niente di più contrario ai reni, quanto i letti soffici.

Il letto del malato dee esser duro.

L'aria secca e calda, l'uso della *scopetta* per la pelle, come pure tutto ciò che vale ad agevolare la *traspirazione*, conviene in questo male.

Aria secca e calda; scopette per la pelle.

Fa d'uopo per conseguenza che il malato porti una *flanella sulla pelle*: se gli applicherà un largo *empiaastro corroborante* sul dorso, o, ciò che adempie alla stessa indicazione, se gli stringeranno i *lombi* con una larga cintura.

Flanella, empiaastro corroborante sul dorso.

Cintura stretta d'intorno ai lombi.

ARTICOLO QUARTO.

Rimedi contro il flusso eccessivo d'urina.

I *Purgativi blandi*, se il malato non è eccedentemente infievolito dalla continuazione del male, faranno di buon effetto. Si comporranno di *rabarbaro* e di *semi di cardamomo*, o di qualsivoglia altro *aromo infuso nel vino*. Se ne darà finchè il ventre divenga lubrico.

Purgativi blandi composti di rabarbaro e di semi di cardamomo.

Immediatamente dopo, il malato prenderà de' *rimedi astringenti e corroboranti*. Si darà dunque quattro volte per giorno, o più spesso, se lo stomaco può sopportarla, mezza dramma della polvere seguente, (conosciuta sotto il nome di *polvere d'Elvezio*.)

Astringenti e corroboranti.

Prendete *allume*) di ciascheduno parti
catechù) eguali.

Polvere d'Elvezio.

Fate fondere l'*allume* in un crogiuolo; tritate poscia le due sostanze insieme.

Si può dare ciascuna dose di questa polvere in una tazza di *tintura di rose*.

Se lo stomaco non può sopportare l'*allume* in sostanza, bisogna farne del *siero*, di cui se ne esibirà tre o quattr'once, tre volte al giorno.

Siero di latte alluminoso.

Il *siero di latte alluminoso* si prepara nella maniera seguente.

Prendete *latte* recente, due pinte, o quattro libbre;
allume tre dramme.

Maniera di prepararlo.

Mettete il *latte* ad un lento fuoco; fate bollire;

gettatevi l'allume ; quando il latte è rappreso , feltrate .

Calmanti ;
loro impor-
tanza in
questa ma-
lattia .
Laudano .
Dose .

I *calmanti* sono utili in questa malattia anche quando il malato dorme bene . Sedano lo *spasmo* , e l'*irritazione* , nel tempo stesso che ristabiliscono il movimento circolatorio . Si possono porgere dieci o dodici goccioline di *laudano* liquido in un bicchiere di bevanda ordinaria , due o tre volte per giorno .

Corrobo-
ranti , chi-
nachina nel
vino , coll'
eliffire di
vitriolo .

I migliori *corroboranti* cogniti sono la *chinachina* ed il *vino* . Si può esibire una dramma di *chinachina* in polvere dentro un bicchiere di *vino* di *Porto* o di *Bordeaux* , tre volte per giorno : rendesi questo *rimedio* più attivo e più aggradevole , aggiungendo a ciascuna dose quindici o venti goccioline di *eliffire* di *vitriolo* . Coloro che non potranno sopportare la *chinachina* in sostanza , la prenderanno in decozione , nella stessa quantità di *vino rosso* , e *acidulato* come sopra .

§. II.

Dell'incontinenza d'orina .

In cosa l'
incontinen-
za d'orina
differisce
dal diabe-
te .

Questo è un male , cui le persone che molto faticano sono assai soggette nel declinar dell'età : un tal morbo si appella *incontinenza d'orina* . Ella però interamente differisce dal *diabete* , in quanto che l'*orina* , nell'*incontinenza* , gemono involontariamente , e goccia a goccia , e non eccedono la quantità che il malato solea rendere in istato di salute . Questa malattia è più incomoda che pericolosa .

Chi sono
coloro che
ci vanno
soggetti .

(Le persone che sono le più soggette a sì fatta incomodità , sono i fanciulli e i vecchi ; le femmine nel tempo di *gravidanza* , e che anno sofferto de' *parti laboriosi* ; i *regolati* , e coloro che sono dediti alla malvata abitudine dell'*onanismo* .)

ARTICOLO PRIMO.

Cagioni dell'incontinenza d'urina.

Ella deriva da un rilassamento dello *sfintere* della *vescica*, e sovente da una *paralisi* di questo organo. Può talvolta essere cagionata da alcuni urti, percosse, *contusioni*, *parti laboriosi*, e altri accidenti. E' talora l'effetto della *febbre*, e viene tal'altra volta prodotta da un lungo uso dei *diuretici* forti, o di *rimedj irritanti* iniettati nella *vescica*, ec.

(Ella è ancora cagionata dalla sola debolezza degli *organi*, come appo i fanciulli, i vecchi, gli *fregolati*, ed i *sensuali* abbominevoli; da una lesione fatta allo *sfintere* della *vescica*, come accade assai spesso nell'operazione della *pietra* e nei *parti laboriosi*; dalle *feccie* ritenute nell'*intestino retto*, e che comprimono la *vescica*; dall'esistenza d'un *calcolo*, o d'*una pietra* nella *vescica*, da un *tumore* qualunque nelle parti circonvicine; alle volte dall'uso immodato dell'acqua, o delle bevande acquose, o in fine dall'abuso dell'atto *venereo*.)

ARTICOLO SECONDO.

Cura dell'incontinenza d'urina.

(L'Incontinenza d'urina è incurabile nelle persone decrepite: non si può che palliarla coll'applicazione dell'*empiaastro corroborante* sulla *vescica*, con una cintura stretta all'intorno dei *reni*, col *vino*, e gli *alimenti* sostanziosi, con un *esercizio* moderato, finalmente mediante tutto ciò ch'è capace d'*invigorire*.

Nei vecchi non si può che palliar il male. Corroboranti.

Nei fanciulli questa malattia, che non dipende che da debolezza, si dissipa con l'età, e a misura che si fortificano. La *polvere di sorcio*, o i *sorci* arrostiti nello spiedo, sulla graticola, che usasi di loro porgere, e tanti altri *rimedj* di questa specie, non anno della rinomanza se non perchè di fatto l'*incontinenza* d'urina nei fanciulli guarisce da se sola.

Nei fanciulli questa malattia si guarisce da se sola col tempo.

Allorchè
ella è offi-
nata, ali-
menti sec-
chi, vino,
bagai fred-
di. Minac-
cie di cor-
rezione.

Del resto quando ella si prolunga troppo, uopo è di privarli della bevanda e degli *alimenti* acquosi; nutrirli di carne arrosta, di pane ben cotto; accordar loro un po' di *vino*: farli immergere nel *bagno freddo*, e sopra tutto minacciarli di qualche castigo; poichè non si può dubitare che non v'abbia spessissimo della mala volontà, massime tra quelli che non pisciano che in letto, e che nel giorno si tengono asciutti.

In quelli
che anno
la pietra.

L'*incontinenza* d'*orina* cagionata da una *pietra in vescica*, o dalla operazione di trarnela, si guarisce, come lo diremo nel Capitolo seguente.

Nelle fem-
mine gra-
vide ella
guarisce in
generale
per via del
parto.

Quella che accompagna la *gravidanza*, trova ordinariamente la sua guarigione nel *parto*. Se l'*incontinenza* d'*orina* persista, si adoperano i rimedj ch'essa esige, allorchè sopravviene ad un *parto penoso e laborioso*: tali sono le applicazioni sulla *vescica* de' *rimedi astringenti e corroboranti*, come l'*empiaastro corroborante*, di cui s'è parlato nel §. precedente; dei *fomenti di vino rosso* e di *rose damaschine*, di *menta*, di *ramerino*, ec. i *femicupj* e i *clisteri*, composti coll'*infusione* di queste stesse piante; si prenderanno interiormente le acque di *Bristol*, o alcune acque ferruginose, come quelle di *Provins*, di *Passy*, di *Forges*; e se il loro *stomaco* è capace di sopportarle, la *polvere*, o il *fiero alluminoso*, proposto nell'Art. IV del §. I di questo Cap.

Allorchè
persiste
empiaastro
fomenti
femicupj
lavativi
corrobo-
ranti.
Acque fer-
ruginee.
Polvere,
o fiero al-
luminoso.

I dissolu-
ti e i vi-
ziofi d'o-
nanismo di
rado ne
guariscono.

E' cosa assai rara che si guarisca l'*incontinenza* d'*orina* prodotta dalla dissolutezza colle femmine e dall'*onanismo*, massime quando sia inveterata: non si può sperare che nei principj, e i *rimedj* sono quegli stessi che abbiamo poc'anzi esposto, eccetto che bisogna cominciare dal rinunziare assolutamente a queste abitudini viziose.

In coloro,
la vescica
de' quali è
paralitica.
Circostan-
ze che in-
dicano un
vescicato-
rie sulle
vertebre
dei lombi.

L'*incontinenza* d'*orina* che dipende dalla *paralisi* della *vescica*, ricerca i *rimedj* della *paralisi*, che esporremo Tom. III, Cap. XLV, §. III, Art. II. Tuttavolta quando questa *paralisi* è cagionata da un *umore di reumatismo*, o di *gotta*, fissato sull'estremità della *midella allungata*, o della *spina del dorso*, o sui *nervi vicini*, *paralisi* ch'è ordinariamente accompa- gnata da quella dell'*estremità*, il *rimedio* è un *vescica-*

torio applicato sulle vertebre dei lombi, e mantenuto per alquante settimane, finchè la paralisi resti presio che dissipata. Allora si può sostituire al vescicatorio un lenimento spiritoso, come il seguente.

Prendete olio di rosa, un'oncia;
unguento nervino, due dramme;
olio essenziale di terebinto, gocce trenta.

Si stropiccia spesso volte nel giorno la parte su cui s'è applicato il vescicante, e anco le altre parti vicine.

L'incontinenza d'orina ch'è sintomo de' mali acuti giunti al loro grado più alto, e che accompagna comunemente la diarrea, o scorrenza di ventre, si guarisce col fugare coteste malattie. Ella non esige verun rimedio particolare.

Forza è però di accordare che questo male resiste il più sovente ai rimedj che abbiamo ora proposto, qualunque sia l'attenzione che si presta nell'amministrarli. In tai casi si consiglia alle femmine d'introdurre un pessario, o un anello dentro la vagina, come nella discesa della matrice; il quale comprimendo fortemente l'uretra, impedisce all'orina di scolare spontaneamente, e rende l'inferma padrona di evacuarla, quando vuole. Si sono parimente immaginati pegli uomini degl'istrumenti, che, comprimendo la verga e l'uretra, obbligano l'orina a restare dentro la vescica, in guisa che si può scaricarla quando si vuole, aprendo e chiudendo l'istrumento. Ma nè gli uomini, nè le femmine vogliono assoggettarli all'incomodo di quest'istrumenti. Si sono altresì immaginati de' vasi di cuojo, di vetro, o di argento atti a raccogliere l'orina: si portano indosso per garantirsi dal puzzo e dall'immondezza cui espone questo male.)

L'incontinenza d'orina sintomatica si guarisce col togliere la malattia di cui è sintomo.

Così bisogna fare allorchè l'incontinenza d'orina resiste a tutti i rimedj appo le femmine; Presto gli uomini.

§. III.

Della soppressione d'orina, o iscuria, e della ritenzione d'orina.

(LA soppressione d'orina è appellata iscuria dai Medici, che la dividono in renale e in vescicale.

Divisione della soppressione d'

orina, o is-
curia.

La *renale* ritiene il nome d'*iscuria* o di *soppressione* d'*orina*, e la *vescicale* si denomina più comunemente *ritenzione d'orina*.)

ARTICOLO PRIMO.

Sintomi della soppressione e della ritenzione d'orina.

Sintomi
dell'iscuria
renale, o
soppressio-
ne d'orina.

Sintomi
caratteri-
stici.

Sintomi
dell'iscuria
vescicale o
ritenzione
d'orina.

Sintomi
caratteri-
stici.

Sintomi
che distin-
guono que-
ste due ma-
lattie.

Come ef-
fe fisica-
no.

L' *iscuria renale* è caratterizzata da un dolore oc-
culto, con un senso di peso ai *reni* e ai *lom-
bi*, da *cardialgia*, da *nausee* e *vomito*, da *sapore ori-
noso* nella bocca, e da puzzo d'*orina* che manda il
malato, da soffocazione e affopimento. L' infermo
non sente alcuna voglia d'*orinare*, e non ne fa sfor-
zo veruno: non v' ha gonfiezza alcuna nell' *ipogastro*,
nè nelle parti adiacenti; non sorte stilla d'*orina* coll'
introdurre la *sciringa* ec.

I *sintomi* dell' *iscuria vescicale*, appellata comune-
mente *ritenzione d'orina*, sono un sentimento di peso
nell' *ipogastro*, nel *pube* e *perineo*; delle voglie d'*ori-
nare* accompagnate da sforzi inutili; una tumefazione
assai elevata al disopra dell' *osso pube*, dolorosa allor-
chè si tocca, e che rappresenta la stessa figura della
vescica: si sente qualche fluttuazione in questo *tumo-
re*, se per altro la *vescica* non sia eccessivamente di-
stesa; finalmente questa tumefazione si deprime, o
scema, allorchè l' *orina* s'è evacuata, sia naturalmen-
te, sia col mezzo della *sciringa*.

L' *iscuria vescicale* è ordinariamente senza *febbre*,
ma quando dipende dall' *infiammazione*, o dalla *sup-
purazione* della *vescica*, della *prostata*, ec. conseguen-
ze assai ordinarie delle *gonorree virulente* arrestate, è
accompagnata da *febbre*, e sovente da delirio; il do-
lore e gli ardori sono vivissimi, e gl' infermi sono
grandemente abbattuti.

E' facile il distinguere l' *iscuria vescicale*, dalla ten-
sione e dall' elevazione della parte inferiore del ven-
tre; da un senso di peso al *perineo*, e sopra tutto
dalla voglia d'*orinare*, che non soffresi quasi mai nell'
iscuria renale. Ma l' una e l' altra terminano sovente
in *cachessia*, in enfiagione di tutto il corpo, *idropisia*,

Cura della soppressione d'orina, ec. 377
affezioni soporose, difficoltà di respiro, delirio, moti convulsivi, e morte.)

ARTICOLO SECONDO.

Cagioni della soppressione e della ritenzione d'orina.

Abbiamo omai fatto osservare, Cap. XXI, §. IV e V di questo Vol., che la ritenzione e la soppressione d'orina possono dipendere da gran numero di cause; come dall'*infiammazione dei reni e della vescica*.

Alcuni calcoli, o della *renella* arrestata nelle *vie urinarie*; le materie fecciose, indurite ed ammassate nel *retto*; lo *spasmo*, o *increspatura* del collo della *vescica*; la *gravidanza*; i grumi di sangue rattenuti dentro la *vescica*; la tumefazione dei *vasi emorroidali*; l'*increspatura spasmodica* di tutti i *visceri del basso ventre*, che ha sovente luogo nelle *malattie acute* e nell'*affezioni ipocondriche ed isteriche*, l'*infiammazione* e gonfiezza della *prostata*, ec. possono ancora cagionarla.

(Coloro che trattengono troppo a lungo le *urine*, si espongono a questo male: le sregolatezze con le femmine possono altresì farla nascere. Le stesse femmine possono esserne assalite dopo l'atto *venereo*. Finalmente ogni vizio, o malattia della *vescica* e del *canale dell'uretra*, che tendono ad indurare, e a restringere la loro capacità, come l'*escrescenze*, le *caruncole*, ec. possono essere altrettante cagioni della ritenzione e della soppressione d'orina.)

ARTICOLO TERZO.

Cura della soppressione e della ritenzione d'orina.

DAlla numerazione delle cagioni che abbiamo poc' anzi esposto, s'intende quanto sarebbe lungo e difficile lo stendersi a partitamente descrivere la cura di cui ciascheduna d'esse è suscettibile. Questo lavoro sarebbe anzi superfluo, poichè la maggior parte di queste cagioni, massimamente quelle che sono in-

flamatorie, formano da se sole de' mali, di cui s'è già parlato, o di cui parleremo in seguito, e la loro cura si trova negli Articoli che le riguardano,

Allorchè queste cagioni sono infiammatorie.

Per la qual cosa l'*iscuria* che dipende dall'*infiammazione dei reni*, della *vescica*, dello *stomaco*, e degli altri *visceri del basso ventre*; da quella degli *ureteri*, nell'occasione di qualche *calcolo*, o *venella* impegnata in questi canali; da quella del collo della *vescica*, della *prostata*, e del canale dell'*uretra*; in seguito d'una *gonorrea virulenta* mal curata, ec. esige il governo stesso di quelle malattie, di cui ella, a propriamente parlare, non n'è che un *sintomo*; e si guarderà il Cap. XXI, e Cap. XXIV, di questo Vol. e Tom. IV, Cap. XLIX, §. I, III e VI, Art. II e III.

In tutti questi casi però, allorchè l'*iscuria* sembra essere il *sintomo* urgente, fa d'uopo cercare di paliarla coi *rimedj* seguenti.)

Evacuazioni, fomenti e bagni.

Per conseguenza crediamo di dover raccomandare contro ogni *ritenzione* o *soppressione d'orina* dipendente da una cagione *infiammatoria*, l'*evacuazioni*, li *fomenti* ed i *bagni*.

Cacciata di sangue: suoi vantaggi in questo caso.

La *cacciata di sangue*, tosto che le forze del malato possono permetterla, è necessaria, massime se v'abbia qualche *sintomo d'infiammazione locale*. La *emissione di sangue* in questo caso non solamente calma la *febbre*, rallentando il moto della circolazione, ma ancora rilassando i *solidi*, distrugge lo *spasmo* e la *costrizione dei vasi*, che cagionano la *soppressione d'orina* (2).

Fomenti molliativi.

Dopo il *salasso* conviene adoperare li *fomenti*. Si fanno con dell'acqua calda solamente, o con una *decozione di piante addolcitive*, come di fiori di *malva*, di *camomilla*, ec. S'inzuppano de' pannolini in questi liquidi, e si applicano sulla parte inferma; oppure

Sanguisughe ali' ano.

(2) Ma se la debolezza del malato persiste troppo a lungo, in maniera d'impedire di usare o di replicare il *salasso*, siccome questa *evacuazione* è di somma utilità in questo caso, forza è di applicare le *sanguisughe all'ano*, massime se l'infermo sia soggetto all'*emorroidi*.

re vi si terrà costantemente una vescica di sì fatte decozioni.

Alcune persone si servono delle piante stesse, dopo che sono state bollite; le mettono tra due flanelle, e le applicano sul ventre. Questo metodo non è in verun conto biasimevole. Queste piante si mantengono calde più a lungo che i pannolini inzuppati di decozione, e tengono nel tempo stesso la parte più egualmente umettata (3).

Piante ammollienti applicate sul ventre.

(Si metterà il malato in un *semicupio* di acqua tiepida, vi resterà quanto le sue forze glielo permetteranno; e, secondo che le circostanze lo domanderanno, si replicherà più o meno di volte.

Semicupio tiepido.

La stessa cura conviene contro l'*iscuria* cagionata dall'aver trattenuto troppo a lungo l'*urina*, come pure a quella che succede all'atto *venereo*, e alle fregolatezze commesse colle femmine. Imperciocchè o questa specie d'*iscuria* è accompagnata da *infiammazione*, o essa la produce: talvolta ancora non deve la sua origine che ad uno *spasmo* della *vescica* e delle parti vicine. In tutti questi casi ella non è molto pericolosa, se non le si lasci fare de' progressi; poichè non mancano esempi per provare che questa specie d'*iscuria* trascurata è divenuta mortale.

Cura allorchè la ritenzione d'urina è cagionata dall'aver trattenuto troppo a lungo l'urina, o da alcune fregolatezze con le femmine;

L'*iscuria* cagionata dall'*affezioni isteriche* e *ipocondriche*, ricerca una parte dei *rimedj* esposti di sopra, congiuntamente a quelli ch' esigono questi mali, di cui parleremo Tom. III, Cap. XLV, §. II e XIII.

Dalle affezioni isteriche e ipocondriche.

Ma nell'*iscuria* prodotta da alcuni umori densi ch' ingorgano le *vis urinarie*; in quella cagionata da *viscosità*, da *suppurazioni*, da *ulcere*, o da *carneosità* di queste parti; da rilassamento, o da torpore dei *seni*

Cagioni che in luogo del rilassanti ricercano dei stimolanti, del leni.

(3) Non v'è chi non si accorga di questa verità. Ma allorchè si adoperano le piante stesse, bisogna avere la cura di spogliare tutte le foglie della loro lanuggine e delle loro costole, che a cagione della loro durezza incomodano la pelle del ventre, sensibilissima in questo caso e nelle *malattie infiammatorie del basso ventre*, di cui s'è trattato di sopra Cap. XXI di questo Vol.

Attenzione che bisogna avere quando si applicano le piante ammollienti

menti spi-
ritosi, i ve-
scicatorj,
le doccia-
ture, ec. i
diuretici
caldi, ec.

o della *vescica*, e da paralisi di questi organi; non v'ha più luogo ai *rilassanti*, v'abbisognano dei *stimolanti*, sia in *fomenti*, sia in *cataplasmi*; dei *lenimenti* caldi e spiritosi, de' *vescicatorj*, come si è detto qui sopra pag. 375 di questo Vol. delle *docciature*, dei *bagni d'acque termali*, del *moto a cavallo* o in *vetture*; e internamente dei *diuretici caldi e salini*, degli *alimenti piccanti*, de' *purgativi*, dell' *acque termali*, ec.

Cagioni
che richie-
dono le
acque di
Contrex-
ville.

Allorchè l'*iscuria* deriva da alcune *viscosità*, da *suppurazioni*, da *ulcere* nei *reni*, negli *ureteri*, e nella *vescica*, o da alcune *carnosità* nel *canale dell'uretra*, noi consigliamo l'uso dell' *acque di Contrexville*, di cui si parlerà nel Cap. seguente nota 3. Così crediamo, dopo varie reiterate esperienze, che si debbano preferire a tutte le altre *acque minerali*, riguardate come *rimedj* in questi casi.

Cura della
ritenzione
d'orina ca-
gionata dal-
la gravi-
danza;

Quando l'*iscuria* è cagionata dalla *gravidanza*, il più delle volte non esige verun *rimedio*; basta ordinare alla *femmina* di prendere sul letto una *posizione*, che possa rimuovere dalle parti inferiori del *bacile* il *fiordello* ch'ella porta in grembo; e ciò le riuscirà agevole, coricandosi sull'uno o l'altro de' *fianchi*. D'altra parte il *parto* stesso la mette al coperto d'ogni *recidiva*. L'*iscuria* che nasce dalle *fecce* ammassate e indurite dentro il *retto*, cede ai *clisteri purgativi*, più o meno ripetuti.)

Dalle ma-
terie am-
massate nel
retto.
Scirringa.

Parecchie delle cagioni dell' *iscuria* esigono che si metta in opra la *scirringa*, per distruggere l'*ostacolo* che chiude il passaggio dell'*orine*, e farle scolare: ma siccome questo istrumento non può essere maneggiato che dai *Cerufici*, noi non ne diremo di più. Una *candeletta* introdotta con cautela e destrezza nel *canale dell'uretra*, riesce sovente meglio che la *scirringa* (4) . . .

Candelet-
ta.

(4) Si comprende che la *scirringa* o la *candeletta* non possono procurare l'*uscita all'orina*, che nell'*iscuria vescicale*, come diremo not. 2 del Cap. seguente.

ARTICOLO QUARTO.

Mezzi generali da usarsi contro la soppressione e la ritenzione d'urina, qualunque ne sia la cagione.

Qualunque sia la cagione della soppressione d'urina, è necessario di tenere il ventre libero. Ciò non vuol dire che abbisogni impiegare de' *purgativi* forti: *de' clisteri molli*vi, o delle *infusioni* leggiere di *sen*a e di *man*na, sono bastevoli. I *clisteri* in tai casi lubrificano il ventre, e servono di *formenti* interni. Giovano ancora singolarmente a sedare lo *spasmo* della *vescica* e delle parti adiacenti.

Gli *alimenti* devono essere leggiere, e presi in piccola quantità. Si porgerà per bevanda del brodo leggiere, o delle *decozioni*, delle *infusioni* di piante *mucillagginose*, come la radice di *altea*, i fiori di *siglio*, ec. Si aggiungeranno di tanto in tanto a sì fatte bevande cinque o sei goccioline di *spirito di nitro dolce*, o una *dramma* di *sapone di Alicante*. Se non v'abbia *infiammazione*, il malato può bere un po' di *punch* leggiere senza *acido* (5).

Purgativi blandi. Clisteri ammollienti.

Alimenti e bevanda.

Spirito di nitro dolce, o sapone di Alicante.

(5) Si osserverà che i *diuretici* qui dall'Autore prescritti, non convengono che nell'*iscuria renale*. Sarebbero perniciosi nella *vescicale*: questa non deve essere attaccata, avuto però sempre riguardo alle cagioni che l'anno prodotta, se non coi *bagni*, coi *semicupi*, li *fomenti*, i *cataplasmi*, la *scringa*, o la *candelista*, ec.

Bisogna accordare che la molteplicità delle cagioni di questo male, e il pericolo cui egli espone in generale, ne rendono il governo delicatissimo, ch'elige della sagacità e dell'esperienza in coloro che vogliono intraprenderlo. Crediamo per tanto di dover consigliare ognuno di chiamare le persone dell'Arte, tutte le volte che si abbia il comodo di farlo.

ARTICOLO QUINTO.

Mezzi di preservarsi dalla ritenzione e dalla soppressione d'urina.

Alimenti
leggieri, be-
vanda di-
luente.

Nessun a-
cido, nè
vino auste-
ro; eserci-
zio, letti
duri, di-
strazione,
ec.

LE persone soggette alla *soppressione d'urina* devono vivere secondo le leggi della temperanza. Bisogna che i loro alimenti sieno leggieri, e che la bevanda sia *diluente*. Non prenderanno nè *acidi*, nè *vi-
ni austeri*. Faranno un *esercizio moderato*. Si coriche-
ranno sopra de' letti duri. Fuggiranno lo studio, e
le occupazioni sedentarie. (6).

CAPITOLO VIGESIMOQUARTO.

Della renella e della pietra.

Definizio-
ne della re-
nella;

ALlorchè della *sabbia* o de' piccoli *calcoli* soggior-
nano nei *reni*, o sono strascinati per la via de-
gli *ureteri* con l'*urina*, si dice che il malato ha la
renella.

Della pie-
tra.

Se avvenga che uno di questi piccoli *calcoli* si fissi
dentro la *vescica*, che vi resti per qualche tempo,
che aumenti di volume per l'aggiunta delle materie
sabbiose dell'*urina*, che vi si attaccano all'intorno,
in guisa che alla fine divenga troppo grosso per sor-
tire dalla *vescica* per via il *canale* dell'*uretra* con l'*urina*,
in tal caso si dice che il malato ha la *pie-
tra* (1).

(6) Questo sarebbe il luogo di parlare di due altre malat-
tie, conosciute sotto il nome generico di *difficoltà d'urina-
re*, e che i Medici chiamano *diffuria* e *stranguria*: ma sic-
come sono *simptomi* ordinarj del *morbo venereo*, il Sig. BUCHAN-
LE ha collocate nel numero dei *simptomi* di questa ultima ma-
lattia. Si troveranno Tom. IV, Cap. XLIX, §. VII, Art. II
e III.

Cosa sia l'
urina.

(1) Non v'è chi non abbia osservato che l'*urina* depono
al fondo del vaso in cui stagna, e che questa posatura è di na-

§. I.

Cagioni della renella e della pietra.

LA renella e la pietra possono essere generate dagli alimenti di gusto troppo piccante, dall'uso dei vini gagliardi ed astringenti, e da un genere di vita sedentaria. Patire troppo caldo nel letto, (in maniera di sforzare costantemente la traspirazione ed il sudore; l'abuso delle sostanze rilassanti a segno di eccitare una scorrenza di ventre abituale;) coricarsi su letti troppo soffici, restare soverchiamente a lungo coricati sul dorso, possono ancora cagionare l'una, o l'altra di sì fatte malattie, che possono parimenti riconoscere per cagione l'uso costante d'un'acqua impregnata di particole terrestri, o pietrose, e di alimenti di natura astringente, o stutiosa, ec. Possono altresì derivare da un vizio ereditario.

Le persone attempate, o quelle che sono state travagliate da gotta, o da reumatismo, ci sono le più soggette.

Chi sono coloro che ci vanno soggetti.

§. II.

Sintomi della renella e della pietra.

LA renella, o i calcoli dei reni, cagionano dei dolori nei lombi, delle suogliatezze, il vomito, e

Sintomi particolari della renella.

tura renosa, pietrosa; ec. ed è perchè l'orina è una spezie di liscivia, composta d'una grande quantità d'acqua; d'una materia terrestre capace di precipitare; di due sali fosforici, l'uno ammoniacale, l'altro a base di alcali fisso; di sal marino, e finalmente d'una materia salina osiosa saponacea, che non contiene che dell'olio combinato. Questa materia terrestre, di cui l'orina è più o meno carica, relativamente al temperamento e al modo di vivere, è quella, che se incontri un nocciolo, vi si attacca, e forma in seguito un corpo più o meno compatto, al quale si è dato il nome di calcolo o pietra: d'onde si vede che la renella non è che il primo grado, e il principio della pietra; e che queste due malattie non differiscono l'una dall'altra che dal volume del corpo straniero che soggiorna nel rene o dentro la vescica.

La renella non è che il primo grado della pietra.

talvolta l'*orine cruenta*. Allorchè i *calcoli* discendono nell'*uretere*, e che sono troppo voluminosi per passare agevolmente per questo canale, tutti questi *sintomi* aumentano d'intensità. Il dolore invade le parti vicine della *vescica*; la gamba e la coscia del lato infermo restano intormentite, i *testicoli* risalgono in alto, e le *orine* sono sopresse.

Sintomi
particolari
della pie-
tra.

La *pietra* nella *vescica* si riconosce dai dolori che provansi nell'orinare, come pure innanzi e dopo di avere orinato; dal gemito dell'*orina*, che esce goccia a goccia, o da una *sospensione* subitanea nell'istante stesso ch'ella scaturiva a pieno sgorge; da un dolore acuto nel collo della *vescica* dopo il moto, massime dopo quello del cavallo, o della carrozza sopra un cammino scosceso; dal *sedimento* dell'*orine*, ch'è bianco, denso, copioso, di mal odore, e *muoso*; da un solleticamento delle parti genitali, (che obbliga il malato dell'uno e dell'altro sesso a portarvi incessantemente le mani,) da incitamenti di scaricare il ventre nello stesso istante che si orina; dalla facilità maggiore d'orinare restando supino che in piedi; da una specie di movimento *convulsivo*, cagionato da un dolore acuto nel rendere l'ultime gocce d'*orina*; finalmente dal toccare la *pietra* mediante il *cattetero* o la *sciringa* (2).

Sintomo
caratteri-
stico.

A R.

Non v'è
che la *scir-
ringa*, che
possa assicu-
rare dell'
esistenza
della pie-
tra. De-
strezza
ch' esige l'
introduzio-
ne della
sciringa
nella *ve-
scica*.

(2) Non v'è che il *cattetero* o *sciringa* che possa assicurare dell'esistenza della *pietra* nella *vescica*. Tutti i segni ora esposti dall'Autore sono equivoci, e ingannano tutto giorno. Fa di mestieri dunque, tosto che si provi alcuno dei *sintomi* descritti di sopra, chiamare un Cerusico sperimentato, e farsi *sciringare*. Dico un Cerusico sperimentato; perchè questa operazione, per quanto semplice ella sembri, esige una destrezza, di cui vi abbisogna di molto onde tutti i Cerusici sieno capaci. Si sono veduti gli accidenti i più funesti venire in seguito di questa operazione, per l'imperizia o l'ignoranza di colui che l'aveva eseguita. Allorchè l'Operatore ha riconosciuto che esiste veramente una *pietra*, conviene riportarsi assolutamente a' suoi consigli, o a quelli d'un Medico, nel qual caso abbiasi riposto la propria fiducia.

§. III.

Vitto che devono seguire coloro che sono travagliati da renella, o dalla pietra.

LE persone travagliate da *renella*, o dalla *pietra*, devono evitare gli alimenti di natura *flatuosa* o *riscaldante*, come le vivande salate, le frutta acerbe, ec. Tutto ciò che prendono deve tendere ad eccitare la secrezione dell'*orina*, e a lubrificare il ventre. Faranno uso di *carciofi*, di *spargi*, *spinace*, *lattuca*, *prezzemolo*, *cicoria*, *porcellana*, *rape*, *pomi di terra*, *carote*, *rapano*, ec. Le *cipolle*, i *porri*, gli *appii*, sono in questi casi riguardati come *rimedj*.

Alimenti di cui devono privarsi;

Di cui devono far uso.

Le bevande le più convenevoli sono il *siero di latte*, il *latte di burro*, il *latte stesso* mescolato coll'acqua, l'acqua d'*orzo*, le *decozioni* di radice di *alten*, di *prezzemolo*, di *legorizia*, o di ogni altra *sostanza mucillaginosa* dolce, come la *semenza di lino*, ec. Se l'infermo è assuefatto ai *liquori spiritosi*, potrà bere del *punch* leggiero senza *acido*.

Bevanda.

Un discreto *esercizio* conviene; ma se fosse violento, potrebbe cagionare l'*orina sanguigna*; bisogna dunque che l'*esercizio* sia moderato. Le persone aggravate da *renella*, rendono sovente un gran numero di piccoli *calcoli*, dopo d'essere stati a cavallo o in vettura. Ma coloro che anno una *pietra* nella *vescica*, sono di rado capaci di sostenere questa specie di *esercizio*.

Esercizio moderato.

Coloro che anno motivo di temere di avere un giorno questa malattia, perchè i loro genitori l'anno sofferta, devono fuggire la vita sedentaria. Se subito dopo i primi *simptomi* di *renella*, si osservi una *dietta* convenevole, se facciasi un *esercizio* sufficiente, si distruggerà la cagione della malattia, o almeno s'impedirà ch'ella non s'aumenti. Ma se seguasi lo stesso modo di vivere, come quello che ha suscitato la malattia, non può egli a meno di non aggravarla.

Regola di vitto che devono seguire coloro che anno motivo di temere questa malattia, perchè i loro genitori l'anno patita.

(Un *vitto* soverchiamente rilassante sembra dover essere favorevole alla produzione della *renella*, e alla formazione della *pietra*. Noi l'abbiamo già detto, e noi esitiamo a ripeterlo: tutte l'*escrezioni* del corpo

Non bisogna che il vitto sia troppo rilassante. Perchè?

umano anno una tale affinità tra loro, che l'una non può essere sforzata senza che le altre non sieno diminuite nella medesima proporzione. Lo abbiamo provato Cap. VI, §. I, Art. III, not. 2 di questo Vol. dall'effetto della *cacciata di sangue* nella *perispneumonia*, allorchè l'infermo sputa agevolmente e copiosamente; e questa verità è ancora più evidente nell'*escrezioni* del ventre. Abbiamo veduto Cap. XXII, §. III, di questo Vol., che uno dei *sintomi* della *scorrenza di ventre* è la diminuzione dell'*orine*, che prendono un colore carico in proporzione della loro scarsa quantità; e che al contrario il ventre è chiuso, allorchè il flusso d'*orine* è abbondantissimo, come nel *diabete*, o *flusso eccessivo d'orina*, di cui abbiamo parlato nel Cap. precedente.

Bisogna che l'orina sia abbondante senza che il ventre sia troppo rilassato.

Dall'istante che qualcheduno è nel caso di temere sì fatto male, sembra dunque importante ch'egli eviti tutto ciò ch'è capace di rilassare soverchiamente il ventre; non è bene ch'egli sia neppure troppo stitico; ma conviene che l'*escrezione dell'orina* sia in lui la più copiosa dell'altre.

Mezzi da praticarsi a questo effetto.

Per ciò l'*esercizio abituale all'aria aperta*, di qualunque si sia specie, purchè non giunga a sforzare il sudore; l'uso costante degli alimenti, specificati in questo §., accoppiati ad alcune sostanze *animali*; il vino bianco temperato in parti eguali di *acqua per bevanda*, e l'attenzione di evitare tutte le cause esposte nel §. I di questo Cap., sono li *specifici* i più certi e i più sicuri.)

§. IV.

Rimedj che bisogna prescrivere a coloro che sono travagliati da renella, o dalla pietra.

Come bisogna governare il malato in un accesso di renella.

IN ciò che appellasi un *accesso di renella*, ordinariamente cagionato da piccoli *calcoli* fermati nell'*uretere*, o in qualcheduna delle *vie orinarie*, bisogna cavar sangue al malato, applicare dei *fomenti caldi* sui lombi e sul ventre; fare de' *clisteri ammollienti*; usare dei bagni; far bere delle *tisane diluenti*, *mucillaginose*, ec. Abbiamo esposto il governo che conviene in que-

No caso, parlando dell'infiammazione dei reni, e della vescica; noi dunque rimandiamo il Lettore al Cap. XXI, §. IV e V di questo Vol.

Il Dott. WHYTT consiglia a coloro che sonò soggetti a de' frequenti accessi di renella nei reni, ma che non anno alcuna pietra nella vescica, di bere ogni mattina due o tre ore avanti la merenda, una foglietta di acqua di calce fatta con le scaglie di ostriche o di petroncoli. Egli osserva con molta ragione, che sebbene questa dose sia troppo piccola per disciogliere sensibilmente una pietra che esistesse già da qualche tempo dentro la vescica, è però probabile ch'ella si opporrebbe alla sua formazione o al suo accrescimento, qualora avesse solo forza bastante di colà pervenire (3).

Acqua di calce, fatta con i gusci di ostriche o di petroncoli.

(3) Si sono provati degli effetti eccellenti in questi stessi casi dalla bibita copiosa dell'acque minerali di Contrexville in Lorena, di cui il Sig. THOUVENEL mio amico ha dato una dotta analisi in una Memoria ch'egli ha pubblicato nel 1774, sui principj e le virtù di quest'acque. Esse anno eziandio fatto escludere delle pietre d'una mezzana grossezza.

Acque di Contrexville.

A questo proposito riferisce la testimonianza d'un Medico sperimentatissimo, che si esprime così: „ Le acque minerali „ di Contrexville sono meravigliose nelle malattie dei reni, „ degli ureteri, della vescica, e dell'uretra; quali sono la „ pietra, il calcolo, la renella, le viscosità, le suppurazioni, „ le ulcere di queste parti, e le carnosità dell'uretra. „ Osianno asserire, soggiunge, sopra testimonianze non sospet- „ te, che le acque di Contrexville sono sovrannamente effica- „ ci contro la pietra, che esse distaccano e fanno sortire dal- „ la vescica, quando non sia che d'una grossezza mediocre; „ che anno la proprietà di spezzare e di frangere quelle che „ sono le più grosse, e di una natura renosa e gessosa; quel- „ le eziandio che sono in parte gessose e in parte murali. „

I Sig. DE BORDEU forma lo stesso elogio dell'acque di Bonnes, o di Bares, e di Canterès, dietro alcune esperienze fatte sopra dei calcoli, che si sono dileguati a capo di alquanti giorni dentro una di quest'acque, dove non n'è restato che un granello, che sarebbe agevolmente passato per tutte le vie orinarie. Aggiunge che non v'è specie d'acque minerali in Francia, dove non si conservi la memoria di alcune guarigioni di colica nefritica calcolosa, e dove non si mostri più o meno di renella resa dalla bibita di sì fatte acque. Recherches sur le Malad. Chroniq. T. I, pag. 575, e seg.

Acque Bonnes, di Bares, o di Canterès.

Cura al-
lorché la
pietra è
formata
dentro la
vescica.

Sapone di
Alicante e
acqua di
calce.

Per quan-
to tempo
bisogna
continuare
questi ri-
medj.

Acqua di
calce se-
conda o
terza.

Allorchè la *pietra* è formata nella *vescica*, il Dott. WHYTT raccomanda il *sapone d' Alicante* e l' *acqua di calce*, fatta di gusci di *ostriche* o di *petoncoli*, ch' egli ordina di prendere nella maniera seguente.

Il malato prenderà tutti i giorni, sotto la forma che gli sembrerà la meno disagiata, un' oncia di *sapone d' Alicante*, e berà tre fogliette, o due pin-
te d' *acqua di calce*, fatta con i gusci di *ostriche* o di *petoncoli*; ma dividerà il *sapone* in tre parti ineguali. Prenderà la maggiore di buon mattino a digiuno, la seconda sul mezzo giorno, e la terza sette ore dopo, avendo cura di bere dietro ciascuna dose un gran bicchiere di *acqua di calce*. Il resto di quest' *acqua di calce* si avrà a bere tra il pranzo e la cena, in luogo di ogni altra bevanda.

Dose. Tuttavolta è bene di cominciare da una dose di *sapone* e di *acqua di calce*, minore di quella che prescrive il Dott. WHYTT. Il malato non dee prendere da prima che una foglietta d' *acqua di calce*, e tre dramme di *sapone* per giorno. Egli aumenterà questa quantità per gradi, sino alla dose prescritta. Ma bisogna ch' egli continui l' uso di questi *rimedj* per parecchi mesi, massimamente s' egli si accorga di qualche sollievo, e per parecchi anni, se la *pietra* sia di notevole volume.

Potrebbe altresì essere vantaggioso per il malato, se soffrisse molto, non solamente di cominciare da piccole dosi di *sapone* e d' *acqua di calce*, ma ancora di non prendere che dell' *acqua di calce seconda*, o *terza*, in vece della *prima* (4).

Cosa in-
tenda per
queste due
specie di
acqua di
calce.
Importan-
za di non
pervenire
alla dose di
acqua di
calce che
per gradi.
Persone
alle quali

(4) Si chiama *acqua di calce seconda*, quell' *acqua* che si è versata sopra il fondigliuolo, dopo che si è travasato e chiarificato la *prima acqua di calce*. (Ved. questa voce nella Tav.) L' *acqua di calce terza*, è quella che si versa sopra la posatura, dopo che si è ridotta a chiarezza la *seconda*, ec.

La cautela che consiglia il Sig. BUCHAN, di non pervenire alla quantità d' *acqua di calce* che prescrive il Dott. WHYTT, che per gradi, è favissima. Servirà in oltre a mettere il malato al caso di assicurarsi se quest' *acqua* convenga al suo *temperamento* e alla sua *costituzione*, anzi che per una dose troppo gagliarda sia divenuta dannosa. Imperciocchè buon nume-

Frattanto dopo che col tempo il malato si sarà assuefatto a questi rimedy, bisognerà che si riduca alla prima acqua di calce; e se si trovasse capace di digerirla facilmente, sarebbe d'uopo che la rendesse più forte, versandola una seconda volta sopra delle conchiglie novellamente calcinate.

L'alcali caustico, o la liscivia de' saponaj, è oggi-giorno il rimedio più in uso contro la pietra. Egli è d'una natura acerrima, e non può giammai essere amministrato che dentro alcuni liquori gelatinosi o inacillaginosi, come il brodo di vitello; il latte fresco, l'infusione di semi di lino, la soluzione di gomma arabica, o la decozione di radice di altea.

L'infermo comincerà dal prendere questo rimedio in piccola dose, come di trenta o quaranta gocci-
le, e l'aumenterà per gradi, a misura che il suo sto-
maco vi si accostumerà. Ecco come si prepara l'alca-
li caustico.

Prendete della calce viva, due oncie;
cenere di tartaro, o di potasse, un' oncia.

Mescolate queste due sostanze, e lasciatela, finchè ne sia risultata una liscivia. Bisogna che questo liquore sia feltrato esattamente, prima di farne uso. Se questi due ingredienti non si disciolgono prontamente, si può aggiungervi un po' d'acqua.

Tuttochè la liscivia de' saponaj, o l'alcali caustico, e l'acqua di calce, sieno i rimedy che fino al presen-
te sono stati riguardati come i più attivi contro la
pietra, tuttavolta ve n' esistono di assai più semplici,
come abbiamo detto qui innanzi nota 3 di questo
Cap., che in certi casi riescono validissimi, e che
per conseguenza meritano di essere tentati. S'è rica-

Alcali cau-
stico, o di-
scivia de'
saponaj. In
quale be-
vanda deb-
ba darli.

Dose.

Maniera
di prepara-
re l'alcali
caustico.

Altri ri-
medj.

to di Pratici ha osservato, che l'acqua di calce era contra-
ria alle persone che provano dell' inappetenza, che sono
soggette alla stitichezza; coloro che si trovano nell' asro-
fia, nel marasma; che anno delle disposizioni allo stato
infiammatorio; che sono soggetti all' emorragie, ec. perchè,
dice il Sig. LIEUTAUD, non si può dissimulare che ciò che
siisce in questo rimedio, non sia una sostanza corrosiva.

questa ac-
qua è con-
traria.
Perchè?

Carota
selvatica
col mele.
Decozione
di caffè sen-
za essere
adulato,
con alquan-
te gocciolo
di spirito
di nitro
dolcificato.

vato un gran beneficio dalla decozione del *danco silva-
stre*, o *carota selvatica*, addolcita col mele, nei casi
dove lo stomaco ributta l'uso delle sostanze acri e cau-
stiche. La decozione di caffè senza essere abbassolito,
presa mattina e sera, alla dose di otto o dieci on-
cie, avvalorata con alquante gocciolo di spirito di
nitro dolcificato, ha sovente recato sollievo al malato,
facendogli rendere delle quantità copiose di materia
terrestre (§).

Riflessioni
sopra le
virtù dell'
alcali cau-
stico.

(5) L'*alcali caustico*, o la *liscivia dei saponaj*, è stata
preconizzata dal Sig. BLACKERIE Medico Inglese, in un'Opera
tradotta in Francese, sotto il nome di *Recherches sur les ve-
rmedes capables de dissoudre la pierre & le gravelle*. Il Tra-
duttore, ch'è un Medico della Facoltà di Parigi, comincia
dal prevenire che vi abbisogna dello scrutinio per apprendere
in qual dose convenga somministrare questo rimedio. La virtù
alcalina di questo rimedio è la sola, secondo il Medico In-
glese, che agisce sopra la *pietra*; e il Traduttore dice espres-
samente, che la *liscivia dei saponaj neutralizzata*, vale a
dire saturata con l'*acido*, fonde altresì le *pietre*. Se n'è as-
sicurato, disciogliendo un frammento di *pietra della vescica*,
nella mescolanza di quattro cucchiain di buon aceto e di due
cucchiain di *liscivia*. Cita la guarigione perfetta del Sig. Nar-
tisse; ella si dovette al sapone e alla *limonea* del FASCIO,
ch'è un *sal neutro*, con eccesso di *acido*.

Ecco, dice a questo proposito il Sig. DE BORDEU, dell'
esperienze chimiche, che si possono riguardare come contraddi-
torie sopra lo stesso fatto, sopra lo stesso male: l'uno fonde
le *pietre*, e pretende di fonderle dentro la *vescica*, guarire,
o sollevare i *calcolosi* con una *liscivia alcalina*; l'altro fonde
le *pietre*, e pretende di fonderle dentro la *vescica*, guarire,
o sollevare i *calcolosi* con dei *sali neutri*, contenenti con un ec-
cesso di *acido*, con la *limonea*. A chi si avrà a riportarsi?
in qual classe riporre l'*acrimonia* che accompagna la forma-
zione della *pietra*? Se tutti i fatti che si annunziano sono ve-
ri, non è evidente che non devesi cercarne la spiegazione ne-
lle virtù *acide*, o *alcaline dei dissolventi*, e che queste opera-
zioni chimiche non anno luogo, o non sono di veruna con-
seguenza, di verun valore nel corpo umano?

Rimedi
più sicuri
e meno pe-
ricolosi.

Ma, soggiunge egli, poichè le nostre *acque* anno fin qui
fatto rendere più di *renella*, e sollevato più numero di *vesci-
che* che tutti i pretesi *specifici*, perchè il nostro metodo in-
nocente e niente pericoloso, non trova dei fautori, come quel-
lo che vien da paese straniero? Vi è poi tanto motivo di
preconizzare la *teoria chimica*, dopo tutte queste osservazio-

Noi non parleremo che d'un altro rimedio, ed è l' *uva ursina*.
 l' *uva ursina*: ella è stata segnatamente decantata da qualche tempo per la *pietra* e la *renella*. Questo rimedio sembra però essere per ogni conto inferiore al *sapone* e all' *acqua di calce*. Ma siccome egli è meno spiacevole, e che ha spesse volte sotto i miei propri occhi sollevato de' malati tormentati da *renella*, si può farne la prova. Questo rimedio si prende ordinariamente in polvere, alla dose di mezza dramma fino ad una, due o tre volte per giorno. Si può ancora giungere fino a sette oppure otto dramme al giorno, con tutta sicurezza. Non può egli produrre che de' buoni effetti.

Maniera di prendere questo rimedio.
 Dose.

(Da quanto ora si è detto, forza è di accordare che i veri *lisontrici*, o rimedj atti a sciogliere la *pietra* nei *reni* e nella *vescica*, sono rari. Il *sapone* e l' *acqua di calce*, l' *alcali caustico* e l' *uva ursina*, anno avuto di tempo in tempo, come lo abbiamo veduto di sopra, i loro partigiani e i loro avversari. Il Signor DE HAEN, di cui tutto il mondo conosce il sapere e la probità, è uno di quelli che ha più di tutti esaltato le virtù dell' *uva ursina*; tuttavia termina col confessare che questa pianta non merita il nome di *lisontrico*. Il Sig. PLANCHON ha però osservato che questa pianta ha guarito l' *incontinenza* d' *orina* venuta in seguito della *operazione della pietra*. Questa è una osservazione, dice egli, che ho fatto in un fanciullo. Dappoichè ebbe preso daccirca dieci in dodici dramme d' *uva ursina*, egli ritenne costantemente l' *orine*. (Ved. le *Naturisme* pag. 197.)

Qual giudizio debbasi formare dei rimedj, de' quali si è di presente favellato. Essi non sono veri *lisontrici*. Proprietà dell' *uva ursina*.

Riguardo adunque de' *lisontrici*, siamo ancora dietro all' *esperienze*, e solo dal costantemente ripeterle, si potrà pervenire alla scoperta del vero rimedio contro questo morbo crudele. Il *sapone* e li *alcali*

ni contraddittorie? Dov' è la sua certezza, poichè le nostre *acque*, che non sono nè *acide*, nè *alcaline*, producono nel caso di *calcoli* gli stessi effetti che la *liscivia* dei *saponaj*? Dov' è la necessità e l' *utilità* della sua applicazione ai fenomeni del corpo vivente? *Recher. sur les Malad. Croniq.* p. 374, e 378.

Rimedio
di Madami-
gella Ste-
phens.

caustici sembra che più si accostino alle proprietà d' un tale antidoto efficace, perciò entrano essi a comporre il rimedio di Madamigella STEPHENS, di cui daremo la composizione nella Tavola, e di cui sembra farsene attualmente minor uso in Inghilterra, sebbene se ne sieno ritratti de' gran vantaggi in quel paese, e anco in Francia. Il Sig. LIEUTAUD tra gli altri riferisce parecchi fatti, di cui, in riguardo alla di lui cognita veracità, non è permesso a chicchessia il dubitarne (6).

Non v'ha
che un Me-
dico che
possa reco-
lare l'am-
ministra-
zione dell'
uno o l'
altro di
questi ri-
medj.

Frattanto noi crediamo di poter asserire, che non v'ha che un Medico il quale possa prescrivere l'uno o l'altro di cotesti rimedj. In generale tosto che una persona si trova assalita dai sintomi soprammentovati, fa di mestieri che chiami un Medico sperimentato; il caso è troppo grave per affidarsi all'ignoranza o all'inesperienza. Si vede la maggior parte delle persone soffrire degli anni interi, non usando d' altri soccorsi che di quelli che loro suggeriscono alcune donnicciuole, le quali, com'è noto, anno de' *specifici* per ogni specie di male, ma che, come è del pari manifesto, niente valgono per guarire. Allorchè tai malati ricorrono al Medico, o al Cerusico

Disso'vente
specifico di
M. Perry.

(6) Un Cerusico Inglese, Sig. PERRY, s'è poco fa dichiarato antagonista di cotesti rimedj, in un libricciuolo intitolato: *Recherches sur le Calcul & la Gravelle*, tradotto dall' Inglese. In luogo del saponi, dei ranni, ec. propone un rimedio di sua invenzione, che chiama *dissolvante specifico*. Nomina un gran numero di persone guarite in Inghilterra, menchè di questo rimedio; e riferisce parecchie osservazioni, tra le altre quella di Lord Georgio Germaine, Secretario di Stato, e Membro del Consiglio privato di S. M. Britannica.

In un viaggio che fece l'Autore a Parigi, tentò alcune sperimente, di cui non s'è reso pubblico il risultato; ma io intesi, che due malati che avevano usato del suo rimedio, e de' quali uno era stato a bella posta in Inghilterra, per prenderlo sotto gli occhi dell'Autore, furono costretti di soggiacere all'operazione della pietra. Finchè adunque non s'abbia una somma bastevole di esperienze, è permesso di dubitare dell'efficacia di questo *specifico*. Tutto ciò che si può conchiudere fino al presente, è ch'egli ha procurato qualche sollievo a molti soggetti.

co, sono nello stato il più deplorabile, e sovente troppo deboli per sostenere l'operazione della pietra, mezzo unico per sollevarli.

La *cistotomia*, o l'operazione pel cui mezzo si trae la pietra dalla vescica, sembra essersi perfezionata quanto mai lo può essere. L'umanità farà sempre mai debitrice ai Cerusici Francesi, di averla portata al punto dove ella è oggi giorno; e se non riesce sempre, questo dipende perchè ci sono de' casi in cui la Natura non seconda il buon successo; ed è perchè la maggior parte delle volte i malati non si presentano che dopo aver troppo tardato, dopo d'essersi sfiniti per via di rimedj infruttuosi, dopo di aver lasciato sfuggire il momento dell'operazione, che il solo Medico, o il Cerusico è capace di determinare.

L'operazione della pietra fino al presente è il solo mezzo di guarire.

Non ci estenderemo nel ragguaglio dei diversi metodi di fare l'operazione della pietra. Non ve n'ha alcuno che non abbia i suoi vantaggi, e nessuno deve essere adottato ad esclusione degli altri. D'altra parte i Cerusici che si sono dedicati a fare l'operazione della pietra, li conoscono tutti, e fanno scegliere quello che prescrivono le circostanze. Tutto ciò, che possiamo dire, è che quello appellato *alto apparecchio*, sembra essere tra tutti il meno doloroso ed il più facile.

Quanto ai mezzi di preservarsi dalla renella e dalla pietra, noi rimandiamo alla regola di *vitto* che devono seguire coloro che anno motivo di temere questa malattia, per la ragione che il loro padre, o la loro madre l'anno sofferta, la qual regola di *vitto* sta esposta qui sopra, in fine del §. III di questo Cap.)

Mezzi di preservarsi dalla renella e dalla pietra.

Fine del Tomo Secondo.

SOMMARIO DE' CAPITOLI
PARAGRAFI ED ARTICOLI
DEL TOMO SECONDO.

PARTE SECONDA.

Delle Malattie.

Avvertimento del Traduttore Francese sopra il Prospetto dei Sintomi, ec. che precede la Seconda Parte.	pag. III
Prospetto dei Sintomi, che caratterizzano, e costituiscono le malattie generali interne, e gli altri mali gravi.	IX

CAPITOLO PRIMO.

<i> Osservazioni generali sopra la cognizione e la cura de' mali.</i>	pag. I
---	--------

L A Medicina non è fondata, che sopra l'osservazione e l'esperienza.	ivi
Cosa bisogna fare per acquistare la cognizione de' mali.	ivi
Non vi si può pervenire se non mediante la pratica della Medicina.	ivi
Sotto qual aspetto bisogna considerare una malattia.	2
Ragioni, che anno dettato il piano, che l'Autore segue in questa Seconda Parte.	ivi
§. I. <i>Del governo generale de' mali relativamente all'età, al sesso, alla costituzione, al carattere, all'aria, agli alimenti, alle occupazioni, ec. del malato.</i>	ivi
Prima intenzione che bisogna avere presso d'un malato.	ivi
Le malattie de' fanciulli e de' vecchi diversificano essenzialmente tra esse. Perchè?	ivi
Le femmine anno delle malattie, che gli uomini non anno, e ricercano d'essere trattate con più di precauzione.	ivi
Una persona delicata esige un governo differente da quello d'una forte, e robusta.	3
Bisogna conoscere il carattere del malato.	ivi
Perchè?	ivi

Perchè bisogna usare attenzione all'aria, che il malato

respira;

3

Agli alimenti, ch'egli usa;

ivi

Alle di lui occupazioni, alla sua maniera di vivere, ec.

ivi

§. II. Cosa bisogna fare prima di mettersi a curare una malattia.

4

Bisogna assicurarsi della natura della malattia, del tempo da cui essa dura, e di ciò che l'ha prodotta.

ivi

Perchè?

ivi

Quanto siasi esposto ad essere ingannato nelle relazioni, che gl'infermi fanno delle loro malattie.

5

Uopo è dunque di consultare non solo il malato, ma quelli eziandio, che gli stanno d'attorno.

ivi

Differenti maniere di pensare degli uomini nello stato del male, e sopra le loro malattie.

ivi

Non abbisogna nella relazione del malato, che dalla franchezza e della verità.

6

Convienne assicurarsi delle evacuazioni, della respirazione, della digestione, ec.

5

Interrogazioni che bisogna fare al malato.

6

Maniera di fare queste interrogazioni ad un adulto;

ivi

A una femmina;

7

Quando il malato è un fanciullo.

ivi

Bisogna esaminare l'esterne apparenze del malato, le sue evacuazioni, l'odore ch'egli esala, ec. Perchè?

ivi

§. III. Del visto nella cura delle malattie.

ivi

Importanza della dieta nella cura delle malattie.

ivi

Errore del popolo in riguardo a' medicamenti.

8

Conseguenze di sì fatto errore.

ivi

I rimedj non possono essere utili, se non quando sieno indicati, e amministrati con prudenza.

ivi

ART. I. Di qual specie deve essere la dieta nelle malattie in generale.

ivi

Ogni male indebolisce le forze digestive.

ivi

Eccezione a questa regola generale.

9

Dieta in una febbre cagionata da stravizzo;

ivi

Nelle febbri infiammatorie;

ivi

Nelle febbri lente, nervose, maligne, ec.;

ivi

Nelle malattie croniche;

ivi

Nello scorbutto;

10

Nella consunzione.

ivi

ART. II. Dell'aria nella cura de' mali.

ivi

Importanza dell'aria fresca, e rinnovellata nella maggior parte de' mali.

ivi

ART. III. Dell'esercizio nella cura delle malattie croniche.

ivi

L'esercizio può essere riguardato come un rimedio in molte malattie croniche.

ivi

ART. IV. Della politezza nel governo de' mali.

11

La politezza sola può sanare parecchie malattie, e in

tutte ella è utile al malato, e a coloro che lo governano.

ART. V. *Della superiorità del vitto sopra i rimedj nel governo de' mali.*

Il vitto può guarire senza rimedj, laddove i rimedj non possono riuscire, se il vitto sia negletto.

Come debbano regularsi coloro, che non anno capacità sufficiente per amministrare i rimedj.

I rimedj non possono essere amministrati da ogni sorta di persone.

CAPITOLO SECONDO.

Della febbri in generale.

Tutti gli uomini devono conoscere le cagioni delle febbri. Perchè?

Cagioni generali delle febbri.

Le febbri sono le malattie le più frequenti, e le più complicate.

Sintomi essenziali delle febbri.

La sola frequenza del polso non costituisce la febbre.

Sintomo il più frequente delle febbri.

Sintomi generali delle febbri.

Sintomi delle febbri che non assalgono, che per gradi;

Di quelle che sorprendono di primo lancio.

§. I *Delle diverse specie di febbre.*

Cosa intendasi per febbre continua;

Per febbre acuta;

Per febbre lenta;

Per febbre maligna, ec.

Pericoli che minacciano le petecchie nelle febbri. In che queste macchie differiscano dalla migliare, e dalla rosolia, ec.

Vi sono delle febbri puramente petecchiali senza essere maligne.

Cosa distingua le febbri maligne con petecchie dalle febbri puramente petecchiali.

Cosa intendasi per febbre remittente;

Per febbre intermittente.

§. II. *Governo generale delle febbri.*

Vera idea che dee formarsi della febbre.

Si potrebbero arrestare i progressi d'una febbre secondaria nei principj gli sforzi della Natura.

Qual è lo scopo che l'Autore s'è proposto nella descrizione e nella cura delle febbri.

Qual è il primo rimedio ispirato dalla Natura nelle febbri? L'acqua.

Importanza dell'acqua nella cura delle febbri e delle malattie acute.	17
I rimedj semplici sono da preferirsi ai composti, ec.	ivi
La semplicità è propria della Natura.	ivi
Sentimenti degli antichi sopra i rimedj composti, ed intorno la loro molteplicità.	18
Cosa debbasi intendere per rimedj semplici.	ivi
Effetti vantaggiosi delle bevande leggere e diluenti nelle febbri acute.	ivi
Sintomi che indicano sì fatte bevande.	19
Come si preparano queste bevande.	ivi
Importanza del riposo nel principio d'una febbre.	ivi
Effetti salutari del riposo del letto nelle febbri.	ivi
La tranquillità dello spirito non è meno di quella del corpo importante nelle febbri.	ivi
Avversione agli alimenti solidi ispirata dalla Natura nelle febbri.	20
In vece di nutrire il malato, essi non farebbero che alimentarlo la malattia.	ivi
Cosa devono essere gli alimenti, allorchè sono indicati.	ivi
I cordiali non sono capaci che di aumentare la febbre, o di produrla, quando non ci sia.	ivi
Pericoli delle confetture, de' biscottini, ec. nelle febbri.	ivi
Vantaggi dell'aria fresca nelle febbri. Ripugnanza perniciosa del popolo contro questo precetto.	ivi
Grado di calore che deve avere la camera del malato.	21
Non bisogna permettere che vi resti molta gente nella stanza del malato. Perchè?	ivi
Circostanze che indicano di dare de' cordiali, d'animare il coraggio e la speranza dell'infermo.	ivi
Su cosa sia fondata la falsa opinione del popolo, relativamente alla necessità della emissione di sangue nelle febbri.	ivi
Il carattere de' mali ha cangiato unitamente alla regola del vitto.	22
Febbri nelle quali la emissione di sangue è nociva.	ivi
Non ci sono che i sintomi d'infiammazione, che indichino il salasso nelle febbri.	ivi
La cacciata di sangue nemmeno è necessaria in tutte le febbri infiammatorie.	ivi
Malattie particolari in cui il salasso riesce mortale.	ivi
Carattere de' sintomi che indicano il salasso.	23
Quando e come bisogna favorire il sudore nelle febbri.	ivi
Pericoli del metodo ordinario di eccitare il sudore.	ivi
Malattie nelle quali unicamente si può eccitare il sudore.	ivi
Sì fatte malattie sono rarissime.	24
Pericoli dell'arrestare il sudore, qualunque volta apparsa naturalmente, sopra tutto alla fine de' mali.	ivi
Nelle febbri bisogna avere attenzione ai desiderj de' malati. Perchè?	ivi

La Natura inspira sovente il gusto pegli alimenti e pei rimedj convenevoli alla malattia.	24
Inspirazione della Natura nelle malattie del genere putrido.	ivi
Da per tutto la Natura domanda ciò ch'è a lei necessario. Esempio dei popoli del Nord e del Mezzo giorno.	25
§. III. <i>Del governo della convalescenza della febbri.</i>	ivi
Prima intenzione, che bisogna avere nella convalescenza delle febbri.	ivi
Cosa debbasi intendere per la parola Convalescenza.	ivi
Caratteri da' quali si riconosce che l'infermo è entrato nella convalescenza.	ivi
Cagioni per le quali ingannasi tutto giorno sopra i caratteri della convalescenza.	26
Non v'è alcuna vera convalescenza, quando non sia stata preceduta da una crisi.	ivi
Cosa sia la convalescenza in seguito d'una malattia trattata a tenore d'un metodo di consuetudine.	ivi
La convalescenza è in ragione della crisi nelle malattie trattate a tenore dei precetti dell' arte.	ivi
I convalescenti devono mettersi al riparo dal freddo, fare un esercizio che non stanchi, ec.	ivi
Quali devono essere i loro alimenti.	27
Bisogna che mangino poco alla volta e di sovente. Perchè?	ivi
Regole che bisogna seguire nel governo della convalescenza.	ivi

CAPITOLO TERZO.

Delle febbri intermittenti. 29

Cosa sia una febbre intermittente.	ivi
Divisione delle febbri intermittenti.	30
Cosa intendasi per febbre cotidiana;	ivi
Per febbre terzana;	ivi
Per febbre quartana;	ivi
Per febbre terzana doppia;	ivi
Per febbre quartana doppia;	ivi
Per febbri di primavera, e di autunno.	ivi
Carattere delle febbri di primavera.	31
Carattere delle autunnali.	ivi
§. I. <i>Cagioni delle febbri intermittenti.</i>	ivi
§. II. <i>Sintomi delle febbri intermittenti.</i>	32
Sintomi che annunziano l'accesso.	ivi
Sintomi dell'accesso.	ivi
Sintomi caratteristici.	ivi
§. III. <i>Regola di vitto che devono seguire i malati presi di febbre intermittente.</i>	33

Vitto durante l'acceso.	33
Le bevande devono essere calde.	ivi
Laudano liquido proposto come capace di moderare l'acceso.	ivi
Alimenti, e bevande tra gli accessi.	ivi
Avvantaggio d'un esercizio moderato tra gli accessi.	34
Queste febbri si guariscono sovente senza rimedj e colla sola regola di vitto.	ivi
Eccezione relativa a quelle dell'autunno.	ivi
Quando sia di mestiere di ricorrere ai rimedj.	ivi
§. IV. Della cura delle febbri intermittenti.	35
ART. I. Maniera di governare gli adulti.	ivi
Bisogna cominciare dai vomitivi. Perchè?	ivi
Si deve dare la preferenza all'ipecacuana.	ivi
Dose in cui bisogna dare questa radice.	ivi
Come bisogna farla prendere.	36
In qual momento conviene porgere l'emetico.	ivi
Importanza de' vomitivi nelle febbri intermittenti.	ivi
I purgativi ci sono alle volte utili.	ivi
Sintomi, che indicano i purgativi in tutte le malattie.	ivi
Ma lo sono meno, che i vomitivi.	37
Tempi di amministrarli.	ivi
Modello d'una medicina conveniente in questi casi.	ivi
Il salasso è radamente necessario nelle febbri intermittenti.	ivi
Perchè?	ivi
Suoi effetti funesti in queste febbri.	ivi
Tempi, in cui bisogna amministrarle la chinachina. Sotto qual forma, e come conviene esibirla.	ivi
Nella febbre cotidiana;	38
Nella terzana;	ivi
Nella quartana, ec.	ivi
La cura di tutte queste spezie di febbri dee essere la stessa.	ivi
La chinachina dee prendersi in gran dose, se si vuole ch'ella risani.	39
Per quanto tempo faccia d'uopo di prendere la chinachina.	ivi
Maniera di prevenire le ricadute.	ivi
Infusione amara di cui bisogna bere durante l'uso della chinachina.	ivi
Parecchie piante nostrali potrebbero guarire le febbri intermittenti.	40
Quali sono queste piante.	ivi
Tre specie di falcio. Maniera di adoperare la scorza di questi alberi.	41
Il castagno d'india. Maniera di adoperare la sua scorza.	ivi
Ciriegio silvestre. Maniera di adoperare la sua scorza.	42

Il frassino . Maniera di adoperarne la scorza .	43
Il pruno . Maniera di prescrivere la di lui scorza .	ivj
Altra maniera di prescrivere la chinachina .	41
Infusione nel vino .	42
Decozione acquosa e vinosa .	44
Cosa bisogna aggiungere alla chinachina nelle febbri intermittenti ostinate ,	ivj
Non abbisogna che di rado aggiungere altri rimedj alla chinachina .	ivj
Cosa conviene fare allorchè la chinachina purga , o produce scorrenza di ventre .	45
Attenzione che bisogna avere nelle febbri d'autunno .	ivj
Malattie nelle quali degenerano le febbri intermittenti trascurate .	ivj
Pretensioni ridicole del popolo sopra il governo di queste febbri .	ivj
Unico metodo di guarire sicuramente le malattie ,	46
La Natura guarisce i tre quarti dei mali .	ivj
Cosa debbasi intendere per la voce Malattia .	ivj
Non si devono amministrarre i rimedj se non a norma dell' indicazione della Natura ,	ivj
Pericoli dei liquori spiritosi , ec. per guarire dalle febbri intermittenti .	ivj
Oggetti disgustosi proposti come rimedj in queste febbri .	47
La chinachina è il vero specifico nelle febbri intermittenti .	ivj
Pregiudizj del popolo intorno la chinachina .	ivj
ART. II. Maniera di governare i fanciulli attaccati da febbre intermittenza .	
Mezzo di far prendere la chinachina ai fanciulli ,	48
Mistura febrifuga conveniente ai fanciulli .	ivj
Mistura salina .	ivj
Bevanda ,	ivj
Esercizio .	ivj
Aria , e alimenti .	49
Clisteri di chinachina per gli adulti ;	ivj
Per i fanciulli .	ivj
Altri mezzi di risanare i fanciulli aggravati da febbre intermittente .	ivj
§. V. Non deve assumersi l'impegno di guarirli da se stessi dalle febbri intermittenzi , quando esse sono irraggiari , o accompagnate da sintomi pericolosi .	
§. VI. Mezzi di prevenire le febbri intermittenzi .	
Rimedj preservativi delle febbri intermittenti .	ivj
L'uso continuo dei rimedj spesso ne rende vuoti gli effetti : forza è dunque il variarli , qualora si prendano come preservativi , e nelle malattie croniche .	51
Le infusioni nel vino devono essere fatte a freddo . Perchè ?	ivj
Altri	

Altri mezzi che devono praticare coloro che soggiacciono alle febbri intermittenti.	ivi
§. VII. <i>Malattie periodiche ch' esigono la cura stessa delle febbri intermittenti.</i>	53

CAPITOLO QUARTO.

Della febbre continua acuta. ivi

C Hi sono quelli, che sono esposti a questa malattia.	ivi
Cosa debbasi intendere per febbre continua acuta.	53
Divisione chimica di questa febbre.	ivi
Non v'ha che due specie di febbre continua acuta: la benigna e la maligna.	ivi
In quale stagione ella è più frequente.	54
§. I. <i>Cagioni della febbre continua acuta.</i>	ivi
§. II. <i>Sintomi della febbre continua acuta.</i>	ivi
Sintomi precursori.	ivi
Sintomi caratteristici.	ivi
Sintomi pericolosi.	55
Bisogna recare soccorso al malato come prima la malattia si dichiara. Perchè?	ivi
§. III. <i>Visto, che bisogna prescrivere a quelli, che sono presi di febbre continua acuta.</i>	56
Quali sono le indicazioni da adempierfi nella cura di questo male.	ivi
Bevande diluenti acidulate.	ivi
Siero di latte aranciato: maniera di prepararlo.	ivi
Tisana allorchè il malato è ristretto il ventre.	57
Tutte queste bevande devono essere un poco calde. Comp devono amministrarfi.	ivi
Perchè si prescrivano parecchie bevande della medesima specie.	ivi
Quali debbano essere gli alimenti del malato. Nessun brodo, nemmeno di pollo.	ivi
Prudenza, con la quale bisogna amministrare gli alimenti in questa malattia.	58
Qual' è la guida che si dee seguire nell' amministrazione degli alimenti.	ivi
Vantaggi dell' aria fresca. Cautele con le quali bisogna procurarla al malato.	ivi
Pericoli dell' aggravare il malato di coperte.	ivi
E' vantaggioso al malato d' essere di tanto in tanto sedente, o di avere la testa alzata.	59
Maniera di rinfrescare la camera;	ivi
E la bocca del malato.	ivi
Bagni de' piedi e delle mani.	ivi
Circostanze che indicano di aggiungere dell' aceto all' acqua di questi bagni.	ivi

Bisogna che il malato sia tranquillo, che non abbia compagnia, ec.	60
Bisogna, ma con prudenza, allettare il gusto e i desiderj del malato.	ivi
§. IV. <i>Rimedj che bisogna somministrare ai malati di ogni età attaccati da febbre continua acuta.</i>	ivi
Importanza della emissione di sangue in questo male.	ivi
Quando e quante volte faccia d'uopo ripeterla.	ivi
E' raro che abbisogni più di tre salassi; imperciocchè non conviene cacciar sangue fino all'estinzione della febbre.	
Perchè?	61
Preensione pericolosa di coloro che cacciano sangue per evacuare l'umore morbofo.	ivi
Idea che si dee formare della emissione di sangue.	ivi
Mistura rinfrescante che si deve prescrivere, allorchè il calore e la febbre sono assai gagliardi.	62
In che consista l'occupazione del Medico nella maggior parte delle malattie acute.	ivi
Cosa bisogna fare allorchè il malato abbia delle voglie di vomitare.	63
Allorchè il ventre è teso e stitico.	ivi
Giorno in cui si giudica la malattia: segni favorevoli;	64
Infaufti.	ivi
Momento di applicare i vescicatorj;	ivi
I senapismi;	ivi
Di porgere i cordiali.	ivi
§. V. <i>Governo della convalescenza della febbre continua acuta.</i>	65
Circostanze che indicano la chinachina.	ivi
Momento di purgare.	ivi
Medicina conveniente in questo caso.	ivi
Riflessioni sul metodo di cura che di presente s'è letto.	66
Maniera con cui comunemente si tratta la febbre acuta continua, messa in confronto	ivi
Con il metodo del Sig. Buchan.	ivi
I suoi precetti sono quegli stessi d'Ippocrate.	ivi
Metodo che seguiva il padre della Medicina nelle malattie acute in differenti gradi;	67
Nelle malattie estremamente acute.	ivi
Allorchè il cammino irregolare della Natura annunziava del pericolo.	ivi
Termine ordinario de' mali acuti.	68
Sintomi, giusta i quali egli faceva vomitare, e in qual tempo della malattia egli lo facesse.	ivi
Non purgava in tutte le malattie acute. Perchè?	ivi
In quali malattie egli purgava, e in qual tempo.	69
Eccezione a questa regola.	ivi
Conseguenze funeste della negligenza dei precetti Ippocratici.	ivi

CAPITOLO QUINTO.

Della Pleurisia vera, della Pleurisia falsa; della Parafrenitide.

69

§. I. *Della pleurisia vera, o infiammazione della pleura, o sia infiammazione di petto.*

ivi

Definizione della pleurisia vera. Come ella si divide.

ivi

Tutte le parti del corpo sono ravvolte da membrane: Noi mi ch'esse portano.

70

Il perioftio:

ivi

Il pericranio:

ivi

Le meningi:

ivi

Peritoneo:

ivi

Pleura.

ivi

Chi sono quelli che sono esposti alla pleuritide:

ivi

In qual età siavisi soggetto.

71

Chi sono quelli che ne vanno esenti.

ivi

Quelli che l'anno di già sofferta, sono soggetti al di lei ritorno.

ivi

In quale stagione ella affale.

ivi

ART. I. *Cagioni della pleurisia vera.*

ivi

ART. II. *Sintomi della pleurisia vera:*

72

Cosa sia ciò che chiamasi punta.

ivi

Caratteri del sangue nella pleuritide:

73

ART. III. *Regola di vitto che bisogna prescrivere a quelli che sono attaccati di pleuritide vera.*

ivi

Per quali mezzi la Natura cerca di liberarsi da questa malattia.

ivi

Quali sono quelli che noi dobbiamo mettere in opera.

ivi

Cosa debbasi evitare dal malato.

ivi

Qual debba essere la bevanda.

ivi

Maniera di preparar la decozione d'orzò.

ivi

Le bevande devono essere prese in piccolissima quantità alla volta, e un poco calde.

74

Bagni giornalieri de' piedi e delle mani.

ivi

ART. IV. *Rimedi della pleuritide vera convenienti a tutte l'età.*

ivi

Necessità della cacciata di sangue.

ivi

La prima emissione di sangue deve essere copiosa.

ivi

Quando e quante volte si debba ripeterla.

75

Quanto sia funesto il pregiudizio che conduce a cacciar sangue finchè la cotenna più non apparisca.

ivi

Effetti infauti dei salassi soverchiamente moltiplicati.

ivi

La sola intensità dei sintomi deve condurci a ripeterè il salasso.

ivi

Tre salassi sono bastanti.	76
Come si debba regolarli riguardo alle femmine che anno attualmente i loro flussi mensurali.	ivi
Tempo in cui bisogna desistere dal cacciar sangue.	ivi
Altri mezzi che concorrono con il salasso a diminuire la viscosità del sangue.	ivi
I fomenti ammollienti. Modo di prepararli;	ivi
Di applicarli.	77
Altra maniera di applicarli.	ivi
Altri fomenti.	ivi
Avvantaggi di questi fomenti.	ivi
Lenimento volatile con cui si strofina il lato.	ivi
Maniera di applicarlo.	ivi
La tintura di canterelle.	ivi
I fomenti secchi sono meno vantaggiosi degli umidi.	ivi
Cacciata di sangue locale con le mignatte, o con le cop- pette: loro avvantaggi.	ivi
Foglie di cavolo novello. Maniera di applicarle. Loro effetti.	78
Momento di applicare un vescicatorio, e quanto tempo bisogna lasciarlo sulla parte malata.	ivi
Bevanda che deve darsi finchè il vescicatorio resta ap- plicato.	ivi
Mezzi di lubrificare il ventre.	ivi
Sintomi che indicano i clisteri nelle malattie febbrili.	ivi
Mezzi ond' eccitare l' espettorazione.	ivi
Elettuario oleoso.	ivi
Soluzione di gomma ammoniaco.	80
Mezzi d' eccitare l' orine, e la traspirazione.	ivi
Decozione di fenega.	ivi
Quando e come bisogna prescriverla.	ivi
Importanza di questo rimedio.	81
Perchè si prescrive un certo numero di rimedj in una stes- sa malattia.	ivi
Non devono essere amministrati senza ordine.	ivi
Qual è quello che si dee seguire nelle malattie inflamma- torie e umorali.	ivi
In queste due spezie di malattia complicata insieme.	ivi
Bisogna attendere l' effetto del rimedio prescritto avanti di passare ad un altro.	82
Ordine che bisogna seguire nell' amministrazione dei ri- medj contro la pleurisia.	ivi
Legge generale per tutte le malattie acute.	ivi
Attenzione e prudenza ch' esige l' amministrazione dei rimedj.	83
Errori ne quali strascina l' orgasmo cagionato dalla crisi d' una malattia acuta.	84
Come bisogna diportarsi nell' istante della crisi.	85
Momento di purgare.	85

§. II. Della pleurisia falsa, o spuria.	84
Carattere di questa specie di pleurisia.	ivi
Chi sono quelli che ne vanno soggetti.	ivi
ART. I. Sintomi della pleuritide falsa.	ivi
ART. II. Cura della pleuritide falsa.	ivi
Come ella si guarisce.	ivi
Rimedj necessarij quando ella è ostinata.	85
§. III. Della parafrenitide, o infiammazione del diaframma.	ivi
Relazione che passa tra questa malattia e la pleuritide.	ivi
ART. I. Sintomi particolari della parafrenitide.	ivi
ART. II. Cura della parafrenitide.	86
Cosa debbasi sopra tutto prevenire in questo male.	ivi
Necessità de' clisteri molliivi.	ivi

CAPITOLO SESTO.

Delle diverse specie di peripneumonia, o infiammazione di polmone, o delle flussioni di petto.

ivi

§. I. Della peripneumonia vera, o infiammazione di polmone.

ivi

Qual'è la sede di questo male.	ivi
Chi sono quelli che ne vanno soggetti.	ivi
Come ella si divide.	87
ART. I. Cagioni della peripneumonia vera.	ivi
Elleno sono le medesime come quelle della pleuritide.	ivi
Quando si debba chiamarla pleuro-peripneumonia.	ivi
ART. II. Sintomi della peripneumonia vera.	ivi
In che differiscono da quelli della pleuritide.	ivi
La peripneumonia e la pleurisia non differiscono tra loro che per la intensità dei sintomi.	88
ART. III. Cura della peripneumonia vera per tutto l'età.	ivi
Il governo è lo stesso di quello della pleuritide.	ivi
Gli alimenti devono essere più blandi.	ivi
Importanza del siero, della decozione d'orzo, o dell'infusione di finocchio col latte.	ivi
Vapore dell'acqua calda introdotto nel petto.	ivi
Suoi effetti.	ivi
Non bisogna soffermare l'evacuazioni del ventre, allorchè non inievoliscono il malato.	ivi
Quando e quante volte si debba cacciar sangue.	89
Pericoli del salasso quando l'infermo sputa facilmente.	ivi
Perchè?	ivi
Effetti della soppressione degli sputi che cagionerebbero i salassi.	ivi

Ci sono molte polmonie che si devono trattare senza le- var sangue .	89
Osservazione .	90
Lassativi e clisteri .	ivi
Mezzi di eccitare la espettorazione .	91
La peripneumonia che non cede ai rimedj termina in as- cesso .	92
Diverse maniere di guarire sì fatti ascessi .	ivi
Segni che fanno temere che questa malattia vada a finire nella tabe .	ivi
§. II. Della peripneumonia o flussione di petto spur- via .	ivi
Caratteri di questa specie di flussione di petto .	ivi
Chi sono quei , che ne sono soggetti .	ivi
ART. I. Sintomi della peripneumonia spuria .	93
ART. II. Visto , che bisogna prescrivere nella perip- neumonia spuria .	ivi
Quali debbano essere gli alimenti ;	ivi
La bevanda .	ivi
ART. III. Rimedj che si devono prescrivere nella peripneumonia spuria .	ivi
Quando abbisogni cacciar sangue e purgare .	ivi
Il salasso è di rado necessario in questa malattia .	ivi
L'ipecacuana v'è più spesso indicata , come pure i lassati- vi e i clisteri .	ivi
Carattere degli sputi che si appellano concotti .	94
Importanza de' vescicatorj applicati per tempo .	ivi
I vescicatorj non mancano la maggior parte delle volte del loro effetto , se non perchè si applicano troppo tardi .	ivi

CAPITOLO SETTIMO.

*Delle diverse specie di tabe , e dell' atrofia o con-
funzione .* 95

§. I. Della tabe , o tifichezza propriamente detta . ivi

C aratteri della tabe . Malattie di cui ella è l'effetto .	ivi
Nomi diversi che vengono dati alla tifichezza .	ivi
Quanto sia micidiale cotesta malattia .	ivi
Chi sono quelli che ci sono i più esposti .	ivi
La tabe è più generale in Inghilterra che altrove . Per- chè ?	96
Cagioni per le quali essa diviene comune in Francia .	ivi
ART. I. Cagioni della tifichezza .	ivi
Tutte quelle della infiammazione del petto .	ivi
Malattie che possono cagionare la tifichezza .	ivi
Cagioni particolari .	97

L'aria riserrata o malfana .	97
Perchè gli artigiani che adoperano il rame , sieno soggetti alla tifichezza .	ivi
Le passioni violente , le affezioni dello spirito , ec.	ivi
Ogni spezie di evacuazione eccessiva .	ivi
La soppressione d'una evacuazione consueta ;	98
Alcuni accidenti nati da cagioni esterne . Esempio .	ivi
La soppressione della traspirazione ;	ivi
Tutti gli eccessi ;	ivi
La contagione ;	ivi
Certi mestieri e certe professioni ;	ivi
Il freddo , l'umidità ;	ivi
Gli alimenti salati e riscaldanti .	ivi
Un vizio ereditario .	ivi
ART. II. <i>Sintomi della tifichezza .</i>	99
Sintomi della tifichezza incipiente .	ivi
Sintomi della tifichezza confermata .	ivi
Sintomi dell'ultimo grado della tifichezza .	ivi
ART. III. <i>Regola di vizio , che devono seguire i tifici .</i>	100
Cangiamento d'aria .	ivi
Esercizio , e in preferenza quello a cavallo .	ivi
Regole da seguirsi nel moto a cavallo . Sua importanza e suoi effetti , quando si metta di buon'ora in opera .	ivi
Il moto a cavallo è uno specifico contro la tifichezza , qualora venga fatto nei principj , e continuato per un tempo conveniente .	ivi
Tempi della malattia , dove più non conviene .	ivi
Segni , da' quali si riconosce che il moto a cavallo reca del beneficio .	101
Ore del giorno , in cui conviene montare a cavallo .	ivi
In generale si consiglia troppo tardi il moto a cavallo .	ivi
Indifferenza de' malati per tutto ciò , che non porta il nome di rimedio .	ivi
I viaggi terrestri .	ivi
Viaggi per mare utili allora eziandio che la tifichezza è giunta al grado suo ultimo .	ivi
Provvisioni necessarie ai tifici nei viaggi marittimi .	102
Stagioni nelle quali devono intraprenderli , e verso quali climi .	ivi
Cosa debbano fare coloro che non possono viaggiare per mare .	ivi
Qual deve essere la dieta del malato .	ivi
Le diverse spezie di latte . Latte di asina . Bisogna ch'egli componga una gran parte della nutrizione .	103
Perchè di rado produca l'effetto che se ne dee attendere .	ivi
In qual tempo della malattia bisogna amministrarlo .	ivi
Il latte in generale più non conviene quando v'abbia febbre .	ivi

Di qual calore, e in quale quantità debbasi prendere il latte asirino.	104
Cosa bisogna fare quando riesce purgativo.	ivi
Non bisogna prenderlo nè caldo, nè in letto.	ivi
Latte di donna.	ivi
Osservazione sopra gli effetti eccellenti di questo latte.	ivi
Pregiudizj ridicoli sulla maniera, con cui si dee prendere il latte muliebri.	ivi
In qual tempo della giornata bisogna poppare da una nutrice.	115
Latte di burro.	ivi
In qual dose deve si prenderlo. Bisogna che il malato ne viva unicamente.	ivi
Latte vaccino. Mezzi di renderlo leggiero.	ivi
Perchè il latte non sembri sempre convenire nei principj di usarne.	ivi
Cautele da usarsi nel principio dell'uso del latte.	ivi
Bisogna il più presto possibile farne la principale sua nutrizione.	104
Non bisogna far bollire il latte, nè schiumare il mele.	ivi
Bisogna prestar attenzione al nodimento dell'animale che somministra il latte.	ivi
Piante di cui deve si pascere l'animale che somministra il latte ai tifici.	ivi
Queste piante si trovano da per tutto.	107
Alimenti, di cui deve si far uso nella tifichezza.	106
Unico vitto su cui si dee fondarsi nella tifichezza incipiente.	107
Osservazione.	ivi
Vitto allorchè le forze e il coraggio del malato sono abbattute.	ivi
Avvantaggi ricavati dall'uso dell'ostriche.	ivi
Gli alimenti e le bevande devono prendersi in piccola quantità alla volta. Perchè?	109
Avvantaggi dell'allegria, della musica, ec. nella tifichezza.	ivi
ART. IV. Governo che devono seguire i malati ne' differenti gradi di tifichezza.	ivi
Rimedj del primo grado di tifichezza.	ivi
Con quali cautele si deve prescrivere il salasso nella tifichezza.	ivi
Pillole pettorali incidenti.	110
Latte ammoniacale.	ivi
Mistura calmante.	ivi
Pericoli de' rimedj oliosi e balsamici.	ivi
Soli rimedj che si possono esibire contro la violenza della tosse.	111
Vantaggi degli acidi vegetabili.	ivi
Infusioni delle piante amare.	ivi

Bevanda allorchè il malato sputa sangue.	111
Vantaggi della conserva di rose presa in gran dose.	112
<i>Rimedj del secondo grado di tifichessa.</i>	112
Chinachina.	112
Maniera di amministrarla.	112
Elettuario di chinachina che si dee porgere allorchè ella muove il ventre presa in polvere.	112
Maniera di prendere questo elettuario.	112
Infusione di chinachina nell'acqua fredda, allorchè non si può prenderla in sostanza.	113
Maniera di fare e di prendere questa infusione.	113
La chinachina è contraria allorchè ci sono de' sintomi d' infiammazione.	113
Parimente quando la costituzione del soggetto è disposta a sì fatti sintomi.	113
Vantaggi dell'acque di Bonnes.	113
Rassegnazione e pazienza per parte del malato.	114
Condiscendenza per parte del Medico.	114
Vescicatorio e fontanella.	114
Vantaggi di questi due rimedj.	114
Cosa bisogna fare allorchè si sia accertato che v'abbia un ascesso dentro il petto.	114
Cosa indichi la esistenza di questo ascesso.	114
Cosa sia che si chiama vomica.	115
Sintomi della vomica.	115
Accidente che accompagna talvolta la rottura della vomica.	115
Cautele che bisogna usare in questo caso.	116
Segni che danno qualche speranza di guarigione.	116
Vitto e rimedj che bisogna prescrivere allorchè il malato avanza verso la guarigione.	116
Quanto tempo dee durare la regola del vitto.	116
Errore che si commette in questo proposito.	116
Osservazione.	116
Cosa bisogna fare allorchè la vomica scoppia nell'interiore del petto.	117
§. II. <i>Della tifichessa sintomatica.</i>	117
Uopo è in questa spezie di tifichessa cominciare dal guarire la malattia che l'ha cagionata.	117
Cosa sia da farsi allorchè ella dipenda dalle evacuazioni eccessive.	118
Consigli alle madri che inciampano in questo male dal porgere a poppare troppo a lungo.	118
Riflessioni sopra questo consiglio.	118
La tifichessa non è che di rado cagionata dall'allattamento.	118
Malattie di cui l'allattamento è il rimedio.	119
La Natura non prescrive legge giammai che adempiere non si possa.	119

410	Sommario de' Capitoli,	
Le femmine incinte proposte in esempio.		119
Prove che le femmine devono elleno stesse nutrire i loro bambini.	<i>ivi</i>	
§. III. <i>Dell' atrofia, o sifischezza nervosa.</i>	<i>ivi</i>	
Carattere di questo male.	<i>ivi</i>	
Chi sono quelli che ci sono esposti.	110	
Cura da usarsi in questo male.	<i>ivi</i>	
Vitto.	<i>ivi</i>	
Rimedi: chinachina, genziana, camomilla, ec.	<i>ivi</i>	
Elisire di vitriolo.	<i>ivi</i>	
Vino acciaiato.	<i>ivi</i>	
Maniera di prepararlo;	111	
Di prenderlo.	<i>ivi</i>	
Importanza de' divertimenti, del moto a cavallo, de' viaggi, ec.	<i>ivi</i>	
Della continenza la più rigorosa.	<i>ivi</i>	
Il primo de' rimedi in una malattia è di fuggire la cagione che le ha dato nascimento.	<i>ivi</i>	
§. IV. <i>Mezzi di preservarsi dalle diverse spezie di sifischezza e dalla atrofia.</i>	112	
I preservativi di queste spezie di mali sono l'esercizio, l'aria buona, e la sobrietà.	<i>ivi</i>	

CAPITOLO OTTAVO.

	<i>Delle febbri lente, o nervose.</i>	113
P Erchè queste febbri sono oggidì sì comuni, e chi sono quelli che ci sono i più esposti.	<i>ivi</i>	
§. I. <i>Cagioni delle febbri lento-nervose.</i>	113	
Le passioni affittive, i travagli dello spirito, gli alimenti insalubri;	<i>ivi</i>	
L'aria umida, riserrata e malsana;	<i>ivi</i>	
Le evacuazioni eccessive;	<i>ivi</i>	
La soppressione della traspirazione;	<i>ivi</i>	
L'irregolarità nel vitto;	<i>ivi</i>	
La intemperanza carnale, l'onanismo, ec.	<i>ivi</i>	
§. II. <i>Sintomi delle febbri lento-nervose.</i>	114	
Sintomi precursori.	<i>ivi</i>	
Sintomi caratteristici.	<i>ivi</i>	
Sintomi, che annunziano una crisi favorevole.	<i>ivi</i>	
Sintomi insauti.	<i>ivi</i>	
§. III. <i>Vitto da prescriversi a coloro, che sono afflitti da febbre lento-nervosa.</i>	115	
Il malato deve essere tenuto frescamente e tranquillo.	<i>ivi</i>	
Perchè?	<i>ivi</i>	
Bisogna sostenere il di lui coraggio, e lusingarlo colla speranza di guarire.	<i>ivi</i>	
La dieta deve essere nutritiva e cordiale.	<i>ivi</i>	

Bevanda .	125
Importanza del vino in questa malattia .	ivi
Si dee preferire il vino di Bordeaux vecchio .	126
Bisogna guardarsi dal troppo riscaldare il malato .	ivi
§. IV. <i>Rimedi che bisogna prescrivere nelle febbri lente-nervose .</i>	ivi
Ipecacuana . Quando abbisogni ripeterla .	ivi
Importanza de' vomitivi in questa malattia .	ivi
Purgativo per coloro che non vorranno prendere l'emetico .	127
Maniera di manipolare questo purgante .	ivi
Confronto tra il governo delle febbri infiammatorie con quello che conviene nella febbre lenta-nervosa .	ivi
La cacciata di sangue è assolutamente contraria a questa malattia, sebbene per qualche riguardo ella sembra indicata .	ivi
Nuova prova della necessità di stare attentissimi ai sintomi caratteristici delle malattie . Errore in cui strascina la negligenza di questo precetto .	128
Osservazione .	ivi
I vescicatorj ci sono necessarij .	129
Dove debbanli applicare .	ivi
Bisogna mantenere lo spurgo de' vescicatorj finchè il malato sia fuori di pericolo .	ivi
Avvantaggi de' vescicatorj in questo male .	ivi
In qual tempo del male si debbano applicare .	ivi
Maniera con cui agiscono i vescicatorj .	ivi
Pregiudizj del popolo circa i vescicatorj .	130
Vera idea che si dee formarli de' vescicatorj .	ivi
Cosa bisogna fare allorchè il malato è stitico ;	ivi
Allorchè è troppo lubrico ;	ivi
Allorchè sopraggiunga una eruzione migliare .	131
Rimedi indipendentemente dai vescicatorj e dai cordiali ,	ivi
Bocconcino per quando il malato è debolissimo .	ivi
Polvere nello stesso caso .	ivi
Cosa si dee somministrare allorchè il malato abbia il singhiozzo , ec. Il muschio solo .	ivi
Il muschio combinato con la canfora e il sal volatile di corno di cervio .	132
Allorchè la febbre diviene intermittente , la chinachina in sostanza ;	ivi
In infusione .	ivi
Altra maniera di amministrare la chinachina .	ivi
In quante spezie di febbre si può amministrare la chinachina .	ivi
In tutte quelle dove la cagione è una degenerazione d'umori .	133

CAPITOLO NONO.

Della febbre maligna, putrida, porporina, o petecchiale. ivi

Questa febbre può essere chiamata la febbre pestilenziale di Europa. Perchè? ivi

Perchè si dia cotesta denominazione alla febbre putrida, porporina, o petecchiale. ivi

Chi sono quelli che vanno più sottoposti alla febbre maligna. 134

Cosa debbasi intendere per febbre maligna. ivi

§. I. *Cagioni della febbre maligna, putrida, porporina, o petecchiale.* ivi

L'aria malsana; ciò che la rende comune nelle prigioni, negli spedali, infermerie, ec. ivi

Le sostanze animali conservate troppo a lungo: 135

Osservazione. ivi

Le biade guaste, l'acqua stagnante: ivi

I cadaveri in putrefazione: ivi

La immondezza: ivi

Le affezioni dell'anima: ivi

La principal sede della febbre maligna è dentro i nervi. ivi

La contagione. ivi

Non v'è che coloro i quali sono utili al malato che debbano accostarsigli. ivi

§. II. *Sintomi della febbre maligna, putrida, porporina, o petecchiale.* ivi

Sintomi precursori. ivi

Sintomi caratteristici. ivi

Ciò che distingue le febbri maligne da quelle che sono puramente infiammatorie: 136

Dalle febbri lente, o nervose. ivi

Questa distinzione è talora difficilissima da farsi. ivi

Come bisogna condursi in tal caso. ivi

Le febbri infiammatorie, e nervose possono convertirsi in maligne. 139

Non è facile di fissare la durata delle febbri maligne. ivi

La loro durata è relativa all'età del malato. ivi

Esse sono meno lunghe presso de' vecchi. ivi

Più lunghe, ma meno pericolose presso i giovani. ivi

Sintomi favorevoli. ivi

Sintomi di pericolo. 140

Sintomi mortali. 141

§. III. *Visto, che bisogna prescrivere ai malati attaccati da febbre maligna, putrida, porporina, o petecchiale.* ivi

Scopo che dee proporsi in questo male. ivi

Bisogna cominciare dal procurare al malato un'aria pura e fresca ;	147
Aspergere la camera , il letto , ec. con de' succhi acidi ;	iv2
Ovvero ridurli in vapori .	148
Farli fiutare dal malato .	iv2
Vantaggi di sì fatti vapori .	iv2
Utilità delle piante di odore acuto .	iv2
Bisogna che l' infermo stia agiatamente , e che niente lo importuni .	iv2
Le bevande , e gli alimenti devono essere acidulati .	iv2
Bevanda allorchè il malato è assai sfinite , e che ha la scorrenza di ventre .	iv2
Allorchè sia stitico .	iv2
Infusione di fiori di camomilla acidulata .	148
Quali debbano essere gli alimenti .	iv2
E' importante di dare frequentemente da bere e da mangiare al malato .	iv2
Cosa debbasi fare allorchè v'abbia il delirio .	iv2
Fomenti de' fiori di camomilla , o di chinachina . Loro vantaggi in questo caso .	iv2
§. IV. Rimedj , che si devono amministrarre nella febbre maligna putrida , porporina , o petecchiale .	148
Vomitivo nel principio . Clisteri , e lassativi .	iv2
I vescicatorj non devono essere applicati che negli ultimi estremi di questo male . Sintomi che li indicano .	iv2
Cosa v'è da temersi per parte de' vescicatorj : sono da preferirsi i senapismi .	iv2
Cosa sia la cancrena ed il sfacelo .	iv2
Eccezione a questa regola .	148
Cautele con le quali bisogna dare l'emetico .	148
Opinione falsa che si ha della virtù de' cordiali e degli aleffisfarmaci in questo male .	iv2
Cosa debbasi pensare di questa classe di rimedj .	iv2
Non ve n'ha alcuno superiore al buon vino , ch'è il migliore de' cordiali .	iv2
Di quale importanza sia la chinachina in questa malattia .	iv2
Maniera di amministrarla .	147
Allorchè il malato abbia uno scioglimento notabile di ventre .	iv2
Utilità degli acidi in questo caso .	iv2
Cosa bisogna fare allorchè il malato è tormentato da svogliatezze e da vomito .	iv2
Allorchè viene annunziato un ascesso alle parotidi .	148
Segni che indicano che un ascesso è maturo .	iv2
Rimedj che bisogna prescrivere per agevolare la guarigione delle ulcere cagionate da questo male .	iv2
§. V. Maggi di prevenir , e di ripararsi dalla febbre maligna , putrida , porporina , o petecchiale .	149

Vitto preservativo della febbre maligna.	140
Quanto sia importante di fuggire il contagio.	ivi
Come bisogna regolarfi onde impedire che il malato non la comunichi.	ivi
Cosa debbano fare coloro che temono d'essere infetti di contagione.	ivi
I salassi e i purganti sono pericolosi in questo caso.	150
Idea falsa che si ha ordinariamente dei preservativi.	ivi
Cosa debbasi intendere per questa sorta di rimedj.	ivi

CAPITOLO DECIMO.

Della febbre migliare.

D Onde questa malattia tragga il suo nome.	ivi
Paesi dove si osserva più frequente.	ivi
Di qual colore sieno le pustole.	ivi
Su qual parte del corpo sieno più abbondanti.	ivi
Questa malattia è talvolta essenziale, ma più spesso sintomatica.	ivi
Chi sono quelli che ci sono i più esposti.	152
Ella è più ordinaria alle femmine, massimamente nel tempo del parto.	ivi
§. I. <i>Cagioni della febbre migliare.</i>	ivi
Cagioni di questa malattia presso le donne di parto.	ivi
§. II. <i>Sintomi della febbre migliare.</i>	153
Sintomi precursori.	ivi
Sintomo patognomonico dell'eruzione futura.	ivi
Presso le femmine di parto.	ivi
Sintomi dell'eruzione.	ivi
In qual tempo della malattia l'eruzione comparisce e disparisce.	154
Sintomi pericolosi.	ivi
Caratteri delle pustole migliari presso le femmine dopo il parto.	ivi
§. III. <i>Vitto, che bisogna prescrivere ai malati affetti da febbre migliare.</i>	ivi
Scopo che si dee proporre in tutte le febbri eruttive.	ivi
Non conviene tenere troppo caldo il malato.	155
Alimenti.	ivi
Bevanda allorchè il malato non è punto infievolito;	ivi
Allorchè egli si trova estremamente abbattuto;	ivi
Allorchè la malattia s'accosta alla febbre maligna.	ivi
Cosa indichi i clisteri ammollienti.	ivi
Importanza della regola di vitto temperato in questa malattia, comprovata da una osservazione.	ivi
§. IV. <i>Rimedj, che si devono somministrare nella febbre migliare.</i>	156

Essi sono poco necessarij allorchè il vitto è ben diretto.	156
Circostanze che indicano i cordiali, e i vescicanti.	ivi
Maniera di amministrarre il vino.	ivi
I vescicatorj.	157
La cacciata di sangue per l'ordinario contraria in questa malattia, anche alle femmine di parto.	ivi
I malati difficilmente tollerano le evacuazioni. Perchè?	ivi
Cautele ch'esige il governo di questa malattia presso le femmine dopo il parto.	ivi
Cosa bisogna fare allorchè la malattia porta in lungo.	ivi
Quando abbisogni purgare.	158
§. V. Mezzi di preservarsi dalla febbre migliare.	ivi
Maniera onde le femmine incinte devono condursi per prevenire questo male.	ivi
Osservazione sopra i mezzi di prevenirlo presso le femmine dopo il parto.	ivi
Gli errori che si commettono nel vitto delle femmine che sono di parto, procedono dall'idea falsa che s'è formata del parto.	159
Importanza del vitto temperato e rinfrescante presso le femmine dopo il parto.	ivi

CAPITOLO UNDECIMO.

Della febbre remittente. 160

D Onde deriva il nome che porta questa spezie di febbre.	ivi
Caratteri della febbre remittente.	ivi
§. I. <i>Cagioni della febbre remittente.</i>	161
Chi sono i più esposti alla febbre remittente.	ivi
§. II. <i>Sintomi della febbre remittente.</i>	ivi
E' impossibile di descrivere tutti i sintomi, a cagione della loro estrema varietà.	ivi
Questa febbre si mostra sovente sotto l'aspetto delle febbri biliose, nervose, e maligne.	162
Massimamente quando ella è irregolare.	ivi
La febbre remittente regolare rassomiglia alle intermitenti.	ivi
Ella non è più da temersi, ma l'irregolare è pericolosa.	ivi
§. III. <i>Regola di vitto che bisogna seguire in una febbre remittente.</i>	163
Egli dee essere relativo ai sintomi. Diluente nei casi d'infiammazione, e corroborante nei casi di malignità, ec.	ivi
In tutti i casi bisogna che il malato sia tenuto frescamente, con pulitezza, e in istato tranquillo.	ivi

416	<i>Sommario de' Capitoli,</i>	
Ragioni per le quali si ripetono sì spesse volte i medesimi avvisti.		163
§. IV. <i>Rimedi che devono prendere coloro che sono attaccati da una febbre remittente.</i>		164
Mezzi di rendere il progresso di questa febbre regolare.		
La missione di sangue, purchè ella sia indicata.		ivi
Un vomitivo v'è molto più necessario.		ivi
Ipecacuana.		ivi
Pozione emetica.		ivi
Riflessioni sopra l'emetico.		ivi
Ragioni per cui non si dee adoperarlo che con cautela.		165
L'ipeacuana è più sicura.		ivi
Maniera di adoperare l'emetico, allorchè le circostanze lo domandano assolutamente.		ivi
Clisteri e lassativi blandi.		ivi
Chinachina allorchè la febbre s'è resa intermittente regolare.		ivi
§. V. <i>Mezzi di preservarsi dalla febbre remittente.</i>		166
Preservativi.		ivi
Chinachina nelle contrade dove questa febbre è epidemica.		ivi
Tabacco nello stesso caso.		ivi

CAPITOLO DUODECIMO.

Del vajuolo, e della inoculazione. ivi

§. I. *Del vajuolo.* ivi

P oche persone si trovano che non soccombano a questa malattia.	ivi
In quale stagione ella sia più frequente; e chi ci sono i più soggetti.	ivi
Si divide in discreto e in confluyente.	ivi
Cosa debbasi intendere per questi termini.	ivi
Queste differenze non sono che de' gradi della medesima malattia.	167
Altra divisione del vajuolo.	ivi
ART. I. <i>Cagioni del vajuolo.</i>	ivi
Il contagio è la cagione la più frequente del vajuolo.	ivi
ART. II. <i>Sintomi del vajuolo.</i>	168
Sintomi forieri.	ivi
Sintomi dell'eruzione vicina.	ivi
Tempo in cui le pustole cominciano a comparire.	169
Caratteri ch'esse anno da prima.	ivi
Ciò che rende i sintomi favorevoli.	ivi
Regola dell'eruzione nel vajuolo benigno.	ivi
Caratteri favorevoli delle pustole;	ivi

In

Infauti e pericolosi.	169
Egli è un segno cattivo allorchè sono in gran numero sopra la faccia.	ivi
La febbre non cede dopo la eruzione del vajuolo confluyente e di pravo carattere.	ivi
Sintomi i più pericolosi.	170
Tempo dell'enfiagione del viso e dell'altre parti. Ordine con cui ciò dee seguire.	ivi
ART. III. <i>Regola di vitto che si dee prescrivere ai malati attaccati dal vajuolo.</i>	171
Condotta pericolosa che si tiene ordinariamente nei primi giorni del vajuolo.	ivi
Le convulsioni presso i fanciulli non sono sintomi pericolosi.	ivi
Perchè?	ivi
Cosa bisogna fare durante la febbre che precede l'eruzione.	ivi
Per quanto benigno sia il vajuolo, non bisogna abbandonare il malato a' proprj capricci.	172
Malori che ne sono le conseguenze.	ivi
Pericoli nel lasciare il malato in letto, di dargli de' cordiali, ec.	ivi
Malattie nelle quali i sudoriferi sono utili.	ivi
Nell'altre riescono dannosi.	173
Perchè si usano familiarmente nel vajuolo.	ivi
Mali che cagionano.	ivi
Effetti de' cordiali e de' sudoriferi.	ivi
Errore sul quale è fondata l'opinione del popolo relativamente ai rimedj riscaldanti nel vajuolo.	ivi
Soli casi in cui il sudore è utile nelle malattie acute.	174
Le nutritici non devono tenere seco loro coricati i fanciulli compresi da vajuolo.	ivi
Osservazioni sopra i pericoli che ne risultano.	ivi
Non si dee permettere che parecchi fanciulli tocchi di vajuolo dormano insieme.	ivi
Malori che ne sono la conseguenza.	ivi
I malati infetti da vajuolo devono essere soventemente mutati di biancherie.	175
Perchè?	ivi
Quanto la sporcizia sia nociva nel vajuolo.	ivi
Utilità del cangiar ogni giorno il malato di biancherie.	
Con quale cautela bisogna farlo.	ivi
Pregiudizio del popolo intorno il vitto riscaldante.	176
Esempj che provano che si può con sicurezza esporre all'aria aperta i malati di vajuolo.	ivi
Non bisogna esporli ne' passeggi pubblici. Perchè?	ivi
Quali debbano essere gli alimenti nel vajuolo.	ivi
Quale debba essere la bevanda.	ivi
ART. IV. <i>Rimedj che si possono somministrare ai malati di vajuolo.</i>	177

Bisogna distinguere quattro tempi nel vajuolo.	177
Cosa intendasi per febbre secondaria del vajuolo.	ivi
<i>Cura del primo periodo, o tempo della febbre che precede l'eruzione.</i>	ivi
Cosa basta prescrivere ai fanciulli in questo primo tempo.	ivi
Sintomi che presso gli adulti indicano il salasso.	ivi
Vantaggi de' clisteri in questo primo periodo del vajuolo.	178
Utilità del salasso, quando sarà indicato: circostanze dove fa d'uopo ripeterlo.	ivi
Cosa sia da farsi quando v'abbiano delle voglie di vomitare.	ivi
Come si debba ajutare la suppurazione, quando le pustole cominciano a comparire.	ivi
Circostanze che indicano i cordiali.	179
E da guardarsi dal riscaldare soverchiamente il malato.	
Perchè?	ivi
<i>Cura del secondo periodo, o tempo dell'eruzione.</i>	ivi
Caso in cui il vitto rinfrescante è d'una necessità assoluta.	ivi
Caso che indica i calmanti.	ivi
Dose di questi rimedj per i fanciulli;	ivi
Per gli adulti.	ivi
Con quale prudenza si debbano amministrare nel vajuolo.	ivi
Disordini che ne sono le conseguenze, allorchè vengono esibiti mal a proposito.	180
Cosa bisogna fare nel caso di soppressione d'orina.	ivi
Importanza d'un flusso copioso d'orine nel vajuolo.	ivi
Gargarismo per nettare la bocca e le fauci.	ivi
Se il ventre è chiuso, devonfi usare de' clisteri ammollenti.	ivi
Cosa bisogna fare allorchè si presentano delle petecchie, &c.	181
Chinachina acidulata.	ivi
Dose per li fanciulli;	ivi
Per un adulto.	ivi
Felici effetti di questo rimedio esibito nel caso che sia indicato, e in dose convenevole.	ivi
Bevanda e alimenti che devono accoppiarsi all'uso della chinachina.	ivi
La chinachina è egualmente necessaria nel vajuolo cristallino. Perchè?	ivi
Vantaggi della chinachina allorchè le pustole sono depresse, &c.	ivi
La depressione istantanea delle pustole mette il malato in grave pericolo. Da che dipenda il più delle volte il fatto accidentale.	182

Non bisogna confonderè questo stato con il disparire delle pustole per via di risoluzione.	181
Cosa serve a distinguere questi due stati differenti.	ivi
Il vajuolo che termina per via di risoluzione, non è per verun conto il vajuolo volante. Caratteri di questa ultima malattia.	ivi
Sintomi del vajuolo volante.	ivi
Caratteri delle pustole.	182
Delle vestigie che restano al cader delle pustole.	ivi
Cura.	184
Cosa dev'essì prescrivere nella depressione istantanea delle pustole.	182
I vescicatorj e i cordiali.	184
Cautele ch' esige l'applicazione dei vescicatorj in questo caso.	ivi
Sintomi necessarj acciocchè sieno bene indicati.	ivi
Cosa bisogna preferire allorchè essi mancano.	ivi
La cacciata di sangue e i cataplasmi sono utilissimi in questo caso.	ivi
La depressione delle pustole è sempre un caso gravissimo ch' esige i consigli d' un Medico.	185
<i>Cura del terzo periodo, o tempo della febbre secondaria.</i>	ivi
Questo periodo è il più pericoloso.	ivi
Ordine con cui si stabilisce la suppurazione nelle pustole del vajuolo.	ivi
Tempo che dura la febbre secondaria tanto più funesto al malato, quanto più s' è custodito caldo.	ivi
Prova.	188
Uopo è di secondare gli sforzi della Natura nell' evacuazioni, ch' ella sollecita.	ivi
Avvantaggi degli acidi in questo periodo del vajuolo; anzi in tutto il corso del male.	ivi
Osservazione.	ivi
Circostanze che in questo terzo periodo esigono la cacciata di sangue;	187
Quali esigono al contrario i vescicatorj e i cordiali.	ivi
Necessità di aprire le pustole del vajuolo.	ivi
Quando e come bisogna aprirle.	188
Bisogna riaprirle, ma a misura che si riempiono.	ivi
Ragioni mal fondate, sulle quali appoggiasi per non prestarfi a questa operazione:	ivi
La quale è generale nell' Indostan.	ivi
Vantaggi di questa operazione. Scemamento de' dolori;	189
Conservamento della bellezza.	ivi
Ella non è tuttavia necessaria, se non quando il malato abbia molte pustole.	ivi

<i>Cura del quarto periodo, o della disseccazione delle pustole.</i>	189
Momento di purgare.	iv2
Non sempre conviene attendere questo tempo per purgare.	iv2
Osservazione.	iv2
Maniera di purgare i bambini;	190
I fanciulli di cinque fino a' sei anni;	iv2
I fanciulli più provetti e gli adulti.	iv2
Cosa bisogna fare allorchè sopravvengono degli ascessi;	iv2
La tosse e degli altri sintomi di tifezza;	191
L'infiammazione della gola;	iv2
Il gonfiamento e infiammazione degli occhi.	iv2
Mezzi di prevenire questi accidenti.	192
§: II. Dell' inoculazione.	iv2
Scopo dell' inoculazione.	iv2
Da qual tempo ella sia conosciuta in Europa.	iv2
Perchè l' inoculazione non è ricevuta universalmente.	iv2
Il successo degl' Inoculatori non dipende dalla loro capacità.	193
Cosa basta per riuscire.	iv2
ART. I. Esposizione de' differenti metodi d' inoculare.	194
Il successo dell' inoculazione non dipende da tale, o tal altro metodo.	iv2
Metodo semplicissimo e felicissimo d' inoculare, proceduto da una circostanza particolare.	iv2
Metodo d' inoculare in Turchia;	195
Sulle coste della Barbaria, in parecchi luoghi dell' Asia, e dell' Europa;	iv2
In Inghilterra.	iv2
Metodo d' inoculare senza far l' incisione.	iv2
Perchè si proponga cotesto metodo.	196
Suoi vantaggi superiori a quello per incisione, che può avere delle conseguenze moleste.	iv2
L' inoculazione non sarà universale, se non quando verrà praticata dai padri e dalle madri.	iv2
Tocca agli Ecclesiastici ad incitare il popolo all' inoculazione.	iv2
Quanto sia importante che i padri e le madri insegnino i loro figliuoli in età tenera.	197
ART. II. Vantaggi importanti che risultano necessariamente dall' inoculazione.	iv2
Pericoli che accompagnano il vajuolo preso per via di contagio, e che si prevengono coll' inoculazione.	iv2
A che sien esposti quelli, che non anno avuto il vajuolo.	198
Tali sono i domestici, e gli schiavi;	iv2
I Medici, i Cerusici, le femmine provette;	iv2

Una femmina incinta , quella che allatta , e lo stesso bambino ;	199
Una madre il di cui figliuolo è infetto dal vajuolo .	199
Osservazione .	199
Il vajuolo essendo una malattia epidemica , non si tratta se non di renderla la più benigna possibile ;	199
E si fatto vantaggio non si può attendere che dall'inoculazione .	199
Confronto della mortalità cagionata dal vajuolo e dall'inoculazione .	199
Obbiezione contro l'inoculazione .	200
Risposta .	199
Uno tra sette di quelli che anno il vajuolo ne muore . Non ne muore nemmeno uno tra mille di quelli che sono inoculati .	199
Quegli che non avrebbe mai avuto il vajuolo non lo soffre dall'inoculazione .	201
ART. III. <i>Quali sarebbero i mezzi da impiegarsi per rendere l'inoculazione universale .</i>	199
Bisognerebbe cominciare dal prescrivere agli Ecclesiastici di raccomandare l'inoculazione .	202
Bisognerebbe in seguito che i Medici inoculassero gratis i fanciulli de' poveri .	199
Cosa dovrebbe fare il Governo per indurre il popolo all'inoculazione .	199
Obbiezioni contro questo piano. Risposte .	203
Quante persone si salverebbero ciascun anno in Francia mediante l'inoculazione .	199
Altri mezzi proposti .	204
Primo ostacolo che si oppone ai progressi dell'inoculazione .	205
Autorità che provano che tutti gli uomini anno il vajuolo , e non lo anno più d'una sol volta in tutta la vita .	199
Ritratto terribile che frequentemente presenta questo male .	206
Conseguenze comuni del vajuolo .	199
Osservazioni che provano che gli effetti dell'inoculazione sono sì leggieri , ch'ella appena merita il nome di malattia .	207
L'inoculazione mette al coperto del vajuolo .	199
L'inoculazione non s'attacca su quelli che anno avuto il vajuolo .	210
Cagioni per cui si pretende che coloro i quali sono stati inoculati , non possano avere il vajuolo .	209
Secondo ostacolo che si oppone all'inoculazione .	206
Solo mezzo di vincere tutte le difficoltà .	209
Obbiezione tratta dal dispendio che recherà l'inoculazione . Risposta .	199

Se veruno de' mezzi proposti non può aver luogo, forza è che i padri e le madri inocolino da se stessi i loro figliuoli.	210
Esempi della facilità con la quale si fa questa operazione.	ivi
Metodo che l'Autore ha impiegato sopra il suo proprio figlio.	ivi
Quanta rassomiglianza abbia questo metodo con quello del Sig. Tronchin.	211
Bisogna che la pratica dell'inoculazione sia generale, acciocchè si risentano tutti gli avvantaggi ch'ella è capace di produrre.	ivi
ART. IV. Della preparazione all'innesto.	212
Stagioni nelle quali bisogna inoculare.	ivi
Qual'è l'età la più propria per l'inoculazione.	ivi
La costituzione debole e cagionevole non è una ragione per impedire l'inoculazione.	213
Quale debba essere la dieta de' fanciulli avanti l'inoculazione.	ivi
Bisogna purgare due o tre volte avanti d'inoculare.	ivi
D'onde dipende il successo dell'inoculatore.	ivi
Non v'è alcun pericolo, se le pustole sono scarse di numero.	214
In che consiste il gran segreto dell'inoculazione.	ivi
ART. V. Governo da praticarsi durante l'inoculazione.	ivi
Lo stesso che nel vajuolo naturale.	ivi
Importanza dei purganti dopo l'inoculazione.	ivi
V'ha del pericolo nell'inoculare coloro che anno di già avuto il vajuolo?	ivi
Osservazioni.	ivi
Quanto sia importante di prestare attenzione alle malattie regnanti, sopra tutto relativamente all'inoculazione.	216
Non bisogna inoculare allorchè non si preveda di poter far nascere il vajuolo.	ivi
Non si dee di troppo cercare di diminuire il numero delle pustole. Perchè?	ivi

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Della rosolia. 217

A ffinità della rosolia col vajuolo.	ivi
In quale stagione si manifesta la rosolia.	ivi
§. I. Cagioni della rosolia.	ivi
Il contagio.	ivi
La rosolia si divide in benigna, e in maligna.	ivi

§. II. Sintomi della rosolia.

Sintomi forieri.	217
Sintomi particolari ai fanciulli.	ivi
Tempo della malattia in cui si dichiara l'eruzione.	218
Sintomi della rosolia maligna.	ivi
Cosa distingue la rosolia dal vajuolo.	ivi
Tempo in cui l'eruzione sparisce.	219
Sintomi fastidiosi cagionati da un vitto riscaldante.	ivi
Sintomo ordinario della rosolia maligna.	ivi
Giornata la più da temersi in questo male.	ivi
Sintomi i più favorevoli.	ivi
Sintomi contrari e pericolosi.	ivi

§. III. Visto che si dee prescrivere a quelli che sono attaccati da rosolia.

Scopo da proporsi nella cura di questo male.	ivi
Vitto rinfrescante. Gli acidi non ci convengono tanto quanto nel vajuolo. Perchè?	220
Quali debbano essere le bevande.	ivi
Allorchè il ventre è restio.	ivi

§. IV. Rimedj da somministrarsi a quelli che anno la rosolia.

Circostanze che indicano la cacciata di sangue.	ivi
Bagni de' piedi.	ivi
Bisogne ajutare il vomito, allorchè si annunzia naturalmente.	ivi
Cosa bisogna fare per calmare la tosse, l'aridità delle fauci, la difficoltà del respiro.	221
Allorchè la febbre si riaccende, le macchie cominciano a impallidire.	ivi
Quando l'eruzione sparisce subitaneamente.	ivi
Allorchè si manifestano delle macchie porporine o petecchiali.	ivi
Circostanze che indicano i calmanti.	ivi
Tempo di purgare.	222
Cosa sia da farsi allorchè una smossa violenta di ventre sussista dopo la malattia.	ivi

§. V. Governo nella convalescenza della rosolia.

Quali debbano essere gli alimenti e le bevande.	ivi
Malattie che potrebbe cagionare l'aria fredda.	ivi
Cosa deesi prescrivere, se in questo tempo si dichiarino de' sintomi di tifichezza.	ivi
Si può inoculare la rosolia. Esposizione di differenti metodi di fare questa operazione.	ivi

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della febbre scarlattina.

223

P Erchè questa febbre sia così appellata.	ivi
In quale stagione ella sia comune.	ivi
Chi sono coloro che ci vanno i più sottoposti.	ivi
Come si divida questa specie di febbre.	ivi
§. I. <i>Della febbre scarlattina benigna.</i>	224
ART. I. <i>Sintomi della febbre scarlattina benigna.</i>	ivi
Quanto duri questa eruzione.	ivi
ART. II. <i>Cura della febbre scarlattina maligna.</i>	ivi
I rimedj quivi sono poco necessarij. Vitto.	ivi
Bevande.	ivi
Circostanze che indicano de' rimedj : clisteri mollitivi, nitro, e rabarbaro.	ivi
Bagni dei piedi e delle gambe. Calmanti sulla sera.	ivi
§. II. <i>Della febbre scarlattina benigna.</i>	225
La febbre scarlattina maligna è sempre pericolosa.	ivi
ART. I. <i>Sintomi che caratterizzano la febbre scarlattina maligna.</i>	ivi
ART. II. <i>Cura della febbre scarlattina maligna.</i>	ivi
Pericolo delle evacuazioni in questa specie di febbre scarlattina.	ivi
Necessità de' cordiali e degli antisettici.	226
Osservazione.	ivi

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della febbre biliosa.

ivi

C aratteri di questa specie di febbre.	ivi
In quale stagione ella sia frequente.	ivi
Pacsi dove ella è comune.	ivi
Chi ne vanno più soggetti.	ivi
§. I. <i>Cura della febbre biliosa, allorchè ella è continua.</i>	227
Circostanze che indicano la cacciata di sangue.	ivi
Vitto e rimedj.	ivi
§. II. <i>Cura della febbre biliosa, qualora sia intermittenza o remittente.</i>	ivi
Vitto e rimedj.	ivi
§. III. <i>Cura della febbre biliosa, relativamente ai sintomi predominanti.</i>	ivi

Allorchè il ventre è inobbediente;	227
Nel caso d'una scorrenza di ventre ostinata o disenterica;	228
Allorchè la pelle è infocata, e ch'ella per nulla si presti al sudore;	ivi
Allorchè si manifestano de' sintomi nervosi, putridi, ec.	ivi
§. IV. <i>Mezzi da usarsi, onde prevenire il ritorno della febbre biliosa.</i>	ivi
Uso della chinachina come preservativo.	ivi

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Della risipola, o fuoco di S. Antonio.

229

A Quali età ella sia comune.	ivi
Chi sieno quelli che ci sono esposti.	ivi
Ora è essenziale, ora sintomatica.	ivi
Qual sia la sede di questo male.	ivi
Stagioni nelle quali è più frequente.	ivi
Quante sorta di risipola ci sieno.	ivi
Cosa sia la risipola chiamata rosolia.	ivi
Cosa sia la risipola vescicolare della faccia. Vera idea che se ne dee formare.	230
§. I. <i>Cagioni della risipola.</i>	ivi
La più comune è il freddo preso dopo aver provato del calore.	ivi
§. II. <i>Sintomi della risipola.</i>	231
Ordine col quale appajono i sintomi.	ivi
Sintomi caratteristici della risipola.	ivi
Sintomi della risipola universale pustolosa.	ivi
Sintomi della risipola dei piedi.	ivi
Sintomi della risipola vescicolare della faccia.	232
Sintomi della risipola sul petto.	ivi
Sintomi favorevoli.	233
Sintomi pericolosi.	ivi
§. III. <i>Regola di vizio che bisogna prescrivere a coloro che sono attaccati di risipola.</i>	234
Bisogna che il malato non senta nè troppe caldo, nè troppo freddo. Perchè?	ivi
Cosa sia da farsi allorchè il male è leggiero.	ivi
Alimenti.	ivi
Bevanda.	ivi
Bevanda ed alimenti allorchè il male è grave.	ivi
§. IV. <i>Rimedio da prescrivere ai malati di risipola.</i>	ivi
La risipola non richiede veruna applicazione esterna.	ivi

426	<i>Sommario de' Capitoli,</i>	
Pericoli delle unzioni, degli unguenti, degl'impia-		235
stri, ec.		ivi
Dei fomenti, sebbene mollienti. Perchè?		ivi
Cautela ch' esige la cura della risipola.		ivi
Uniche applicazioni da permettersi.		ivi
Non si può cacciar sangue in questa malattia, se non con		236
riserva.		ivi
Caso in cui il salasso è necessario.		ivi
Circostanze ch' esigono i bagni ai piedi, i cataplasmi di		ivi
cipolle, o i senapismi;		ivi
I serviziali mollienti, il nitro, ed il rabarbaro;		ivi
Gli stessi purganti forti, i vescicatorj.		ivi
Quando e come convenga regularsi per eccitare la suppu-		237
razione.		ivi
Circostanza in cui bisogna somministrare la chinachi-		ivi
ma.		ivi
Sua importanza in questo caso. Dose.		ivi
Si applica ancora all' esterno in cataplasmi e in fow-		ivi
menti.		ivi
Come bisogna regularsi nella risipola scorbutica.		ivi
§. V. <i>Mezzi di preservarsi dalla risipola.</i>		238
Maniera di vivere.		ivi
Alimenti e bevande.		ivi
Bisogna evitare la stitichezza.		ivi

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Della frenitide, o sia infiammazione del cervello. ivi

Q uesta malattia è più spesso sintomatica ch' essenziale.	ivi
Quanto questa malattia sia pericolosa, allorchè è essen-	ivi
ziale.	ivi
Paesi dove ella è conosciuta, e persone che si vanno	
soggette.	239
§. I. <i>Cagioni della infiammazione del cervello.</i>	ivi
§. II. <i>Sintomi della infiammazione del cervello.</i>	240
Sintomi precursori.	ivi
Sintomi che manifestano l' infiammazione del cervello.	ivi
Sintomi caratteristici.	ivi
Sintomi pericolosi.	241
Sintomi favorevoli.	ivi
Questa malattia esige de' pronti soccorsi. Perchè?	ivi
§. III. <i>Visto da prescriversi a coloro che sono sopra-</i>	
<i>fatti da infiammazione di cervello.</i>	ivi
Quali sono l' indicazioni ch' ella presenta.	ivi
Convien allontanare dal malato tutto ciò che può distur-	
barlo, e non si dee tenerlo nè troppo caldo, nè trop-	ivi
po freddo.	

Si terrà allegro, e la sua camera non sarà nè troppo chiara, nè troppo scura.	245
Non bisogna contrariarlo, ma anzi promettergli ciò che sembrarebbe dovere essergli nocevole.	ivi
Convien in fine mettere in opra tutto ciò ch'era capace di ricrearlo, allorchè era in salute.	ivi
Quali debbano essere gli alimenti.	ivi
La bevanda.	ivi
§. IV. <i>Rimedi che si devono somministrare ai malati compresi d'infiammazione del cervello.</i>	243
Vantaggi dell'emorragia di sangue dal naso.	ivi
Mezzi di provocarla.	ivi
Cacciata di sangue alle vene jugulari.	ivi
Circostanze che esigono le sanguisughe alla tempia.	ivi
Importanza del flusso emorroidale.	ivi
Mezzi di eccitarlo: sanguisughe, clisteri irritanti, supposte.	ivi
Maniera di preparare le supposte.	244
Attenzione che bisogna avere nell'applicarle.	ivi
Bisogna ripristinare l'evacuazioni soppresse, o sostituirne dell'altre in loro luogo.	ivi
Tenere il ventre lubrico con de' clisteri, de' purganti, ec.	ivi
Radere la testa all'infermo, e irrigarla con aceto, ec.	ivi
Fargli mettere i piedi nell'acqua avvalorata coll'aceto, e prescrivere il bagno totale.	ivi
Circostanze che indicano i vescicatorj.	245

CAPITOLO DECIMOOTTAVO.

Delle differenti specie di ottalmie, o infiammazioni degli occhi.

246

§. I. Dell'ottalmia, o infiammazione degli occhi essenziale.

ivi

SEde di questo male.

ivi

ART. I. Cagioni dell'ottalmia, o infiammazione degli occhi essenziale.

ivi

Ella è talvolta epidemica e contagiosa.

247

Chi sono quelli che ne sono soggetti.

ivi

ART. II. Sintomi dell'ottalmia, o infiammazione degli occhi essenziale.

248

Conseguenze dell'ottalmia, quando sia grave.

ivi

Sintomi favorevoli.

ivi

Sintomi molesti.

ivi

ART. III. Regola di vitto, da prescriversi a colui

<i>ro, che sono presi da infiammazione degli occhi essenziale.</i>	148
Quali debbano essere gli alimenti.	149
La bevanda.	150
Bisogna che gli occhi del malato sieno al coperto da ogni oggetto luminoso, dal fummo d' ogni sorta, ec.	150
Deve restare tranquillissimo di corpo e di spirito.	150
ART. IV. <i>Rimedi da somministrarsi a coloro che sono affetti da infiammazione degli occhi essenziale.</i>	
I rimedi esterni sono più sovente nocivi che utili in questo male.	152
Il salasso è necessario: dove sia d'uopo il farlo.	152
Utilità delle mignatte applicate alle tempie o alle palpebre.	150
Mezzo facile di trarre la quantità di sangue necessaria con le mignatte.	152
Importanza de' diluenti e de' lassativi.	152
Lassativi che sono convenienti.	152
Bevande diluenti che devonfi preferire.	152
Bagni de' piedi.	152
Bisogna radergli il capo, e lavarlo con l'acqua fredda.	152
Quando e dove fa d'uopo applicare i vescicanti.	152
Giovano naturalmente, quando si mantengono aperti per qualche tempo.	152
Importanza del setone in questa malattia.	152
Maniera di farlo e di medicarlo.	152
Cosa debbasi fare, allorchè il calore ed il dolore degli occhi sono notabilissimi.	152
Circostanze che indicano i narcotici.	152
Con quali cautele bisogna amministrarli.	152
Maniera di fortificare gli occhi, dopo che l'infiammazione è dissipata.	152
Attenzione che conviene aver in ogni infiammazione degli occhi.	152
Cura dell'ottalmia cagionata da percossa ricevuta negli occhi.	152
§. II. <i>Dell'ottalmia, o infiammazione degli occhi sintomatica.</i>	
Ella è pertinace quando dipende dalle scrofole.	152
Quod che ora diceasi dell'ottalmia che dipende dalle scrofole, deesi intendere di tutte le altre infiammazioni sintomatiche degli occhi.	152
Dieta e bevanda in questo caso.	152
La chinachina è il rimedio più appropriato.	152
Maniera di amministrarla.	152
Dose.	152

<i>Paragrafi, ed Articoli,</i>	429
Bisogna continuarla per lungo tempo.	253
Etiopie minerale. Cautele con le quali deve essere amministrato, non meno che tutte le altre preparazioni mercuriali.	254
§. III. <i>Mezzi per preservarsi dall'infiammazione degli occhi.</i>	ivi
Fontanella.	ivi
Salasso e purgazione, nella primavera e nell'autunno.	ivi
Regola austera di vitto.	ivi

CAPITOLO DECIMONONO.

Della schinanzia infiammatoria, o sia infiammazione di gola; dell'angina maligna, o sia male di gola canceroso; dell'angina spuria, o sia male di gola semplice.

273

Cosa caratterizza una schinanzia.	ivi
I Medici comunemente nominano questo male, angina.	ivi
§. II. <i>Della schinanzia infiammatoria, o sia dell'infiammazione di gola.</i>	ivi
In quale stagione ella è frequente, e chi sono coloro che ci vanno soggetti.	ivi
Sede della schinanzia infiammatoria.	ivi
Maniera con cui bisogna condursi per iscoprire la sede di questo male.	256
Sovente l'ispezione non presenta niente alla vista.	ivi
ART. I. <i>Divisione della schinanzia infiammatoria.</i>	ivi
Caratteri della prima specie, che occupa la trachea.	ivi
Caratteri della seconda specie, la di cui sede è la laringe.	ivi
La terza specie occupa i muscoli dell'osso joide e della laringe. Suoi caratteri.	257
Caratteri della schinanzia della faringe, ch'è la quarta specie.	ivi
Schinanzia dell'ugola, delle tonsille, del velo del palato, ec. ch'è la quinta specie. Suoi caratteri.	ivi
Caratteri della schinanzia convulsiva; sesta specie.	258
Caratteri della schinanzia convulsiva soffocativa; settima ed ultima specie.	ivi
ART. II. <i>Cagioni della schinanzia infiammatoria.</i>	259
La contagione.	260
ART. III. <i>Sintomi della schinanzia infiammatoria.</i>	ivi

Sintomi precursori .	160
Caratteri del sangue e degli sputi .	161
Sintomi della schinanzia confermata .	162
Sintomi favorevoli .	163
Sintomi pericolosi .	164
Sintomi mortali .	165
ART. IV. <i>Visto che bisogna prescrivere a coloro che sono attaccati da schinanzia infiammatoria .</i>	
Quali vogliano essere gli alimenti e la bevanda .	166
Il malato deve custodirsi tranquillo , e guardarsi dal non parlare che a voce dimessa .	167
La sua testa dee stare elevata .	168
Cosa convenga mettergli d'intorno al collo per tenerlo caldo .	169
Mezzo praticato in Ircòzia a questo effetto .	170
Buoni effetti della gelatina di uva spina nera , o in sua mancanza , della gelatina d'uva spina rossa , o di more .	171
Vantaggi che si ritraggono dai gargarismi . Maniera di adoperarli .	172
Eccellenti effetti dei bagni ai piedi e alle gambe .	173
Mezzi d'impedire che questa malattia non divenga pericolosa .	174
Importanza dei rimedj esterni in questa malattia .	175
ART. V. <i>Rimedj da somministrarsi a coloro che sono colpiti da schinanzia infiammatoria .</i>	
Quando e dove abbisogni il salasso .	176
Riflessioni sulle copiose cacciate di sangue ed i purgativi gagliardi .	177
Idea che deesi avere della schinanzia .	178
L'emeticò dato a proposito può essere salutare .	179
Lassativi blandi .	180
Buoni effetti del cristallo minerale o del nitro purificato . Modo di servirsene .	181
Del linimento volatile .	182
Ricetta d'una specie di balsamo tranquillo pubblicato dal Sig. Chomel .	183
Maniera di adoperarlo .	184
Necessità di ben coprire il collo .	185
Rimedj decantati , ma che non meritano alcuna preferenza sopra i cataplasmi di mollica di pane e di latte .	186
Gomma guajaco in elettuario . Maniera di amministrarlo .	187
Nell'angue di considerazione fa di mestieri applicare un vescicatorio alla nuca .	188
Quanto tempo bisogna mantenere la spurgazione della piaga .	189
Cosa bisogna fare allorchè l'infiammazione passa a suppurazione .	190

Come bisogna nutrire il malato allorchè la tumefazione è tanto considerabile che impedisce affatto l'inghiottire .	269
Quando e come bisogna aprire il tumore .	269
Cosa conviene fare , allorchè la tumefazione impedisce l'inghiottire e il respirare .	269
§. II. <i>Dell'angina maligna , o sia de' mali di gola cancerosi e con ulcere .</i>	269
Persone che ci vanno soggette , e stagioni nelle quali ella si osserva più frequente .	269
ART. I. <i>Cagioni dell'angina maligna , o dei mali di gola cancerosi e con ulcere .</i>	269
La contagione .	269
Tutte le cagioni delle febbri maligne .	269
ART. II. <i>Sintomi dell'angina maligna , o sia de' mali di gola cancerosi e con ulcere .</i>	270
Sintomi precursori .	270
Sintomi ordinarj ai fanciulli .	270
Sintomi dell'interno della gola .	270
Sintomi particolari a questa malattia .	270
Sintomi caratteristici .	270
Sintomi che distinguono questa angina dalla infiammatoria .	271
Sintomi fastidiosi ;	271
Pericolosi ;	271
Favorevoli .	271
Sintomi , che persistono sovente dopo la guarigione .	271
ART. III. <i>Visto da prescriversi a coloro che sono attaccati da schizenza maligna , ec .</i>	272
Il malato deve essere tenuto in letto .	272
Quali debbano essere gli alimenti e la bevanda .	272
ART. IV. <i>Rimedi che si devono somministrare a coloro che sono travagliati da male di gola canceroso , ec .</i>	272
Quanto il governo di questa specie di angina differisca da quello della infiammatoria .	272
Qualità che devono avere i rimedi .	272
Cosa bisogna prescrivere nei principj , se vi sieno delle forti inclinazioni al vomito .	272
Gargarismo , allorchè la malattia non è perigliosa ;	272
Allorchè i sintomi sono violenti .	272
Maniera di usarlo .	272
Vapori che devonfi far ricevere dentro in bocca .	272
Cosa bisogna prescrivere , allorchè la malignità è a grado altissimo : la chinachina .	272
Maniera di amministrarla .	272
Vesicatorj : dove bisogna applicarli .	272
Cosa bisogna fare allorchè il malato è stanco dal vomitare .	272

Per il flusso di ventre.	274
Allorchè sopravviene un'emorragia di sangue dal naso.	ivi
Una stranguria.	ivi
Tempi di purgare.	ivi
Cosa abbisogna fare, allorchè il male essendo guarito, vi rimane della debolezza, dell'abbattimento, ec.	ivi
§. III. Dell'angina spuria, o sia de' mali di gola semplici.	275
Caratteri e sede de' mali semplici di gola.	ivi
ART. I. Sintomi de' mali di gola semplici.	ivi
Sintomi precursori.	ivi
Sintomi dei mali di gola semplici confermati.	ivi
Sintomi caratteristici.	276
ART. II. Cura de' mali di gola semplici.	ivi
Circostanze che indicano il falasso.	ivi
Cosa bisognerebbe fare per omettere la cacciata di sangue.	277
Negligenza che si commette nei principj di questo male e di tutti gli altri.	ivi
Cosa conviene fare allorchè il dolore non è violento.	ivi
Allorchè vi abbiano alcuni segni d'infiammazione.	ivi
Pratica perniciofa del popolo contro il gonfiamento dell'ugola.	ivi
Di parecchi altri mali di gola appellati orecchioni.	278
§. IV. Mezzi di preservarsi dalle diverse specie di angine, e di mali di gola.	ivi
Austerità di vitto.	ivi
Purgagioni spesso ripetute.	ivi
Importanza di tenerli il collo e i piedi caldi.	279
Cosa si abbia a fare allorchè dopo svanita l'infiammazione della gola, le glandule restano gonfie.	ivi

CAPITOLO VIGESIMO.

Dell'infreddatura, delle diverse specie di tosse, e del mal di castoreo. ivi

§. I Dell'infreddatura. ivi

I dea che bisogna formarli dell'infreddatura.	280
Nessuno è al coperto dall'infreddatura, e raffreddasi in tutti i climi.	ivi
ART. I. Sintomi dell'infreddatura.	281
ART. II. Regola di vitto da seguirsi quando si sia molestato da infreddatura.	ivi
Alimenti.	ivi
Bevanda.	ivi

In che debba consistere la cena.	281
Il malato dee trattenerfi in letto e al caldo.	282
Importanza del vapore d'acqua calda: maniera di adoperarlo.	ivi
Mezzi sicuri di prevenire gli effetti dell'infreddatura, se si mettesero in pratica.	ivi
A cosa espongasi, quando si trascurano.	ivi
Temerità di coloro che vogliono guarire le infreddature coi liquori spiritosi;	ivi
Con la teriaca.	283
Conseguenze fastidiose che anno le infreddature appo gli artigiani, che non vogliono sacrificare alcuni giorni al riposo:	ivi
O che sdegnano di farlo, riguardando l'infreddatura come un male troppo leggiero.	ivi
L'infreddature ammazzano più uomini che la peste.	ivi
Questo male ha le stesse conseguenze presso i viaggiatori per le stesse ragioni.	ivi
Pericoli del darfi troppo pensiero di una infreddatura.	284
Bisogna aggiungere alla regola del vitto un esercizio moderato.	ivi
Utilità dei bagni de' piedi. Grado di calore che dee avere l'acqua di questi bagni.	ivi
ART. III. <i>Rimedj da somministrarsi a coloro che sono molestati da infreddatura che non cede alla buona regola di vitto.</i>	285
Malattie che risultano da una ostinata infreddatura.	ivi
Circostanze che indicano la cacciata di sangue;	ivi
Un vescicatorio.	ivi
Pregiudizj del popolo sulla maniera di curare l'infreddature.	ivi
Non ci sono rimedj esclusivi a tale o tal altro male: i sintomi sono gl'indicanti de' rimedj.	286
ART. IV. <i>Mezzi sicuri di preservarsi dall'infreddamento.</i>	ivi
Errore di quelli che si tengono troppo al caldo per prevenire le infreddature.	ivi
§. II. <i>Delle diverse specie di tosse.</i>	287
ART. I. <i>Della tosse di petto.</i>	ivi
<i>Sintomi della tosse di petto.</i>	ivi
Quanto duri la tosse di petto.	ivi
Quali ne sieno le conseguenze fastidiose, allorchè è pertinace.	ivi
<i>Cura della tosse di petto accompagnata da febbre.</i>	288
Sintomi che indicano la cacciata di sangue;	ivi
Contraindicanti.	ivi
Vitto.	ivi
Bagni ai piedi.	ivi
Clisteri.	ivi

<i>Cura della tosse di petto senza febbre , ma accom-</i> <i>pagnata da' spuri densi e viscosi .</i>	289
Soluzione di gomma ammoniaco .	ivi
Rimedj scilittici .	ivi
Sciloppo pettorale incisivo .	ivi
<i>Cura della tosse di petto senza febbre , ma accom-</i> <i>pagnata da spuri tenui e limpidi .</i>	ivi
Rimedj addolcitivi e oliosi .	ivi
Tisana .	ivi
Elisir paregorico .	ivi
Infusione di succo di Spagna .	290
Solo caso , che indica i rimedj oliosi e mucillagginosi .	ivi
Errore che si commette tutto giorno nell'uso di questi rimedj ;	ivi
E de' morfelletti di malva, dello zucchero d'orzo , ec.	ivi
<i>Cura della tosse di petto senza febbre , ma accom-</i> <i>pagnata da umore acre .</i>	ivi
Succo di legorizia, zucchero d'orzo, morfelletti balsami- ci, il succo di Spagna , ec.	ivi
Emulsione oleosa coll'aggiunta dell'elisir paregorico , o della tintura tebaica , o del laudano .	ivi
<i>Cura della tosse di petto senza febbre , ma fomen-</i> <i>tata da umori che concorrono al polmone .</i>	291
Rimedj espettoranti e cauterio .	ivi
Empiastro di pece di Borgogna .	ivi
Utile in quasi tutte le spezie di tosse, eccetto quando v' abbia ulcerazione nel polmone .	ivi
Maniera di prepararlo, di applicarlo e di curarlo .	ivi
Acciocchè riesca, bisogna portarlo lungo tempo .	ivi
Come si rimedia al prurito che suole eccitare .	292
Cautela da usarsi quando vogliasi lasciarne l'uso .	ivi
Cosa bisogna aggiungere alla pece, acciocchè non si at- tacchi troppo fortemente alla pelle , ma che per altro vi si mantenga attaccata .	ivi
ART. II. <i>Della tosse stomacale .</i>	ivi
<i>Sintomi della tosse stomacale .</i>	293
Cosa distingue la tosse di stomaco da quella del pet- to .	ivi
Ella è più di tutto comune alle femmine delicate , ec.	ivi
Sue cagioni .	ivi
<i>Cura della tosse stomacale cagionata da materie</i> <i>raccolte dentro lo stomaco .</i>	ivi
Indicazione .	ivi
Vomitorj blandi , e purgativi amari .	ivi
Tintura sacra .	ivi
Maniera di prepararla .	294
Osservazione .	ivi
<i>Cura della tosse stomacale cagionata da debolezza</i> <i>dello stomaco .</i>	295

Chinachina .	295
Polvere stomachica .	ivi
ART. III. <i>Della tosse nervosa.</i>	296
Chi sono coloro che vanno soggetti alla tosse nervosa .	ivi
In cosa distinguesi dalla tosse stomacale ;	ivi
E dal mal di castrone appo i fanciulli .	ivi
<i>Cura della tosse nervosa negli adulti e nei fanciulli .</i>	ivi
Vitto .	ivi
Bagni dei piedi e delle mani .	297
Calmanti .	ivi
ART. IV. <i>Della tosse sintomatica.</i>	ivi
<i>Della tosse, sintomo del metter de' denti .</i>	ivi
Bisogna lubrificare il ventre, e scarificare le gengive .	ivi
Cosa sieno le scarificazioni . Loro importanza .	ivi
Momento in cui bisogna farle .	ivi
<i>Della tosse, sintomo dei vermini .</i>	298
<i>Della tosse, sintomo di gravidanza .</i>	ivi
Salasso e purgativi blandi .	ivi
<i>Della tosse, sintomo foriere della gotta .</i>	ivi
Il mezzo di guarirla è di eccitare l'accesso di gotta .	299
§. III. <i>Del mal di castrone.</i>	ivi
Fanciulli i più esposti al mal di castrone .	ivi
Cagioni .	ivi
ART. I. <i>Vitto da prescriversi nel mal di castrone .</i>	ivi
Scopo che dee proporsi nella cura .	ivi
Alimenti per i bambini .	ivi
Per coloro che sono più attempati .	ivi
Bevanda .	300
La mutazione dell'aria è un rimedio nel mal di castrone .	ivi
Egli è contagioso .	ivi
ART. II. <i>Rimedj da somministrarsi nel mal di castrone .</i>	ivi
Quando e quante volte abbisogna cacciar sangue .	ivi
I vomitorj vi sono utili . Perchè ?	301
Maniera di far prendere l'ipecacuana ai fanciulli .	ivi
Altri vantaggi de' vomitorj in questo male .	ivi
Bisogna che sieno blandi .	ivi
Sciloppo, o tintura di rabarbaro .	ivi
Dosi per i bambini ;	302
Per quelli che sono più attempati .	ivi
Altra maniera di muovere il ventre di quelli che anno difficoltà a prendere i rimedj .	ivi
Utilità del kermes minerale in questa malattia .	ivi
Come conviene esibirlo .	ivi
Circostanza dove ei conviene .	ivi
I rimedj oliosi, pettorali, ec. sono contrarj nel mal di castrone . Perchè ?	ivi

436	<i>Sommario de' Capitoli,</i>	
Millepiedi. Maniera di usarli.		303
Quando abbisogni dare de' calmanti.		ivi
L'estratto di cicuta non è superiore all'oppio.		ivi
Lenimento d'aglio con cui si stropicciano le piante dei piedi, e che si applica in empiastro.		ivi
Circostanze che lo contro-indicano.		ivi
Bagni alle gambe, ed empiastro di pece di Borgogna.		ivi
Vescicatorio.		304
Tempo di dare la chinachina e gli amari.		ivi
Dose per un fanciullo;		ivi
Per un adulto.		ivi
Rimedio che non può essere amministrato se non da un Medico.		ivi
Castoreo congiunto alla chinachina.		ivi
Dose per un fanciullo.		ivi
Ricapitolazione del governo nel mal di castrone.		ivi

CAPITOLO VIGESIMOPRIMO.

Dell' infiammazione di stomaco, e delle viscere del basso ventre. 305.

Questi mali sono perigliosi, e richiedono i più pronti soccorsi. Perchè?	ivi
§. I. <i>Dell' infiammazione di stomaco.</i>	ivi
ART. I. <i>Cagioni dell' infiammazione di stomaco.</i>	ivi
Cagioni generali della febbre infiammatoria.	ivi
Cagioni particolari.	306
ART. II. <i>Sintomi dell' infiammazione di stomaco.</i>	ivi
Sintomi caratteristici.	ivi
La colica dello stomaco n'è sovente un sintomo precursore.	ivi
Sintomi pericolosi.	ivi
ART. III. <i>Visto da prescriversi nell' infiammazione di stomaco.</i>	307
Pericoli de' cordiali in questa malattia.	ivi
Cagione ordinaria del poco buon esito nella cura dell' infiammazione di stomaco.	ivi
Pericoli de' vomitori.	ivi
Quali debbano essere gli alimenti.	ivi
Le bevande.	308
ART. IV. <i>Rimedi da amministrarsi nell' infiammazione di stomaco.</i>	ivi
Importanza della cacciata di sangue.	ivi
Perchè?	ivi
Dei fomenti.	309
Anno ad essere nè troppo caldi, nè troppe freddi.	ivi

Stropicciature sulla forcella dello stomaco.	309
Bagni dalle gambe. Mattoni caldi, o cataplasmi ai piedi.	ivi
Bagno caldo.	ivi
Importanza del vescicatorio sulla parte addolorata.	ivi
Clisteri lenienti.	ivi
Quanto sieno utili in questo male.	ivi
Non bisogna abbandonare troppo presto i rimedj, e si dee continuare la regola del vitto parecchi giorni dopo d'essere guarito.	ivi
§. II. Dell' infiammazione degl' intestini, o del basso ventre.	310
Male dolorosissimo e acutissimo.	ivi
ART. I. Cagioni dell' infiammazione del basso ventre.	ivi
Nomi differenti che porta questa malattia. Quali sono passione iliaca, enteritide, colica infiammatoria, ec.	ivi
Volvulo, colica di misere.	311
ART. II. Sintomi dell' infiammazione del basso ventre.	ivi
Sintomi particolari.	ivi
Sintomi caratteristici.	ivi
Sintomi favorevoli.	312
Sintomi pericolosi.	ivi
Sintomi mortali.	ivi
ART. III. Vitto da prescrivere a coloro che sono tocchi d' infiammazione del basso ventre.	ivi
Lo stesso che quello dell' infiammazione di stomaco.	ivi
ART. IV. Rimedj che si devono somministrare nell' infiammazione del basso ventre.	313
Importanza della cacciata di sangue.	ivi
Del vescicatorio applicato nel sito del dolore.	ivi
Dei fomenti, dei clisteri lassativi, dei bagni alle gambe, ec.	ivi
Come debbano essere composti i clisteri.	ivi
Allorchè la malattia non cede ai rimedj precedenti, bisogna far uso dei purgativi, accompagnati dai calmanti.	314
Avanti di passare a questi purgativi bisogna usare le stropicciature oleose.	ivi
Maniera di farle.	ivi
Bisogna parimenti prescrivere i bagni totali.	ivi
Osservazione.	ivi
Purgativo composto di sali amari.	ivi
Ricetta.	ivi
Dose.	315
Dose del calmante che bisogna dare nel tempo stesso.	ivi
Cosa bisogna fare per arrestare il vomito.	ivi

Allorchè il malato non può ritenere niente nello stomaco .	315
Purgante in pillole .	ivi
Dose .	ivi
Bagno totale di acqua calda .	ivi
Mezzi da tentarsi , quando disperasi di poter purgare il malato .	316
Mercurio crudo :	ivi
Utile allorchè non v'abbia luogo di temere la cancrena .	ivi
Cosa conviene fare allorchè l'infiammazione del basso ventre è cagionata da un'ernia .	ivi
Quanto sia necessario di esaminare sul principio se il malato patisca qualche rottura , e con quale attenzione bisogna fare cotesto esame .	317
ART. V. Mezzi di preservarsi dall'infiammazione del basso ventre .	ivi
Evitare la stitichezza ; Perchè ?	ivi
Le frutta acerbe , i liquori flatuosi ;	ivi
Il freddo umido .	ivi
§. III. Delle diverse specie di colica .	318
Caratteri e governo della colica in generale .	ivi
Divisione delle coliche relativamente alle loro cagioni .	ivi
Definizione del vocabolo colica . Cosa debbasi intendere per questa voce .	ivi
ART. I. Della colica flatuosa , o ventosa .	ivi
Caratteri della colica flatuosa .	ivi
Cagioni della colica ventosa .	319
Chi sono quelli che ci vanno soggetti .	ivi
Sintomi della colica ventosa .	ivi
Sintomi caratteristici .	ivi
Cura della colica ventosa .	320
Allorchè ella è cagionata dai liquori flatuosi , dalle frutta acerbe , es. devesi esibire l'acquavite .	ivi
Tenere i piedi , lo stomaco , e il ventre caldo .	ivi
Fargli su queste parti alcune strofinazioni secche .	ivi
Ma l'acquavite e i rimedj riscaldanti non convengono , se non quando la colica dipende da queste cagioni ; e ancora non bisogna adoperarli , che nei principj .	ivi
Essi sarebbero perniciosi , qualora ci fosse il menomo sintomo d'infiammazione . Come abbisogni in allora trattare il malato .	ivi
Allorchè è cagionata dagli alimenti che non sono flatuosi di loro natura , conviene dare i diluenti .	321
Allorchè dipende da sregolatezze e da indigestioni , s'intertengono l'evacuazioni , e si finisce coll'usare il rubarbaro .	ivi

Allorchè è cagionata dall'umidità dei piedi, dal freddo, ec. si esibiscono le bevande diluenti calde, ec.	321
<i>Mezzi onde preservarsi dalla colica ventosa.</i>	<i>ivi</i>
Acquavite, o liquori spiritosi. Perchè?	<i>ivi</i>
Acqua di menta col pepe.	322
ART. II. <i>Della colica biliosa.</i>	<i>ivi</i>
Qual'è la sede di questa colica.	<i>ivi</i>
Chi sono quelli che ci vanno soggetti.	<i>ivi</i>
Cagioni.	<i>ivi</i>
<i>Sintomi della colica biliosa.</i>	<i>ivi</i>
Sintomi forieri.	<i>ivi</i>
Sintomi caratteristici.	<i>ivi</i>
<i>Cura della colica biliosa.</i>	323
Salasso o clisteri.	<i>ivi</i>
Bevanda acidula.	<i>ivi</i>
Tisana lassativa.	<i>ivi</i>
Come debbano essere composti i clisteri.	<i>ivi</i>
Fomenti e semicupj.	<i>ivi</i>
Stropicciature oleose.	<i>ivi</i>
Cosa bisogna fare allorchè il vomito è ostinato.	<i>ivi</i>
Teriaca sopra la forcilla del petto.	324
E' importante di attaccare cotesto male tosto che si presenta. Perchè?	<i>ivi</i>
Osservazione.	<i>ivi</i>
<i>Mezzi di preservarsi dalla colica biliosa.</i>	<i>ivi</i>
Vegetabili teneri.	<i>ivi</i>
Lassativi acidi e rinfrescanti.	<i>ivi</i>
Marmellata di Tronchin.	<i>ivi</i>
ART. III. <i>Della colica isterica.</i>	<i>ivi</i>
Malattia peculiare alle femmine.	<i>ivi</i>
Chi sono quelle che ci vanno soggette.	<i>ivi</i>
<i>Sintomi della colica isterica.</i>	325
Sintomi caratteristici.	<i>ivi</i>
<i>Cura della colica isterica.</i>	<i>ivi</i>
Ogni specie di evacuazione è contraria in questa colica.	<i>ivi</i>
Cosa bisogna fare allorchè il vomito è considerabile.	<i>ivi</i>
Pillole fetide.	<i>ivi</i>
Tintura di castoreo.	326
Balsamo del Perù.	<i>ivi</i>
Empiastro antistenterico.	<i>ivi</i>
Gli uomini ipocondrici sono soggetti ad una colica presso poco consimile.	<i>ivi</i>
ART. IV. <i>Della colica nervosa.</i>	<i>ivi</i>
Chi sono quelli che vanno soggetti a questa malattia, e in qual paese si scopre frequentemente.	<i>ivi</i>
Nomi differenti che porta questa specie di colica.	<i>ivi</i>
<i>Sintomi della colica nervosa.</i>	327
Sintomi forieri.	<i>ivi</i>

Sintomi caratteristici.	327
Questa specie è la più dolorosa di tutte le coliche.	ivb
<i>Cura della colica nervosa.</i>	ivb
Metodo antispasmodico.	ivb
Purgativi blandi, clisteri oleosi, e fomenti.	ivb
Olio di castoreo. Dose.	ivb
Catrame internamente. Dose.	ivb
Esternamente in stropicciatura.	ivb
Metodo forte, o della Carità di Parigi.	329
Clistere di vino puro e d'olio di noce.	ivb
Clistere purgativo forte.	ivb
Emetico, teriaca, e laudano.	ivb
Purgativo in parecchi bicchieri.	ivb
Calmanti e tisana sudorifera.	330
Pozione cordiale.	ivb
Dose.	ivb
Bocconcini purganti.	ivb
Quando bisogna levar sangue.	ivb
Elettricità.	331
Cosa bisogna fare se il malato è debile dopo guarita la colica.	329
Allorchè termina in paralisi.	331
<i>Mezzi di preservarsi dalla colica nervosa.</i>	ivb
Alimenti grassi e oleosi.	ivb
Liquidi.	ivb
Sortire all'aria ed evitare la stitichezza.	ivb
Come si giunga a preservarsi nell'Indie Occidentali.	ivb
ART. V. <i>Riflessioni sopra la cura delle coliche in generale.</i>	332
Soccorsi egualmente utili in ogni specie di colica.	ivb
§. IV. <i>Dell'infiammazione dei reni, o nefritide, e della colica nefritica.</i>	ivb
Ci sono due specie di nefritide, la vera e la calcolosa.	ivb
ART. I. <i>Cagioni dell'infiammazione dei reni, e della colica nefritica.</i>	333
Chi sono quei che ci sono esposti.	ivb
ART. II. <i>Sintomi dell'infiammazione dei reni, e della colica nefritica.</i>	ivb
Sintomi comuni alle due specie di nefritide e alla colica nefritica.	ivb
Caratteri che la distinguono dalla colica biliosa.	334
Sintomi particolari all'infiammazione dei reni, o sia alla vera nefritide.	ivb
Sintomi particolari alla nefritide calcolosa, o colica nefritica.	ivb
ART. III. <i>Vitto che bisogna prescrivere nell'infiammazione dei reni, e nella colica nefritica.</i>	335
Alimenti.	ivb

Bevande.	335
Vantaggi de' diluenti presi in gran quantità, ma poco per volta.	ivi
ART. IV. <i>Rimedi che bisogna amministrare nell' infiammazione dei reni, e nella colica nefritica.</i>	ivi
Salassi nei principj: dove bisogna farli.	ivi
Mignatte.	ivi
Fomenti.	336
Clisteri mollienti, o lassativi.	ivi
Stropicciature nel caso di renella o di calcolo: diuretici blandi.	ivi
Cosa sieno gli ureteri.	ivi
Esercizio.	ivi
Conseguenze del male, allorchè non termina dentro gli otto primi giorni.	ivi
Segni che indicano la formazione d' un ascesso;	ivi
Che lo indicano formato;	ivi
Che indicano la cancrena;	ivi
Uno scirro.	ivi
Alimenti quando l' ascesso è formato.	ivi
Bevanda nello stesso caso.	ivi
Latte di burro.	ivi
Acque minerali ferruginee.	ivi
ART. V. <i>Mezzi di preservarsi dall' infiammazione dei reni, e dalla colica nefritica.</i>	ivi
Da cosa convenga astenersi.	ivi
Alimenti.	ivi
Esercizio.	ivi
Come debbano adagiarsi nel letto i malati.	ivi
§. V. <i>Dell' infiammazione della vescica.</i>	ivi
ART. I. <i>Cagioni dell' infiammazione della vescica.</i>	ivi
ART. II. <i>Sintomi dell' infiammazione della vescica.</i>	339
Sintomi caratteristici.	ivi
ART. III. <i>Cura dell' infiammazione della vescica.</i>	ivi
Dieta tenue. Bevande diluenti e rinfrescative.	ivi
Cacciata di sangue.	ivi
Fomenti.	ivi
Clisteri mollienti.	ivi
Bagni.	ivi
La soppressione d' orina, conseguenza ordinaria dell' infiammazione della vescica, può dipendere da molte altre cagioni.	ivi
Idea della cura che esigono queste cagioni.	340
§. VI. <i>Dell' infiammazione del fegato, o colica epatica.</i>	ivi
Ella è difficilissima a guarirsi. In qual modo termini il più delle volte.	ivi

ART. I. <i>Cagioni dell' infiammazione del fegato.</i>	340
ART. II. <i>Sintomi dell' infiammazione del fegato.</i>	341
Sintomi dell' infiammazione della parte convessa del fegato.	ivi
Cosa distingue questa malattia della pleuritide;	ivi
Dall' affezioni isteriche e ipocondriche.	ivi
Sintomi caratteristici.	ivi
Sintomi pericolosi.	342
Sintomi che annunziano la cancrena.	ivi
Conseguenze di questa malattia, allorchè degenera in scirro.	ivi
Maniera con cui termina l' infiammazione del fegato.	ivi
ART. III. <i>Vitto che bisogna prescrivere nell' infiammazione del fegato.</i>	343
Bevanda.	ivi
Alimenti.	ivi
ART. IV. <i>Rimedi che si devono amministrarvi nell' infiammazione del fegato.</i>	ivi
La cacciata di sangue nei quattro primi giorni.	ivi
Lassativi.	ivi
Fomenti.	ivi
Glisteri lassativi, e vescicatorj.	ivi
Diuretici.	ivi
Maniera di favorire il sudore, allorchè si presenta naturalmente.	344
Grado di calore che devono avere le bevande in tutte le infiammazioni locali.	ivi
Cosa bisogna fare se il ventre è sciolto.	ivi
Come bisogna regolarli, allorchè l' infiammazione del fegato si converte in ascesso;	ivi
In scirro. Regola di vitto che il malato dee seguire in tal caso.	345
Riflessioni sopra l' infiammazione degli altri visceri del basso ventre.	ivi

CAPITOLO VIGESIMOSECONDO.

Del morbo colera; della smossa di ventre; della diarrea; del vomito.

§. I. *Del morbo colera.* ivi

Caratteri di questa malattia.	ivi
Di quante spezie ve n' è.	346
ART. I. <i>Cagioni del morbo colera.</i>	ivi
Stagioni nelle quali questo morbo si osserva il più frequente.	ivi

ART. II. *Sintomi del morbo collera.*

Sintomi precursori.	ivi
Caratteristici.	ivi
Sintomi della malattia avanzata.	ivi
Mortali.	ivi
Sintomi peculiari del morbo collera umido.	ivi
Sintomi particolari del morbo collera secco.	348
Cosa distingue il morbo collera umido dalla diarrea biliosa e dalla dissenteria.	ivi
Non è contagioso.	ivi

ART. III. *Cura da tenersi nel morbo collera.*

Indicazioni.	ivi
Acqua di pollo a gran bicchieri, o ripetuta sovente- mente.	ivi
In clisteri ad ogni ora.	ivi
Mezzi di arrestare i vomiti. Acqua di pane: in qual guisa si prepari.	ivi
Giulebbe salino e laudano liquido.	ivi
Non bisogna tentare d'arrestare l'evacuazioni, qualora almeno non indeboliscano il malato.	ivi
Dose del laudano, e del giulebbe salino.	ivi
Siero di latte vinoso forte.	350
Bagni alle gambe. Stropicciature sulle gambe, che devono tenere calde.	ivi
Formenti spiritosi sopra lo stomaco.	ivi
Bagno totale e decozione di tamarindo.	ivi

ART. IV. *Cura del morbo collera, allorchè il ma-
le ha rimesso di sua violenza.*

Bisogna continuare il laudano dentro il vino.	ivi
Alimenti, ed esercizio.	ivi
Infusione di chinachina, o di qualsivoglia altro amaro den- tro il vino acidulato.	ivi
Per quanto sia spaventevole questo male, non bisogna perdersi di coraggio. Osservazione per prova.	351
§. II. <i>Della smossa di ventre.</i>	ivi
La smossa di ventre non è sempre una malattia.	ivi
Quando esiga della regola nel vitto.	ivi
<i>Cura della smossa di ventre.</i>	ivi
Bevanda.	ivi
Clisteri. Alimenti.	ivi
Quanto dura la smossa di ventre. Quando ella prenda il nome di diarrea.	352

§. III. *Della diarrea, o scorrenza, o flusso di ven-
tre.*

La diarrea si divide in sierosa, biliosa, colliquativa, ef- fenziale, sintomatica, e critica.	ivi
Non si tratta in questo paragrafo che dalle diaree che possono essere essenziali.	ivi
<i>Sintomi della diarrea.</i>	ivi

La diarrea spontanea non è più pericolosa che la smossa di ventre.	352
ART. I. Governo della diarrea, o scorrenza di ventre cagionata dal freddo, o dalla soppressione della traspirazione.	ivi
Custodirsi al caldo. Tisana diluente.	ivi
Bagni dei piedi e delle mani. Flanelle sulla pelle, ec.	ivi
ART. II. Cura della diarrea cagionata da soverchia copia d'umori.	ivi
Importanza del vomitorio in questo caso.	ivi
Ipecacuana.	354
Rabarbaro.	
Cibo e bevanda.	ivi
ART. III. Cura della diarrea, o scorrenza di ventre cagionata dalla soppressione d'una evacuazione consueta.	ivi
Salaffo, e allorchè non basta, evacuazioni analoghe a quelle che sono soppresse.	ivi
ART. IV. Cura delle scorrenze di ventre, o diarree periodiche.	355
Questa spezie di scorrenze di ventre non deve giammai essere arrestata. Perchè?	ivi
Osservazione.	ivi
La scorrenza di ventre periodica è vantaggiosa ai fanciulli nel tempo della dentizione.	ivi
Ella non domanda rimedj che quando loro produca de' tormini.	ivi
ART. V. Cura della diarrea cagionata dalle passioni o affezioni dell'animo.	356
Questa spezie esige molte cautele e non domanda nè vomitorj, nè purganti.	ivi
I calmanti, e gli antispasmodici sono i rimedj che convengono.	ivi
Importanza della tranquillità di cuore.	ivi
ART. VI. Cura della diarrea cagionata dalle festanze venenose.	ivi
Bisogna eccitare il vomito e il secesso: con quai mezzi.	ivi
Caso dove bisogna cacciar sangue.	ivi
Calmanti.	ivi
ART. VII. Cura della diarrea cagionata dalla gotta rimontata.	357
Rabarbaro e purgativi blandi.	ivi
Fomenti e cataplasmi per richiamare la gotta.	ivi
ART. VIII. Cura della scorrenza di ventre cagionata e mantenuta dai vermini.	ivi
Polvere di stagno, rabarbaro, e calomelano.	ivi
Acqua di calce.	ivi

ART. IX. Cura della diarrea dipendente da serie specie d'acqua.	358
Interdirsi l'uso di queste acque, o correggerle mediante la calce viva e la creta, ec.	ivi
ART. X. Cura della scorrenza di ventre cagionata dalla delicatezza dello stomaco.	ivi
Privarsi dell' esercizio violento dopo di aver mangiato.	ivi
Infusione di chinachina.	ivi
Vino.	ivi
ART. XI. Precepsi generali sulla maniera di curare una scorrenza di ventre qualunque, allorchè le cir- stanze esigono che s' arresti.	359
Regola di vivere.	ivi
Alimenti.	ivi
Bevanda.	ivi
Brodo di testa di castrato.	ivi
Epilogo dell'ordine, che bisogna seguire nella cura del- la smossa di ventre, e della diarrea o scorrenza di ventre.	ivi
ART. XII. Mezzi di preservarsi dalla diarrea, o scorrenza di ventre.	360
Evitare gli alimenti di difficile digestione, il freddo, l' umidità, le passioni violente, ec.	ivi
§. IV. Del vomito.	ivi
Il vomito non è sempre una malattia.	ivi
ART. I. Cagioni generali del vomito.	ivi
Gozzoviglie.	ivi
Materie ammassate dentro lo stomaco.	ivi
Flusso di ventre arrestato troppo subitaneamente.	361
Soppressione d'una evacuazione consueta.	ivi
Diverse specie di malattie.	ivi
Movimenti straordinari.	ivi
Passioni violente, oggetti disgustosi.	ivi
Bile dentro lo stomaco.	ivi
Malattie nervose.	ivi
Gravidanza.	ivi
ART. II. Maniera di curare il vomito cagionato dall' indigestione, o dalle sostanze venefiche.	ivi
Siccome in tal caso egli è piuttosto rimedio che male, bisogna mantenerlo.	ivi
Ipecacuana.	362
ART. III. Cura del vomito cagionato dalla gotta salita, e dalla soppressione d'una evacuazione con- sueta.	ivi
Fomenti, cataplasmi, ec.	ivi
Salasso, purgativi, bagni ai piedi e alle mani, cauterio, setone, vescicatorio, ec.	ivi
ART. II. Maniera di curare il vomito cagionato da gravidanza.	ivi

246	<i>Sommario de' Capitoli,</i>	
Piccole levate di sangue e lassativi blandi.		362
Tè; colezione in letto.		363
Vantaggio del caffè;		ivi
Dell' ostriche. Osservazione.		ivi
Tranquillità di corpo e di spirito; alimenti ripetuti so-		
ventemente; acqua fredda, o con un po' di acquavite,		
di acqua di cannella, ec.		ivi
ART. V. Cura del vomito cagionato da debolezza		
dello stomaco.		364
Chinachina nel vino col rabarbaro.		ivi
Polvere stomachica.		ivi
Elisir di vitriolo.		ivi
ART. VI. Cura del vomito cagionato da agrezza.		ivi
Magnesia alba. Dose.		ivi
ART. VII. Cura del vomito cagionato da passioni		
violente.		ivi
Nè vomitorj, nè purgativi.		ivi
Tranquillità di corpo e di spirito; allegria. Cordiali,		
laudano.		ivi
ART. VIII. Cura del vomito cagionato dalle affe-		
zioni nervose.		365
Antispasmodici. Muschio, castoreo.		ivi
Empiastro stomachico o di teriaca sulla forcilla del		
petto.		ivi
Infusione di cannella o di menta.		ivi
Stropicciature sullo stomaco collo spirito di vino raffinato		
o acquavite.		ivi
Fomenti, femicupj caldi.		ivi
Ostriche. Osservazione.		ivi
ART. IX. Mezzi sicuri di guarire il vomito, quan-		
tunque ne sia la cagione, allorchè si rende necessario		
l'arrestarlo.		366
Pozione salina.		ivi
Maniera di prepararla.		ivi
ART. X. Riflessioni sulle diverse specie di vomito,		
e sul governo ch' esigono.		ivi
Non in tutti i vomiti si devono amministrare dei ri-		
medj.		ivi
Quali sono quelli in cui sarebbero pericolosissimi.		367
Non convengono che quando i vomiti indeboliscono con-		
siderabilmente l'infermo.		ivi
Il vomito della gravidanza cessa ordinariamente da se		
nel quarto o nel quarto mese e mezzo: egli non ri-		
chiede che la regola di vitto.		ivi
Il vomito cagionato dalla debolezza dello stomaco non		
ricerca che gli amari.		ivi
ART. XI. Mezzi di prevenire il ritorno del vomito.		ivi
Vitto.		ivi
Alimenti.		368

CAPITOLO VIGESIMOTERZO.

Del flusso eccessivo d'urina, o sia diabete; dell'incontinenza d'urina; della soppressione, e della ritenzione d'urina.

368

§. I. *Del flusso eccessivo d'urina, o diabete.*

ivi

Chi sono quelli che ci vanno soggetti. ivi

ART. I. *Cagioni del flusso eccessivo d'urina.* ivi

Le acque minerali spesso lo cagionano. Perchè? ivi

ART. II. *Sintomi del flusso eccessivo d'urina.* 369

Sintomi che offrono dall'urine; ivi

Dal malato. ivi

Sintomi precursori. ivi

Quando e presso chi questa malattia è suscettibile di guarigione. ivi

ART. III. *Vitto da prescriversi a coloro che sono molestati da flusso eccessivo d'urina.* 370

Bevanda. ivi

Alimenti. ivi

Ostriche. ivi

Acque di Bristol. ivi

Acqua di calce con la scorza di quercia. ivi

Decotto bianco: colla di pesce. ivi

Esercizio moderato. ivi

Il letto del malato dee esser duro. 371

Aria secca e calda; scopette per la pelle. ivi

Flanella, empiaastro corroborante sul dorso. ivi

Cintura stretta d'intorno ai lombi. ivi

ART. IV. *Rimedi contro il flusso eccessivo d'urina.* ivi

Purgativi blandi composti di rabarbaro e di semi di cardamomo. ivi

Astringenti e corroboranti. ivi

Polvere d'Elvezio. ivi

Siero di latte alluminoso. ivi

Maniera di prepararlo. ivi

Calmanti; loro importanza in questa malattia. 372

Laudano. Dose. ivi

Corroboranti, chinachina nel vino, coll'eliffire di vitriolo. ivi

§. II. *Dell'incontinenza d'urina.* ivi

In cosa l'incontinenza d'urina differisca dal diabete. ivi

Chi sono coloro che ci vanno soggetti. ivi

ART. I. *Cagioni dell'incontinenza d'urina.* 373

ART. II. <i>Cura, dell'incontinenza d'urina.</i>	373
Nei vecchi non si può che palliare il male.	iv2
Corroboranti.	iv2
Nei fanciulli questa malattia si guarisce da se sola col tempo.	iv2
Allorchè ella è ostinata, alimenti secchi, vino, bagni freddi. Minaccie di correzione.	374
In quelli che anno la pietra.	iv2
Nelle femmine gravide ella guarisce in generale per via del parto.	iv2
Allorchè persiste, empiastro, fomenti, semicupj e lavativi corroboranti.	iv2
Acque ferruginose.	iv2
Polvere, o siero alluminoso.	iv2
I dissoluti, e i viziosi d'onanismo di rado ne guariscono.	iv2
In coloro, la vescica de' quali è paralitica.	iv2
Circostanze ch'indicano un vescicatorio sulle vertebre dei lombi.	iv2
Lenimento spiritoso.	375
L'incontinenza d'urina sintomatica si guarisce col togliere la malattia di cui è sintomo.	iv2
Cosa bisogna fare allorchè l'incontinenza d'urina resiste a tutti i rimedj appo le femmine;	iv2
Presto gli uomini.	iv2
§. III. <i>Della soppressione d'urina, o iscuria, e della ritenzione d'urina.</i>	iv2
Divisione della soppressione d'urina, o iscuria.	iv2
ART. I. <i>Sintomi della soppressione e della ritenzione d'urina.</i>	376
Sintomi dell'iscuria renale, o soppressione d'urina.	iv2
Sintomi caratteristici.	iv2
Sintomi dell'iscuria vescicale o ritenzione d'urina.	iv2
Sintomi caratteristici.	iv2
Sintomi che distinguono queste due malattie.	iv2
Come esse finiscano.	iv2
ART. II. <i>Cagioni della soppressione e della ritenzione d'urina.</i>	377
ART. III. <i>Cura della soppressione e della ritenzione d'urina.</i>	iv2
Allorchè queste cagioni sono infiammatorie.	378
Evacuazioni, fomenti e bagni.	iv2
Cacciata di sangue: suoi vantaggi in questo caso.	iv2
Sanguisughe all'ano.	iv2
Fomenti mollitivi.	iv2
Piante ammollienti applicate sul ventre.	379
Attenzione che bisogna avere quando si applicano le piante ammollienti.	iv2
Semicupio tiepido.	iv2

Cura, allorchè la ritenzione d'orina è cagionata dall'aver trattate troppo a lungo l'orine, o da alcune irregolarità con le femmine.	ivi
Dalle affezioni isteriche e ipocondriche.	ivi
Cagioni che in luogo dei rilassanti ricercano dei stimolanti, dei lenimenti spiritosi, i vescicatorj, le docciette, ec. i diuretici caldi, ec.	ivi
Cagioni che richiedono le acque di Contrexeville.	380
Cura della ritenzione d'orina cagionata dalla gravidanza ;	ivi
Dalle materie ammassate nel retto.	ivi
Sciringa.	ivi
Candeletta.	ivi
ART. IV. <i>Mezzi generali da usarsi contro la soppressione e la ritenzione d'orina, qualunque ne sia la cagione.</i>	
Purgativi blandi. Clisteri ammollienti.	381
Alimenti e bevanda.	ivi
Spirito di nitro dolce, o sapone di Alicante.	ivi
ART. V. <i>Mezzi di preservarsi dalla ritenzione e dalla soppressione d'orina.</i>	
Alimenti leggieri, bevanda diluente.	382
Nessun acido, nè vino austero; esercizio, letti duri, distrazione, ec.	ivi

CAPITOLO VIGESIMOQUARTO.


Della renella e della pietra.

D efinizione della renella ;	ivi
Della pietra.	ivi
Cosa sia l'orina.	ivi
La renella non è che il primo grado della pietra.	ivi
§. I. <i>Cagioni della renella e della pietra.</i>	383
Chi sono coloro che ci vanno soggetti.	ivi
§. II. <i>Sintomi della renella e della pietra.</i>	ivi
Sintomi particolari della renella.	ivi
Sintomi particolari della pietra.	384
Sintomo caratteristico.	ivi
Non v'è che la sciringa che possa assicurare dell'esistenza della pietra. Destrezza ch'esige l'introduzione della sciringa nella vescica.	ivi
§. III. <i>Visto che devono seguire coloro che sono travagliati da renella o dalla pietra.</i>	385
Alimenti di cui devono privarsi ;	ivi
Di cui devono far uso.	ivi
Bevanda.	ivi
Esercizio moderato.	ivi

Regola di vitto che devono seguire coloro che anno motivo di temere questa malattia, perchè i loro genitori l'anno patita.	ivi
Non bisogna che il vitto sia troppo rilassante.	ivi
Perchè?	ivi
Bisogna che l'orina sia abbondante, senza che il ventre sia troppo rilassato.	386
Mezzi da praticarsi a questo effetto.	ivi
§. IV. Rimedj che bisogna prescrivere a coloro che sono travagliati da renella o dalla pietra.	ivi
Come bisogna governare il malato in un accesso di renella.	ivi
Acqua di calce, fatta con i gusci di ostriche o di petoncoli.	387
Acque di Contrexeville.	ivi
Acque Bonnes, di Baresges, o di Cauterès.	ivi
Cura allorchè la pietra è formata dentro la vescica.	388
Sapone di Alicante e acqua di calce.	ivi
Dose.	ivi
Per quanto tempo bisogna continuare questi rimedj.	ivi
Acqua di calce seconda o terza.	ivi
Cosa intendasi per queste due spezie di acqua di calce.	ivi
Importanza di non pervenire alla dose di acqua di calce che per gradi.	ivi
Persone alle quali questa acqua è contraria.	ivi
Perchè?	ivi
Alcali caustico, o liscivia de' saponai. In quale bevanda debba darsi.	389
Dose.	ivi
Maniera di preparare l'alcali caustico.	ivi
Altri rimedj.	ivi
Carota selvatica col mele.	390
Decozione di caffè senza essere adustato, con alquante goccioline di spirito di nitro dolcificato.	ivi
Riflessioni sopra le virtù dell'alcali caustico.	ivi
Rimedj più sicuri e meno pericolosi.	ivi
Uva ursina.	391
Maniera di prendere questo rimedio.	ivi
Dose.	ivi
Qual giudizio debbasi formare dei rimedj de' quali s'è di presente favellato.	ivi
Essi non sono veri litontritici.	ivi
Proprietà dell'uva ursina.	ivi
Rimedio di Madamigella Stephens.	392
Dissolvente specifico di M. Perry.	ivi
Non v'ha che un Medico che possa regolare l'amministrazione dell'uno o l'altro di questi rimedj.	ivi

L'operazione della pietra fino al presente è il solo unico
mezzo di guarire.

Mezzi di preservarli dalla renella e dalla pietra.



Fine del Sommario del Tomo Secondo.



B.5.5.440



